四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目
北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一三六冊目次

小兒衛生總微論方二十卷　明弘治二年李延壽刻本　〇〇一

新編婦人大全良方二十四卷辨識修製藥物法度一卷
（宋）陳自明撰　元勤有書堂刻本（四庫底本）　二七〇

小兒衛生總微論方二十卷

明弘治二年李延壽刻本

小兒衛生總微論方二十卷（大學士英廉家藏本）

不著撰人名氏。凡論一百條，自初生以至成童，無不悉備。論後各附以方。前有嘉定丙午和安大夫特差判太醫局何大任序，稱家藏是書六十餘載，不知作者爲誰。博加搜訪，亦未嘗聞此書之流播。因鋟於行在太醫院。（案南宋雖定都臨安，而當時猶稱行在，以示恢復之意。咸淳臨安志所載甚明。）以廣其傳。案北宋錢乙始以治小兒得名，其藥證直訣一書僅有傳本，亦不免闕略。其他如晁陳二氏所著錄者，有嬰童寶鏡、小兒靈秘方、小兒至訣、小兒醫方妙選、小兒癍疹論諸書，皆不可得見。是書詳載各證，如硬舌、鱗瘡之類，悉近時醫書所未備。其議論亦篤實明晰，無明以來諸醫家黨同伐異、自立門戶之習。誠保嬰之要書也。此本爲明宏治己酉濟南朱臣刻於寧國府者，改名保幼大全。今考嘉定本原序，復題本名。臣序又稱得之醫者鄭和，和稱得之古冢中。其說迂怪。蓋方技家自神其授受，亦無取焉。

小兒衛生總微論方序

余先君有小兒衛生總微論方二十卷家藏甚久今六十餘載矣不知作者謂誰博加搜訪未嘗聞此書之流播也自嬰孩初育以至成童所謂保衛其生總括於微視古今方書極為詳盡仁哉著書者之心也宗族親舊間幼稚有疾余每口傳指授効如影響又取其可以通用於大人者增湯劑而用之尤為神異豈此書不言之妙有待於余而發耶烏可掩為一家之寶而不與人共之於是集二三同志訂正其謄寫之舛錯于行在太醫局以廣其傳得此者擬而用之當知余言不誣或未免畫蛇添足之譏亦不暇顧矣吁吾曾大父史夫其名恨不得詳其人也

嘉定丙午立春日和安大夫特差判太醫局

何大任序

小兒衛生總微論方目錄

卷第一
醫工論 稟受論 初生論 回氣論
洗浴論 斷臍論 [illegible]相視論 初生服
藥論 中寒論 臍風撮口論
胎病論 [illegible]
[illegible]

卷第二
五氣論 [illegible] 乳母論
慎護論 食忌論 天小論 色紋論

卷第三
五臟生病論 [illegible]
驚搐論 脉理論 諸身熱論

卷第四
驚癇論上 [illegible]

卷第五
驚癇方下

卷第六
驚癇別論 [illegible]
中風論 [illegible] 中風角弓反張 中風口眼喎斜 [illegible]

卷第七
傷寒論
卷第八
瘡疹論
卷第九
吐瀉論上 吐哯 霍亂吐瀉 [illegible]
[illegible]
卷第十
吐瀉方下 吐瀉後證
卷第十一
八痢論 脫肛論
卷第十二
五疳論 諸瘡外動 諸瘡雜證
卷第十三
蟲動論 食氣積癖論
卷第十四
心腹痛論 盤腸 脹病論 癖病論 虛羸論
咳嗽論 傳效 痰涎
卷第十五
黃疸論 客忤論 三疰 虫毒 夜啼論
諸汗論 不語論 渴論 諸血溢論
卷第十六
寒熱論 瘧論 弄舌論 魃病論
腎疳論 腹皮青黑論 難乳論
大小便論 五淋論 遺尿論
卷第十七
癩疝論 陰腫生瘡論 瘕氣論 顖
門腫凸論 顖陷 顖論 陽癰論 鍼刺論
梗喉論 疣子論 虫蚁咬論 藥毒論
卷第十八
墮傷論
頭病論 頭瘡 禿瘡 赦瘡 耳病論 耳聾 耳鳴 耳痛 耳瘡 耳蟨
眼目病論 目別論 鼻病論 鼻塞 鼻癰 鼻衄 鼻瘡 鼻齆
面瘡論 唇口病論 牙齒病論 舌病論
卷第十九
咽喉論 項癭論 瘰癧論 龜胸論
龜背論 手脚拳攣論 風疹癮疹論
疥癬論 金瘡論 破傷風 湯火傷論 湯傷 火燒
卷第二十
疳瘡論 癰癤論 惡瘡論 浸淫瘡論
風濕瘡 爛臂瘡論 魚臍瘡 凍瘡論

子136-004

瘑瘡論　漆瘡論　月蝕瘡論　水毒論
蠼螋瘡論　赤遊腫論　諸丹毒論
鱗体論　疵黶論

小兒衛生總微論方目録終

小兒衛生總微論方卷第一

醫工論

凡為醫之道必先正己然後正物正己者謂能明理以盡術也正物者謂能用藥以對病也如此然後則事必濟而功必著矣若不能正己則豈能正物不能正物則豈能愈疾今冠於篇首以勸學者

凡為醫者性存溫雅志必謙恭動須礼節舉乃和柔無自妄尊不可矯飾廣收方論博通義理明運氣曉陰陽善診切精察視辨真偽分[illegible]審標本識輕重疾小不可言大事易不可云難貧富用心皆一貴賤使藥無別苟能如此於道幾希反是者為生靈之巨寇

凡為醫者遇有請召不擇高下遠近必赴如到其家須先問曾請未曾請師即問曾進是何湯藥已未經下乃可得知虛實也如已曾經下即虛矣更可消息參詳則無誤矣又治小兒之法必明南北稟受之殊必察土地寒溫之異不可一同施治古人最為慎耳

稟受論

人稟父母精血化生故內經有曰陽施陰化謂之有子聖經言方其受孕之初一月血凝二月胚胎兆三月陽神為魂四月陰靈為魄五月五行分五臟六月六律定六腑七月七精開竅八月八景具全九月氣足象成十月百神集備至日滿而生也（又云一月如珠露二月若桃花三月男女分四月形象成五月筋骨全六月毛髮生七月遊其魂八月遊其魄[illegible]）其始有[illegible]謂之妊者以其陽始而陰妊之也有謂之胚者以其未成為器而猶坯也有謂之胞者以[illegible]為正陽而陰包之也有謂之胎者以[illegible]於母而[illegible]口已也有謂之娠者以其

有時而動也有謂之懷者以其有身而依也原夫此衆者皆陽始陰任在有形之先次由五行而後化成也故曰陰陽具而五行立矣凡陰之所任者壬也一陽壬兆則人乃肇生命門主生氣之原精所藏焉壬陽水也合丁之陰火而生丙故有命門然後生心心主血神所藏焉丙之陽火合辛之陰金而生庚故有心然後有肺肺主皮毛魄所藏焉庚陽金也合乙之陰木而生甲故有肺然後生肝肝主筋魂所藏焉甲為陽木合己之陰土而生戊故有肝然後生脾脾主肉意所藏焉戊為陽土合癸之陰水而生壬故有脾然後生腎腎主骨志所藏焉故腎與命門一也此陰陽五行夫婦生化自然之理也人之賦禀自受氣至胎化自成形至生養亦皆由焉

初生論

兒纔生出母腹中急當擧之便以綿絮包裹抱大人懷之温煖雖暑月亦不可遽去綿絮須漸漸減去之蓋乍出母腹中不可令冒寒也又急以綿裹手指揩拭兒口眼中及周圍穢血皆令盡淨不可令入口眼也若擧遲失於包裹則令兒中寒若穢血得入口眼則令兒生病其證候方論並在後

回氣論

兒纔生出母腹中聲遲者急以葱白細鞭其背呼父小名即啼又兒纔生下氣欲絶不能啼者必是難產或冒寒所致急以綿絮包裹其兒頻放大人懷中温煖若已包裹須更添之令極温煖且未得斷臍將胞衣置炭火上燒之仍撚大紙撚蘸油點著於臍帶上往來燎之以臍帶連臍得火氣由臍入腹故也更以熱醋湯蕩洗臍帶須臾則氣回啼哭然後如常洗浴斷臍此法甚良救者甚多

洗浴論

兒纔生下須先洗浴以蕩滌汙穢然後乃可斷臍也若先斷臍則浴水入臍而為臍瘡等病及浴水須入藥預先煎下以瓶貯頻臨時旋煖用之不犯生水即佳并已後浴之亦用藥煎湯據所宜時日則大良矣凡浴宜用寅卯酉日若初生不值但於日中選此三時如時亦不值唯忌壬午丁巳癸巳日時大凶而與避之餘皆可也今具煎湯用藥下項

用猪膽汁湯浴兒則不患瘡癬皮膚滑澤
用金銀虎骨丹砂煎湯則辟邪惡去驚悸
用李葉切半升煎湯則辟肌熱去溫壯
用白芷二兩苦參三兩挫碎煎湯則去諸
風用葯藿葱白葫麻葉白芷藁本蛇床子
煎湯退熱
用苦參黃連猪膽白芨杉葉柏葉楓葉煎
湯去風
用大麻仁苓陵香丁香桑葚葉本煎湯治
諸瘡
用金銀桃奴雄黃丹砂煎湯則辟邪除驚
用益母草煎湯治疥癬諸瘡
凡煎湯每用水一斗入藥煎至七升去滓適寒
溫用之冬不可太熱夏不可令冷須調停得宜
乃可用之兒自生之後須依時洗浴以去垢汚
又不可數、若都不洗浴則皮皺毛落多生瘡
疥凡洗浴時於背上則纔、少用於餘處任意
即不可極淋其背亦不可久坐水中則引寒作
病切須慎之如常能依法用之令兒体滑舒
暢血脉通流及長少病無不驗也

断臍論

兒生下須當以時斷臍若不以時斷臍者則令
臍汁不乾而生寒為臍風之由斷臍之法當隔
單衣以牙咬斷之將暖氣呵七遍若用刀斷
之須用剪刀先於懷中煖透然後方用不得便
用冷刀多致傷臍生病宜切戒之其斷臍帶亦
令長至兒足趺上云當長六寸若不盈則傷臟令
兒腹中不調若太長則傷肌令兒皮粘臍之處
斷臍訖須用烙臍餅子安臍帶上燒三壯炷如
麥大若兒未啼灸至五七壯灸了上用封臍散
封裹之法須槌治帛子令柔軟用方四寸許上
置新綿厚半寸及匕置藥末滴紫暢以封之如
不除其藥即用極細熟艾一塊置於上封之但
不令封臭實急急則令兒吐哯又須常切照顧
勿令溫著及濕襴中亦不可令兒尿濕恐生瘡
臍及引風也

烙臍餅子

豆豉　黃蠟各一分　射香少許

右以豆豉為細末入射研均熔蠟和劑捏
大小捻作餅用

封射散

雄鼠糞 乾姜 甑帶

綿灰 胡粉 麝香（少許）

右同研極細末每用半錢至一錢傅臍上封之永不患臍瘡臍一如已因風濕患瘡硬者香臍帶落與未落依此用藥使差

兒已封裹臍了一切如法待數日許忽然啼啼欲衣中有刺者皆此乃臍燥刺其腹故也當與解之務去故帛藥物更換裹之如舊此證亦於十日許解視換時須避風冷若隆冬則左右置火於温煖處換之至於尋常澡浴亦用盆亦當如是若失於照顧致傷臍患若是方

治小兒初生臍未落時腫痛水出

右取故緋絹燒灰研細末傅之

治小兒臍中汁出不止赤腫

右以白石脂為細末炒令微煖傅之日三四

治小兒臍瘡

右以甑帶燒灰研細末豬脂和傅或以桑白皮汁傅乳上吮兒飲

又方以棗礎上研傅之治歷年不差者伏龍肝亦得

又方以當歸為細末傅之久不差者用之神效

治赤腫或膿血清水出者

又方以馬齒莧乾燒灰研末傅之或以亂髮燒為燒末傅之

又方以乾蚵蚾火煅為灰研末傅之佳

又方以黃蘗為細末傅之治久不差者亡

治小兒臍赤腫

杏仁（去皮） 豬頰車髓（中者）

右先研杏仁極爛和髓傅之一方研杏仁如脂和休中骨傅

治小兒因剪臍傷外風致臍瘡久不乾

白礬（燒） 白龍骨（煅等分）

右同研為細末傅之必之用如無兩味也得一味亦可

又方以綿燒灰研為細末傅之新舊皆可

治小兒臍瘡濕不乾若至百日即危極胡粉散

胡粉（細研） 乾姜（燒灰） 白石脂（燒令赤細研）

右同為細末每用一字或半錢傅之

凡小兒患臍瘡未愈不可乳令大飽

相兒壽夭論

兒生下洗浴斷臍之後當視其壽夭命長短成人不成人

兒生身不收者死　兒生魚口者死

兒生股間無生肉者死　兒生汗血者死

兒生陰下破者不[illegible]　兒生[illegible]下白或赤者皆[illegible]

兒生陰不起者死　兒生身如[illegible]血者無[illegible]

兒生臍小者不壽　兒生声絶而復揚急者[illegible]

兒初生目自開者不成人　兒初生頭四破[illegible]

兒初生啼声散者不成人　兒初生有長[illegible]

兒初生啼声深者[illegible]　兒初生頭毛不周[illegible]

兒初生汗出不流[illegible]　兒初生小便[illegible]

兒初生常摇手足[illegible]　兒初生枕骨不成[illegible]

兒生膝骨不成[illegible]　兒生掌骨不成[illegible]

兒生踵骨不成[illegible]　兒生腹骨不成[illegible]

兒初生陰穴而[illegible]　兒初生臍中[illegible]

兒初生啼声[illegible]　兒初生卵下[illegible]

兒初生身体群白[illegible]　兒初生頦上有[illegible]

兒初生目視不正[illegible]而剔[illegible]非生人

兒初生[illegible]不作人[illegible]

初生服藥論

兒初生出世腹指拭口服滌洗浴了斷臍畢[illegible]包記且未得与乳當用好甘草一中指節許擘碎以水三蜆殼煎二蜆殼以綿纏指蘸与兒吮之[illegible]吐出惡汁為佳若服二蜆殼不吐即無物不須更服也此法不問兒虛實[illegible]皆須服之次看形色若面色紅潤啼声響快者用擘破黄連以湯浸取濃汁調硃砂末抹兒口中打盡腹中旧糞方可與乳又法以朱砂半錢滴[illegible]兒良久臍糞乃下為佳故[illegible]經云兒初生惡血未納若拭以綿指吞而[illegible]者吐以甘草入而在腹内者[illegible]以黄連[illegible]所以甘草[illegible]也次用硃砂[illegible]一大豆許細研水飛煉蜜一兒殼看稀稠和[illegible]分三劑每用一劑乳汁化時時滴兒口中[illegible]即止姚和衆云成煉硃砂能温[illegible]血氣也一日只可一豆許分得過也[illegible]次用真牛黄一大豆許細研以煉蜜酸棗穴和成膏每用一大豆許乳汁化下特、滴兒口中姚和衆云能去驚辟邪惡[illegible]若兒形色不實怯弱者不宜服之如胎[illegible]或身[illegible]色

子136 009

黃昏盲多朋此病在三日外也

中寒論

兒縱生率遲或斷臍晚者令兒胃冷故寒中之也又先斷臍後洗浴則水氣得入之或洗時水氣所干亦為中寒之候其證腹中絞痛夭糾啼呼面青黑屎青白當以當歸末為粉著乎繫上灸而熨臍腹日日頻熨至啼止臍乾為度仍不可灸令大熱恐引驚也

初生不乳

初生洗浴斷臍胸包帶穢污下臍黃其都了經日不飲乳及不小便者蓋因難產或包衣來遲早寒或被風邪微干傷動藏氣所致有此候者多為撮口治不可稍緩

通關散治初生兒不飲乳及不小便

以石器中研奶汁二合入四破葱白一寸

煎取一合藥注子分灌之服之立效

臍風撮口

兒白初生至七日內外忽然面青啼聲不出撮唇緊不能哺乳口青色吐白沫四支逆冷乃撥風撮口之證也此由兒斷臍之後剪臍不定

風濕所乘其輕則病在皮膚而為臍瘡不差其重則病入臟腑而為臍風然撮口亦如大人因有破傷而感風則牙關緊而口撮不能入食身強四支厥逆與此候頗同故謂之臍風撮口乃是惡之病也千金有云小兒忽患臍風撮口者百無一活皆坐視而斃良可憫惻有一法極驗但世罕有知者凡遇其患則看兒口中上齶有小泡子如米狀急以溫水蘸熟綿子裹手指輕輕擦破即口便開而安

又方視小兒口中上下齶間若有白色如豆大許便以指甲於當中掐之自外達內令血出至有血出亦不妨又於白泡兩邊盡頭亦依此掐令內外氣斷不必直破入指甲尖恐太深則傷兒此二法相類子母秘錄云於掐破處以蟲蛻末傅之大良及有治方集之後

治小兒斷臍之後不慎照管致風濕所乘令兒不能乳啼名曰臍風宜速療之不久則為撮口也

當歸 天漿子

右為細末入射香一字傳臍

又方　黃蘗　蜊　釜下墨煤　乱髮燒灰存性
右各等分同為細末用一字傅之
治小兒臍瘡不差因風傳受欲為撮口或者
金朋黃散
川黃連六錢一分為末　胡粉一錢　龍骨一錢細研
右同為細末每用少許傅之時時用
治小兒剪臍汁風昏青撮口吐白沫四支冷
定命散
赤足蜈蚣一條去頭足炙　川烏頭尖三个　麝香少許
右為末入麝研勻每服半字煎金銀湯調下

治小兒初生撮口
蛇蛻皮一分燒灰　鈎藤一分　乾蠍梢一分已上為末
硃砂一分別研水飛　麝香半錢別研　真牛黃一錢
右同研細拌勻再研每服一字取竹瀝一
兩點同乳汁調灌下一方只○蛇蛻硃砂
麝香各一分每用半字津調塗口中
又方以蒜瓣置臍上灸之
又方以夜合花枝濃煎汁拭口并洗
又方拭兒口傍先利令兒細研雀甕汁塗之
又方生擣鼠婦并雀甕汁相和調塗抹口中

漸乳得效鼠婦乃濕生蟲也

胎中病論

兒自生下至一臘前後有病者多是未生之前
在母胎妊之時母食毒物胎有所感至生下之
後毒氣發而為病又有母於娠妊之時失於固
養氣形勿克疾疾因之故聖濟經言病生於中
者令生俱生也今叙于後

梗舌

兒纔生出母腹因以指拭口中惡物便子細看
兒口中如有皮膜似薏苡中之膜裹定兒
舌或連舌根者此名梗舌乃胎毒所攻而生或
母於娠妊時愛食飛禽之物感而所致便須急
以指甲刺破剝去之指拭血淨用燒白○礬灰
細末傅于舌豆許若不摘去則梗其舌而不能
語令兒啞也及日數多亦不能去也

氣閉

兒初生一兩日間有大小便不通腹
脹滿而欲絕者此胎毒之氣鬱閉所致也便急
令一婦人用溫水先漱口了後吸咂兒前後心
并臍下及手足心共七處各五七次以赤紅
色為度須臾氣散則自通矣不爾即無生意也
有此候用此法可謂再生

子156 011

鵝口 兒自初生至七日內外因胎毒上攻

舌上生白屑如米連口兩角生黃瘡及舌下片

膜如石榴子大令兒聲不發者名曰鵝口

治小兒鵝口保命散

白礬（一分） 馬牙硝（半兩研細） 硃砂（一分研細水飛）

右同研令細末每用一字取白鵝糞以水

攪取汁調之先以手指纏亂髮揩拭兒舌上

口角齶中去垢穢淨然後用藥傅之令遍

髮指時以井花水沾用或以綿纏指頭沾粟

漿汁用

治小兒鵝口不能乳

以馬牙硝研細遍摻舌上下兩頰口角內外

患處日三四次

又方以桑白皮汁和胡粉傅之

又方以雞肶胵中黃皮燒灰研細乳和傅之

又方以白鵝矢汁灌口中又方以黍米汁傅之

又方以金錫七枚先用薄荷汁浸過後用[illegible]

七葉裹之文武火炮過焙令乾研末更入[illegible]

同研令細蜜和為膏傅病處

重齶 兒自初生至七日內外因胎毒上[illegible]

氣不散兒口中上齶連喉有生物如芦籜盛

之狀或作疱在懸癰之前塞其氣路不通令兒

危殆名曰重齶又兒生下即死者多此病也不

少知之當急視之凡遇是病便以指甲摘破或

○以綿纏長針留尖如粟米許刺之令兒氣泄

則治其疱破則出青黃血水便用帛子揾拭後

用鹽湯漱口擦潔令淨若入喉即傷兒須慎之

如一刺後作者再刺

治重齶[illegible]散

鉛霜（一分研細） 真牛黃（一分研細） 太陰玄精石（一分研細）

硃砂（一分研細水飛日乾） 右件再同研令入白龍

腦細末半錢相和每用抄一字塗半錢許兒舌[illegible]

重齶（重齶重舌） 兒初生至七日內外因胎毒上攻

於兒口中若發於齶上作腫作兩重之狀名曰

重齶若發於上下齗兩傍腫如疊齗者名曰

重齗若發於舌上腫起初更生一小舌者名曰

重舌腫悶作痛令兒多啼不能吮乳而妨礙

治重齶重齗 右以蛇蛻皮燒灰研細[illegible]

又方治[illegible] 右以生蒲黃末傅之

烏賊魚骨[illegible] 治重舌腫悶妨礙吮乳

烏鰂骨二兩 乾蟾蜍 蒲黃 枯白礬灰一兩研
右和研如粉每用半錢以雞子黃調
又方治如前 以蛇蛻皮為末乾捻傳舌下
患处不一時便清不能飲乳者用之得○飲或
以鷄羽蘸淳酢發燕掠舌下
又方以木蘭皮長一尺廣四寸削去麄皮以酢
一升漬之取汁注患处
又方以伏龍肝研細末牛蒡汁調傳或以酒
又方以馬牙硝末塗舌下日三
又方以二家骨肉切如指大以摩舌上

又方以黃丹豆許納管中吹舌下
又方以蒲黃傳之不過三以差一方微○炒以
紙襯地上出火毒研羅細末先用溫水蘸帛裹
指輕輕接掠後摻藥
又方以桑白皮煮濃汁塗乳上吮兒
治重斷口噤欲死
右以亂髮燒灰研細末以傳舌下 頭用
又方治如前以鹿角灸適溫熱熨之
又方以小豆煮汁和鹿角灰傳之日三
又方以露蜂房燒灰研細末臘和膏傳之

蓐瘡 兒自初生至七日內外因胎毒攻發
生瘡者名曰蓐瘡謂在蓐草上生瘡也
治蓐瘡 右以黃連為細末先用生麻油淨盞
子內將黃連末逐旋摻油上倒合在銚三兩子上
下用艾燒火熏令極乾刮聚再入生油調塗各
少許和膏傳之
又方以澤蘭心細嚼傳之 又方以黃檗
治小兒初生三日頭面生瘡身體壯熱
升麻 柴胡去苗 石膏各 甘草 當歸
右㕮咀每服一錢水一盞煎至三分去滓時

時量兒大小加之
治小兒初生蓐中生熱瘡
右以鷄子五枚敲破去白只取黃又以糯米
如鷄子黃許一味相和銚子中煎熬取汁塗
之更用苦參末傳之甚奇 劉禹錫云須去武
後生子蓐內便有熱瘡發於臂髮延于身
初用他藥無益狀似至重昼夜啼號不乳因
閱本草有云亂髮合雞子黃煎消為水療小
兒驚熱下痢注云去痰熱百病亂髮雞子黃本草
發瘡熱瘡因用之立效如神煎法雞子黃亂

汲初入銚煎時甚乾以須臾復逐有液出旋取
置一磁碗中以液盡為度
口噤　兒自初生至七日內外忽口噤不能乳
腹急多啼下青黑糞或口生瘡如粟米名曰口
噤此證手脚急而口噤與撮口相似然撮口證
面色赤常声不出口吐白沫此口噤證面色赤
而多啼口不吐白沫所以異也此緣兒在母腹
中時為風熱傷胎所致故聖濟經曰風熱傷胎
生而口噤也（千金云赤者為心...）
治初生兒口噤不開不收乳立聖散

乾蜘蛛（一枚去足口以新竹瀝漬一宿炙焦為末）　乾蝎稍七箇（炙）　膩粉（...）
右同研勻細末每服一字乳汁調（滴兒口中...）
又方以鹿角粉大豆末等分研細乳和（塗乳上令兒吮之）
又方以生甘草一分細剉水一盞煎至六分去滓
放溫分數次灌兒口中令吐出痰涎後以
猪乳汁点兒口中差（亦治撮口）
又方以真牛黃少許研細淡竹瀝調一字灌之
次以猪乳滴口中
又方以赤足蜈蚣去足炙黃為末以猪乳調半
錢分三四次温灌之（一方同雀甕不開口者五）

枚燒灰研細末飲調服壹字
又方以白殭蚕二枚為末蜜和傅兒口內如無
以原蚕蛾二枚炙黃代之亦治撮口
又方以雀矢白水和圓麻子大乳服二（圓雞）
矢白亦佳一方雞矢白棗大綿裹水五合煮二
沸分服
治小兒口噤体熱
右以青竹茹三兩醋一升煎取三分之一去滓
治小兒口噤牙關不開
右以天南星一箇煨熟急用紙封角莫令透
氣却以紙裹近上尖处剪一簽子雞頭大令

洩氣出於鼻孔中畫之牙關立開亦治撮口
躽啼　兒自初生已來身色青白無血色好啼
哭昼夜不止身体仰而躽衣則甚腹滿不乳大
便青白昼夜啼諸藥不効者此名躽啼乃兒
未生已前在胎胎中時為風冷傷而所致故聖
濟經曰風冷傷胎生而躽啼千金有云小兒有
胎寒則腹痛躽啼時吐哯或腹中如雞子黃
按之如水声便沒沒而後出不急治多變為癇
治小兒胎寒躽啼養臟湯
當歸（去蘆二兩）　沉香　丁香　白朮　桂心　川芎（各半兩）

右為細末每服一錢水[illegible]
治小兒忽患腹痛夭矯汗出者亦胎寒也[illegible]
右以黎菜葉煮濃汁七合分三四次服
又方以當歸為末每用一小豆許乳汁調下日
三夜一病兒大添之
又方以栢子仁為末每服一錢半温水調下
治小兒胎寒軀啼發癇礬石圓
右以馬齒礬火煅半日為末棗肉和圓黍米
大每服一圓乳汁送下量兒大小增減以
差為度有痰亦去神良[illegible]

二十四

血瘕又名胎積兒未生之前在母腹 中藉母經血
以滋養臨至生下時須拭去口中惡血及拭
藥下盡兒腹中穢血之糞[illegible]銅乳若拭[illegible]
時揩拭兒口中惡血不淨吞嚥入[illegible]腹中
旧有穢糞不曾下之或下之不盡因而成瘕
故名曰血瘕又名胎積至生下百日內外兒
生頭若眼目赤澁小便如血口中氣急身体
紫色腹脹躁煩多啼不乳
治小兒血瘕胎積丸
白丁香一字 [illegible] 輕粉半錢 滑石半錢 乳香半錢 巴豆三[illegible]

[illegible]
右為末糊丸黍米大每一二丸看
虛實大小与服煎柳心七箇湯放温送下連一
二服糞下惡物是効亦令乳母服和氣藥調養
飼兒若先服藥後吐了止大便不通面黑[illegible]
胎赤 兒自生一月至開眼已後眼兩眥及瞼皮
赤爛名曰胎赤此因兒生時拍拭時久或
不淨眼瞼致惡血入於兒眼又或生下時揩拭
兒眼邊惡血不尽亦令入兒眼漬漬以生是病
不急治之則至長不差
治小兒胎赤眼二金散 黄連[illegible] 黄蘗[illegible]

二十五

右先為麁末用乳汁同浸一宿焙乾收之每用
少許以新綿裹荊芥湯浸之放溫時時頻洗
胎驚 兒在母腹未生之前因有所驚胎內感
之至生下百日以來兒心神不寧睡卧不醒如
煩躁頻啼哭無時上視發搐面青腹直撮口縮
腮糞青黃水者此名胎驚方論著於驚癇門
之中 胎怯 兒自生下以來面無精光肌肉
薄大便白水身無血色時時哽氣多噦目黑
睛少白多哭此胎怯也宜天麻浴湯治之
治肥 兒生下肌肉厚遍身血色紅滿至此[illegible]

月以後漸〻肌瘦目白睛粉紅色五心熱大寒
難時〻生涎此胎肥也更看父母肥瘦肥不可
生瘦〻不可生肥治亦宜天麻浴湯
胎熱 兒生下有血氣時叫哭身壯熱如淡茶
色目赤大便黄赤糞稠急食乳此胎熱也[illegible]
治小兒胎怯胎肥胎熱等諸疾天麻浴湯
天麻二錢 蝎尾去毒 朱砂各半錢 白礬末 射香[illegible]
烏蛇肉酒浸去皮焙乾 青黛[illegible]末各三錢
右為末勻每服三錢水三碗桃枝葉五七條
煎十數沸帶熱浴之勿得浴背湯須適寒[illegible]

治小兒胎熱或乳母飲食飽惡辛毒吐乳汗不止
兒色如淡茶黄色瘦瘁不為肌膚四支瘻躄
縱疾服之充悦健壮
芍藥二兩半 柴胡去苗三兩 鱉甲醋炙 茯苓去黑皮[illegible]
人參去芦 大黄各一兩 甘草 乾姜各半兩[illegible]
右為末煉蜜和丸大豆大百日至一歲兒服
一丸乳服日二量兒大小增減
不治病
胎内十二證 一双瞽 二焦叉眇 三駢拇 四六指
五体殘 六叉螯 七獨臂 八噎[illegible] 九缺唇

十[illegible] 十一攣拳 十二侏儒
胎外十二證 一睛凸 二近覩 三鼻[illegible]
四耳返 五結喉 六項癭 七舌短 八齒齵
九龜背 十蛇背 十一駢脇 十二交脛

小兒衛生總微論方卷第一

小兒衛生總微論方卷第二

五氣論

兒自胎孕以至生成皆稟五行而分五藏故自
五氣以生五態而各不同聖文[illegible]言五行秀
有異宜五態[illegible]武[illegible]性潜異
者蓋母氣胎育[illegible]
剛柔之勇怯又經云心氣[illegible]語脫肝氣鬱
而行遲肥氣弱而肉瘠腎氣怯而解顱[illegible]
類悉皆是矣然五藏之氣稟受殊異其於此[illegible]
聖人亦有方藥以補養之矣

心

心氣盛者則伶俐早言笑所以髮潤而多髮
心氣怯者則性癡而遲語髮久不生生則不黑
心主血髮為血之餘怯則久不生也[illegible]
治小兒生下無髮以鯽魚燒灰末和醬汁塗之[illegible]
治小兒髮久不生苣勝丹
當歸去蘆一兩　生乾地黃去土二兩　芍藥一兩[illegible]
苣勝一合即胡麻　胡粉半兩別研
右同研勻細煉蜜和丸黍米大每服十丸[illegible]
黑豆湯下兼化塗頭上量大小用
又方以楸葉中心子杵爛絞汁塗之

又方以羊屎燒灰淋汁同豉汁洗之生[illegible]
又方治血熱髮竭不生以桃柳煎湯入豬膽汁
和沐頭髮自生
治小兒心氣不足從小至數歲不能言菖蒲丸
石菖蒲一兩　人參去蘆半兩　丹參去蘆一分　天門冬去心
麥門冬去心焙一兩　赤石脂
右同為細末煉蜜丸菉豆大溫水下五七丸
至十餘丸量大小增損日三久服取効
又方　石菖蒲一兩　遠志去心　桂心一兩
黃連[illegible]　人參[illegible]　黃[illegible]　酸棗仁[illegible]

右為細末煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸
粒煎生薑湯化下無時　又灸法　灸心俞三壯
灸兩足踝三壯　又方治五六歲不語者心
氣不足舌本無力不能發轉故也一云風冷
傷於少陰以赤小豆為末酒和塗舌下神効
以社壇餘胙酒與飲亦許

肝

肝氣盛者則嬌健而早行立肝氣怯者則
長不能行而脚細名曰鶴膝肝主筋怯則筋弱
故長不能行也又或眉久不生眉屬肝肝氣不
榮故眉久不生也何以知眉屬肝且五臟皆有
毛其髮屬心心為火火性炎上故髮生上搶也
鬚屬腎腎為水水性潤下故鬚生下順也是以
女人皆無外腎故無鬚也毛屬肺肺在五臟之
上而主外故毛生皮膚之外也眼睫屬脾脾眼輪
亦屬脾脾在右偏故睫斜在眼輪之上也眉屬
肝肝在左偏故眉斜生眼睫之上也左為上右
為下所以眉在上而睫在下也
治小兒從小至數歲不能行麝茸丹
麝香研　茄茸酥炙黃　生乾地黃去土
虎脛骨酥炙黃　當歸去蘆洗焙　黃芪[illegible]

右為細末用羊髓二兩煮爛和丸黍米大每服十丸摩沉香湯送下乳前日三服

又方羚羊角丸 羚羊角 虎脛骨 生乾地黃 酸棗仁 白茯苓 桂 防風 當歸 黃耆各一分

右為細末煉蜜和劑每用一皂子大食前溫水化下日三兒大者加之

又方以五加皮為末飲服之取藥家未開口盜食哺之日三便能起行

又灸法小兒行小至五歲不能行者灸兩足踝各三壯

又灸法小兒鶴膝脚細不能行者灸膝眼三壯

治小兒生下無眉毛以待生者

以七月中採烏麻花不拘多少陰乾為末以生烏麻油浸每夜傅之

治小兒眉毛眼睫因癬退不生名乳頰癬

野油花 赤箭 天麻苗 防風各等分

右為細末先洗癬淨揾乾以好油調塗之

又方 羊屎 末錢 豬牙皂角 蛤蟆末

右為細末熊膽汁和丸菉豆大每服一丸

脾虛汗 脾氣盛者肌肉厚而色紫耐飢而乳多

脾氣怯則肌虛而喜汗汗多則肉瘠脾主肌肉

[illegible]則汗[illegible]則衛衰故汗多而肉瘠也

治小兒脾怯多汗丁香散

陳皮一兩 青皮去穰 訶子肉去核 甘草炙 丁香

右為細末每服二錢水一盞煎至六分

治小兒喜汗香瓜丸

大黃瓜黃色者一個 川大黃 胡黃連 柴胡

青皮去穰 鱉甲醋炙黃 黃蘗 蘆薈

右將黃瓜割頂去瓤以諸藥為細末填入內至滿却將頂蓋口杖子簽定慢火內煨熟取藥并瓜研之如皮研不爛則去之乾卻入麵糊和丸菉豆大每服二三丸乳後冷漿水下兒大加之

撲法 黃連去須 牡蠣火煆 貝母各一錢

右為細末以米粉一升同研勻粉身

肺 肺氣盛者肌膚瑩白潤膩髮細黑淺肺氣怯則肌膚沮敗若無皮而血凝故[illegible]亦名血凝孫真人言小兒出腹肌肉若是血也漸漸堅化肺主皮膚肺氣不足則血沮敗不成肌膚故若無皮毛而血凝面目皴劈口患黃閉目撮面

子136-018

口中乾燥四文不能伸縮哭無声不吃乳此皮
毛不歛也多是不育千金治以龍膽湯方具于後
治初生兒血凝皮肉不歛哭無声不吃乳
以胡粉研細酒和塗之乾即再
又方以白殭蚕為末煎湯適寒温浴之
又灸法初生兒血凝
以臍四边各去臍半寸并鳩尾下五処各灸三壯
腎　腎氣盛者顖小而合早牙齒早生腎氣怯
者解顱而顖不合牙久不生生則不固面㿠目
睛多白腎主骨髓腦為髓海怯則腦髓不成故

顖解而不能結解也顖不差而百病交攻極難將
護此最為大病矣又腎主骨牙乃骨之餘怯則
牙文不生也　治小兒解顱玉乳丹
鍾乳粉(依法煉者半两)　熟乾地黄(依法蒸者半两)
柏子仁(半两)　當歸(去苗半两)　防風(去蘆分)　補骨
脂(一分揀淨炒)　或加黄耆白茯苓亦得
右為細末入鍾乳粉柏子仁拌勻煉蜜和丸
黍米大毎服十丸煎茴香湯送下乳後
又方　細辛(去苗)　桂心(各半两)　乾姜(七錢半)
右為細末以乳汁和傅縫上乾即後

又方以蛇蛻皮炒焦為末用猪頰車骨中髓〇
調傅縫上日三一方只用猪頰髓
又方以驢蹄燒灰研細末生油和傅縫上
治小兒顖不合　生蟹足骨(半两)　白歛(半两)
右為細末以乳汁和貼縫上
又方以龜甲煮湯適寒温浴之不得用冷者
治小兒顖不合鼻塞不通
以天南星炮去皮為細末淡醋調塗
緋帛子上貼之仍炙手熱頻熨立効
治小兒顖不合顱顖陷並主之

蛇蛻皮(燒)　防風(去蘆)　白芨　大黄(各一分)
右為細末入青黛一分同研極勻毎用半錢
用豶猪膽汁調勻將紙一片依大小長短剪
一片剪子攤藥在上仍於四边各留少許紙
用淡醋糊塗徧以貼病上不住以温水潤動
一伏時換一方防風(一两半)　柏子仁　白芨(各一两)為末
乳汁和傅顖上十日知二十日愈日一易之
又法治小兒解顱顖不合作頭巾与裹遮護之
久而自合千金云良法也
治小兒齒久不生

以雄鼠屎三十枚日一枚拭齒斷即生其屎兩
兩角尖者乃雄鼠屎也一云用雄鼠屎炒焙
又方以黑荳三十粒於牛糞火內燒令煙盡細
研入射香少許再研勻細用針挑不生齒處
令血出以藥末揩上不得見風忌鹹多年不
生者用之極効
又方以犀梳中竹木正旦刮屑塗之即生

乳母論

兒生自乳養者一切不論若令乳母乳養者必
擇其人若有宿疾狐臭瘰癧上氣咳嗽瘑癬頭
瘡龜背駝背身體瘦弱齆鼻聾啞顛狂驚癇痼疽
癬疥疾症不可令乳兒也
凡乳母乃血氣化為乳汁則吾性善惡悉由血
氣所生應喜怒飲食一切禁忌並宜謹慎若縱
性恣意因而乳兒則令兒感生疾病也若房勞
乳母則令兒瘦瘁交脛不能行若醉以乳兒則
令兒身熱腹滿若當熱乳兒則令兒變黃不能
食若怒作乳兒則令兒驚狂上氣若吐下乳兒
則令兒虛羸氣弱是皆當慎忌也
凡每乳兒乳母當先以手按散其熱然後与兒
吮之若乳猛汁湧恐兒嚥乳不及應防搶噎
則輒奪之令兒少息又復与之如是數次則
可也又當視兒飢飽節度一日之中知幾番
而足量以為常每於早晨若有宿乳須當捻
去若夏月不去熱乳令兒吐䘌冬月不去寒
乳令兒咳利又若兒大喜之後不可便乳令
兒驚癇若兒大哭之後不可便与乳令兒吐
瀉又乳母不可太飽恐停滯不化若太飽則
以空乳令吮則消
凡每乳兒乳母當以臂枕兒頭令兒口与乳齊
乃乳之不可用時即太多令兒飲乳不快
致兒噎又乳母欲寐則奪去其乳恐睡著
不覺被乳填沃口鼻別生其他事又且不知
兒飢飽也
凡兒生六十日目瞳子成能識人百日任脈反
覆一百八十日兒骨成能獨坐二百日掌骨
成能匍匐三百日髕骨成能獨立三百六十
日膝骨成能移步乳母常須依時按節
教引使兒能會此是定法也即不得常常擁
持過時都不教引致令兒筋骨弛隨

慎護論

凡乳母慎護養兒乳哺欲其有節襁褓欲其有宜違其飢飽察其強弱適其襁薄循其寒燠蓋有違不可不知也

凡兒自初生至滿月宜常時取豬乳汁滴兒口中最為佳妙 又以珠砂末一大豆許蜜一蜆殼和之分三次或四次每十日內外與一次塗兒口中安心神鎮驚氣

凡兒始生肌肉未成不可與煖厚新綿之衣當與故絮帛舊衣若與新綿厚煖則蒸燠生病筋骨緩弱故聖經云襁褓者衣欲舊帛綿欲故絮非乃惡於新燠亦資父母之餘氣以致養焉

凡乳母若遇天和無風之時當抱兒在日中嬉戲使數見風日則血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒若藏幃帳之內重衣溫煖譬如陰地草木不見風日則脆軟不任易為傷損故聖濟經言重衣溫厚幃帳周密宜與戒損甚則傷皮膚害血脈是生多疾也

凡兒常令薄衣雖冬月但令著兩夾衣及納衣不類若極寒即漸加舊絮衣人家多務愛惜乃以新綿厚衣溫養過當適以為害薄衣之法當從秋習之若至來春稍暖須漸減其衣不可便行卒減恐令兒傷中風寒

凡兒於冬月須著帽項之衣夏月須著背搭及於當脊更絮綿一重以防風邪所干謂諸藏之俞皆在於背故也又常令乳母每日三時摸兒項後筋兩辟之間名曰風池若熱即須燙之令微汗則愈 諸家云常令小兒摸風池者是也

凡兒於春時不可覆頭裹足致陽氣不得出泄則發熱矣 凡兒常當看觀消息無令身體有汗若汗出則致腠理虛而以受風寒晝夜寤寐皆當慎之須審天氣冷煖衣被厚薄蓋之

凡兒於暑月時當令在涼處勿禁水漿但少與之唯是不宜多與

凡兒不可抱於簷下洗浴又不可當風解脫恐為寒干又啼哭未斷不可與乳冒令衝逆又不可哺飼恐為食傷又不可近神佛之前驢馬之畔又不可令兒見怪異之物及各門異戶不相識之人恐為驚忤

凡兒生三日之外當宜浴以消姚知柔只以要氣

煑飲研如乳汁每日與半蜆殼許以助胃氣
神導達腸胃孫眞人云以粳米飲七日外與
三大豆許愼不可雜與藥嬰巢氏云兒生滿
三十日後當哺少物如二棗核許至五
十日如櫻桃許至百日如大棗許若乳少當
以意增之不可多與恐不能勝別生病矣若
乳多不消哺食者亦須少少與之以壯腸胃
兒大稍稍增之當有常劑聖濟經亦云兒生
三日用飲過三日用哺哺之以穀氣逆[illegible]
之多少量日為則如是則五臟得養而胃氣

壯矣今之養小兒者多務愛惜過當從從至二
三歲尚未與食致脾胃虛弱体力怯軟平生多
病者往往半年之後宜煑陳米稀粥與之十月以
後漸與稠粥爛飯以助中氣則自然易養少病
惟忌生冷油膩葷茹甜物
凡小兒乳哺既有常劑若忽爾却乳哺少者此
是腹中少有不和也便當與微微下之若都不
肯食但飲少乳者此傷重要下之不可不下也
若不與下則生寒熱或為吐利及為癖積脉大
[illegible]發癇宜不早治之由孫眞人云小兒寒

熱亦當下之乃差又小兒乳哺不能與疾癖也
常當斟通之若稍不進乳食便以微藥剋化紫
圓最妙方在後不得行駛藥轉利又不得為無辜
而過延致病大即難治爾小兒微患便與微下
則損不甚而易愈矣若於春夏之時有疾千金云[illegible]
切不可妄行吐下及微疾亦不可亂行針灸蓋
針灸傷經絡吐下損府藏故也若誤行轉瀉
則使下焦虛而上焦熱變成大病也故巢氏有
言小兒春夏自非甚病決定不可吐下者是也

食忌論

凡小兒有不可食之物不可不知今具于後
小兒不可多食栗子令兒氣弱行遲
小兒不可食蕨菜令兒立則無力久不能行
小兒不可食芡令兒不能行
小兒不可食黍米雞肉胡介令兒腹中生蟲
小兒未斷乳食雞肉令兒腹生蛔蟲
小兒不可食越瓜令兒發瘧疾
小兒不可食麥令兒髮落 麥是長不成麥也
小兒不可食凫茨令兒臍下痛
小兒不可食鱘魚令兒生癥瘕

子136 022

小兒不可食炒豆得肉令生氣壅致死

大小論

經言六歲已上者為小兒十八已上者為少年驗此之言則十八已下者皆為小兒也此乃古之所論尔以今時校之則時世相異理或未當且礼云男子三十日壯有室又曰男子三十而娶是古之男子皆三十已上方娶故十八以下得為小兒之稱今之時則不然男不過十五而娶至十八已有生一二子者豈得為小兒也以今時言之當以十四以下為小兒治其十五

已上者天癸已行婚冠既就則為大人治耳

諸般色澤紋證論

經云小兒六歲已还者經所不載有病難治無承據之也詳之此謂嬰兒未能言者有病則無由問其所苦故無承據也若能言者必能問之小兒豈有六歲尚不能言者故其不能言者唯一二歲兒也故先賢言嬰兒未能言者最為幼小有病則肌膚未全寸關一脉更蒸未定氣血細微若憑診切實難明晰惟在辨其形色參其聲候乃知病之所在者矣其觀視之法[illegible]要

神定志勿令情意感乱不得於兒哭啼之時臨起之際則色不正矣須於臨時之後已特之前夏即未熱冬即未温外色不雜內氣閑雅乃可向明而觀察之也聖濟經曰通識之士必察則秉勇怯視其盛衰虛实適以寒温平以陰陽病之輕重緩急隨證以治之不必散於藥治也諸所論繁冗難以執拠今採其當者叙而次之

諸色澤候

面上五臟部分色　左頰主肝右頰主肺額上主心鼻上主脾一云唇口頤上主腎色青為風色赤

為熱色黃為食色白為氣色黑為寒也

面上五藏四時色　經言五藏之色皆外榮於面故死生疾病係焉肝主春其色青心主夏其色赤脾主長夏其色黃肺主秋其色白腎主冬其色黑是謂五藏之色隨四時各榮於面也其色不深不浅應常光潤者為和平也若色重深者其藏实浅淡者其藏虛

面上五藏生死色　經曰藏榮者其色生青如翠羽赤如雞冠黃如蟹腹白如豕膏黑如烏羽枯夭者其色死青如草茲赤如衃血黃如枳实

枳突白如枯骨黑如炱煤

面上五藏部分相乘色　肝色青者本色也赤者心乘肝也黃者脾乘肝也白者肺乘肝也黑者腎乘肝也心色赤者本色也青者肝乘心也黃者脾乘心也白者肺乘心也黑者腎乘心也脾色黃者本色也青者肝乘脾也赤者心乘脾也黑者腎乘脾也白者肺乘脾也肺色白者本色也青者肝乘肺也赤者心乘肺也黃者脾乘肺也黑者腎乘肺也腎色黑者本心也青者肝乘腎也赤者心乘腎也黃者脾乘腎也白者肺乘腎也

面上五藏四時相乘色　經言青赤見於春赤黃見於夏黃白見於長夏白黑見於秋黑青見於冬是謂五藏之生五行相繼也為病經若肝色見青白心色見赤黑脾色見黃青肺色見白赤腎色見黑黃是謂真藏之色五行相剋也為病重

面目死生色　內經曰凡病面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑者皆　不死聖濟經云脾真為本而面黃必生者以真氣外榮故也若面青目赤面赤目白面青目黑面目白面赤目青者皆死謂無脾色外榮故也而真氣不藏

鼻上色　聖濟經曰鼻端青為腹冷黑為水氣白為無血黃為胸寒赤為有風鮮明為留飲

目內色赤者心熱淡紅者虛熱青者肝熱淺淡者肝虛黃者脾熱無精色腎虛

唇口死色　凡小兒病者有黑色滿面或繞口入口或延眉繞目或暗人中者皆死有青色延面連目入耳者死目無精光眼中有物如橫紅針者死

外臺死色　凡小兒病者面上有青黑色如紗蓋定從髮際至印堂者不以疾狀淺深六十日死至鼻柱者一月死至人中者十日死滿面者四日死

諸処紋狀候

耳後完骨上有青絡如線三兩路臥不靜者此瘈疾候當刺瘀破令血出以為小治若自腫破者死候也

手大指後白肉魚際之上有筋絡色青黑者胃中有寒赤黃者有熱赤青黑雜者寒熱若青而小短者少氣

又手覆手大指第二指之間虎口上有筋脈或
線香其顏色曲直以驗其病若紋直者是[illegible]
曲者是傷沉隱為曲向外者吟曲內為食
歌曰虎口齊紋直清知四足驚黑色元因水赤
乃大飛禽狀[illegible]人驚發青[illegible]有傷異外[illegible]內
為禽獸隱定風生長大疾須重短小得[illegible]
但看又手處病狀驗靈真
一指上及三節名曰三關小兒有男左女右
看之有入脉筋脉紋狀以驗其病名曰入[illegible]
錄最下一節名為氣關有紋过者病疑[illegible]重
論病既至到氣不調順故名氣關也
第二節名為風關有紋過者須發驚風漸加因
重故名風關也
第三節名為命關有紋過者則病極而命[illegible]
魚刺形主初驚在氣關主壯熱吐瀉在風關[illegible]
初驚發發在命關驚極難治
歌曰形如魚刺是初驚 遍体如湯面色青
吐瀉躁煩如似此 通陽和氣便惺惺
魚刺形七瀉痢在氣門主傷冷吐瀉在風關[illegible]
傳[illegible]為病在命關驚傳慢驚風極[illegible]

[illegible]形如懸針瀉利多 發驚身熱定嬉和
此病若變驚風慢 命關已變是沉痾
水 水字形主肺驚在氣關涎痰咳嗽虛積在風關
發驚喘吏涎在命關因不治
歌曰形如水字肺家驚 虛積相傳面色青
開上有涎須与治 命關若过更無寧
乙 乙字形又曰曲主食驚在氣關主食傷吐痢在風
關傳變風 乙形屬肝肝刑于脾在命關傳慢[illegible]治
歌曰形如乙曲病因肝 眼慢驚啼變癡偏
今積為傷傳变此 慢脾風已変三關
去蛇形主内实外虚 來蛇形主外实内虚 蛇中[illegible]
形内外俱虚此数樣皆曲毎乙曲蛇在氣關主
疳積在風關主勞带驚[illegible]命關不治
歌曰形如蛇曲病因深 脾積疳勞又帶驚
才過二關宜早治 若過三關更莫論
環 長者弓形短者環形主疳積在氣關吐逆疳熱[illegible]泻
土在風關疳極羸瘦在命關不治
歌曰形如環弓疳氣黃 好食泥土是尋常
此病早求良醫治 三關已到命難[illegible]
亂紋 亂紋形主蟲痛在氣關主氣不和[illegible]

子136 025

生物在風關主虫咬心腹痛在命關病困
難治
歌曰紋乱縱横虫上尋　曉夜啼號不可條
神術求鴻却無應　安虫取積得康寧
○珠形死候　此候不供三關上下見者皆為死候
歌曰琉珠見候不須醫　便是沉痾莫療之
三關若見都沐望　安排後事更無疑
諸紋總歌
魚刺初驚候　懸針瀉痢多
水紋驚肺積　乙樣是肝訛
曲虫驚痛病　環弓一論過
乱紋虫咬甚　流珠病已病

五藏主病論
諸形證候
肝藏　肝主風肝病実則目直叫哭呵欠頓悶
項急肝病虛則咬牙多欠口中氣熱則
外生口中氣温則內生治當補之　肝氣則搐衣
捻物熱甚則目　直不搐風主動又風證
未安熱即風動於四末故手搐衣捻物也然
入於目牽其筋脉則兩背俱緊不能轉視故
目直也治當瀉其心肝什有風則目連劄風甚則

身反折強直不搐凡病新久皆引風、風動止
於頭目目屬肝風入於目則目上下左右如
風之吹不輕不重兒不能任故目連劄也風
甚則風入於筋脉筋脉緊急故身反強直也
治當瀉肝補腎　肝有熱有風甚則皆兼發搐不
搐者謂未得心熱故也若心熱乘於肝則子
母俱有実熱風火相搏而乃發搐其抽掣之
勢如風蕩火也　治當瀉熱之藥　若肝熱擾衣捻
物壯熱飲食喘悶者肺乘之也　治當補脾瀉肝
四時冬相春王夏衰秋絕若在春肝王之時

早晨亦同反見肺病乘肝者是肺強肝怯也當
瀉肺補其　腎令肝虛補母者毋能令子実若其則直補肝
或子母補之俱痊　輕者肺病退則愈重者目中
淡青心實發搐若更有赤者當發搐也謂怯則
目淡青色有心熱則赤故當發搐肝虛實皆
主風若外感生者則呵欠頓悶口中氣熱治
當發散若能食飲水不止者當微下之
心藏　心主驚心病實則叫哭發熱飲水而搐
上竄發搐治當瀉之心病虛則臥而悸動不安
手足搐搦治當補之心病虛實皆主熱心實則

喜仰卧謂心氣实則氣上行瀉若合面卧氣則不通快故喜仰卧便氣得上下通也（治當瀉[illegible]）心熱則視其口中氣温或合面卧而就冷及上竄咬牙也（謂心熱則胷亦熱見錐不能言）有欲冷之意故合面卧也（治當瀉熱若邪熱乘）心則為驚啼（治當安神心）於四時春相夏王秋衰冬絕若在夏心王之時（日中亦同）反見腎病乘心者是腎強心弱也（治當補其肝心瀉其膀胱或令[illegible]）（而瀉膀胱者謂腎主虛而不实瀉其腑之府則[illegible]不[illegible]）輕者腎病退則愈重者搐動不已當發搐也

脾藏（胃附）脾主困　脾病实則困睡身熱飲水不能食（治當下之）脾病虛則身温吐支冷吐瀉生風（治當補之）脾寒者夜啼（脾屬陰冷即夜間發[illegible]）故見啼哭（治當温中）脾熱者弄舌　脾熱則舌絡緊故時時舒吐也或時飲水熱則津液少故也（治當分解其熱不可用涼藥下之腎虛者多疑其）飲水為熱便以涼藥下之加面黃肌瘦五心煩熱則為疳也（治在疳疾門中若不因脾熱入病）未已弄舌者凶也又脾藏冷熱皆主吐瀉困倦若吐乳色黃者傷熱吐乳色青者傷冷四時

之閑秋冬春三時皆冷多唯夏暑有[illegible]（胃附）胃熱者若吐瀉昏睡露睛者虛熱也[illegible]瀉昏睡不露睛者实熱也胃久虛熱多[illegible]病胃冷者若吐痰涎白綠水不食腹痛[illegible]青白利穀不化也胃虛冷也若胃虛怯有[illegible]者作上至項下至臍也若面㿠白无精光口頰揚口中氣冷不思食者胃不和也又小兒筋骨未成血脉未全自小多啼哭者胃啼也脾胃二者腑藏表裡人之司命故同病也脾於四時王在四旁（[illegible]）若於[illegible]時又見他

藏病乘脾者是脾弱也（如春冬三月[illegible]時見肝[illegible]未來之秋九月金位土王之時[illegible]未來之[illegible]治當補[illegible]）為殃隨証治之輕者所乘之藏病退則愈重者而目赤黃脾怯也

肺藏　肺主喘　肺病實則身温悶乱氣促喘急（治當瀉之）肺病虛則身熱哽氣長出氣（治當補之）肺熱則手掐眉目鼻面甚則吐衄涎及咯血者久則肺虛（[illegible]）治當解熱若实則涎[illegible]又復有風　冷者則[illegible]喘[illegible]氣悶乱喘而嗽上氣

广136 027

當先治肺後散風冷 若肺只傷風者不胃滿也但是散風又肺有虛實寒熱咳嗽者 泣於咳嗽門論之 肺經四時夏相秋王冬衰春絕若在秋肺王之時 日並時同 反見肝病來乘肺者是肝強肺怯也肺怯則脣色白若病而悶乱氣麄喘促哽氣者難治為肺虛損也脣白者 謂肺脾病久也脾為肺之母母子皆虛不能相營也故名曰怯 治當補脾肺而瀉其肝也 經者肝病退則愈當瀉 脣白枯者死白澤者吉

腎藏 腎主虛腎病無實唯斑瘡腎實則變黑

陷餘無實病腎病虛則身冷兒精光畏明体骨重蓋腎氣不足則下竄而骨重惟欲墜於下而縮身也又腎屬水陰也虛則畏明若因他病致腎虛者非也又腎虛者謂本怯由胎氣不成精神不足目中白睛多面㿠白兒光多鮮顱此皆難養縱長不過八八之數若恣色欲多不及四十而亡也 治虛當補之 腎於四時秋相冬王春衰夏絕若在冬腎王之時 夜半同 反見心病來乘腎者是心強腎弱也 治當瀉心而補腎 輕者心病退則愈重者下竄不語 嚌虛

凡病必視其新久虛實 假令肺病又見肝證若前牙多欠者則易治 謂肝虛不能勝肺也 若目直叫哭項急煩悶者則難治 謂肺病久則虛肝強而實反勝其肺也 虛則補其母實則瀉其子又病必視其五藏衰王時候參其相乘勝 召其虛實真假易治 微邪是也 逆者賊治 賊邪是也 五藏相反隨證治之

凡病先虛或已經下之有合下之者必先實其母後下其子也 假如肺虛而痰實此可下之證當先益其脾後方瀉肺也 諸病效此

凡病有熱者或疎利解化之後無虛證者勿服用溫補之若用之熱必隨生

諸死絕候

五藏天藏絕歌

心藏 吐瀉變為痢血黑濁難治 當心痛 心氣絕則血黑 變黑者得不寒而痰涎 飢寒難行坐唇舌不縮藏 心主舌 熱則不能收 兩眼如脂赤 痢久則面皆無色今面色赤如脂者 心絕則舌捲 無語口生瘡 心主舌絕則不能語 若向夏中得更莫細思量

肝藏 眼目時時淚滴頻以作人頻頻只要揉

心煩又多嗔（肝主目絕則不能○開故雖而不見又肝主筋）力絕則點頭人不能事也又肝主怒絕則多怒不止也唇白眼胞腫

狂躁延啼声東方應此候病則不宜春

脾藏 面色黄時好不可見相傳体弱瘠羸甚

垂行覓食滄（脾主足体絕則爲粉又脾絕則胃□□□）

痰（脾絕則胃熱故食不安而上吐出）嗄乳吞無力□□□

時難（脾主唇絕則不能收斂其齒又不能吮乳眼□□□）

眼胞（爲脾絕則瘦腫）免更住人間

肺藏 肺候應白色莫使見絕形鼻青孔□□

腹脹眼胞傾（肺主鼻絕則肺逆衰之而色青□□□）

故孔黑燥也肺主眼胞絕則腫也 項直喘氣急背凸□□

上声肺主氣絕則喘急項直背□□□□□□□□

咽口氣也 秋間逢此候四方別托生

腎藏 冷汗時時有氣多夜哀鳴（腎□□□）

故冷汗出而小便不禁精者神之舍絕則精神離故夜哀□□□

陰夜亦屬陰故也 遍身生栗疥手足冷如冰（陽氣不□）

能声嫂故也 項倒頭難舉面黑没精神（□□□□□）

倒面目以腎黑無精神也 此候應壬癸冬（□□□□）身

王叔和死證歌 眼上赤脉下貫瞳人顖門腫

起蒸及作坑鼻乾黑燥肚大青筋目多直視

爪不軟睛指甲黑色忽作鵶鳴舌出口□□

齒咬人魚口氣急啼不作声蚘虫既出必□

死形用藥速急十無一生

錢乙死證 瀉不定精神好 大渴不定止之

又渴 吹鼻不噴 病重口乾不睡 □氣

唇上青黑點 頰深赤如塗胭脂 鼻孔開

張 喘急不定 面有五色不常不澤

諸般死證 病困汗出如珠不流 頭毛上逆

唇口乾 口鼻冷氣 頭足相抵 卧正

如綿 四支垂嚲 手足掌冷

通心死候歌

顖陷□乾目直視 口中冷氣卧如痴

身形強直手足軟 掌冷頭低尽莫醫

小兒衛生總微論方卷第二

小兒衛生總微論方卷第三

變蒸論

小兒在母腹中胎化十月而生則皮膚筋骨腑臟氣血雖已全具而未充備故有變蒸者是長神智堅骨脉也變者易也蒸者熱也每經一次之後則見骨脉氣血稍强精神性情特異是以聖濟經言嬰孺始生有變蒸者以体具未充精神未壯尚資陰陽之氣水火之濟甄陶以成非道之自然以變為常者哉故兒自生每三十二日一次昔以人兩手十指每指三節共骨三十段又兩掌骨共三十二段足亦如之以應之也大倉公曰氣入內支長機骨於上變者乃是也聖濟經又曰變者上氣蒸者体熱上氣者則以五藏改易而皆上朝藏真高於肺也体熱者則以血脉敷榮陽方外固為陰使也故變蒸畢而形氣成就者也亦由稟分之生非陰陽氣緼熾蒸無以成變也兒自生三十二日為第一變者屬腎又三十二日再變且蒸者屬膀胱腎与膀胱為表裡共六十四日也其變則耳与骶骨皆冷者腎為水水數一故為變蒸之始也又三十二日為第三變屬心又三十二日為第四變且蒸屬小腸心与小腸為表裡共一百二十八日也其變則汗出而微驚者心為火火數二故為變蒸之次二也又三十二日為第五變屬肝又三十二日為第六變且蒸屬膽肝与膽為表裡共一百九十二日也其變則目不開而赤者肝為木木數三故變蒸之次三也又三十二日為第七變屬肺又三十二日為第八變且蒸屬大腸肺与大腸為表裡共二百五十六日也其變則皮膚熱或汗或不汗者肺屬金金數四故為變蒸之次四也又三十二日為第九變屬脾又三十二日為第十變屬胃脾与胃為表裡共三百二十日也其變則不食腹痛而吐乳者脾為土土數五故為變蒸之次五也後又六十四日復一大蒸四次積二百五十六日大蒸畢凡五百七十六日大小變蒸數足其血脉充長之于受血而能視足受血而能步亦手足之能也其變蒸之候体熱微驚耳冷髋冷上唇頭有白泡起若魚目珠子脉乱或汗或不汗不欲食食則輙吐目白睛重日亦黑睛微開而不開

至變蒸了自然明矣其輕者五日而衰重者十
日而衰或先期五日或後之五日或十日之中
熱乃除耳若熱甚通日不歇不得驚動勿令傍
邊人多而譊雜令日妄行發刺但少與紫丸微
利之則熱便止矣或用陽真人附後黑散子發香
散調治亦可嚴不可熱治若傷寒時行溫病及
驚熱溫壯等證錯雜與變蒸頗皆相似耳熱雖變
蒸上無痞泡等乃為變蒸病各從其證為治若於
變蒸內有寒熱之疾一定參驗證候啼不止
者斷之則愈

變蒸驗

看嬰兒先明四時運有變蒸之狀正加疏理
之胎寒熱初來慎一七內方過周期來爾當四
八以重朝系夫魂魄將成筋骸並營關節骨理
通徹奇經運用而陰陽以正性來而血氣初
平頭骨精神嬰嬰全然有兒未知蒸變一一子
細須明肝者幹也東方所屬為木象之三數發
形證於兩目陣身壯熱心惶子以無疾偏體不
沉為神魂而未是四數心在金二由在火咳啾煩
頻汗出顆顆兩目開張項仍加數夜裡虛驚為

又刊肝腑骨髓叢發以當長漸長性情心傍
人而悉氏脾土五呼聲木二稱發氣暗引精志
時增乳哺甘甜尻骨成而獨坐臟經絡流利掌
骨具而開膈能次後筋脈之精更膝蹀之漸變
氣乃不亦於內散光影而遊於滿面亭亭立猶
未語以咲語而今頭手足受血移步行而堪怜
耳目通神意智生而可美斯由呼吸以定肌体
乃孕兩氣而外陽內陰一息而入鼻出口期來
應節百骸臟充盈將來乖宜致得風邪甚有
於是髮堅無潤乳晛吐口珠起舌唇冷浸亂耳

或腸鳴而微利或發驚啼而勿喜經云蒸即蒸血
內之堅變即變形神之正矣

治方

紫丸治小兒身熱變蒸不解及溫壯傷寒乳哺
失節宿滞痰癖腹滿吐哯便利不調寺疾亦
治食癇先寒後熱

代赭石火煅醋淬七次赤石脂各一兩巴豆三十粒去皮心油

杏仁五十粒去皮尖

右上四味為細末下二味擣成膏相和更杵
二千下相得若硬入少蜜同杵作劑密器中

寂之三十日兒服麻子許分圓乳汁送下候令
頂之後方与少乳勿得多与至午中當出小利即
熱除其未除明旦更一服百日兒小豆許以此
湿量加减夏月多熱喜令發疹每二三十日輒
一服甚佳

紫散子治嬰小兒身熱變蒸不解及挾時行溫病
麻黃去根節二分　大黃一分　杏仁一分去皮二分和膏
右剉燒存性為細末每服壹字或半錢量
大小加減以水半錢盞煎以許須抱兒於燥
溫避風处速進二三服取微汗候身凉以粉

香散撲之一方只炒黑用
麝香散　蛤粉不以多少研極細末蒸過　麝香少許研
右勻末用絹裹蛤粉撲兒身如凶凉胃氣未和
不快義乳服觀音散方在後
熨法治小兒變蒸大存寒加之發寒熱又手脚
腰冷天稀而痛啼不止　蜜麴中吹　食塩
右二味量其相等和勻炒令熱以重帛裹
適溫熱熨兒仍不可太熱恐驚胳兒也
已上凡兒於變蒸之內若遇身熱脉乱汗不出
欲乳食乳食後輒吐者必審其日數度是變

蒸論之時者雖有是證死所苦也　陳和賈云小兒變蒸之以
四君子湯加茯神寺服其方白朮人参茯苓茯神各平两甘草炙三錢同
末每服前湯調下最慎不可妄治及服驚藥一本今作百合湯

脉理論

凡兒稟受臟腑氣血榮衛形体雖有生骨全盡
於未語之前變蒸之際則血氣未充骨筋
未固筋骨未堅臟狀未成若有病也難逐驗
又難訪問是以先賢言嬰小之病難治者以
無承擽也故立其觀視形色之法為兒自生
五百七十六日大小變蒸数畢則氣血宗精神
異筋骨壯脉理全至後方可診切又能言問也
或以謂小兒之脉与壯者不同者是不達診者
之大体也凡脉之長短遲速在因形以別之不
必拘於至数經言小兒脉多雀鬪要以三部為
主其脉小数小細者平也諸家所言甚衆今擇
其當者具之孫真人云小兒之脉因難分表裡
今撮其要者不出数條其總日歌曰
小兒有病須憑脉一指三關定其息小兒寸口
少者其至指以分三關也以一指診之
浮洪風熱數為驚虛緩沉遲实有積

浮脉為風秋得之曰平餘時得之主傷風寒咳
疼壯熱或夜熱昼涼咳嗽嚏噴鼻塞清涕咽疼
不食　歌曰
浮為風兮秋日平　餘中風寒頭目疼
壯氣逆衝鼻清涕　嚏噴咳嗽吐食頻
洪脉為熱夏得之曰平餘時得之主風熱壅盛
身体温壯瘡瘍血泄
歌曰
洪為湛溢夏時和　餘須數熱壯温多
風壅作驚或瘡腫　有時泄下血滂沱

數脉為驚春得之曰平餘時得之主驚風抽掣
脉數小者多癲癇跳直視怕怖盗汗非時咬牙
吐舌撮吐喘息脉數大者一兩日間必發搐搦
歌曰數為驚候春日長　餘時小數睡驚揚
喘息直視舌頻吐　大數潮搐發沉痰
沉遲為虛冷冬得之曰平餘時得之主脾胃虛
弱泄瀉滑腸脱肛吐痢不止日漸尪羸以成
脾困或作痟劳　歌曰
沉遲之脉冬日安　餘時脾胃弱虛言
泄瀉滑腸肛脱出　吐利尪羸瘦更殘

[illegible]脉為積滞四時得之皆主食傷積聚面黄
腹脹髮焦煩渴吐蚘腹痛
歌曰
实脉含傷積滞言　壯熱腹脹髮毛乾
吐痢壯疼或為癇　四時免異一般看
實論四時脉謂　春弦夏洪秋浮冬沉四季緩
各推其王相表裡以察其病假令春得弦而
浮者病在表在腑為陽為順病則易治若得
弦而沉者病在裡在臟為陰為逆病則難治
餘時放之

三氏脉訣曰
小兒乳後輒吐逆　更兼脉乱免憂慮
弦急之時被氣纏　脉緩即是不消乳
緊數細快亦少苦　虛濡邪氣驚風助
痢下宣腸急痛時　浮大之脉歸泉路
脉經曰小兒之脉快疾一息七八至曰平不及
曰損太過曰至
通真子歌曰
小兒三歲至五歲　呼吸須將八至看
九至不安十至困　短長大小有邪干

小兒脉緊是風癎　沉脉須知乳化難
腹痛緊弦牢实秘　沉縮有熱在骨間

諸脉　脉至三動而止不見者死　脉來速如弓弦硬直者死　脉來瞥然不見者死

三動而止不來沉　速硬如弦勁在弓
瞥然至而反不見　皆為死脉定由宗

緩疾脉

弦者為風寒　弦数者為癰

□□者為氣不和或為客忤

脉緊者為癎　緊數者驚癎

脉浮者為風　浮緊者驚風

浮大者傷寒　浮虛者盜汗

浮数者風熱

脉伏者為氣滞

脉緩脉細者皆為冷為乳不化

脉虛脉濡者為虛弱為驚

虛濡者慢驚風　虛緊者伏熱

脉沉重者為有積　沉数者骨間冷（一云骨間熱）

沉遲者虛冷　沉緩者傷食

脉牢緊者癖聚　牢实者腸秘

心脉滿大肝脉小急者驚癎

心脉数小者疳淋　数急者熱

寸口脉直上直下者為驚

寸口脉大小脉不匀乱者变蒸

左手寸口死脉心痛中熱　嘔逆口瘡或咳嗽喉中哽声頭汗出而熱此乳母食冷以乳兒所作也又脉乱者吐逆

右手寸口死脉胸滿短氣吐逆噫噦喉中響此乳母抱兒衝冒風寒所作也

凡脉如雀啄而緊者風癎

凡脉大小不依部次者惡候

凡小兒脉軟呼吸八至曰平九至曰病十至曰困

凡小兒脉虛者病亦虛（輕手得也）脉实者病亦实（重手得也）故急驚脉促急慢驚脉虛微

諸身熱論

凡小兒有病皆須身熱其證不一今條而具之

小兒於某時間發熱过時即退至來日依時熱至夜間此為潮熱欲發驚也

子136 031

小兒身熱但尚壯熱不已者此爲壯熱甚則發驚也

小兒身熱但溫而不甚壯熱此爲溫熱

小兒身熱口中氣熱叫哭无時呵欠煩悶面目青色此爲風熱甚小發驚

小兒身熱飲水悸惕手足搖動上視弄舌中內青筋見掌中赤的筋生涎此爲驚熱

小兒身熱面赤時久不退壯熱意頗叫氣急發丙胷高涎壅此爲積熱與壯熱相似但胷高涎壅爲異乃藏府積蘊熱毒三焦爲痰壅膈也又頭項硬者亦三焦爲痰壅也 已上皆甚則可搐治在驚癎門中

小兒身壯狀發熱氣促鼻塞清涕噴嚏惡寒毛起眼淚出或出痰嗽不止此爲傷寒治在傷寒門中

小兒身熱時發時退退但肚熱或夜發熱面黃腹脹吐瀉乳食不化噯酸臭異常此爲食傷治在傷食門中

小兒夜發熱曉即如故多涎喜睡此肺虛發熱也此與食傷夜發熱相似須要識之况二證餘候各皆不同食傷者可下肺虛者不可下下之則失津液發渴引飲皆錢乙治朱監簿子五歲夜發熱曉即如故衆醫作熱以疏轉解之不愈其候多涎喜睡又以藥下其涎病益甚至五六日大分斂藺乙治之乙曰不可下乃取白朮散煎湯三升使任意取足飲朱曰飲多不作瀉否乙曰但生水不能作瀉縱瀉亦不足怪但不可下耳朱又曰先治何病乙曰止瀉治痰退熱清神皆此藥也服乃至之作兩渴止與東子不渴無痰又投阿膠散二服而安 [illegible] 錢乙方本在 [illegible]

小兒每早食後發熱至夜則涼此爲血虛 [illegible]

小兒身熱形瘦多渴飲食不爲肌肉此爲疳熱 治在疳門中

小兒血氣旺盛壅而熱引飲大便黃紫小便赤少四肢身體冷熱而無此爲胃實熱也 [illegible]

小兒身熱發驚耳冷尻冷上唇頭有白泡宛如魚目珠子或汗或不汗此爲變蒸 治在變蒸門中

小兒身熱昏睡驚惕喜嚏噴耳冷尻冷此爲瘡疹候 治在瘡疹門中 此與食傷變蒸相似傷寒耳尻俱熱變蒸唇上有白泡如珠子爲異

小兒身熱有逆有順外在內者多飲水得之在外者多因風寒 [illegible] 之錢氏有云小兒身熱飲

水者熱在內身熱不飲水者熱在外此大概
之驗也在內者宜下之在外者宜散之若小
兒積熱內外傷感表裏渾身俱熱煩赤口乾
小便赤大便焦黃少者先以四順清涼飲
子利動臟府熱即退矣既而復熱者并表熱
之解而表熱未去後以惺惺散或紅綿散加
麻黃微發其汗表熱乃去既去又復發熱者
世醫尽不能識再下再表皆為不可誤傷多
矣此表裏俱虛氣不歸元陽浮於外所以再
發熱也但以六神散和其胃氣則收陽歸內

[illegible]小兒壯熱傷風溫疫傷寒風熱痰涎
傷食蘊積相似大定辨認之間但與升麻葛
根湯惺惺散小柴胡湯服之[illegible]此數藥隨
治之不致誤也惟傷食者則大便酸臭氣不
思食或吐宜與微下之
古人論小兒內外氣盛或時小驚或微蓋傷
風傷食又應變蒸身熱者但以紫圓熱[illegible]
或龍膽湯為治此二藥无所不療雖微利勿
以[illegible]人氣未不進人小兒氣消而冥者此亦

中有伏熱也宜服龍膽湯若糞白而酸臭者
此挾寒不消也宜服紫圓但小與令內消甚
者小增令微利痞皆須節乳哺一兩日令胃
氣平和若不節則病易復一則復下傷其胃
氣令腹脹滿若至再三下之則過傷矣

諸治方

治小兒潮熱溫壯勝金散
雄黃研 白芍藥 甘草炙 [illegible]
南星炮 荊芥穗各 右為末每服半錢水一小
盞入薄荷三葉煎至五分溫服無時
治小兒潮熱發躁[illegible]散

川大黃二兩 秦艽去蘆 [illegible]木香一兩 [illegible]服一字或
半錢水一小盞入青蒿三兩葉葱白二寸同
煎至五分去[illegible]溫服 [illegible]皮骨蒸勞氣用童
子小便浸青蒿葉白[illegible]
治小兒潮熱減食蒸瘦秦艽散
秦艽去蘆切焙 甘草炙各一兩
乾薄荷葉半兩切焙
右為末每服一二錢水一中盞煎至五分去
滓食後溫服
治小兒骨熱潮作亦治[illegible]及解傷寒地骨皮

知母　柴胡去芦　甘草炙　半夏湯洗七次切焙
人參去芦　地骨皮去骨　赤茯苓去黑皮各半分
右為末每服二銭水一盞生薑五片煎至六分去
滓食後温服量大小加减
治小兒温壯身熱臉赤煩渴燥悶凉肝圓
龍膽草去芦二两　玄參去芦一两　當歸去芦洗半一两
右為細末煉蜜和圓菉豆大每服二十圓竹
葉湯下兒大增之无時
治小兒温壯風熱牛黄膏

寒水石四两燒火水 雄黄一两水飛　山梔子仁一两去子
甘草一分炙　牙消一两　鉛白霜半两
右為細末入射香少許煉蜜和旋取皂子許
薄荷水化下乳食後
治小兒温壯風熱膈臥不穩咳嗽喘急退熱散
龍腦薄荷葉二两　白殭蚕去絲嘴半两炒
玄胡索去皮半两
右為末每服半銭或一銭蜜湯調下无時
治小兒風熱驚熱眼睡不安鎮心丹
鐵粉一分　蛇黄一两燒醋焠七次　代赭石

屁霜半两　射香一分別研
右為細末煉蜜入糊圓如小豆大每服一粒
磨剪刀銹水化下食後亦治驚癇發搐
治小兒風熱昏塞悶不食梨汁粥
右以鵝梨三枚切碎以水二升煑取汁一升
去滓入粳米一合煑粥食之
治小兒驚熱如火亦治温壯龍齒散
右以龍齒為末調服或以爛龍角研濃汁服
一二合
又方人參牛黄散

右以人參牛黄等分為末以薄荷水調下一錢
又方治如前
右以竹瀝二合温之分三四服無即刮竹茹
以醋煎温服
治小兒積熱嘀呀三焦壅滯青金丹
青黛四两　甘草二两生末　蟬殻去足一两
射香一銭研　辰砂一分研水飛　牛黄別研
腦子一分研　龍齒末半两　天竹黄半两
右為細末以飴糖和圓雞頭大每一粒分

子136 037

服溫水化下無時

治小兒積熱痰實三焦蘊毒及風熱面赤大小便秘澁犀角圓

生犀末一分　人參去蘆半兩　黃連去鬚一兩

枳實去穰麸炒　檳榔半兩　大黃二兩酒浸切片蒸焙乾

[illegible]

右為細末煉蜜和圓如麻子大每服一二十圓臨臥時熟水下未利加圓數踈導極悉

治小兒諸熱四順飲子

地骨皮去骨　防風去蘆并叉枝　山梔子去殼取仁

連翹各等分

右為細末每用一錢或二錢水一小盞入燈心竹葉少許煎至五分盞放冷服無時

治小兒諸熱甘露散

牙消一分　龍腦研　薄荷葉一兩　大黃去兩

生草半兩炙　芎藭一分　雄黃一分水飛

右為末每服半錢蜜水調下無時

治小兒諸熱煩躁牛黃散

右鬱金大者濕紙裹慢火煨熟為末入牛黃少許冷水調下大者一錢小者半錢無時

治小兒身熱不瘥

右以熟湯研郁李仁如杏酪一日服二合

又方

右以雞卵一枚和白蜜服之

小兒於立夏之後有病身熱者慎勿妄為吐下但以除熱湯浴之除熱粉粉之赤膏摩塗之

除熱湯

右以白芷根苗苦參等分為麤末用清漿水煎更入鹽少許以浴兒浴畢用粉粉之

又方

白芷苦參秦皮煎湯或蒺藜苗但得一味煮湯皆可

又方

右切李葉一升水七升煎至三升適溫煖用之澡浴或只用楮葉亦可

涼肌粉

右以白芷楓葉藁本苦參黃連各半分為細末每用三錢以蛤粉二大棋同研勻細入生絹袋子每浴了以撲身遍令勻亦治夏月伏暍

遍身生赤瘡手用之極妙

赤膏

丹砂　雷元　芒硝　戎鹽　大黃各三兩

右切碎用苦酒半升浸四物一宿以煉成豬脂一斤煎三上三下去滓入芒硝成膏每用以摩心下及塗臍中

治小兒血熱早食後發熱至晚則凉豬膽圓

胡黃連　宣黃連去鬚各半兩　赤芍藥一兩

右為細末以實豬膽汁和成劑却入在膽皮中懸銚上用漿水煮勿令着水入煮熟取出

圓如菉豆大每服三十圓米飲湯下食後臨臥日三有生瘡疽一證亦早食後身熱煩相似但以鼻衄泄瀉宜審辨之

牛黃膏治小兒瘡熱引飲亦治傷風溫壯

雄黃研水飛　甘草末　川朴硝各一分　鬱金末

腦子一錢研　寒水石生研飛　菉豆粉半兩

右同為細末煉蜜和成膏每用半皂子大薄荷湯化下食後

治小兒裏熱頭昏頰赤口內熱小便赤大便少要微挨動臟府即安四順清涼飲子

又治睡臥不寧五心煩熱四肢抽掣及乳哺不節并寒溫失度熱久蓮綿歎發驚癇目赤口瘡瘡疹餘毒

大黃濕紙裹煨熟去皮　當歸去蘆　赤芍藥

甘草炙各等分

右為末三歲上兒每服一錢水一盞煎至七分盞分二服更量大小加減食後溫服

治小兒外熱要微發汗即愈惺惺散良方名桔梗散治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱等

桔梗去蘆　細辛去苗　人參去蘆　甘草炙

白茯苓去黑皮　白朮各等分　瓜蔞根

右為細末每服一錢匕至二錢一小盞入薄荷三葉同煎至六分去滓溫服此傷寒溫壯變蒸瘡疹未辨皆可服

治小兒風熱體熱頭目不清紅綿散

白殭蠶去絲嘴一兩炒　天麻一兩　天南星二兩

剉切作片子油煠黃　蘇木節一兩半別末

右為細末每服一錢水一小盞入綿少許同煎至五分去滓溫服若傷風有表證發熱者於本方中入去節麻黃半錢同煎若有重[illegible]

心躁煩渴者入滑石末半錢同煎

治小兒發熱已經汗下仍熱者大神散

人參去須　白茯苓去黑皮　乾山藥

白术　甘草炙　白扁豆

右為細末每服一錢水一小盞入棗一枚擘破生姜三片同煎至五分盞通口服此藥用処甚多治胃冷加附子治風証加天麻治諸痢加罌粟殼若服之熱猶未退更与銀白散治之

銀白散

乾山藥　白术　白茯苓去黑皮各半兩　知母

人參去蘆　白扁豆　甘草炙　升麻各一分

右為細末每服一錢匕二小盞棗一个同煎至五分盞溫服無時

治小兒溫壯驚風及傷寒天行發熱或作瘡疹於初身熱未辨之間並可服此升麻葛根湯

乾葛細剉　升麻　芍藥　甘草各等分

右為麁末每服二錢水一小盞煎至五分盞去滓溫服無時

治如前小柴胡湯

柴胡去苗二兩　黃芩　人參去蘆各等分

半夏六錢湯洗七次　甘草三分炙

右為麁末每服二錢入生姜三片棗一枚水一小盞同煎至五分盞去滓溫服無時

治小兒胎中腹受血氣實盛發熱不歇及食不消變蒸不解客忤鬼氣溫壯寒熱并諸驚癇悉皆主之

龍膽湯

龍膽去蘆　鉤藤　柴胡去苗　黃芩

桔梗去蘆　芍藥　茯神去木　甘草炙各一分

蜣螂二个去翅足炙焦　大黃一分剉碎微炒[illegible]

右為麁末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服無時

治嬰小壯熱未能服藥者粉方

寒水石　芒硝　滑石　石膏　赤石脂

青木香　大黃　甘草　黃芩　防風去蘆[illegible]

芎藭　麻黃根各等分

右為末每用藥末三合入牡蠣粉一升細搗粉亦可相和再羅細研用以粉身日二次

治小兒風熱溫壯或傷寒時氣瘡疹未[illegible]

並宜服之仍兼小黑膏服尤善
桔梗去芦 細辛去苗 人參去芦 栝蔞根
白术 甘草 川芎 白茯苓去黑皮各等分
右為末每服二錢水一盞入生姜三片薄荷三葉同煎至七分盞三歲已下兒作四服無
時
小黑膏 川烏 南星各一枚大者
右入一小瓶子內用湿紙密搭封口慢火燒之候火滅取出削取中心所存白处如
皂子大用之須燒教揀擇中度者方用為末

次入薄荷葉玄參末各五錢匕研匀煉蜜和
成劑每用旋摯豆許圓之葱白湯下頻頻服
若筋脉或緩或急加乳香同葱白湯下之
治小兒發熱極甚已伏鳥心經昏冒不省或躁
服熱藥熱所致用之神效
以生梅花腦子半字或一字取新殺猪心一个
血一兩滴同研作一圓新汲水少許化下大
良未省即再服一粒
治小兒驚熱 以水磨犀角汁服之
薄荷散治小兒風熱溫壯及傷寒傷風瘡疹之

熱之間皆可服之
薄荷葉 藿香葉去土 荊芥穗 甘松去土
白芷 防風去芦并叉 川芎 桔梗去芦
白殭蚕去絲嘴 甘草炙 藁本去苗 細辛去苗各半兩
右為末每服一錢茶調溫服亦治大人風氣
不順頭面風等疾大能清利頭目止昏眩聰
明耳目

小兒衛生總微論方卷之十三

小兒衛生總微論方卷第四

驚癇論上

欲發候

小兒驚癇者世俗之總名須分輕重也輕者但身熱面赤睡臥不定啼惕上竄不發搐者此名驚也重者上視身强手足拳發搐者此名癇也其發搐之病最為重大必有因漸亦有得發之候以明之也養小兒之家若能辨之求治於未發之前不惟易愈又不至於危殆今集欲發搐候下項

目上視喜惕者欲發搐也　身熱項强常汗出者欲發搐也　手足喜搖掉者欲發搐也　搖頭弄舌者欲發搐也　喜欠目直面青者欲發搐也　潮熱或壯熱驚者欲發搐也　睡中時笑或狂語言手足搐動者欲發搐也　鼻中燥大便小便不利者欲發搐也　髮上逆啼面暗色不變者欲發搐也　身熱吐哯喘麄者欲發搐也　噫氣下而妄怒者欲發搐也　鼻口青喜忪悸者欲發搐也　咬牙甚者欲發搐也　目直色赤或青者欲發搐也　瞳子卒大異常者欲發搐也　面色青黃上竄氣急者欲發搐也　眼斜視者欲發搐也　嬭乳不和或嗔乳唇舌緊者欲發搐也　涎盛咽難呼呷有聲者欲發搐也　臥而不安身熱不乳數惕跳者欲發搐也　体熱口中氣亦熱面目青呵欠頰者欲發搐也　掌中赤黑肉青筋見怕物驚者欲發搐也　吐利不止厥痛時起者欲發搐也　唇口頰顋者手足心皆熱喜冷者欲發搐也　目瘀冷悶撮口吐舌者欲發搐也　身熱小便難或目直視或視不精皆欲發搐也

孫真人曰小兒眼瞼不穩或身熱之時見有諸小驚之証輒紫圓微下之減其熱氣令終不病癇發搐也月用一次甚佳方已在前變蒸門中

已發搐

發搐之候世俗所謂者多矣有言一証屬一藏一証屬一府喬岳歌曰小兒驚候有多般不顯根源見病難睡裏咬牙驚入腎非時吊眼病歸肝夜啼到曉无因肺唇白面青一脊前後心煩四肢熱面紅如火向心開

吻水脾驚急脉微氣喘一同言漢東王氏言
時吊眼驚入肝睛後咬牙驚入腎夜啼到
驚入小腸面青作行驚入膽氣啼喫水驚
入肺面紅臉赤驚入心五心煩熱驚入脾候
中鋸響驚入大腸乾嘔死時驚入胃睛中啼
哭驚入三焦如此之類言至百種叢脞無謂
何以為治又有言驚發三次為癇者第一次
發兩太陽左右青脉頰眼第二次發山根青
脉見驚三次發眼下臉連金匱青脉見之言
發搐面赤指冷□□見者為癇又云□□後完

骨上青脉如□□為癇此等之論亦為臆說
大抵不發搐者為驚發搐者為癇也千金論
癇證大体只分三種一曰風癇因解脫衣被
觸冒風邪而作其證先屈指如數乃發口中
氣熱呵欠頓悶手足搖動治當發散二曰驚
癇猛聞大声或撲仆驚怖而作其證先叫啼
乃發心神不寧不可下之下之內虛則病益
盛治當安神去熱三曰食癇因乳哺失節或
有積癖而作其證先不乳而吐先寒後熱乃
發其證身体溫壯或熱多睡□吐逆腹脹

故小兒有癖積脉大者必發癇治當下之此
三種內風驚二癇時時有之食癇者十中無
一下之便愈詳此三種雖諸病皆能變癇莫
不緣於風驚食之所作也又內經有云五
藏主五畜其間發重者各見其象肝為犬癇
目直視身反折手拳犬鳴心為馬癇張口搖
頭背強硬馬叫忌為羊癇目瞪吐舌羊叫脾為牛癇
目瘓腹滿牛叫肺為鷄癇搖頭反折手縱搐
擲鷄叫腎為猪癇目擯身直如尸吐沫猪叫
已上論癇發者乃諸書精要也然不若錢乙

所論發搐者乃心肝二藏為病也其理有據
而妙肝主風心主火風火相加發而為搐前
論小兒諸病然久皆能變癇發搐者以人有
病則飲食遲减脾胃不旺肝心受之引動肝
風肝又主驚若不得心火則不能發搐又人
有病則氣血錯亂心神不寧引動心火心又
主驚若不得肝風亦不得發搐也須肝心二
藏相為子母俱有實熱風火相搏驚□相搏
乃能發搐其狀亦如風之蕩火焔熾□然也
故肝心二藏為病之源餘藏雖不正主亦有

子136 013

袒乘兼見之証，及所發亦有其時，假如錢論潮熱變發搐，在早晨寅卯辰時者，此肝用事之時也。身体壯熱，目上視，手足搖動，口生熱涎，項頸強急，此肝旺也。錢治補腎瀉肝，是謂補其母而瀉其子也。發搐在日中巳午未時者，此心用事之時也。心惕，目上白睛赤色，牙關緊急，口內涎生，手足搐動，此心旺也。錢治瀉心、熱退則肝亦不能旺，是謂子能令母虛也。發搐在日晚申酉戌時者，此肺用事之時也。目微斜視，不甚搐而喘，身熱，睡露睛，

手足冷，大便黃水。錢治瀉其肝心，而補其脾。發搐者，心肝實為病之源，故瀉之。手足冷，大便黃水者，脾虛怯也，故補之。發搐在夜間亥子丑時者，此腎用事之時也。不甚搐，臥不穩，身体溫壯，目睛緊斜，喉中有涎，大便銀褐色，乳食不消，多食不納津液。錢治但瀉其心而補其脾。且心肝二藏為病之源，今独瀉其心而不瀉其肝者，此本因潮熱所作，發在腎用之時，是腎虛心熱極甚也。故但瀉其心熱退則肝亦平矣。若更瀉肝，則腎轉虛矣。卅大

便銀褐色，乳食不消，不納津液，皆脾衰之証，故補其脾也。已上四藏，分主十二時，脾藏為衰見之証。此潮熱發搐，治則惟瀉心肝者，蓋二藏俱實，為病之源故也。其肺藏有虛實之証，見虛則補，見實則瀉。況發搐是心火旺所作，而肺冷實熱亦罕，惟偏搐者有之。外腎藏但主虛而無實，見其虛則補之。內經有云：虛則補其母，實則瀉其子。先補其母，後瀉其子，子能令母虛，母能令子實。錢乙論此發搐，元白為治法，最可謂得聖人之經旨，深意也。可

謂出類拔萃矣。今更以錢論三事參之：一者發搐逆順，二者發搐陰陽，三者發搐真假。及各於逐項之下以錢治法為証，後學之士，將此三事參推五藏虛實，則形候察其虛實以時刻，依法為治，則小兒發搐之病，無以外矣。

○發搐逆順

男發左搐，或手大指屈外，或目左視無声者順也。若發右搐，或手大指屈內，或目右視。有声者逆也。女發右搐，或手大指屈內，或目右視無声者順也。若發左搐，或手大指屈外

或目左視有声者逆也順者相勝也左肝為
目右肺為金一頁一勝故無聲也逆者戰也
二藏俱实木金相擊故有声也順者易治逆
者難治男逆稍易女逆極難更當參其發時
以補瀉為治昔錢乙治李寺丞子三歲發搐
自卯至巳目右視大叫哭乙曰逆也男為
陽本發左視无声則順右視有声則逆所以然
者左肝木也右肺金也逆則二藏相戰金木
相擊而有聲也治乃瀉強補弱假令女發
搐目左視是肺來乘肝，肝不能任故叫哭也

當瀉其肺後治其心續治其肝若病在秋[illegible]
時肺兼旺位當大瀉其肺若病在春[illegible]此肝
旺之時尚不能勝肺是肺強而肝大弱也當
補其肝腎大瀉其肺若男發搐目右視是
肝來勝肺而叫哭當瀉其肝心若病在春夏[illegible]
時肝心旺時當大瀉其肝若病在秋此肺
旺之時尚不能勝肝是肝強而肺極虚也當
補其肺大瀉其肝所以言目反視者乃肝主
目也凡搐則是風熱相搏於內風屬肝故引
見於目也今此病男反女故稍易治於女也

先瀉其肺不悶亂以知肺病退也後補其脾
續治其肝心五日而愈乙又治徐氏子三歲
每日西發搐身微熱目微斜露睛四肢冷而
喘大便微黄請乙與李一醫同治乙問李曰
病搐何如以何藥治之李對不當乙曰搐者
心肝实也身微熱者日西肺用事之時肺主
身溫今且熱者肺虚也目微斜露睛者肝肺
相乘勝也四肢冷者脾虚也肺若虚甚則脾
母亦弱木氣乘之四肢即冷治當先補脾肺
得脾虚証退然後治其心肝九日乃愈此亦

逆搐肝肺相勝目斜者必當右視也今存此
以明逆順為治之法尔

發搐陰陽天吊附陽搐屬陽陰搐

小兒發搐為急慢驚急者古書無有惟曰陰癇陽
癇所謂急驚者乃後世名之也以陽動而
速故陽搐曰急驚。陰靜而緩故陰搐曰慢
驚此陰陽癇發搐之別也陽搐者身大熱
面赤引飲口中氣熱大小便赤黄眼上視逆
劄手足搐急牙關緊禁項背強直涎潮
因心熱極則生風風屬肝心肝子母氣

熾動而發搐也及其發定則了然如故此陽
盛陰虛治當利驚以除風熱不可與巴豆訣
藥大小之恐為虛熱不消小兒瘈瘲積熱於心
因聞大声或誤驚觸則動而發搐若熱極者
雖下因聞声驚觸亦自發搐小兒本实者多
此假也奈兩小兒心為壅滯涎盛熱積不得宣
通或因乳飲酒食肉無度致煩毒之氣流入
於胃因之乳兒令兒宿滯不消熱毒乘心發為驚搐眼
曰翻騰壯熱不休甚者爪甲皆青狀若神祟
俗謂之天吊此非天能吊人以其眼吊上視

故取意名之況小兒發搐未有不眼上若实
亦陽搐之候也治宜去涎熱昔錢乙治蘇親
宅七太尉子八使發陽搐自寅至午於未發
前錢乙見其目直視而頰赤此心肝俱熱[illegible]
坐石抚子就冷此熱甚也又肌体素肥而本
实其脉急促發搐自寅至午皆心肝用事之
時治乃瀉其心肝而補其腎病遂得愈此亦
瀉強補弱也　陰搐者身溫面皖口中乞
似搐不搐但時時痰涎似搐而乏精神
眼露睛殺殺上視或胃痛而啼作聲或不能

啼哭唇口白色脉沉弱此因大病之後或吐
瀉过甚致脾胃虛損而生風往搐乃成此陰
盛陽虛治當補其脾胃瀉去肝風小兒虛弱
亦不因吐瀉取轉直發陰搐者亦有之本法
昔多此候也慢脾風附小兒因傷風冷或病吐
瀉醫以溫藥補之不已復用凉藥治之又不
已太醫謂傷於風冷胃亂治之致脾虛而内不
能散外不能解至十餘日其證昏睡露睛大
便不聚而瀉此脾虛風入風在脾胃之間故
大便不聚而瀉時痰涎身体四肢口鼻中氣

皆冷小兒亦有因驚所傳或諸病久变見此
証者皆因脾胃虛怯而生風所為也故俗謂
慢脾風实实乃陰搐之危候治當去脾間風
風退利止以補脾胃昔錢乙治王氏子病吐
瀉他醫以藥下之至虛変陰搐其候睡露睛
手足瘈瘲而身冷乙見曰此慢驚也與藥以
实脾胃即開目身溫王疑其子不大小便又
令他醫以藥利之而復身冷尚欲令乙利小
便乙曰不當利利之必身冷王曰已身冷矣
乙曰不能食而胃中虛若利大小便使脾虛

俱虛當閉目身冷即死今此兒幸胎氣實而
難衰乙復補脾胃則微能飲食所以然者
謂利大小便脾胃虛寒當補脾而不可別攻
也後不語他醫作失音治乙曰既失音何開
目而能飲食又牙不噤而口不緊他醫不能
曉乙曰此因用清藥利小便致脾腎俱虛今
脾已實腎尚虛故也遂以藥補腎及依法為
治半月能言一月而痊

發搐真假

真者兒在母胎中時血氣未全精神未備則動
靜喘息莫不隨母母調適乖宜喜怒失常或
聞大聲或有擊觸母驚動於外兒胎感於內至
生下百日以來因有所犯引動其疾必發驚熱
吐哯心神不寧臥不昏驚躁啼哭[illegible]
直手足搐搦口撮頸斜目瞪氣入[illegible]掉搖
全或瀉青黃水是胎病也是內發風癇發為
真搐然亦發稀而難治不過三兩次必死[illegible]
假者兒生出母腹百日以來肌膚嫩怯血
軟弱被外風傷之入客於內每遇[illegible]
任故發搐搦口中氣熱呵欠噴嚏此風
似重者亦不呵欠噴嚏與胎病相似若發頻
者輕輕則易歇故也治當發散青錢乙治李
司戶孫生百日來發搐日三五次請眾醫治
或作熱天吊或作胎驚或作驚癇治言不應
後請乙治乙曰嬰兒初生肌骨嫩怯被風傷
之兒不能任故發搐也然頻發者輕以客風
在內每遇不任即搐搐輕則易歇故發頻也搐
稀者是內藏發病不可救也乙用微發散
風邪藥並須浴法治之乃愈仍不可多服蓋
兒至小易為虛實多即生熱止一服而已
用封鍼不救已上錢乙所用方並本集載述

驚搐禍難論

凡小兒急驚方搐者不用忙慢亦不足畏
驚難微搐切當救乃危候也方搐之時但當
扶持慎勿擒提蓋風氣方盛恐流入筋脈或
手足曲戾不隨或成拘攣
凡小兒急驚閻孝忠云當其搐勢減時與鎮心
治熱藥一二服如射香圓抱龍圓辰砂圓紫
雪之類候驚勢已定用藥下其痰熱如射香
圓救金川桃枝圓之類如此則心神安寧即

愈
凡小兒慢驚若因吐瀉已成虛損者閻忠孝云
當與速生胃氣以理中丸研金液丹末煎生
姜米粥調灌之多服乃效候胃氣生手足漸暖
四支猶然瘈瘲即減金液丹一二分增青州
白圓子一二分同研如上服漸漸以意減金
液丹加白圓子亦用異攻散羌活膏鈎藤飲
之類調理頻頻與粥細至危者往往死中得
生
凡小兒急慢驚陰陽異証切宜辨而治之急

驚合用涼藥慢驚合用温藥世人多用一藥
不能分別誤小兒多矣殊不知藥性自有温
涼豈可泛用初虞世謂治陰陽癇寒温藥性
當於方中用時增損則死矣矣又閻孝忠言
慢驚藥中宜去龍腦縱須合用必以温藥爲
佐或少少用之惟涼故也
凡小兒於大陰雷發声之時必掩塞其耳或
作雜声以乱之恐猛聞大声而發驚
凡小兒發搐時瞬而身軟者爲癇若發搐不
時醒身硬者爲痓多啞乃中風之候

凡小兒驚癇泄瀉并諸病煩渴者皆津液內
耗也不問陰陽煎錢氏白术散使任意取足
飲弥多弥好
凡小兒驚癇藥中能不用水銀輕粉者尤佳
如不得已而用之但去其痰即止蓋小兒腸
胃易損亦傷以滴今所集之方多不用輕粉
如須用之者當依此酌量減損
凡小兒欲生瘡疹有發搐者當從瘡疹爲治
餘諸病有與驚癇相兼可以一方爲治者依
法用之若不可以一方爲治者則各用所主

藥相兼治之
凡小兒驚蟯蜋爲治第一世醫多不學未免
有用者若用之須擇不傷水者傷水則不堪
用去其頭翅足炙令焦乃入藥
一凡小兒吐瀉後精神目頻多睡不吃乳食四肢微冷發變
成癇者以神麯爲末入腦射各少許温水調
服若已成癇其如鷄聲而色青黃手足瘈瘲
腸中不利更入珠砂同末服之若變癇滑利
者以麯末裹圓如鷄頭大温水化下
又一方麯末一兩琥珀甘草各二錢硃砂雄黃

各一分同末煉蜜圓……

小兒百病……

小兒衛生總微論方卷第四

小兒衛生總微論方卷第五

驚癇方下

治驚癇欲發搐方

定心膏 治諸熱安心神截驚癇欲發

生葛根(取汁) 竹瀝 大麻仁(一分去皮研)

菉豆粉(一兩) 朱砂(半兩研) 牛黃(一錢研) 射香(一錢研)

右同和如稀更入少菉豆粉相拌得所石臼中杵三二百下成膏圓雞頭子大每服一丸煎人參湯化下量大小增減用無時

琥珀丹 治如前

琥珀(一兩) 白殭蚕

臘月牛膽製天南星(一兩) 天麻(一兩) 白附子(半兩)

香白芷 朱砂(一兩研水飛) 龍腦(一錢研)

右拌勻煉蜜圓如雞頭子大每服一圓煎人參薄荷湯化下量大小增減用無時

生葛飲子 治熱極不已欲發驚癇

生葛汁(一合) 竹瀝(一合) 牛黃

右相和每服半合量大小與之無時

鈎藤飲子 治發熱時戴眼口吐涎沫欲發癇搐

鈎藤(半兩) 蚱蟬 人參(一分) 黃芩(一分) 大黃(一分)

右麤末每服一大錢水一盞煎至六分入竹

瀝半合同煎數沸下牛黃一小豆許細研入之攪勻
放溫量大小與服得微汗爲效乳母忌蒜麪炙爆之物
治小兒心胸積熱毛焦睡中狂語欲發驚
朱砂半兩研 牛黃一分 右同研如粉每服一錢磨
犀角水調服量大小與之無時
治小兒熱盛夜後狂語欲發驚以竹瀝一歲兒連
夜飲二合少少頻與兒大以意加之無時
人參散治小兒忽作驚狀目上視手足搐未可
服驚藥宜先與此服之
人參去蘆 茯苓去黑皮各半兩 甘草一分炙

右爲末每服一錢溫湯調下食空服
茯神散治小兒煩熱心悸手足搖動欲發驚癎
茯神去木 龍齒研 牛黃研 犀角屑各半兩
寒水石一兩 石膏一兩 川大黃一兩
右爲麤末每服一錢水一盞煎至五分去滓入
竹瀝半合更煎一兩沸量大小與服無時
又方治如前 茯神去木 龍齒研 升麻
甘草炙各半兩 寒水石 石膏各一兩 麥門冬去心
右爲末每服一錢水一盞煎至五分去滓入
竹瀝半合更煎一二沸量大小與服無時

辰砂金箔散治小兒心膈邪熱神志不寧
煩渴睡臥不穩弄舌齒齘夾實狹道咽嗌不
利欲發驚癎
辰砂一兩研 桔梗去蘆 人參去蘆 白茯苓去皮各一錢
蛤粉 甘草炙 腦子半字 金箔二十片
右爲細末百日下兒用半字至一字薄荷
水調塗舌上令自嚥百日上兒或大便秘
者蜜湯調一字嚥服一歲上者半錢咽喉腫
痛口舌生瘡者以少許摻瘡處去津咽效
牛黃散清心涼膈鎮驚欲發已發

牛黃半兩細研 朱砂一兩細研 麝香一分研 龍腦半兩
天竺黃一兩研 蝎梢
右同拌研勻每用一字新汲水調下無時
牛黃圓治眼直惡聲嚼舌吐沫欲發驚癎
牛黃一兩研 黃丹一兩 麝香一錢研
右同研細用生乳半升熬成膏和劑圓菉豆
大每服三圓溫水下日三如無牛乳用羊乳
亦得
急風膏利胸膈清心神截欲發已發驚癎
朱砂半兩研 天麻子去皮

白殭蠶一分研　乾全蝎一箇炒[illegible]
右拌研勻細入龍腦細末半錢再同研勻用
軟皮剤成圓如皂子大每服一粒煎人參荊
芥湯化下無時
消驚膏　治小兒風熱涎盛截除驚癇安鎮心神
定寧搐搦　荊芥穗去梗
全蝎去毒　朱砂研飛　天南星　白附子各炮
天麻去蘆　蝎稍炒　半夏[illegible]各一錢
水銀錫結砂子　膩粉各一錢
右同勻細用石腦油[illegible]內棗湯煮過捏和藥
末爲劑圓如黑豆大每服一二圓薄荷湯化
下更量大小加減服無時
抑驚朱砂圓　治小兒溫壯驚風積熱一切痰涎
鎮心化痰清神利膈消驚截搐
朱砂研細水飛　膩粉各一分　[illegible]　金箔七片
乾蝎十箇全者　天麻一分　白附子一分炮
半夏湯洗七次薑汁浸焙乾一分　白殭蠶炒去絲嘴一分
右同爲細末研勻煮棗肉和如小豆大每服
二圓煎荊芥薄荷湯化下無時
剪刀股圓　治小兒驚風欲發未見的証但吐[illegible]

一圓無不消退用之常驗
五靈脂去砂石一分　乾蝎緊小全者　龍腦別研半錢
乾蟾酒浸去骨炙令黃色一分　牛黃別研一錢
雄黃大顆醋淬七次別研如粉　白殭蠶直者去絲嘴微炒用
天竺黃別研半兩　朱砂研一錢水飛　麝香別研半錢
右順手研令極細糊圓櫻桃大每服一圓金
銀薄荷湯以剪刀股研化服之三歲下者只
半圓無時
治風癇方
蜣螂散　治小兒風癇發搐
乾蜣螂[illegible]　天麻[illegible]　防葵半兩
蝎稍一分　威靈仙半兩[illegible]
川芒硝　天竺黃各一分二味同研細
右同拌勻爲散每服一字或半錢乳香湯調
下量大小加減與服無時
麻黃蝎稍散　治如前　麻黃去根節半兩　蝎稍十四箇
右將二味碎之用薄荷葉裹之外更用紙裹
了於水浸濕過火中煨紙焦乾取出爲
末每服半錢金銀薄荷湯調下無時
[illegible]散治風癇多困不省

川芎 犀角散 獨活(去芦[illegible]) 蝎梢
人參(去芦) 天麻([illegible])
右為細末每服半錢溫酒調下無時
蔥湯圓治風癇發搐痰涎壅熱
天南星([illegible]) 蝎梢([illegible]) 半夏([illegible])
寒水石([illegible]各一分) 朱砂([illegible]) 殭蚕([illegible]各一分)
右為細末麵糊圓菉豆大燒蔥白湯送下
三五圓量大小加減無時
人參化風膏治風癇發搐[illegible]無時
天麻(酒浸) 全蝎([illegible]) 殭蚕([illegible])

人參(去芦) 川芎 白附子([illegible]) 羌活(去芦)
獨活(去芦) 防風(去芦[illegible]各一分)
右為細末煉蜜圓如皂子大每服一圓荊芥
湯化下量大小與之無時
治小兒風癇
以鼈甲去裙襴炙黄杵末每服一錢乳汁調
服之或以蜜和圓如小豆大服之亦可無時
雞蘇散治小兒風癇
雞蘇 木賊 荊芥
右各等分為細末以茶清調下半錢[illegible]

皂莢煎圓治如前
肥嫩不蛀皂角([illegible])
號丹([illegible])
右將號丹為細末量其所用入皂莢膏和劑
圓如菉豆大每服五七圓溫湯送下乳食前
搐梅散治如前
以大石榴一枚剜頂去子剜作甕入全蝎五
个在內却以頂蓋之紙筋搜黄泥封裹了先
用微火[illegible]漸加大火煆通赤良久去火放
冷去泥取[illegible]中焦者細研為散每服半錢[illegible]調下搐[illegible]

若[illegible]之[illegible]定不會服者灌之兒稍大用防風
湯調下無時
大青膏治[illegible]風發搐
青黛([illegible]) 麝香([illegible]) 天麻([illegible]) 白附子([illegible])
蝎尾([illegible]) 朱砂([illegible]) 烏蛇([illegible])
天竺黄([illegible])
右為細末生蜜和膏每服月中兒粳米
大同日已上兒子大一歲以上一皂子同牛黄
膏溫薄荷水化開一處服之五歲上者同甘
露散一處服之

牛黃膏

雄黃[illegible] 甘草[illegible]

川甜消[illegible] 朱砂[illegible] 龍腦一字

寒水石[illegible]

右為細末研勻蜜和劑溫薄荷水化[illegible]

服之無時

甘露散一名玉露散

寒水石[illegible] 石膏[illegible]

甘草生分

右同為細末每服一字半錢溫湯調下食後

治驚癇方

蟬蛻散治驚癇熱盛發搐

蟬蛻[illegible] 人參[illegible] 黃芩一分 茯神一分

升麻[illegible] 牛黃[illegible] 天竺黃[illegible] 牡蠣粉[illegible]

右同勻細每用半錢煎荊芥薄荷湯調服無時

鎮心膏治驚癇發搐熱盛悶亂

遠志[illegible] 防己[illegible] 茯神[illegible] 人參[illegible]

大黃[illegible] 辰砂[illegible] 雄黃一分[illegible]

金箔[illegible] 銀箔[illegible] 龍腦[illegible]

右拌勻煉蜜和膏每服一皂子大薄荷湯化下

無時

金銀丹治驚癇發搐安神定志除煩熱化痰涎

羌活[illegible] 人參[illegible] 茯苓 川芎 山藥

南星 蛇黃[illegible] 蟬蛻[illegible]

[illegible]子一錢 乳香一分 全蝎一分 牛黃[illegible]

蟬殼[illegible] 殭蠶[illegible] [illegible]粉[illegible]

麝香一錢 朱砂[illegible]

右為細末麵糊和圓作二三等圓子[illegible]

量圓數服無時

安神湯治驚癇搐搦精神恍惚心驚不寧

白茯苓[illegible] 白鮮皮一兩 馬[illegible] 人參[illegible]

遠志[illegible] 石膏[illegible] 甘草一分 犀角末一分

右為細末每服一錢水一盞去心麥門冬少許

同煎至五分去滓放溫時時與服

[illegible]圓治驚癇發搐中焦壅熱痰盛

茯神[illegible] 人參[illegible] 防葵 鉤藤[illegible]

朱砂[illegible] 雄黃[illegible] 犀角屑 龍齒[illegible]

大黃[illegible] 牛黃[illegible] 龍腦[illegible] 金銀箔[illegible]

右為細末煉蜜和圓小雞頭大每服半圓或

一圓薄荷湯化服量大小加減無時

治食癎方（千金月蝕圓方具前驚搐門中）

真珠圓 治食癎發搐

滑石末一錢　輕粉二錢　乾蝎半（巴豆［illegible］）

半夏麴末一錢　南星末一錢　麝香一字研

右為末蒸餅和圓菉豆大一歲下者一圓上

若二圓葱湯下乳食前

蛜蝌散 治食癎發搐身熱服上藥

乾蝎　白附子　朱砂（另研水飛）　膩粉（一錢）

巴豆（二十四个去皮膜出油不盡研）　天漿子（三个去殼）　麝香（一字）

右同研細每用一字薄荷湯調下量大小加減乳食前

天青圓 治食癎發搐及有驚積（許宣撰）

青黛（炒五錢）　蜈蚣（一對全者炙）　蝎（二十一个全者炒）

巴豆（二十一个去皮心膜出油各用）

右為末用鵝梨汁煎菉豆粉作糊和圓菉豆

大每服一圓酒一匙水一匙薄荷汁少許同

化下食癎或急驚發搐服之立效乳食前

銀湯圓 治如前

天南星　檳榔（一个去皮）

巴豆（去皮膜出油）　牛黄（一字）　蝎梢（十四个）

砂末（五分）

右為細末煎薄荷湯調麪作糊圓如黍米大

每服五圓煎金銀湯下乳前食更量大小加

減

妙聖丹 治食癎發搐利胸膈

蝎梢（四十九个炒）　木香（一分）　代赭石（一分）

牙硝（一分）　大黄（一分）　膩粉（一分研）

朱砂（一分研水飛）　麝香（一分研）　腦子（一分研）

巴豆（七个去皮心出油）

右為細末滴水和圓黍米大每服三五圓

香湯下乳食前

蟾酥丹 治食癎吐不止湯藥不下

蟾酥（一分）　真珠末（一分）　甘遂（一分）

牡蠣粉（一分）　犀角末（一分）　巴豆（七个去皮心出油）

杏仁（一分）　麝香（一分研）

右拌研勻細糯米飯和圓黍米大每服三圓荊

芥湯放溫送下量大小加減乳食前

靈朱圓 治食癎乳食不消心腹壅滯四肢抽掣

五靈脂（去砂石）　朱砂（研水飛）　巴豆（去皮心出油）

右同研細如粉燒粟米飯和圓黄米大一二

歲兒溫水下二圓取或利或吐效更在量大
小加減服之以飯前

三聖圓治癎證發未能分辨皆可治之

黑錫（一兩以鉛半兩水銀同炒結砂子研極細）　蝎梢（半兩）　木香（半兩）
天南星（半兩炮裂）　殭蠶（去絲嘴半兩炒）　人參（去蘆半兩）
半夏（半兩湯洗七次）　防風（去蘆并叉枝半兩）

右為細末石腦油半盞研極細入射香一錢
腦子半錢各研細與衆藥末拌勻棗肉和圓
香米大每服三五圓至十圓煎荊芥薄荷湯下更時

治五藏五畜癎方

治肝病犬癎　伏日取犬齒水磨汁服
又方　取犬頭骨為末服
治心病羊癎　三月三日取羊齒水磨汁服
又云心病馬癎　取馬齒水磨汁服
又方　取馬[illegible]服[illegible]一二
馬蹄
治脾病牛癎　取牛齒水磨服為牛齒最佳
又方　取白牛糞中豆服之
又方　燒蹄末服
又方　取牛鼻中木燒灰服

治肺病鷄癎　取白鷄腦水調服
治腎病豬癎　五月五日取豬齒水磨汁服
又方　取豬乳服

五色圓治五藏五種癎證

朱砂（半兩研水飛）　水銀（一分）　雄黃（一兩研水飛）
真珠末（一兩令研極細）　鉛（二兩同水銀熬）

右為末煉蜜和圓麻子大每服三四圓煎金
銀薄荷湯下無時

露蜂房散治五種疾發搐口吐涎沫

露蜂房（一兩洗淨炒焦）　石菖蒲（一兩九節者）　桂心（半兩）
遠志（甘草水煮去心半兩）　人參（去蘆半兩）　牛黃（一分研）
杏仁（湯浸去皮尖炒黃一分）　朱砂（一分研水飛）

右同為細末每用半錢射香湯調下無時

治偏搐方

鉤金治落癎偏搐

赤足蜈蚣（一條）　赤色大壁虎（不[illegible]）

右蜈蚣乾以利刀當脊分切作兩半各逐左
右別研為細末不得交錯各用貼子盛之於
貼子上號記左右遇其患者每用一字許鼻
內搐之左治左右治右俱搐者[illegible]

左[illegible]則㕮左右在右則㕮右皆住

又金箴治如前

右以蜈蚣一条大者去頭足尾用真酥塗慢火上炙黄置竹子面南用快竹刀子當脊縫中停劈作兩半用兩貼子題記左右字不得交差重則誤矣 又以射香一錢亦分左右兩邊先將左分一半在左字貼内與蜈蚣同研作細末却入左字貼内盛起次將右分一半入在右邊與蜈蚣同研作細末却入右字貼内盛起不得相犯遇病者眼睛吊上止見白睛搐搦不省不能出声者用細筆筒子置藥以搐者左右鼻孔中吹之用藥不可多若眼吊全未下即添些小以意度量其眼隨手便下搐亦便止餘同二法二方相犯

保壽散治驚癇緾搐

雄黄 茯苓 人參 朱砂

牙硝

右細匀每用半錢熟水調下一歲用一字

[illegible]湯搐急驚方

紅膏治急驚潮搐涎盛

天南星 朱砂 水銀

乾蝎

右件匀入臘射各錢再研入棗肉和劑入石臼中杵三五百下圓如豆子大每服一圓煎薄荷湯化下神驗死時

朱粉丹治急驚壯熱吐涎發搐

朱砂 膩粉 蝎稍

巴豆

右為細末糊圓每服三兩圓煎桃仁湯下一方無巴豆但作散每服半錢湯使如前無時

百靈圓治急驚化涎定搐

黑鉛 水銀 天南星

白附子 乾蝎 天麻 蟬殼

麝香 牛黄

右為末匀細糯米飯和圓黍米大温酒下三圓量大小加減服死時

天漿子圓治急驚潮發搐

天漿子 牛黄 射香

白附子(各一錢焙) 犀角末(一分) 半夏(一分湯洗七次)
蟾酥(一錢) 猪膽(一个)
右為細末入猪膽汁和剤如汁少入少麪糊
圓黍米大每服三五圓薄荷湯下无時
朱砂散治如前
朱砂(一分研水飛) 鐵粉(一錢) 射香(半錢研) 蘆薈(一錢別研)
胡黃連(一錢) 蝎稍(一錢) 白附子(一錢) 金箔(十片)
殭蚕(一錢) 赤足蜈蚣(一條炙) 甘草(一錢炙)
右為細末二歲上兒半錢匕已下者一字金
銀薄荷湯調下三歲上者一錢匕如口噤不

開灌入鼻中無時
白金散治如前
天南星(一兩大者) 朴硝(兩半) 白礬(一錢) 甘草(半兩)
右為麁末用水五盞慢火一処煮交水尽為度
焙乾為細末入硃砂末乙錢拌匀每用半錢
煎金銀薄荷湯放温調下無時
七宝牛黃圓治急驚目睛上視手足發搐
朱砂(水飛) 粉霜(別研) 輕粉 雄黃(研水飛各一錢)
牛黃(半錢別研) 腦子(一字研) 射香(一字研)
右為細末糯米粥和圓小豆大二歲下兒半

圓上者一圓金銀薄荷湯磨化服之月内兒
一圓分四服百日者分三服看兒大小壯怯
及病勢輕重以意加减無時
水銀圓治急驚痰壅發搐悶乱口噤
水銀(一分入棗肉少許同研至星尽) 膩粉(一分研) 南星(一分炮)
乾蝎(一分微炒)
右為末用棗肉和圓黍米大每服五七圓
乳香湯下量大小加减無時
小朱砂圓治急驚發搐瘈瘲
朱砂(一分研水飛) 巴豆(二十个去皮膜出油令尽)

半夏(湯洗七次焙乾各一錢) 杏仁(二十个)
右為細末麪糊和圓菉豆大二歲兒一圓剝
斧薄荷湯下三歲加一圓五歲者三圓如
有驚在内者利動至病盡藥圓乃出如無驚者
藥不下也甚妙兩穩乳食前
至聖膏治急驚張搐手拳緊多睡嗞呀煩熱悶实
朱砂(一分水飛) 天南星 鐵粉(一分研)
蝎稍(七个) 續隨子 腦射(各少許)
右為細末煉蜜和圓如鶏頭大薄荷溫湯化下
一圓如涎多加輕粉半錢更看大小加减服

[illegible]散治急驚搐搦壯熱[illegible]痰盛
乾全蝎 巴豆 輕粉 梅花
川鬱金 朱砂
右為細末入腦射各少許每用一字薄荷湯
下或得吐瀉或得轉汗皆愈如牙關緊即斡用
藥搽開然後服之開關散方在後
蝎梢散治急驚風潮搐
以全蝎中一緊實者去尾尖上毒炒焦為末
每服一錢濃煎防風湯調下[illegible]相識[illegible]宣教
[illegible]一子病驚搐得此方治安恐再發遂與

常服之妙 後同與烏蛇散服之尤佳
四聖散治一歲至五六歲兒急驚潮搐
天漿子 朱砂 全蝎 射香
右同研膏每服少許薄荷溫水化下無時
治小兒卒得急癇
右剉碎以水五合煮取二合分八服日五夜三
鈎藤 甘草
治急驚風搐痰盛
天漿子 乾蝎 朱砂
右同為末軟飯和圓粟米大每服二圓荊芥
湯下不計時量兒大小加減

方治如前
以全蝎一枚薄荷四葉裹合火上炙令薄荷
葉焦同研細末分作四服溫湯調下亦治大
人風涎只作一服無時
治急驚發痫迷悶不省[illegible]沖目擦搐
以真牛黃一大豆許研細和蜜水服之
以犀角末半錢匕溫水二合分服
以真熊膽二大豆許以乳汁或竹瀝服之能
去心中涎良愈
以虎睛研末以水調灌之量大小與一方用

一豆許炙乾研末猪乳三合和之綿纏蘸浸
與兒吮之頻頻以多為佳
治小兒卒驚似有痛處而不知疾狀
以刺雄雞冠血滴少許入兒口中
治小兒初發驚搐壯熱痰壅嘔吐不止
蝎 麻黃 薄荷
右為細末量大小用藥以水六分煎一四沸溫
服
牛黃膏治驚風邪熱痰盛膈壅時發潮搐
不時上視咬牙服之恐驚化涎

[illegible]鎮心袪邪止嗽美進乳食
牛黃別研 人參去蘆 甘草炙
牙硝枯 朱砂研水飛 雄黃研 蛤粉
金箔 銀箔 龍腦少許
右為細末煉蜜和劑每九錢重分作一十圓
以金箔為衣每服一圓溫薄荷水化下乳後
天吊附
治孩童天吊搐搦
以東行桑根取汁與服 亦能俾搦口瘡
保生圓治天吊搐搦壯熱藏府壅滯

蝎稍 天南星 巴豆去皮心
右於清明日初夜將藥露北極下一宿明旦
杵羅為末以豉四十九粒口含不語津潤至
既去皮研爛和圓黍米大隨年圓數溫水下
乳食前
治天吊偏急塗頂法 川烏末 芸薹子末
右用新汲水調塗頭頂上立驗一方用烯糊
調塗顖上
一字散治天吊眼上能退風與神
大天南星 蟬殼 乾蝎一分

右為細末次入蕎麥麵一分用酸石榴一个
去穰子留殼將諸藥入在內鹽泥封裹於灶
內慢火燒至泥乾焦為度取出再研極細每
服一字溫酒調下無時
壁魚兒圓治天吊目睛上視手足搐搦
右以壁魚兒乾者十个濕者五个用乳汁相
和研爛再入乳汁少許灌之
琥珀散治天吊驚風發搐
琥珀末[illegible]分 真珠末[illegible]分 朱砂末[illegible]分 鉛霜半分

赤芍藥末一分
右拌勻每服一字煎金銀薄荷湯調下無時
殭蚕散治天吊目上視發搐
白殭蚕 馬牙硝半兩 蔚金
一乾蝎
右為末每服一字乳汁調下急者服半錢
治陰癎慢驚方
犀角散治吐瀉變慢驚發癎瘲
犀角屑 白朮 甘草 橘皮
右為細末每服半錢水一盞入金銀薄荷煎

至七分溫服連進三服無時
[illegible]白散治吐瀉生風發慢驚痰癡此藥[illegible]逐涎解
脾去風
右用大天南星一个重一兩者換酒浸七伏
時取出置新瓦上周圍以炭火炙令乾烈須
於地上去火毒用瓷器合之候冷取出於羅
爲末次入朱砂細末一分拌勻每服半錢荊
芥湯調下早辰午前各一
青金膏治因吐瀉變慢驚痰癡
烏蛇肉（一分酒浸焙乾） 蝎梢（一分） 天麻（一分）

白附子（一分） 大附子（一箇炮裂去皮臍） 青黛（一分研）
射香（一錢研） 天竹黃（一錢研）
右爲細末入研藥拌勻煉蜜和膏同皂子大
煎人參薄荷湯化下量大小與服無時
聽鶯圓治慢驚身熱痰癡昏憒
朱砂（半錢水飛） [illegible] 青黛 盧會（[illegible]）
膩粉（一錢） 龍腦（半錢別研） 使君子（[illegible]）
右拌勻細寒食麵作糊和圓桐子大薄荷湯
化下一圓無時
[illegible]散治慢驚身冷痰癡昏困（保生名[illegible]）

大附子（[illegible]） [illegible]
半夏（[illegible]） 白附子（[illegible]） 朱砂（[illegible]）
射香（[illegible]）
右爲末同勻每服一字薄荷湯調下無時
羌活膏治脾胃虛而生風或因吐利或取轉過
度發爲慢驚
羌活（去蘆） 川芎 人參（去蘆） 白附子（炮） 赤茯苓（[illegible]）
天麻（[illegible]） 殭蠶（[illegible]） 乾蝎（[illegible]） 附子（[illegible]）
白花蛇（酒浸[illegible]分） 防風（去蘆[illegible]） 牛黃（[illegible]）
麻黃（去根節） 肉荳蔻（[illegible]） 藿香葉（去土）

沉香 鷄舌香（[illegible]） 木香（[illegible]） 真珠（[illegible]）
射香 輕粉（一字研） 腦子（[illegible]）
雄黃 辰砂（[illegible]）
右爲細末同勻煉蜜和劑旋圓如大豆許每
服一圓薄荷湯或去心麥門冬湯下一二圓
量大小加減若急驚者勿服此藥性溫故
也服之無時
銀白圓治脾困虛弱或因吐瀉或久病成慢驚
身冷痰癡
天麻（[illegible]） 殭蠶（[illegible]） 白附子（[illegible]） 乾蝎（[illegible]）

天南星湯浸洗切焙二分
右為細末以湯調成麵作糊圓菉豆大圓了
頭寒食麵中養七日畢取而用之若急用未
足日數亦可用每服五七圓至一二十圓量
大小加減生姜米飲下空心服看病勢漸加
圓數多少服妙
鉤藤飲子治陰癇多昏驚手足冷時瘈瘲直視
不乳
鉤藤鉤子三分 殭蚕[illegible] 川芎 甘草炙
蟬殼去土并頭翅足炙 蛇蛻炙[illegible]各分 蝎蛸[illegible]

右為末每用二錢水一盞生姜五片煎至七
分去滓量大小與服小者分三四次與服不
會服即灌之若審是陰癇的當用藥末二錢
入炮過附子末用指面許依前煎之溫服日
三夜一急驚不用附子服之無時
比聖圓治陰癇体虛羸瘦多困
烏蛇酒浸取肉炙[illegible] 蠍梢 白殭蚕炒[illegible]
青黛 白附子各分 蟾蜍[illegible]
右為細末煉蜜圓桐子大如遇病者末以[illegible]
圓湯泡薄荷水化灌兒鼻中如得嚏則可[illegible]

以金銀湯化下一圓日二三若證藥下
難治服之無時
天漿子散治陰癇昏困多睡時時瘈瘲
天漿子[illegible] 白殭蚕[illegible] 乾全蝎[illegible]
右為細末每服一字煎去根節麻黃湯調下
日三得汗出為效服之無時
七神丹治陰癇面青口噤喉內涎鳴手足瘈瘲
搐搦
朱砂研飛 牛黃研 羌活去蘆各一分 天南星[illegible]
麝香一分研 蝎尾炒 殭蚕[illegible]各七个

右為細末以熟棗肉和圓菉豆大薄荷湯下
二三圓兒小化服亦得無時
天南星煎圓治陰癇慢驚瘈瘲
天南星[illegible] 白附子半兩[illegible]
天麻一兩 乾蝎一兩
右下三味為細末入膏和圓菉豆大三歲兒二
圓五歲兒三圓薄荷湯送下日二服無時
五靈脂圓治如前
五靈脂去砂石 白附子生 天南星生
乾蝎生 蟬殼去土生各一兩

右為細末用醋二盞先以粉末一兩同於
膏入諸藥和圓菉豆大每服日晚以乳汁化
下一圓二歲下二圓大者以意加之金銀薄
荷湯化下服畢身上汗出見效無時

鋸殼膏治如前

右以蠖姑一个去頭翅足入射香輕粉各黃
米許同研極細以粉水少許就之得如綠豆
之立效

必效丹治如前

赤足蜈蚣一條炙 蝎梢[illegible] 生犀尖[illegible]錢

梁坯半錢 朱砂[illegible] 射香一字
右為細末煎豬脂[illegible]丸[illegible]大每服[illegible]五圓用
大金[illegible]下無時

天金散

辰砂[illegible] [illegible]鐵粉[illegible] 輕粉[illegible] 金箔[illegible]
右為細末分作九服如遇患者將一服分二
姬每一半用童子小便并酒共半盞煎三四
沸放冷調藥一半送下必效用如行五里許
再一服時半日後須下驚痰是驗便安如已
絲取轉者即用井花水調入金散下必效

再須諸是慢驚者方可與服立見其効[illegible]
絕心頭溫者灌下藥即醒

薰陸香圓治虛風慢驚發搐痰涎安神寬定[illegible]

血竭[illegible]研 乳香[illegible]研
右研細於火上炙為圓如乾即入少水和
如酸棗核大每服一圓薄荷酒化下並治婦
人產後血暈不省人事無時

蜈蚣散治如前

蜈蚣[illegible] 蝎[illegible] 辰砂[illegible]
右為細末百日兒一字荊芥湯調下漸大以
意加之無時

天雄膏治如前

赤頭蜈蚣[illegible]
白附子[illegible] 朱[illegible] [illegible] 輕粉[illegible]
雄黃[illegible] 白术[illegible] 鬱金[illegible] 半夏[illegible]
右為細末入腦射各少許煉蜜和圓雞頭子
大薄荷湯化下一圓無時

塗頗法治陰癇慢驚

右以天南星洗七遍為細末用生姜自然汁
煮糊調塗頗頂上

子136-062

妙聖散治慢驚久不差兩手顫瘲抽掣不止
赤足蜈蚣一條[illegible] 草烏[illegible] [illegible] 射香一錢研 龍腦半錢研
右拌勻每用半字以小竹筒吹入兒兩鼻孔中候兩手定時方可議服別藥
天麻鈎藤湯治因吐利脾胃虛而生風變慢驚
鈎藤三分 天麻 蟬殼去土 防風[illegible]
人參去蘆 麻黃[illegible] 殭蠶[illegible] 蠍尾[illegible]
甘草炙 [illegible] 射香一錢研
右同為細末每用二錢水一盞煎至六分量大小與服如吟多面青唇白四肢冷入附子末半錢無時

喝起散治因吐瀉生風變慢驚或作慢脾風
半夏[illegible] 生姜[illegible]
朱砂 滑石 白礬[illegible] 滾石子[illegible]
右為末每服一字煎冬瓜湯調下如一服醒便止後服無時
生銀散治慢驚乍靜乍動手足瘈瘲時發時止
生銀末[illegible] 雄黃[illegible] 黑鉛一錢水磨
天南星[illegible] 磁石[illegible] 鐵華粉一錢

朱砂一錢水飛 射香一錢
右為細末每服一字煎犀角屑湯調下如見涎困者用薄荷自然汁調下汗出為效
治陰癇若多用性溫燥之藥有至癇証已退未退之間却生熱証或反為急驚者甚多凡治病必當先問病者之家所患幾日因何得之曾服何藥如此詳審若服熱藥太過可用解毒藥治之見不効者
豆卷散治陰癇慢驚服溫熱藥太多而却生熱証反為急驚
大豆卷[illegible] 貫衆
板藍根 甘草炙各一兩
右同為細末每服半錢或一錢白水煎服[illegible]一服甚者用漿水三錢煎數沸溫服之二三服[illegible]
[illegible]散治諸癇
大黃[illegible] 半夏[illegible] 甘草[illegible]
金星石 銀星石 寒水石 禹餘糧[illegible]
不灰木 青蛤粉[illegible]
右等分為末入龍腦一字再研新水調下

字或半錢量大小加減此回方也錢之八竹
松兩枝麝香末一錢金牙石一分加減天黃
一半服之无時

慢脾風者

錄口散治慢脾變風危困者

天南星一枚生姜自然汁和劑捻作餅子炙黃
白附子一枚[illegible]薄荷自然汁和劑捻作餅子炙黃
右[illegible]為末每服半錢或一錢煎冬瓜子湯調下

羌活膏治慢驚　及脾風及身体冷四肢硬
危急將不救者

羌活去蘆　獨活去蘆　人參去蘆　茯苓去皮
防風去蘆　桂去皮　乾蝎炒　水銀半錢
硫黃[illegible]研　射香一字研
右先研硫黃次入射香水銀研至無星極細
之入諸藥末拌勻煉蜜和膏圓皂子大薄荷
湯化下　保生治胃虛吐瀉生風羌活天麻防
風各半兩人參茯苓蝎梢各一分朱砂水銀
硫黃各一分服之無時
大天南星散治吐瀉或服轉藥過度脾虛生風
為慢驚或作脾風危急之候

右以天南星一枚重八九錢至一兩者先掘
一地坑深三寸許用炭火五斤燒通赤去火
入好酒半盞在內然後入天南星却用炭火
三兩條蓋却坑子候天南星微裂取出剉碎
再炒令勻熟不可稍生放冷為細末每服一
字或半錢濃煎生姜　防風湯調下無時
又方治如前
梓州厚朴[illegible]半夏[illegible]
右用米泔三升同浸一百刻周一伏時以文
火慢[illegible]尺為度如至百刻水未盡加火熬乾去厚

朴只用半夏為細末每服半字或一字薄荷
湯化下無時
辰砂膏治陰癇搐掣[illegible]為脾風
右以大附子一枚[illegible]錢匕微炮去皮臍於
頂頭剜一竅子入辰砂[illegible]各半錢却用取
下附子末填滿於竅上燒存性次用天南星
[illegible]蝎梢[illegible]朱砂[illegible]同為細末煉蜜
和圓雞頭子大每服一丸射香薄荷湯入酒
三兩滴化服無時
丙丁散[illegible]

f 1.6 0t 1

天南星　烏蛇肉(酒浸去骨)　天麻
麻黄(去節)　大附子(炮)
全蝎(去毒)　白附子(炮)　白殭蚕(炒)
右為末以水一升浸三日去其滓用寒食
麪一袋和匀蹋作麪餅子七日取出以紙
袋盛吊起十四日可用治小兒吐瀉精神昏
困多睡不乳四支厥冷欲發慢驚者以麪一
兩為末入蝎子末一字每服半錢或一錢溫
水調下若吐瀉發慢驚者此症極危須當其
病心主血病則血亂肺主氣病則氣弄肝主
筋病則抽掣脾主困病則昏困腎主寒病則
身冷故病者血亂氣并四支抽掣吐瀉昏困
唇口色白身体冰冷煩悶慢驚面青喉嚨
痰聲搐搦已成慢驚更入朱砂末一錢半
拌匀服依上若慢驚吐利傳為脾風者用
麪末一兩㕮咀入蝎一錢半拌匀煉蜜和丸鷄
頭大名丙丁膏滋心化下又別以麪末一兩
朱砂末檳黄末各抄一錢拌匀入蝎末半
抄二錢拌匀煉蜜圓雞頭大名太乙丹治小
兒百病此方簡易簡家藏服之無驗
[illegible]孝忠云小兒吐瀉脾胃虛而生風以為慢驚
或傳成脾風大便不禁至虛須危憊者嘗遠
生胃氣實與理中丸并剉金液丹作末煎生
姜米飲調灌之多服乃効服至二三兩無虞
候胃氣生手足漸煖然四支猶然寒疾即
減金液丹一分却用青州白圓子一二分
同研如上法與服以意詳之漸減金液丹加
白圓子兼用異以散[illegible]羌活膏
白圓的藏飲了大觀[illegible]依此治之仍須與補
食雖不存始往往死中得生十有七八予於
岳太尉處得一方稱自王運使所傳治小兒
急慢驚風吐瀉不止危不可治者名為安胃
圓與上相似大同而小異
好青州白圓子(三錢)　好金液丹(三錢)
全蝎(去毒炒)　射香(少許)
右同研為細末以糯米飯和丸黍米大每服
二三十丸煎蘿蔔糯米湯下無時
射香牛黄丸治小兒急慢驚風慢脾風
牛黄(一錢研)　射香(研)　蜈蚣(一錢)　乳香(一錢研)
没藥(一錢研)　蜈蚣(一條炙黃)　花蛇肉(去骨一錢酒浸宿)

天南星(二錢炮) 草烏(二錢炮去皮) 天麻(二錢[illegible])
防風(二錢半[illegible]) 雄黃(半錢研水飛) 朱砂(一錢研)
右為細末，酒糊和劑如皂子大，一歲至二歲
兒每服一圓，研細，煎金銀薄荷湯調下；七歲
至十歲服二丸至三丸，煎人參湯調下；擇時
風細研三丸灌下，次看前湯下，無時。
香餅子 治小兒吐瀉之後，脾虛生風，目睛直
視，其發搐硬，手足瘈瘲，乃治心肺中風[illegible]
塞不省([illegible])
川烏([illegible]) 天南星([illegible]) 白附子([illegible])
蝎梢(一分) 蜈蚣([illegible]) 朱砂([illegible])
射香(一分[illegible]) 乳香([illegible]) 鐵[illegible] 牛黃([illegible])
右為末，同研細，酒糊圓如鷄頭大，捏作餅子。
每服一二餅，煎人參薄荷湯化下。
聖脾散 治慢脾風
香附子([illegible]) 小黑豆([illegible]) 甘草(半分)
右為細末，每服半錢，飯飲調下，無時。
急慢驚通用 治小兒急慢驚風，聲已不出，色[illegible]
殆命在須臾，首男左女右，[illegible]中指在手心[illegible]
救，當中點灶及[illegible]

粒，甚者不過三粒，聲出即止。(此[illegible])
天麻膏 治小兒急慢驚風及慢脾風搐搦[illegible]
塞牙噤，一切惡候及吐瀉等疾。
全蝎(一分) 牛黃(一錢研) 白附子(一錢) 天麻(一錢) 雄黃([illegible])
訶子([illegible]) [illegible](一錢) 藿香葉(去土一錢) 白荳蔻仁(一錢)
[illegible]砂([illegible]) 白殭蠶(去絲嘴四錢炒)
右為細末，煉蜜丸如鷄頭大，每服一丸，煎薄荷
湯化下。若吐瀉者，煎冬瓜子湯下；咽吐
者，煎丁香湯化下。並不拘時候，更量大小臨時
加減，亦看病之輕重用藥，則無失矣。
牛黃丸 治急慢驚風[illegible]不止
牛黃(研) 天竺黃(研)
犀角屑 胡黃連(各半兩) 蘆薈 人參(去蘆) 白茯苓
丁香 鉤藤 龍齒([illegible]) 射香([illegible]研) 腦子([illegible])
右為細末，煉蜜和，菉豆大，每服三丸，粥飲下，無時。
黑神圓 治急慢驚
膩粉([illegible]) 香墨([illegible]) 白麵([illegible])
牛黃(別研) 青黛 使君子([illegible]) 腦子([illegible])
右為末，糊圓桐子大，每服半圓，薄荷水下([illegible])
動，服一圓。楚州小醫閻王鐵，因此藥致富[illegible]
之，未嘗傳人，予得之，乃號驚丸，小黑耳[illegible]
救，班研，一服立差，無時。

青金丹治如前　雄黃末研一朱砂末各一錢鐵粉各一錢
乳香末一錢　南星末一錢炮　蝎稍炒二錢　輕粉
青黛各一錢　射香一字　花頭蛇去皮酒浸焙
右為末以梨汁和劑分三丹同之茶米
麻子菉豆大量大小與之一圓薄荷水送
下煎金銀湯亦得無梨汁用薄荷汁熟睛
雄朱丹治如前　雄黃水飛　朱砂水飛等分
右為細末用白項曲蟮一條放藥中令蟮
濕以竹笓子刮下丸如芥子大每服三丸
金銀薄荷湯下其曲蟮却須放了不可壞

死服之無時
軟金丹又名聖力丹治小兒急慢驚風三癇瘈
瘲頭項動搖目睛上視或牽斜偏搐背脊強直
或反折如弓口噤牙緊或弱指如數或溫壯連
綿或服涼藥過多內生虛風或因傷寒變搐發
瀉或因吐痢生風為病一切諸証乳食不進昏
冒不省凡此急候服之皆愈但不當急者此藥
必効如已當急者更須審詳虛實若涎實者同
水銀圓化此藥服之二藥引化驚涎則潮搐立
止虛者但只服此藥即便放下服表如小兒涎

熱風熱有諸般驚証服之便差更無變動又治大
人卒中風病涎潮不省此藥神聖救人不可量
牛黃一錢　丹砂一兩水飛　雄黃研水飛　生犀鎊
末各一兩　天麻　殭蠶去絲嘴　半夏湯洗七次焙
蟬殼去土　南木香　使君子肉各一分
南薑蠶炒去嘴　香墨各一分　去大南星炮　白附
子炮去皮各一錢半　水銀二錢半用黑鉛三錢半結砂
金箔一百片　白花蛇　烏蛇三錢取項後腹前去皮骨酒浸焙
腻粉一錢半　螺青一兩　射香一字研
龍腦半分研　附子一枚炮裂去皮臍　蜈蚣中者

二条去頭蜜炙　金蝎三十个　天漿子三十五个去殼
文檳榔一枚　丁香一錢半　蟾酥二皂子大　金箔
銀箔各十五片　右為末逐件旋入研之細勻
用不蛀皂莢一挺刮去皮弦以好酒半升浸
一宿按揉取汁去滓入石腦油三錢銀器內
文武火煎十數沸放冷別煉蜜少許投內和
諸藥得所入者圓棗大小若皂子大別以金
銀箔為衣每服一圓金銀薄荷湯化下　此亦
三者用水銀圓化下小兒量大小与之有神效
右譚氏方也服之死時

又方八仙大青金丹治小兒諸驚癎此東京西吾內山藥鋪馬兒某家方 天竺黃二錢末 墨二錢不許大不要得使盡 射香一錢研 朱砂一錢研水飛 水銀半兩 錫半兩

右於銚內先鎔錫化入水銀結砂子乳鉢內研開次入諸藥末研勻細方用濃墨水和丸彈子大以灰碗盆內鋪紙於紙上布藥逅乾十歲兒一粒分三四服七八歲兒作四服五六歲兒分六服三四歲兒分十服一二歲兒分十六服新生百晬兒分三十服並微利當服者須隔旬日服一服小兒風熱裝涸潮搐

延盛咳喘並臨時加減如吐瀉後生風服亦不妨此藥性温宜少服並用湯化下如煎湯不可犯鐵器入口如聖服之死時

治急慢驚發搐 乳香半錢研 甘遂一錢

右同研細每服半錢乳香小便調下妙

又方治如前 蝎梢半錢 朱砂一皂子許研水飛 射香一錢豆許右同為末每服一字或半錢用赤小豆拌勻薄荷温酒調下死時

定命丹治急慢驚風吊眼撮口搐搦不定壯熱用 蟾酥一錢乾者酒浸一宿 乾蝎七枚全者 南星末一分

白附子末半錢 青黛半錢研別為末 射香少許

右勻細末粟米粥和丸菉豆大別以青黛為衣每服一丸荊芥薄荷湯下服藥後困睡勿疑凡病者先化半丸點鼻中得嚏者必效如新生兒閉臟將二捻生油一滴新水半茶腳化一丸服之取下胎中所受病更免諸驚和熱服之死時

射香餅子治如前 烏頭蛇一對酒浸一宿取肉 蝎梢 白附子一兩炮 天南星一兩炮 白殭蚕一兩炒去絲 乳香半兩研 朱砂一兩研水飛 天漿子四十九个去殼 射香

一錢研 金箔十片 右為細末煉蜜和丸桐子大捻扁作餅子用金銀荊芥湯化服大小加減凡時此便是除風膏若以麥飯和丸便是麥飯膏此黑漿兒[illegible]藥[illegible]方也

如聖散治如前 白附子二錢炮 丁香[illegible]半錢 全蝎二錢中者用麵炒去足[illegible]甲 人參去蘆 甘草 烏蛇三兩炮去皮骨 附子二錢 丁香一錢半 [illegible] 天竺黃一錢 天南星米泔浸一宿[illegible] 龍齒半 蔚金一錢 腦 射各少許

右為細末十歲下兒半錢上者一錢匕

湯調下如兒驚搐大小便不通者進二三服兒稍

是湯治如前 右以大天南星一枚重四錢

若 細研為末用水一碗冬瓜子四十

九粒同煎至一盞去滓入青汁半盞分三服

痢食以四君子湯加之一方每用南星末一

錢上下以水半盞煎至半盞或藥亦可亦得入

生姜三片冬瓜子四十九粒煎至半盞以下分二

服方治慢驚服之無時

當歸膏名如前 右以大天南星二兩為末臘

臘月黄牛膽取汁和之却入膽中如膽汁[illegible]

星可用之密塞懸當風處乾細末入朱砂末一錢射

香少許蒸甘草膏 和劑丸雞頭子大每一

爲手丸臨水化下量大小加減如一膽寫

星末不盡用二膽亦得服之無時

黄金湯治如前 右以代赭石火煅醋淬十次

為細末水飛過日中曬乾每服半錢一錢

煎真金湯調下量大小與之連進三服兒

脚脛上有赤斑點者即是[illegible]出現當安

也若無赤斑點者出不可治兒服無時

如聖青金丹治急驚發搐熱吐逆[illegible]

潮搐 龍腦一錢研 射香研 膩粉研各一分 白麪二錢

香墨一錢半爲末 青黛二錢研 使君子去殼為末二十個 裹

慢火煨熟爲末 金箔 銀箔各五片

右細研末滴水丸雞頭子大慢驚風用冷薄荷

湯化下一丸須臾便睡睡覺立愈更服三兩

服急驚[illegible]下半丸下涎一合以來神効無時

滚涎丹治 慢驚風潮搐無時 龍腦一字

朱砂一錢半 鵰砂末一錢 馬牙硝五錢 鈆霜二錢

水銀錢結砂子 牛黄一字 射香一字

右同研自然成膏丸楊梅核大梨汁化下一

丸量大小加減無時

牛黄丸治急慢驚風發搐痰壅及吐瀉生風

牛黄一錢 牛膽制天南星末一錢 滴乳香末一錢

全研 人參去蘆一分 天麻 [illegible] 白

殭蠶去絲 [illegible]

射香一分 全蝎 [illegible]

右為細末煉蜜和丸雞頭實大荊芥薄荷湯

化下一丸量宜加減無時

龍搐丸治急慢驚發搐不開噤身反強

水銀 [illegible]

酒浸一宿去皮 人參半兩 天南星半兩炮 白附子半兩
乾蝎七個去毒 朱砂半兩水飛 青黛一分 腦子 麝香各一錢
右為細末石腦油研和丸小麻子大每服一
丸薄荷湯化下無時
虎睛丸治急慢驚搐涎熱多睡及諸惡証
虎睛一對酒浸炙焙 乾 蓪明天麻半兩 白茯神去心
肉豆蔻半兩 白附子一分 天漿子五七個 雄黃半兩 使君子一百
個去殼切焙 乾朱砂二兩水飛 全蝎去毒半兩 牛黃半兩
天南星二兩炮 京墨半兩燒過 青黛半兩 麝香
輕粉各一分 右同勻細末酒糊丸桐子大每服

一丸薄荷湯化下有急病加作二三丸不拘時
烏蝎散治急慢驚搐一如弓危困難治療之者此
方主之 烏蛇肉酒浸去皮骨一錢 赤足蜈蚣一條去頭足
糯米炒 全蝎一錢半去毒 天麻半兩 白茯苓半兩 黑附子
半兩炮裂去皮臍 白殭蠶炒去絲一分 麝香少許
右為細末每服半錢用田斷井索煎湯調下
其效如神如急用無斷井索煎荊芥湯不拘時
治胎癇發搐真假方
虎睛丸治自生嬰兒百日以來壯熱驚搐
發在百日內以後雖發搐真假相似以後須有灸

外風傷之也
虎睛一對酒浸微炙取末 牛黃一分別研 朱砂一分研水飛
雄黃一分研水飛 麝香一分研
右為細末煉蜜和丸綠豆大以乳汁研化三五丸
烏金膏治胎癇發搐頻併 烏蛇一條酒浸去皮骨只
取肉焙用酒浸一宿焙 蠶紙一張燒灰 蟬殼去足半兩 全蝎
半兩七枚為末 朱砂半兩研飛 麝香半錢研 腦子半字研
金箔二十片細研 右拌勻煉蜜和膏丸皂子大
當每服一粒煎人參薄荷湯化開服無時
牛黃丸治自生至百日以來五臟多熱而發驚搐

牛黃一分各研 龍腦一分 黃芩末半兩 朱砂半兩研飛
乾蝎一分 犀角末半兩 右同研如粉粟米飯
和丸麻子大溫水化一丸與服無時
羌活膏治胎癇發搐不省
羌活去蘆一兩 烏蛇肉酒浸焙乾 獨活去蘆一兩
天麻半兩 全蝎半兩 白殭蠶炒去絲 人參半兩去蘆
右為細末煉蜜和膏每服一皂子大射香荊芥
湯化下無時
鎮朱丹治如前
乾蝎一分微炒 天漿子一分微炒去殼 朱砂半兩研飛 牛黃一錢

露蜂房一分燒灰爲細末 水銀一分用黑鉛一分結砂子 射香一錢
右同拌勻麵糊和丸黍米大每服三五丸金
銀薄荷湯化下兒小乳汁化下亦得無時
中灰圓治生下便喜多驚
右剪父母兩手爪甲燒灰研細麵糊和丸麻
子大幷花火化下一丸無時
生摩膏治新生兒肌膚幼弱爲風邪所中身体
壯熱手足驚掣
甘草 防風各一兩去蘆 白朮一兩 雷元一兩半
桔梗去蘆二十銖
右㕮咀以豬肪脂一斤煎油入藥微火上煎
之良久視稠濁得所膏成乃去滓丸如彈子
大每服一粒炙手摩兒百遍寒者更熱熱者
更寒小兒無病早起常以摩顖上及手足心
甚辟風寒之邪
朱砂散治一臘至月內兒發驚轉爲慢驚
朱砂一分研水飛 牛黃一分別研 射香一錢
乾蝎梢炒 天漿子有蟲者去殼炒黃色如無亦得用
右各研細延再研極細散每服半錢乳汁調抹
兒口中以乳汁送下無時

保生散治新生兒胎驚此在母胎中時因有所
驚乃感至生下百日之內心神不寧睡卧不
醒壯熱躁煩啼哭無時面青赤腰直身冷
搐縮口撮或糞青黃水
胡黃連去蘆 鵬砂研 鐵粉 輕粉各一錢
右爲末每服一字薄荷乳汁調下服藥後有
青赤物下是效如無隔日服琥珀丸服之無時
琥珀丸
輕粉 乾全蝎炒 琥珀研 鐵粉各二分
南星炮 白附子炮 龍腦研
右爲末酒糊和丸黍米大薄荷溫湯下一二
丸如服此藥眼反牙噤如魚口者乃死候也
服之無時
治嬰小初生未滿月驚著似中風欲死者方
以好朱砂用新汲水磨濃汁塗五心上神驗
治嬰小新生中風
以射香一分劈新背交脊上會中毛拔取手
指大許一把以乳汁和令得所於銅器中慢
火炒令焦燥與射香同研如粉每服一字乳
汁調下日三服
小兒衛生總微論方卷第五

小兒衛生總微論方卷第六

驚癇別論

驚癇咬牙

小兒驚癇發搐有咬牙不休及未發發過時亦常咬牙者予在行朝有李𢓰判一子病症如是遂請衆醫詢治有言是驚入於腎者此乃喬岳溪東王先生歌中辭裏咬牙驚入腎之句其意謂牙爲骨之入腎故以言之此常流無識語遍古書無有亦無驚入腎之理畢用藥無驗今詳校其証特爲明之乃是陽明之病也足陽明爲胃之經起鼻交頞絡鼻外入齒中延出俠口環唇下交承漿頤廉從出大迎循頰車且發搐爲風風屬木胃屬土木能剋土是以牙齒受風則牙類車邪干則緊故使咬牙不休以緩頰車之急以解牙齒之病也瞷

暗癇

暗癇其病似驚癇又似中風痓病謂其發時則暗地急至令人僵仆心神昏塞志意迷悶氣亂不省手足彈撥戰抖搐搦或喉中涎響或叫吐痰沫或作吼叫其脉三部陰陽俱盛每發遠則終日或半日近則一兩時不發過便起知如不病之人俗呼謂之癇病稍輕者謂之暗風古人又云小者發則爲驚大者發則爲癇小者氣血怯弱發即難當而傷多大者氣血壯盛即易任而失少

驚癇餘証

小兒驚癇搐搦至發定之後有諸餘証不張者雖大勢已歇而病本尚在或脈冷熱藥過多或汗下之失宜故痼滯難退而有餘証也

驚癇兼別病

小兒病久發搐則五臟俱虛並受其病故發則血亂心氣奔擾搐搦肝府因冒體冷腎又有因虛而別病兼發或別病而因帶驚癇或有一方兼治之者並採而具之

治驚癇咬牙方

子1561

蟬花散 治驚風咬牙并夜咳嗽

蟬花 和殻 僵蚕 [illegible] 甘草 各一分

玄胡索 去皮半分

右為細末一歲上兒一字至三四歲者半分煎去土蟬殻湯調下無時

小鎮心圓 治諸驚咬牙不穿大便色青

朱砂 [illegible] 鐵粉 京墨 各一兩 [illegible] 射香 各一分

右為細末陳米飯和圓菉豆大每服二三圓荊芥湯化下無時

治暗瘂方

真熊膽 [illegible] 生天南星 [illegible] 粉霜 一分

硃砂 [illegible] 雄黄 [illegible] 射香 一分

右句研細用猜猪膽汁和丸粟米大每服五七丸至十丸金銀薄荷湯下無時

神烏散 治瘖風癇 [illegible] 妙 歌曰

臘月烏鴉一箇全 半兩硃砂口內填 麻縷烏背安瓶內 [illegible] 鹽泥固濟火中安 [illegible] 黄昏上火天明住 [illegible] 取出篩羅為末研 每服一錢射酒下 [illegible] 服之十日定須痊

一方名同治同前

漆黑老鴉 一个全者 胡桃 七枚 蒼耳心子 七个

右用一藏瓶入內藥味在內鹽泥固濟木炭火煅煙盡為度取出研細每服一錢空心熱酒調下如患忽氣肝腫陰囊偏墜更入新生孩兒胎衣一副同煅亦依上法蔥椒熱酒調下看大小加減

異聖散 治癇病日發數次諸藥不能差

猪蹄甲 [illegible]

青礞石 [illegible] 金星石 銀星石 [illegible]

右用猪蹄甲末二兩石末一兩半再研勻細入生麻油半兩再研極勻每服半錢以菉豆[illegible]末研百遍調下空心食前服小者減之

日應丹 治癇病連年不差

黑鉛 硫黄 水銀 鐵粉 [illegible]

右先將鉛於鐵銚內鎔化次入水銀不住手攪令勻次入硫黄諸藥同炒攪勻離火再炒[illegible]又如[illegible]

頃出用紙襯地上頓一宿出火毒研令匀
細以熟軟粟米飯和丸菉豆大每服五七粒
煎人參湯送下無時

接生如聖丸　治癇病暗風年深不差

赤石脂二分　硝石半分　白礬枯過一分

右為細末糯米粥和丸菉豆大每服十丸十五丸
温水送下食後日三服如日一次發者服半月即愈

啄木散　治多年癇病

臘月啄木鳥一個用無灰酒三升先以青鹽半[illegible]
一个底瓶剉荊芥穗葉厚一寸上頓啄木鳥
又用荊芥穗葉蓋一寸厚傾酒在內仍用
紙封合塩泥固濟炭煅之候酒乾青煙
出為度去火放冷只取啄木鳥研為
末次入下項藥

石膏一兩煅研　鐵粉[illegible]　朱砂一分研細水飛

附子一兩正坐者炮裂去皮臍　射香一分研　腦子一分研

右同匀細末每服一分先令病人呷温水三兩
口以温酒一盞先火許調藥飲之餘酒送之服
畢便睡於臘火時臨發時一服候一兩日更服
一次每兩日一服不過十服即效[illegible]

患病十餘年發即涎潮手足僵踡顛仆不省
服此藥百服而愈小兒可減服

又方
取芭蕉自然汁時時呷一兩口甚者服
及五件必愈前有親姊王同服此得効
二者恐不可為常此亦治驚癇搐搦
[illegible]有少加射香尤妙

治諸癇通用方

開關散　治諸癇發牙關緊急口噤不開不
能進藥

蟾酥一片　鉛白霜一字

右研令極細用烏梅肉蘸藥於兩口角揩擦
良久乃開以進別藥

蝎梢散　治如前

蝎梢七个　朴硝一分

右同研細每用一字或半分揩牙須臾即牙
關口噤自開然後進別藥

定命丹　治諸癇發搐壯熱昏塞不省

蝎七个微炒　天南星炮裂為末一分　白附子半兩炮過為末

青黛半分研　蟾酥一分乾者酒浸一宿　射香一字研

右為細末粟米粥和丸菉豆大別以青黛為
衣新生兒用細粉一捻油兩滴新汲水化一丸

殺化蕀一米粒許與服便當米粉下胎中積糞則驚熱諸疾不生若患驚癇困重者用荊芥薄荷湯化下一丸得困睡無疑至覺乃愈但有患者亦化下一丸滴入鼻中得嚏者為必差不嚏者難治

人參茯神湯 治諸癇發搐神昏恍惚

人參 茯神 [illegible] 天門冬 去心 羚羊角屑 白鮮皮 [illegible] 天竺黄 甘草各一分

右為末每服一錢水一盞入姜二片薄荷三葉同煎半盞去滓溫服無時

鐵粉丹 治諸癇搐搦包絡有涎膈不利

鐵粉 一兩研 硃砂 水飛研 牛黃 一分研 乾蟾 [illegible] 蝎梢 七个

右為細末糯米飯為丸黍米大每服三五丸煎人參湯下無時

大驚丸 治諸癇發搐神志昏亂痰涎壅塞

雄黃 研飛各 青礞石 火煅研 鐵粉 [illegible] 硃砂 各研飛三 蛇黃 火煅醋淬九次研飛 蝦蟆灰 各半

右研勻以水浸蒸餅和丸桐子大每服一丸煎薄荷水磨化下日二三服

化涎不用膩粉服之[illegible]不拘時候

[illegible]驚丸 治諸驚癇搐搦痰涎壅塞咽膈不利

鐵粉 [illegible] 茯苓 蛇黃 [illegible] 使君子 肉 天南星 [illegible]

右各秤錢半入金銀箔各乙拾片麝香乙錢腦子半錢同研勻細糯米稀糊丸皂子大朱砂為衣每服半丸小兒乙丸分二服三歲下兒分二四服並薄荷湯磨下無時

豬膽半夏丸 治諸驚癇搐

右以半夏乙兩湯洗七遍用豬膽三个取汁浸半夏於磁器中日曬乾切片焙為細末生薑自然汁煮麵糊和丸梨子大每服五七丸至十丸煎麥門冬熟水下食後臨卧各一服忌動風毒物其効如神

大麻防風丸 治一切驚癇抽掣搐搦精神昏憒痰涎不利及風溫邪熱等疾

天麻 防風 去蘆 人參 去蘆各 乾蝎 白殭蠶 去絲嘴炒 朱砂 水飛 雄黃 各研 甘草 炙各 牛黃 麝香 各研

右為細末煉蜜和丸桐子大每服乙二丸薄

荷湯化　下無時。

神聖辰砂南星丹　治諸癇發搐服之曾經大効

右以天南星四十九个乙般大者於五月五日取活蝎四十九个與南星同頓在乙尾器中盛之用鹽泥固濟外邊周密吊於淨室中至臘日取出揀天南星曾被蝎螫者用之曾經螫者有小竅子為驗其不曾經蝎螫者不用將可用南星以酒浸乙宿焙乾杵為末次用好辰砂乙分真牛黃射香龍腦各乙錢研細乙處拌勻生薑汁和丸桐子大每服乙二

粒煎人參薄荷湯化下無時

蝍蜟散　治諸癇經驗

右以蝍蜟三十枚全者用乙大石榴割開頂上取去穰子作一甕子入蝍蜟在内却以割下頂子蓋之紙筋黃泥固濟厚半指許初延火炙漸至武火燒令通赤良久放冷取其中焦黑者細研為散每服[illegible]一字乳汁調下先將天用半錢防風湯下無時

白金散　治諸癇潮發不省困重　山殭蚕[illegible]　[illegible]好者半兩湯洗[illegible]　天竺黄一分細研　[illegible]

丁香[illegible]　龍腦[illegible]

右件研勻細每服半分生薑自然汁調灌服無時

神效至聖保命丹　治一切驚癇風痓中風弄舌[illegible]腹脹堅硬夜啼發熱急慢驚風惡候目[illegible]上視搐掣開目叉張倒仆不省昏憒悶亂等疾

全蝎十四个[illegible]　朱砂[illegible]水飛　射香[illegible]　防風[illegible]　金箔[illegible]十片　天麻一分　白殭蚕[illegible]　[illegible]附子[illegible]　天南星一分　蟬殼[illegible]

[illegible]二錢

右為細末粳米飯和丸櫻桃大以朱砂為衣初生兒半丸周晬兒一丸乳汁或薄荷湯化下三五歲有急候者用二丸五七歲至十歲常服只一丸此藥性平溫不冷不熱大能鎮心神退驚癇安魂定魄祛風逐邪化涎消痰甚有神效世之名醫固多收藥如或未得此方請試合一料驗之方知予細[illegible]小小家能自合之療不為傷粉藥所誤[illegible]亦可救人服之無時

金定命丹 治諸驚癇抽掣痰等疾

水銀(研膏) 辰砂(水飛) 全蝎(去毒) 天南星(生)

犀角屑(各八分) 天麻 白附子(炮去皮臍)

白殭蚕(去絲嘴直者炒) 青黛(半兩) 麝香(二錢)

右同爲細末先用棗熟煮去皮核取肉與水銀研膏至無星爲度然後和藥末如硬更入棗肉候得所即丸如雞頭大每服一丸薄荷温湯下

治驚癇後餘證方

定吉散 治癇搐止後再被驚著仍要發搐

鵲舌香(一分) 黄芪(一分蜜炙) 辰砂(一分水飛)

五靈脂(去砂石半兩研)

右爲細末嬰小用一字二三歲半分四五歲一分糯米飲調下無時

通聖散 治癇搐差後多吐逆腹脹氣急不食及因驚之後一切壓候皆主之

人參(去蘆) 茯苓(去黑皮) 甘草 白殭蚕(去絲嘴) 朱砂(水飛各一分) 白附子(半兩炮) 全蝎

蟬殻(去土足二十個炒去)

右爲細末每服半分或一分煎冬木子薄荷清米飲調下量大小與之乳食前

仙烏豆 治因發驚癇之後心神失守而瘂

號丹(二兩) 百藥(二兩)

右同爲末入一合子盛先用蚌粉封口縫後以鹽泥固濟炭火煅通赤放冷取出研末以水一斗黑豆五升同藥末於鍋中煮至水盡爲度曬乾任意與食服無時

通關散 治驚癇退後只是声啞不能言

右以天南星炮烈爲細末嬰小半字一字二三歲至四五歲兒半分六七歲兒一分獲豬膽汁調服咽下便能言語 昔錢乙治王氏子慢驚退後不語能作失音治之不差一曰既失音何開目而能食飲又牙不噤而口不緊也諸醫皆不曉一曰此前遇驚癇時曾用清藥利大小便致脾腎俱虛今補脾實而治驚已退腎尚虛怯不能上接於陽故也遂以地黄丸補數日能言其方本集載之

天茄散 治驚癇退後筋脉不舒不能行步或因汗出驚退而汗出不通所致

茄種(切片焙乾半兩) 附子(炮去皮臍半兩) 羌活(去蘆一分焙)

右為末二三歲兒一字五七歲半分七八歲一分射香酒調下日三疾愈止服不拘時候

治驚癇熱別病方

射香餅子　治慢驚因虛而風邪又從背俞襲之入傷心肺之經為相合之病成慢驚本証之外更加胷滿短氣胃悶不省汗出無時（心肺中風者具中風門中）

川烏頭（半兩炮去皮臍）　天南星（半兩炮）　白花蛇（酒浸一宿去皮骨焙乾半兩）　乾蝎梢（半兩）　赤頭蜈蚣（二条酒浸炙黃色二先為末）　射香（半兩研）　乳香（一分研）　朱砂（一分研飛）　鉄粉（一分）　牛黃（一分研）

右同拌研勻細酒糊丸雞頭实大捻扁每服一餅人參薄荷湯化下

烏稍丹　治如前

烏稍蛇（酒浸去皮骨二兩）　天漿子（一个微炒去）　天麻（一兩）　防風（一兩去芦并叉枝）　天南星（炮一兩）　乾全蝎（去毒一兩）　白附子（一兩炮）　大附子（一枚炮裂去皮臍）　半夏（一兩湯洗七次）　人參（一兩）

右都一處好酒浸三宿取出焙乾為細末次用水磨雄黃一兩辰砂一兩同研細水飛焙乾射香二分龍腦一分各研細與上件同拌

勻糯米飯和丸黍米大每服五七粒至一二十五粒量大小加減金銀薄荷湯送下不拘時候

乾漆蕪荑散　治諸般重証傳帶驚癇[illegible]視上竄叫呼搐搦漸成危急

乾漆（杵碎炒令煙盡）　白蕪荑（去皮各等分）

右為末每小者一字大者一分米飲調下日三量大小加減以差為度乳食前

[illegible]夾丹　治驚癇涎痰咳嗽喘滿

半夏（三兩湯洗七次去滑）　白礬（和過研一兩半）　南星（二兩）　滑石（二兩飛）

鉛霜（半兩研）

右為末糊丸麻子大朱砂為衣每服十丸生姜湯送下乳食前

[illegible]惠湯　治虛而生風發搐喘滿或慢驚欲作

桑白皮（三兩）　白茯苓（去黑皮一兩）　白殭蠶（炒去絲）　訶黎勒　杏仁（去皮尖炒黃別研）　甘草（炙）　人參（去芦半兩）　桔梗（去芦一兩）　白术（一兩）　陳皮（白一兩去）

右為末每服一分水一盞入生姜三片同煎至六分去滓放溫時時呷之此是孩兒

御方也服之便定

青金丹 治諸癎諸疳諸蟲瀉痢等疾

蘆薈 [illegible] 雄黃研 一分 朱砂研 二分 胡黃

連 二分 膩粉 蟾酥 [illegible] 蘆薈 [illegible]

白附子 [illegible] 麝香 [illegible] [illegible]

水銀 [illegible]

右為末同勻用豬膽汁熱過浸少米為丸

丸黃米大一歲兒二丸量大小增減 [illegible]

潮搐先以一丸溫水化滴鼻中令嚏 [illegible]

者會下搐搦亦定更用薄荷湯化下一二丸

如變蒸寒熱亦以 [illegible] 湯化下諸般瀉痢 [illegible]

下諸疳瘦弱飲下疳蟲 [illegible] 咬 [illegible] 子湯下 [illegible]

口瘡鼻爛乳汁研 [illegible] 白羊子肝一

底竹刀批開研藥作 [illegible] 肝內 [illegible]

驚疳熱空心服 [illegible] 大蒜 [illegible]

聖青金丹 治一切風癎搐搦及寒熱 [illegible]

諸疳五疳八痢肚大腳細泄瀉無時天吊胎

驚暗風癎病熱疳口瘡等疾悉皆主之

青黛 [illegible] 瓜蒂 一分 朱砂 [illegible] 輕粉

[illegible] 蟬殼 [illegible] 雄黃 [illegible] 蘆薈 一分

胡黃連 一分 [illegible] 麝香 [illegible]

右為末勻細用獲豬膽汁和丸桐子大根令

匀之者般驚癎風疾搐搦上視溫水化一丸

滴鼻中噴嚏立效更用薄荷水化下一二丸

疳泄瀉腹脹 [illegible] 大腳細諸疳等飲化下 [illegible]

麝香丸 治 [illegible] 諸疳等疾

[illegible] 龍腦 [illegible] 黃連 [illegible] 木香 [illegible] 蝦蟆 [illegible]

[illegible] 香 [illegible] 牛黃 [illegible]

[illegible]

[illegible]

丸至一二十丸 [illegible] 大小 [illegible] 增減 [illegible]

肉湯下驚癎 [illegible] 薄荷湯下更研一丸

諸鼻中 [illegible] 口瘡 [illegible] 傳之 [illegible]

藥或白蕪荑湯下 [illegible] 日內見大小便 [illegible]

水 [illegible] 封 [illegible] 中諸 [illegible] 麝香各少許 [illegible]

生 [illegible] 一兩 溫水化下 [illegible]

飲下病急者研碎 [illegible]

[illegible] 者不得與 [illegible] 宜服之

奪命丹 治一切諸般驚風天吊暗風癎病胎

驚 [illegible] 搐上 [illegible] 及 [illegible]

肚大脉細髮稀餅渴又治便痢腹如木穀不化洞泄下注并溫壯身熱口瘡煩燥叫啼(并疳)

宋砂(半兩水飛研) 射香(研) 麒麟竭(研各半分)

牛黃(研) 龍腦(研) 沒藥(研) 熊膽(研)

粉霜(一分研) 青黛(二分研) 使君子(…)

右相和再研勻細取井花水滴水為丸如菉豆大每服一粒以薄荷自然汁半蜆殼許化開入溫湯半茶腳調勻服之若諸疳瀉痢不止或驚癇涎盛吊眼發搐者以三丸化下更量大小加減

治諸驚癇客忤 以射香當門子一粒好朱砂一塊如當門子大同研極細溫熟水調下未能服者灌之

治驚癇夜啼 以仙人杖安兒身邊令睡

仙人杖乃笋欲成竹時立死者

中風論

小兒血氣柔弱肌肉脆薄若寒溫失度則腠闢而為風邪所中始著俞穴而行經脉次隨血氣而入府藏從其所著即生病焉其入府藏者唯心肺二藏居膈膜之上窒隙之處又俞穴亦在於上故風乃易中而有患者其狀昏困不省…之細掣心背滿氣短多汗此尤為急大抵其餘府藏皆居膈膜之下壅實之處又俞穴亦在於下故風乃難中而無患者其入於經脉者為病甚多今撮其有患者其之風痓者(風痓一云)風邪傷中陽經也或因澼脫或臍瘡未合為風所傷皆令發痓其狀口噤不開項背身体強直耳中策策而痛一向昏憒不省其脉如弦直上下也(驚…)與驚癇相似然發而時省身軟者驚癇也若痓不時醒身體強直者風痓也其全不蘇身痓者死

風角弓反張者亦由風傷陽經也故令腰背反折不能俛仰如前弓之狀此亦頗似痓病然痓病身体強在此病身体反折所以異也 風口噤者手三陽之筋入結頷頰足陽明之筋上夾於口風邪中於諸陽之筋使關機攣急不得使口噤不能開也診其脉遲者生 風拘攣不隨者風邪寒熱入於血脉漸於筋脉筋受邪冷則四支拘攣熱則緩縱不隨也 其脉脉急細如弦者筋急拘攣也若脾脉緩弱者四支不隨也 風口眼喎斜者由風邪入於口項

子136 080

筋其脉偏急故令口喎僻目不能平視語
不能正也診其脉浮而遲者可治又云夜臥當
耳有隙因風入耳亦令人口喎也　風癔不省
皆由風邪先中於陰病發於五藏其狀奄忽不
知人事喉中噫噫有声舌強不能言汗出身軟
眼下鼻兩邊人中左右有色白可治者一黑一
赤吐沫者難治汗不出體直者死

治心肺中風方

牛金散　治心肺中風昏悶不省心胸滿悶
發痉氣汗出不休　烏蛇肉[illegible]
天麻一兩　全蝎[illegible]　殭蚕[illegible]
朱砂[illegible]研　龍腦一分研
右為末拌勻每服半分溫湯調下無時

如聖丹治如前　乾全蝎[illegible]　羌活[illegible]
白附子[illegible]　天南星[illegible]　黑附子[illegible]
右為細末入膩粉一分研勻煉蜜和丸如菉荳大
每服五七粒荊芥湯下無時

白花蛇散　治心肺中風声不能出
白花蛇[illegible]　羚羊角屑一兩
桂心一兩　芎藭[illegible]　人參[illegible]

川烏頭[illegible]
右為細末每服一字或半分射香荊芥湯
下併二三服無時

治風癔方

[illegible]散　治中風痊病口噤體強耳中策策
悸發不時者　蝎尾[illegible]　殭蚕[illegible]
天漿子[illegible]　白附子[illegible]　朱砂[illegible]
射香一分研
右拌研勻每服一字或半分薄荷湯入酒
滴調下

天南星膏治如前　天南星[illegible]
赤頭蜈蚣[illegible]　金蛇[illegible]　烏蛇肉[illegible]
巴豆[illegible]　朱砂一兩研　牛黃[illegible]
射香一分研
右同勻細入南星膏[illegible]中拌勻軟硬
得所為度每服一皂子大薄荷自然汁入酒
一滴同化服之無時

二證同治方

烏犀煎　治心肺中風及風痊病　烏犀屑一兩
天南星[illegible]　白附子[illegible]

射香一字　蝎梢半兩去毒

右件細末三歲下兒一字　金銀器中同煎湯

金銀薄荷湯調下量大小　下煎時減無時

水銀丸治如前　水銀　蛇黃醋淬　赤頭蜈蚣

輕粉　雄黃　一錢　麝香末　麻黃

右同為末勺以青州棗肉和丸如大豆大一

兒空水化一丸無時

治中風口噤不方　調下無時

石膏湯　治中風口噤頷頰緊急

石膏　獨活　川芎　麻黃

桂枝　赤芍藥　防風

甘草

右為末每服一大錢水一盞　白附子

數片煎至五分去滓溫服　生薑　薄荷五

羌活紫湯　治中風口噤身溫　滴口中

右以羌活一兩去蘆頭剉　碎酒二升浸一宿

用黑豆一升炒令煙出　以酒

乘沃之放溫去滓每服一　水銀粉

服無時　花蛇肉

雀矢丸　治中風口噤不語聲音不出飲食不下

白花蛇酒浸去皮骨　蝎梢半兩去毒

右為細末用無灰酒兩大上至四五兒半錢

量兒用皂子許麝香湯化虛實加減無時

奪命散治如前　乾蛇頭　赤頭蜈蚣

蜈蚣一條　乾全蝎　生　麝香

草烏頭　地龍　大豆

龍腦一錢

右件勺細每服一字溫酒調下無時

烏蛇散治如前及治風角弓反張

之病　烏蛇肉　麻黃

天麻　全蝎　細辛

附子　羌活

人參　半夏　薄荷

右為末每一錢水一盞　生薑十片　薄荷五

葉同煎至一盞去滓放溫　滴口中

治中風角弓反張方　碎酒五升　一宿

天麻散　治中風腰背反折　中　酒

蝎梢　赤足蜈蚣　麻黃

川烏頭尖　白花蛇肉

天南星　麝香　飲食不下

右取雄雀糞研末糊丸麻子大飲下三二丸薄荷湯亦得大良雀矢白亦佳

又方 治口噤頷急風中陽經

右以白礬虎灰研為末水調一錢匙服

又方 治卒口噤不開

右以附子末葦管吹入口中甚良

治牙噤不開 以天南星一枚煨熟乘熱用紙封裹不令透氣仍於上尖處剪一雞頭大竅子透氣於鼻中立開

治中風拘攣不隨方

獨活黄芪湯 治中風四肢拘攣

獨活 黄芪 酸棗仁(湯浸去皮各一兩) 麻黄(去根節) 羚羊角屑 桑白皮(剉) 肉桂(去粗皮) 芎藭(各半兩)

右為細末每服一大錢水一盞入生姜薄荷各三片煎至五分去滓溫服無時

赤箭湯 治中風半身不隨

赤箭 白殭蚕(去絲嘴微炒) 白附子(炮) 細辛(去苗) 麻黄(去根節) 白花蛇(酒浸去皮骨各半兩) 杏仁(二十一枚湯浸去皮尖)

右同為末每服一錢水八分盞入石榴皮少許煎至五分溫服無時

治中風口眼喎斜方

防已湯 治中風口眼喎斜視不能平語不能

漢防已 川升麻 天麻 川芎(各一兩) 桂心 羚羊角屑 麻黄(去根節各半兩)

右為細末用杏仁一分湯浸去皮尖炒黄研細拌勻每服一錢水一盞入生姜三片薄荷三片同煎至五分去滓稍熱時時與服

歪散 專治中風口眼喎斜

蝉殼(生一兩五月五日取東南枝上者) 寒食麪(一兩)

右同研勻細每用半錢以釅醋調攤薄紙上如前藥搽子貼患處左斜貼右右斜貼左如口正急以水洗去之

全蝎散 治中風口眼喎斜語言不正手足痛麻不遂

全蝎(去毒炒) 殭蚕(去絲嘴炒) 川芎 黄芩 大天南星(湯洗七次去皮臍切焙) 甘草(炙) 桂(不見火) 赤芍藥 麻黄(去根節各一兩) 天麻(炙)

右為粗末每服二錢水一盞生姜七片煎至六分溫服無時

朱砂丸 治中風口眼喎斜筋急牽引

朱砂(水飛半兩研飛) 乾蝎(微炒) 天麻 白附子(炮各一……)

白殭蠶去絲嘴微炒 乾薑炮剉 麝香研各一分

右為細末拌勻軟粳米飯和丸黍米大每服三丸乳汁送下日三服無時

又方名同治同

朱砂研水飛 乾蝎去毒微炒 殭蠶去絲嘴微炒 天南星炮剉各半兩 白附子一分炮

右為細末糊丸菉豆大一歲兒一丸薄荷湯下隨歲加之無時

治風癱不省方

梘子煎 治中風癱困不省

梘子微炒 白殭蠶去絲嘴微炒 防風去蘆 白附子炮各

乾薑炮 麻黃去根節 半夏湯洗七次各半兩為末

朱砂半兩研 牛黃一分研 麝香一分研 金箔二十片研後入

右用好醋兩大盞与前藥熳火熬成膏入後藥和勻成劑圓菉豆大每服五丸一歲下量大小加減牙關噤者斡開灌之

急風散 治如前

白附子四枚炮去皮臍 全蝎去毒五枚炙 天南星一分炮 去黃色 半夏湯洗七次焙 天麻一分 膩粉半分

右為細末每以一分分四服薄荷酒調下立効

治一切搐搦逆量大小与之

…風湯 治如前

香附子炒去毛 川芎

羌活去蘆各等分

右為細末每服一錢水半盞入酒兩滴同煎至七分溫服急者湯酒調服

小兒衛生總微論方卷六

136 084

小兒衛生總微論方卷第七

傷寒論

經曰：傷寒有五，有中風，有熱病，有溫病，有中濕，有傷寒，其所苦各不同。此五者配入五氣，隨四時而病，故春風、夏熱、秋濕、冬寒，中溫而傷寒則為一焉（其細論在傷寒大小既證集中）。其四時之病皆謂之傷寒者，乃總舉之名也。內熱病者，乃盛暑之時受熱之氣中人為病也，又名曰中暍。溫病○者，乃雨露霧嵐煙瘴之氣中人為病也。小兒無此二三病，謂小兒不治家事，未有幹辦，早卧暖起，不致衝冒故也。外傷風、傷寒、溫病，小兒有此三病，謂嚴寒厲風溼氣無所不至，小兒肌肉脆軟，氣血柔弱，易為傷之故也。是三病者，其證其脉不可診切。兒稍大者，可切脉而別之。傷風之脉，陽浮而陰弱也；傷寒之脉，陰陽俱盛而緊濇也；溫病之脉，行在諸經，未知何經之動，隨其經之所在而取之也。若嬰孩小未能診切者，但看其形候耳。

傷風者，乃四時八方為邪之風傷人。其候昏睡，呵欠頭疼，口中氣熱，或自汗惡風，發熱鼻鳴乾嘔，熱多寒少，面光而不渗，手足皆熱煩燥。治當發散。有飲水者，有能食者，有不能食者。其飲水能食者，可微下之，餘不可下也。

傷寒者，乃冬時嚴寒之氣傷人，入於腠理。當是之時，壯者氣行而已，怯者則著而為病。其即發者為傷寒，至春發者為溫病（一云在夏至之前，非時行也），至夏發者為熱病（一云在夏至之後，非中暍之熱病）。其候面赤，渾身壯熱，頭痛体疼，鼻塞聲重，清涕欬嗽，寒毛立，氣促急，或嘔吐白水，寒多熱少，面色慘而不舒，手足指末微冷，不煩燥而惡寒（傷風者不惡寒而惡風，傷寒者不惡風而惡寒。其惡風者當風而乃惡寒也，其惡寒者雖不當風而亦自憎寒也，以此別之）。治者若脉洪盛，身体壯熱，頭痛面赤，四肢暖者，為陽證，宜汗之；若脉微細，身冷，不甚頭痛体疼，面青，四肢冷者，為陰證，宜溫之。

溫病者，乃四時之間非節候邪氣傷人。如春應溫而反寒，夏應熱而反冷，秋應涼而反熱，冬應寒而反溫（言此時而行此氣為病，無少長皆略同，故名天行時氣，又名時行溫病）。其候頭痛身重，壯熱體疼，或吐瀉，或寒熱相似，但臨時看其脉與其證以為

隨經受病隨經而之為治也已上三病通以
傷寒爲治邪在外者䚮之汗之邪在內者溫之
下之當隨証捴法而行之錢乙言傷寒男体重
面黄女喘急面赤各憎寒口中氣熱呵欠煩悶
項急此乃不分傷風傷寒而槩言之也况傷風
傷寒証候傳變多端自有專經可憑孫真人云
治小兒与大人無異惟戚用湯劑極少耳更有
傷風寒而兼食者俗呼謂之夾食傷寒也其候
壯熱煩渴鼻塞声重四肢困倦眼黄腹中脹痛
涎唾嘔逆或呵欠頓悶治者不先攻所傷但先

解表候○表解然後下之則病與食皆去也若
不顧其表便以藥攻之多致結痞之又有因此
亂而食寒飲冷傷於脾胃而中風寒其候胃脘
不快腹脹而痛面色唇口皆青手足逆冷脈沉
細者此寒傷於脾寢屬太陰庸工不識以為胃
腸不快妄用針灸或便投駃藥則胃愈不快
而吐利只一兩日間便致危殆此不可之誤非
其治也所謂傷寒本經藥証甚多難以具述今
採其小兒常所患者之方及○有[illegible]之証畧
傷寒以傷風寒手足冷身熱面赤頭痛者此脾

快也宜先和脾然後發散傷風寒自利者脾虛
也宜先補脾然後發散未差者先調中後發散
下証者微下之有熱者退之
傷風寒[illegible]者脾虛也宜[illegible]脾[illegible]
喘候[illegible]發散
傷風寒得下証大勢已退而餘熱未[illegible]
之大過胃虛而熱乘之發也胃中虛[illegible]
[illegible]生異証[illegible]得[illegible]
[illegible]
傷風寒[illegible]者爲[illegible]入[illegible]

之春○[illegible]逆結胃[illegible]
結胃在[illegible]而不病若以爲痞[illegible]
[illegible]則爲[illegible]若三四日時[illegible]入[illegible]
[illegible]實有[illegible]者當下之若熱入大腸則[illegible]
[illegible]不通若熱入小腸則爲小便[illegible]
熱入大小腸則爲大小便不通熱入脾[illegible]
上候於肌肉熱盛蒸於外則爲發黄[illegible]
心胃則爲煩躁[illegible]者則爲[illegible]
[illegible]口舌者則生瘡腫疼痛[illegible]
[illegible]則爲[illegible]

子136 086

小從大便出者則便血從小便出者則溺血
若壯熱未汗躁喘鼻衄一[illegible]一升數合而熱得
歇者病則解矣若出至二三升者危矣若熱毒
積瘀於內不得時下致[illegible]則[illegible]
若煩寒昏冒閉目者死若胃有寒氣相搏則[illegible]
咳噫 若脉有寒相搏則咳噫氣急若[illegible]
傳變入陰則四肢厥逆面青惡冷 下利清[illegible]
當隨証施治
錢乙論傷風傷寒瘡疹傷食狂熱[illegible] 一[illegible]
似者念李杏[illegible]疑之間但與升麻葛根湯[illegible]

[illegible]投小柴胡湯此數藥通治[illegible]
孕忌方云嬰孩傷寒不可[illegible]
[illegible]傷心[illegible]治又不可[illegible]
[illegible]乃[illegible]則陰[illegible]治[illegible]
冷或[illegible]治[illegible]不可[illegible]
[illegible]實[illegible]熱[illegible]一向[illegible]
不[illegible]則[illegible]骨[illegible]難治[illegible]
[illegible]錢[illegible]正防[illegible]正次[illegible]
治傷寒名[illegible]大[illegible]
壯熱頭痛[illegible]大[illegible]

[illegible]可
有[illegible]滿腹
不決者以香[illegible]
[illegible]散[illegible]服有[illegible]
涎[illegible]咳嗽者小[illegible]
十有八九餘一[illegible]
方[illegible]名亦依[illegible]
[illegible]古方[illegible]不[illegible]
[illegible]熱之[illegible]
子[illegible]方今[illegible]

[illegible]者用服白散[illegible]
胃不和者以安胃[illegible]
散[illegible]服[illegible]
[illegible]天麻防風[illegible]人參[illegible]
[illegible]丸如此[illegible]治[illegible]
者乃病又傳[illegible]
[illegible]治乃得[illegible]可[illegible]
[illegible]熱[illegible]
宜[illegible]通古人治病之[illegible]
[illegible]方共[illegible]子後

[illegible]白[illegible] 治傷[illegible]
[illegible]天[illegible]者皆可
[illegible]以[illegible]熱寒[illegible]
一[illegible]研勻[illegible]
[illegible]服一錢[illegible]
[illegible]以乳汁送[illegible]
[illegible] 治傷寒[illegible]
[illegible]者
[illegible]以[illegible]不二[illegible]
每服一錢 以[illegible]

[illegible]頭痛[illegible]
[illegible]
[illegible]研[illegible]入[illegible]
[illegible]即[illegible]入[illegible]
[illegible]湯調下[illegible]
[illegible]時
[illegible]熱頭疼[illegible]
研細入甘草末[illegible]
[illegible]湯調下一方[illegible]

風半兩為末同研勻滑石可用桂府白色者

安胃丸乃化滯丹小丸子也

香㯕散　治傷寒心胷痛悶不快

右以橘皮洗去穰為細末每服一錢生薑湯調下乳前食

又沙散　治傷風寒溫熱表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴引飲或木入即吐小便不利或作寒熱及汗出表解而煩躁不止

右以五叉散半兩入朱砂細末一錢同研勻每服一小錢米飲調服無時

天麻防風丸人參化風　膏以上二方俱見發熱痛門

小珍珠丸　治風壅痰實利咽膈除咳嗽止煩熱清頭目

白礬燒汁盡研末一兩　寒水石火煅通赤出火毒研一兩　半夏湯洗七次去滑為末一兩

右拌勻研細麵糊和丸黃米麻子菉豆三等丸子每服五七丸至十丸溫生薑湯下食後量大小加減與服

𣲖喜散　治傷風寒發熱去風頭痛無汗惡風或溫熱鼻塞清涕淚出噴嚏

防風去蘆并叉枝　人參去蘆　甘草炙　天麻去蘆

前胡去蘆各三錢半　細辛去苗　柴胡去苗各一錢半

白茯苓去黑皮　桔梗去蘆各三錢　枳殼去穰麩炒一錢半

川芎一錢

右為細末每三歲已上抄一錢水六分薄荷兩葉同煎三兩沸通口服無時

紅綿散　治傷風寒及夾驚取汗

麻黃去根節全蝎炒大黃紙裹煨熟切焙　天麻生各一分　甘草炙　白附子　蘇木剉炒

右為細末一歲下兒服一字已上兒半錢四五歲一錢水一小盞以綿少許裹紫蘇煎之至綿紅色即去綿溫服

經煎散　治傷風寒夾驚潮發頭痛体熱咳嗽手足冷

麻黃去根節半兩　人參去蘆　茯苓　白殭蚕去絲嘴　全蝎　天麻　白附子　甘草炙各一分　朱砂一錢研　川烏炮去皮尖一錢半

右為末每服半錢至一錢水五分入胭脂一豆大薄荷兩葉葱白一寸同煎至四分放溫服不拘時

千金丸　治傷寒夾風夾驚夾食取微利

朱砂末一錢 全蝎七个末 白殭蚕七个末
膩粉一錢 射香半錢
右為末勻白飯和丸萊菔子大薄荷湯下一歲兒三丸量大小加減無時
茯苓散 治傷寒數日胃熱不利調中 赤茯苓一兩 陳皮三分 桔梗去芦半兩 甘草炙半兩
右為末每服一錢水六分入生姜二片煎至四分溫服無時
枳實散 治傷寒已汗未汗卒胃膈痞痛
右以枳實麩炒黃為末每服一錢或半錢米

三一

飲調下無時
竹瀝 治傷寒發熱煩燥不解
右以竹瀝新汲水各半盞和勻服無時
真珠散 治傷寒口乾心熱煩燥 真珠末研 龍腦研 牛黃研各半字 瓜蔞根 茯神去心各一分 朱砂研各一分 牙硝 寒水石煅各一分
右為末勻每服半錢蜜水調下無時
秦艽散 治傷寒心神煩燥口乾煩渴
右以秦艽半兩去苗細剉用半[illegible]水半盞煎至六分去滓放溫分三四服無時

藕汁蜜 治傷寒煩渴 右以生藕搗取汁半盞入蜜一錢調勻服無時
葛根湯 治傷寒發熱煩渴 葛根 人參去芦各半兩 麥門冬去心 白茯苓 甘草炙 澤瀉各一分
右為末每服半錢或一錢水半盞薄荷兩葉煎至四分去滓溫服無時
百合散 治傷寒腹中滿痛 右以百合半兩炒黃為末每服半錢或一字米飲調下無時
黃芩散 治傷寒五六日大便不通熱燥躁亂 黃芩 枳殼麩炒去穰 大黃 大腹子各半兩 右為粗末每服一錢

三二

水半盞煎至四分去滓服不拘時
犀角散 治如前 犀角屑 川大黃炮 柴胡去苗各半兩 人參去芦一分 朴硝 甘草各半分 右為末每服半錢水五分入棗一个煎至四分去滓溫服量兒大小加減
石燕散 治傷小便不通小腹脹滿 [illegible] 葱白湯調下
又方 右以蒼耳根煎湯調五苓散服之乳前食
葛根汁 治傷寒衄血不止 右以生葛根搗汁[illegible]服即止無時
立應散 治如前 蒲黃一 乾葛根末 石榴花焙乾末
右為細末每服半錢或一字生地黃汁調下[illegible]衄止
又方 以黃蘗為末每服半錢或一字新汲水調下無時

金匱要治傷寒經驗方

[illegible]

治傷寒吐血 微煖過等分 [illegible]

右為細末每服一錢 [illegible]

以溫水下如𠃧不及 [illegible]

下亦可

香墨圓治傷寒吐血咒 [illegible]

右以香細墨為末 [illegible]

七圓散下或調之

地黃汁治傷寒吐血心 [illegible]

右以生地黃搗取汁 [illegible]

麥門冬湯治傷寒咳嗽 [illegible]

麥門冬去心 [illegible] 甘草一分

右為末每服 [illegible]

一捻金散治傷寒 [illegible]

白殭蠶去絲嘴炒 甘草半兩炙 延胡索去皮一分

右為細末每服一撚薑汁調下無時

潤肺散治傷寒鼻塞涎壅咳嗽肺氣不利語声不出

麻黃去根節 人參去芦各一兩

杏仁麩炒去皮尖 貝母去心麩炒 黃芩各一兩 甘草炙半兩

陳皮去白一分半 桔梗去芦一分 阿膠炒 [illegible]

右為末每服一錢水八分煎至六分去滓溫服無時

赤芍藥散治傷寒陽証咳逆

右以赤芍藥沸湯浸七遍每遍以毛筆蓋半 [illegible]

時敷足取出炒燥為末每服一錢豆豉三粒

生姜一片水七分煎至五分放溫服無時

草豆蔻湯治傷寒三多咳逆

草豆蔻煨 良姜各等分

右為末每服一錢水六分煎熟滴入醋少許

投令帶熱服

[illegible]湯治傷寒躁發熱入胃吐

澤瀉一兩 桂去皮一兩 術 茯苓去皮 白术各半兩

右為末煉蜜和丸如雞頭大每服一丸生姜自然汁化破與服只木用便只以五苓散亦治發熱[illegible]

渴飲水〻入即吐或小便不利發熱在裏不發黄

濾煎茵蔯蒿湯調下餘病飲調

四味人參湯　治傷寒脉遲胃冷嘔吐

乾姜炮　黄芩　黄連去須　人參去蘆各等分

右為粗末每服一錢水六分煎至四分去滓

温服無時

附子姜朴丸　治傷寒三焦嘔吐手足厥冷

附子炮去皮臍半兩　乾姜一分　厚朴去粗皮生姜製一分

右為末糊丸麻子大每服五七丸米飲下無時

半夏湯　治傷寒嘔逆不下乳食

右以半夏半兩湯洗七次去滑生姜一兩同剉

碎焙乾每服一錢水一盞煎至五分去滓時々與

服無時

蘆根飲子　治傷寒乾嘔及反胃嘔吐

生蘆根四兩　青竹茹各一合　糯米一合　生姜半兩

右㕮咀先以水一升煮千里雞底取半升澄清

下藥再煮取二三合隨意服量大小加減

小半夏湯　治傷寒乾嘔欲死

半夏　生姜各一兩　右㕮咀以水一大盞半

入藥煎至半盞去滓分數服

三黄散　治傷寒熱發黄

川大黄半兩剉微炒　黄芩一分　黄連去須一分

右為末每服半錢水六分煎半去滓温服無時

大麥苗汁　治如前

右取大麥苗搗爛絞汁与服小麥苗亦得

人參柴胡飲子　治体虚傷於寒邪渾身壯熱

頭目昏重項背拘急支体疼痛乾噦嘔逆或

作寒熱發歇無時煩渴不食

人參去蘆　柴胡去苗　白术　白茯苓　青皮去瓤

桔梗去蘆　麥門冬去心　川芎　白芍藥

甘草炙　桑白皮　升麻各等分

右為末每服二錢或三錢水一盞生姜二片同煎至七分

量大小分服無时

治傷寒時氣頭痛不可忍

右以朴硝研細末生油調塗頂上

治傷寒毒攻手足痛苦

右以羊桃汁雜塩豉汁漬之

黑龍散　治小兒傷寒在表服冷藥衰伏於中

危困不得汗　麻黄去根節二分　竹茹一分　蘇木一分

硃砂半分　烏蛇一分乃火煆　右為末每服

半盞水五分煎至三分溫服無時

鵲石劑散 治傷寒傷風發寒熱欲死人不
[illegible]麥骨間蒸熱
寒水石 朱砂水飛 白礬枯 鐵華粉 粉霜 [illegible]
輕粉 白附子 [illegible] 蝎梢 [illegible] 射香 [illegible]
右為細末每服半錢入鵲一寸白井花水共約一
茶盞調勻服無時

茵蔯散 治傷寒發黃不可下
茵蔯[illegible] 白朮[illegible] 甘草[illegible] 右為[illegible]服
半錢燈心湯調下小便不利者加茯苓一兩

絳雪丹 治傷寒五六日發黃小便不利煩躁
悶飲水煩躁不解
朱砂[illegible] 硝石一兩研 龍腦[illegible]
右同研勻細白米飯和丸如雞頭子大沙糖水
化下量大小服

商陸熨 治傷寒咽喉腫痛
右以商陸根切碎杵爛炒熱用手帕子裹之
熨腫處冷即易之

桔梗湯 治傷寒咽喉腫痛
桔梗[illegible] 甘草二兩炙

右為末每二錢水一盞煎六分放溫冷細細呷服
[illegible]散 治傷寒熱[illegible]
右以[illegible]為末同煎[illegible]過含之
[illegible]汁勻[illegible]以[illegible]為末同煎[illegible]之量服
黃芩湯 治傷寒[illegible]舌腫舌
裂舌上生芒刺[illegible]出血皆治
黃芩[illegible]
錢水一盞煎至六分去滓溫服[illegible]每二
[illegible]金[illegible] 治傷寒結胸氣痞并主之
[illegible]

右為細末煉蜜和劑捏作餅子如小錢大結
胸者用芒硝半錢同白湯化下[illegible]或一餅
服之痞氣者煎陳皮湯化下無時

[illegible]散 治傷寒結胸[illegible]
右以草烏頭二个一生一炮同為末生姜自然
汁和勻為丸如雞頭子大每一丸用[illegible]湯化下

芫花熨法 治傷寒胸腹不心下結痞硬痛名水結
右以芫花醋[illegible]用綿裹熨之冷
即易[illegible]

[illegible] 治傷寒[illegible]

右以藍澱一字或半錢新水調下
苦參酒　治傷寒熱毒結在胸中大七日以上死
右以苦參半兩剉碎用酒一盞煎至半盞去
滓放温分作四服連併服之須臾吐出即瘥
汁立愈
黄連湯　治傷寒熱入腸胃下痢膿血
黄連去須微炒半兩　黄蘗半兩剉微炒　阿膠一兩[illegible]
梔子仁半兩　右為麄羅末每服一二錢水一大
分煎至四分去滓温服無時
梔子仁湯　治傷寒熱毒攻於腸胃下赤汁或

如爛肉鴨肝壯熱腹痛
梔子仁三七个　豉二合　薤白一握切　右以水二大
盞同煎至一盞去滓量兒大小分作數服無時
烏仙散　治陰証傷寒四肢厥逆
右以川烏不拘多少當子小便浸不計日數直
至浸脫皮時用水浮洗[illegible]曬至八分乾便以
絹袋盛吊於當風處[illegible]取為末臘茶調
下半錢量大小[illegible]
燒附散　治傷寒陰盛隔陽其候厥逆脉沉細而
煩躁体冷　右以大附子一枚半兩者入急火
炮[illegible]微存中心二三分取出用瓷器合蓋放冷為
末[illegible]入臘茶末一大錢同研勻細每服半錢
水一小盞蜜少許同煎半盞去滓温服之訖須
臾[illegible]躁止得睡汗出而解　又一方炮附末每一字
或半錢酒調下[illegible]服取汗出　若小兒本怯者最宜服
茱萸熨法　治傷寒陰証厥逆　右以茱萸半升酒
和勻濕用絹袋二[illegible]盛蒸令熱　甚以熨脚心　冷
即易之候氣通暢勻暖即止
牛蒡根汁　治傷寒汗後餘熱不退煩躁發渴
四肢無力不能飲食　右以牛蒡根杵爛

絞取汁服看大小多少與之
玉女散　治傷寒汗後潮熱日發諸藥不効
右以川烏一兩火炮去皮臍為細末每服一錢
或半錢水一盞半入生姜七片棗一枚煎至四
分温服無時
傷寒之病傳變証候甚多予嘗編傷寒類証論
方亦頗詳備今集小兒傷寒裁方　如或有証候
未盡者請照類証依法為治耳

小兒衛生總微論方卷第七終

瘡疹論

瘡疹之候古今皆云天行時氣與傷寒相似然亦有
小異也其初覺之時頭痛身體重面赤氣粗壯熱
多驚驚悸呵欠煩悶咬牙噴嚏此皆同也
其瘡疹者不惡寒而惡熱面色與四肢俱赤
腦黃手足厥冷耳尖冷尻骨冷小便赤澀
驗其脉三部皆洪數絕大不定是其候也凡此
異耳傷寒者宜發散解之瘡疹者宜溫平和之
不可妄發妄下又不可令受風冷其瘡疹乃是兒
在母胎中之時食母血穢滋養兒五臟之氣至
至不已後其毒不拘何時須當出發
其瘡疹欲出缺易一藏者長大者皮膚
發出
中受五臟發生熱三日或兒所蓄胎中穢毒曰上熱運入皮膚
叉發交成赤點或如沙粒疹風疹之類
為五臟瘡也前人言瘡有表裏證其瘡皮膚
如春枝白頭漸加赤腫大膿差遲者謂之大瘡
此謂表證發於臟也其皮薄如水泡破即易
乾者謂之水痘此為表發於腑也

然未盡善然但言膿疱二泡三種外斑疹又不
知屬何所主也不著錢一所論其瘡出有五名
屬五臟之液其狀有五各以屬五臟之色肝為
水泡主淚以淚出清如水其色青而大肺為膿
疱主涕以涕出稠如膿其色白而大心為斑主
血其色赤而稍大脾為疹主裹血其色黃赤而小
腎為倒靨其色黑於諸臟內惟腎無證
水泡膿疱皆大而皆於內所以不多故瘡
子皆小也又病水泡膿疱者瘥後變成
瘡出改也皆如泡中容有去則瘡是

疹初欲出之時則五臟證候悉見以熱
藏證及全己然方得
多而毒氣有兩證三證
而俱發也乙治
問者上問曰疹來者何屬一曰
傷寒不退一口在母腹中時有毒乙曰若言
熱何不涼氣熱者言傷寒不過七日之外
疹何又不相應若言腹中之毒今發為何
藏皆無以對乙復曰兒在母胎中至六七月已
成形食母腹中穢液入五臟至十月即

滯胃至生時兒口中猶有不潔之毋以物拭清
又以黃連朱粉下其臍糞之穢以毋錢拔不察
餘氣在兒藏中因遇寒溫邪氣相搏而發熱出
成瘡疹也未出欲作之時熱動五藏則五藏之
證皆見呵欠煩悶肝也時發驚悸者心也乍涼
乍熱手足冷者脾也面頰亦赤咳嗽噴嚏者肺也
惟腎無證以其腎在府下不能食其胃穢是使
耳者但尻耳冷者是也然耳但屬於腎惡穢
乃五藏之瘡既出則歸一藏肝為水泡肺為膿
疱心為斑脾為疹腎雖無證其候惡者亦歸

腎而黑陷則歸腎也此由不慎風冷內虛所致
瘡黑陷耳尻反熱者逆也今十大尉瘡子無他
證當用平和藥為治用猪龍圓散服而愈其方
在本條之
凡瘡疹欲出者身必發熱其發亦自有時隨瘡
所主如早晨發熱不已為水泡日午發熱不已
為心時時發熱不已為疹日晚發熱不已為膿
疱發熱三日已上熱遲入皮膚所以也其熱重
者瘡亦重其熱輕者瘡亦輕方其身熱瘡未出
之時須審察證候子細不可有誤誤則為害大矣

且瘡疹欲作之時須審發熱、則瘡疹未出熱至
三四日乃欲消發已若腹痛者是腹裏突出
服藥者是以瘡毒出喉口舌痛者皆瘡出也
若三日已後不消發出不快欲發有腹之間故
也當以藥發之止可服升麻葛根湯惺惺散
之類乎乎者兼微兒身不甚熱者與少許黃酒
飲之此微發不出即加藥發之既發之後出不
多脈平無他證者即是瘡本稀也不可更發若
不發者瘡證務輕宜但務多以熱藥發之則熱
發太熱藥瘡出轉盛則生熱證大小便不通更以

疏利下之使致危殆此證之甚矣若瘡發之
時有大熱者只可與和小便如覺熱極發癢
服寒藥不可及者宜微與利之以減其毒不可
大利須是子細常與看視晝夜間亦不住看覷
熱瘡未有赤紅點子出時乃可與微利者已
有出者斷不可利也錢乙有曰身熱煩渴腹滿
而喘大小便澀面赤悶亂大吐者當利小便
不差者宣風散利之此亦瘡疹未出之前有此
候之證解而不減乃可與微利之張渙亦曰
瘡未出時其脈大不定而小便赤

此証正宜疎利與須早亦禁中及在外治此
甚多者獲安愈亦與上証並同者也若紅點不
出之前無此熱実之証者亦不可利不然曰傷
寒身熱在表固不可下瘡疹身熱在表亦不可
下蓋傷寒與瘡疹一体之病所以傷寒証中有
瘡疹瘡疹之候也世人不岺妄云瘡疹初覔未出
者宜先利其毒已出者不可利若出已定膿血
太盛者亦可與利此寧非也大抵瘡疹首尾皆
不可下此言甚善者當務從之若微覺寒熱
瘡疹未出之前別無熱益之証者不可與下若

熱毒之証輕者與利小便重者利小便不減方
可與微下若已出者慎不可下至出足已定亦
不可與下須直候瘡痂焦黑欲飲食能李動之
後方可與解餘毒若下之亦不可用駛藥泄瀉
如此則無誤矣是以瘡疹上黑陥者多因誤投
冷藥妄亂下之及不慎風冷乳食不節内虛脾
弱所致也故児病瘡疹不得令受風冷冬月必
在暖處夏月縱不可觸過亦須避其風涼在涼
瘥處理可也蓋須三畏劍果食常令飽足無令
飢餒亦須不多與食渾殊不知飢則内虛脾胃

氣弱則生也証也且瘡疹欲發之時身必壯熱
二三日前涼瘡方始出真出後瘡紅肥脉浮大
而嘔吐者是毒氣出也若瘡出多都身熱疼痛者是
自然瘡燃之所作乎出尺則涼也庸工不明
為是熱疼痛以為熱盛便投涼藥致身反涼
而瘡出不快変黑倒陥昧者細懷亂到戚病
方瘡者與乎如是夫微錢可哀哉昔唐公
論治小兒瘡疹湯藥有可服不可服之論寔
先明陰陽陰陽衛然後方利藏府古聖立言
垂法為後世治之底豈可忽諸故與瘡之中

惟瘡疹切忌妄下為最甚錢乙治睦親宅一夫
王児瘡疹子始用李督以薬妄下之其瘡黑陥
乃召之乙見大驚曰若非謀下則為逆病也王
曰已下之乙曰瘡始出未有他証不可下但用
平和之薬頻與乳食不受風冷可也如三日外
出不快者當依次發之有大熱者當利小便如
瘡痂起能食者微利両行即止今先下早瘡未
尽出而倒靨已成為難治此誤也縱縫得安其
病有三一者疥二者聾三者亦日李不能治經
三日黑陥後召乙乙白幸不發寒而致困也蓋

[illegible]胃入脾[illegible]土不能制水腎虛其[illegible]
[illegible]令禾發寒乃用[illegible]泄瀉腸癖之府[illegible]
則胃之藏自不藏也一乃得安[illegible]或曰何木
以腎主惡而不受濕三陰不致加寒[illegible]
[illegible]乙之[illegible]發哉之[illegible]
[illegible]發[illegible]熱[illegible]一次[illegible]
[illegible]又熱則[illegible]一居肝心肝二[illegible]
[illegible]熱去[illegible]
[illegible]其心肝之藏[illegible]又有[illegible]而[illegible]
[illegible]白[illegible]作[illegible]定[illegible]

[illegible]熱[illegible]之證[illegible]入[illegible]熱而[illegible]出也[illegible]
[illegible]乙[illegible]四[illegible]大[illegible]因[illegible]子[illegible]
[illegible]熱[illegible]不[illegible]乙[illegible]日本乃[illegible]
[illegible]內[illegible]合用[illegible]令[illegible]散乃[illegible]乙
[illegible]之至三日[illegible]熱乙日[illegible]二日不
[illegible]不[illegible]一[illegible]二日[illegible]
[illegible]治之[illegible]日[illegible]乙[illegible]方本集[illegible]之
[illegible]疹出有[illegible]者若只出一[illegible]
[illegible]作[illegible]者[illegible]若三兩[illegible]出或一次[illegible]出[illegible]
[illegible]出[illegible]者輕出[illegible]者重[illegible]外肥若[illegible]外黑

裏赤者重黑者大[illegible]如
針孔者[illegible]也青[illegible]紫[illegible]不止[illegible]
[illegible]而喘大小便不通者因也[illegible]
[illegible]後發疹子者順先發水泡後[illegible]者
逆先發[illegible]後[illegible]水泡多者[illegible]
泡後發斑子多者逆少者[illegible]
子須先出疹子斑子者[illegible]
[illegible]水[illegible]者後必不出疹子[illegible]
[illegible]重而毒氣出甚斑子[illegible]
甚者必帶了微者也微者不[illegible]

有[illegible]小兒[illegible]出疹子[illegible]大[illegible]
三[illegible]已[illegible]出疹子者或[illegible]有斑子[illegible]
[illegible]疹相似其兩[illegible]乃子[illegible]之[illegible]
[illegible]者時月[illegible]疹之病在[illegible]
不[illegible]為[illegible]病之則[illegible]冬病之[illegible]
春月胃[illegible]之時病者多歸胃而[illegible]
當[illegible]春[illegible]夏[illegible]秋斑子冬疹子者亦不[illegible]
也病雖重疹紅肥猶當十活四五若黑[illegible]者[illegible]
問何時十難救一其候寒戰牙[illegible]或身[illegible]黑
紫者急以藥瀉膀胱之府以[illegible]腎氣而[illegible]之若

服□□身熱氣溫欲飲水者可冷以脾氣生而
腎寒今去而溫熱生也若服藥之後惡寒手
足冷汗出耳骫反熱者死候也以腎大旺脾
虛不能制也
凡瘡疹出多稠密遍身其勢太甚兒甚苦之又
變黑倒靨不出者急以豬血腦子救之沈存中
侍郎有方治瘡疹發及伏陷危困者取臘月
豬血瓶盛掛風中令乾每用半棗大加生龍腦
豆許溫酒下甚效予家有小女病傷寒但腹痛
晝夜號哭手足厥冷日加昏困形證極惡予疑

是欲發瘡子先不害此藥急令就屠家買少
生豬血得盛是接之血已敗惡無可奈何遂只
以龍腦和而灌之一服遂得少睡須臾一身瘡
點出復安不尒幾死
凡瘡疹若黑陷而忽瀉便膿血并痂皮者此証
為順也如水穀乳食不化者逆遂須以[illegible]
黑須腎令脾氣本壯或以服補脾[illegible]
者雖用弗脾能制之令[illegible]
得出是脾強腎退即出而安也若瀉米[illegible]
不化者是脾虛不能制腎則成逆也此[illegible]

凡瘡疹若嬰小及乳下兒病者不可與排一等
為治妄施湯藥小者宜少少服藥惟忌多服多
則反為累也又令母慎口又不可令兒失飢避
其風冷及用藥調理乳母為佳若斷乳兒患者
亦當審其輕重大小用藥如至八九歲以上至
十歲外者方可施藥也
凡瘡疹兒病大盛遍身潰爛膿血沾黏衣被
臥不得及有瘡痂片段無皮或作瘡突痛癢
血多盛者用臘月黃牛糞日乾燒灰篩一寸許
厚令在上臥之及掺其瘡潰無皮之處即愈一

方用黑牛糞燒灰傳亦得
凡瘡疹兒病面上有者[illegible]急以真酥潤之
頻潤為佳縱有痂便揭去更潤之縱痂揭有
少血亦不妨但以酥或麵油塗潤之若不潤及
揩揭則瘡痂乾硬不落有凝肉生即瘢成瘢乎
也此理昭然人多不曉反謂揭早成瘢甚誤也
凡瘡疹切忌雜人恐有汗氣狐臭觸之又不可
令兒聞穢惡臭物也故左右不可闕於胡荽以
胡荽能禦汗氣及辟諸惡氣故也家有數兒一
已既患餘兒次皆及之便當為備以防之以穢

氣轉相傳染也兒能食者可特與之葡萄食之
蓋能利小便及取如穢蟲伏之義也
凡瘡疹兒患者切不可踈而忍生冷入腹猶損
脾也若欲發發時發得的當急以胭脂或藥塗
兒兩目周圍令瘡不〇上面入眼之若瘡入眼
者是毒氣入於肝經上無於目者瘡初出時塗
眼臉稀便與時一服眼毒之瘡上亦可不生
矣若有瘡須服藥治之消毒散若瘡毒出若瘡盛
以後熱或服痘疹是毒不盡所致也又瘡去
已發及或入眼切殺須以可免損及瘡書

熏之子餘魚及酸辛等物皆不可食是患者皆
卻謂于食之即目晉疾若知忌之可免其瘡如初
凡瘡疹兒病出不至痂焦瘡已愈者皆食盡
起動者以清涼飲子利者直天不可與服利一
兩行去其餘毒所安然後病也若一下因後痞
發燥及閉臉鼻之下利世人不用此法者於此
數證或不能免也
凡瘡疹治療之法初起之時身熱未出證候未
明未能辨認者宜升麻葛根湯消毒散服若熱
二三日證候已辨者則隨證而目辨識氣遊出法

別無他證者平和湯調之出不快者發之當究
氣虛實之變黑陷者熱之又毒攻咽喉者翻
傳身瘡毒後心煩者則煩渴毒入大小
腸大小便不通或遺瘀下血其攻皆證
生瘡膿疹生翳膜則瞽人以至癱瘓
然一切諸證皆隨證用藥甚者亂下見鼎
毋同服其藥則病得易愈
升麻葛根湯治瘡疹初發未出身熱
恐是瘡疹疑驚風變蒸之狀疑惑之間
升麻　葛根　芍藥　甘草各等分

右為麄末每服二錢水一盞半煎
六分去滓溫服無時
消毒散治瘡疹已出未出時可服未出即出
惡實　荊芥　牛蒡子二兩炒　甘草
右為麄末每服一大錢水一盞煎至五分去
滓溫服下利者不可與服若咽喉腫痛者
宜服之　荊芥防風
二兩　出千金方中
紫草飲子治如前
右以紫草二兩細銼用百沸湯一大盞沃之

化毒湯治初[illegible]上方痘毒[illegible]
[illegible]
紫草[illegible] 升麻 [illegible]
石膏[illegible]麻黃以水二盞[illegible]五十粒同煎至
一大盞去滓放溫量大小〇三四次與服一
方痘疹未出[illegible]之內[illegible]出[illegible]全出[illegible]
當日煎服三服立效
人參敗毒散治痘疹[illegible]便[illegible]可
人參 白茯 [illegible] 甘草[illegible]
右為細末每服一錢水一盞煎至六分去滓
溫服無時
[illegible]初出[illegible]服之令痘[illegible]
[illegible]可[illegible]乳下[illegible]服之斷乳令自服
紫草[illegible] 陳皮[illegible]
右為末每服一大錢水一盞入葱白二寸煎
至六分去滓溫服無時
胭脂塗[illegible]初出便用塗眼周圍以防痘子
入眼也左右[illegible]之
黃蘗膏[illegible] 痘疹[illegible]用以塗面從耳
前眼[illegible]之以防痘子入眼及面作
[illegible]能早用即能護目[illegible]面上不生[illegible]
出亦少[illegible]可用[illegible]
黃蘗[illegible]
新菉豆[illegible]一方[illegible]
甘草[illegible]
[illegible]
右為細末用[illegible]
[illegible]面塗之日三五次
[illegible]以胡荽[illegible]
[illegible]以物合之[illegible]
[illegible]以[illegible]合之
[illegible]口從兒項下[illegible]
[illegible]之其[illegible]吸一[illegible]
[illegible]口[illegible]不得[illegible]頭面[illegible]
[illegible]之為[illegible]合[illegible]出快[illegible]
[illegible]同[illegible]左右[illegible]
[illegible]之[illegible]故也
[illegible]子[illegible]作[illegible]氣[illegible]
[illegible]作[illegible]不快[illegible]發之
[illegible]子[illegible] 甘草[illegible]
右[illegible]每服二錢[illegible]服及利咽兩化[illegible]

止嗽一方只鼠粘子一两甘草半两為末
每服二錢水一盞煎至八分去粗温服無時
紫草散治如前　鈎藤鈎子　紫草茸各等分
右為細末每服一字或半錢温酒調下無時
此藥微用發之緩急未出加藥發之
必勝散治痘疹出未能遍匀服之能透肌發出
右以牛蒡子不限多少炒令香熟為細末每
服一錢入荊芥二穗水一盞煎至七分温服
無時

龍腦膏子治痘疹未透心煩狂躁氣喘妄語或如見鬼
右以生龍腦半錢研細旋滴猪心血和丸如雞頭肉大每服一圓煎紫草湯化下少時心神便定得睡瘡子已發得透了自然依常法服安
此方亦治黑陷伏搐者如用以温酒化下
又方
只用猪血一滴半許腦子一小豆許研

細酒少許和服之極有神效之
驗此然存中時用之古也
安斑散治痘疹出快肥紅平調之
川升麻　赤茯苓
綿黃芪　羌活去芦各一両
人參去芦　枳殻去穰麩炒
桔梗去芦　甘草各半両
右為細末每服二錢水一小盞入紫草薄荷各少許煎至五分去滓温服無時

快斑散
此方治痘如前
貫衆一两　赤芍藥一两
甘草半两
白茯苓半两
枳殻麩炒去穰半两
右為末每服一錢水一小盞入竹葉七片煎至五分去滓温服
無時其效如神

抱龍圓治如前

天南星為末用臘月牛膽汁和成劑再入膽陰

百日而乾四兩如无只以泉水或新水浸

天南星三日候透軟煮三五沸取出乘軟

去皮臍只取白軟者薄切焙乾如黃色為末

用八兩以甘草二兩半擘破水二椀浸一

宿慢火煮至半椀去粗旋旋添入天南星

末內慢慢研之令甘草水盡次入於餘藥

天竺黃一兩　雄黃一分研飛　辰砂半兩研飛

射香半兩研

右同勻末煮甘草膏子和圓皂子大溫水化

服百日兒一圓分三四服五歲兒一二圓若

用臘月中雪水煮甘草和藥尤佳此藥治

傷風傷寒溫疫風熱痰實咳嗽驚風潮搐

蠱毒中毒溫壯及室女白帶錢乙治瘡疹

出快紅肥只以此藥平調最好

小品犀角地黃湯治瘡疹太甚解散之

赤芍藥一分半　生地黃四兩　牡丹皮去心一兩

犀角屑半兩無即以升麻代

右為麁末每服二錢水一小盞煎至六分去

滓溫服有大熱如狂者加黃芩半兩更量

大小與服

木香湯治瘡疹太盛煩痛　青木香二兩　丁香

薰陸香　白礬各半兩　麝香二錢

右為麁末每服二錢水一小盞煎至六分去

滓溫服熱盛者加犀角屑半兩輕者去白

礬大效

猪膽醋治瘡疹內發盛者

醋四兩　大猪膽一个取汁

右合煎三四沸每服半合量大小與之

日四五服無時

萊菔汁治瘡疹出不快　右以開花蘿蔔煎汁時時與飲

紫草汁治如前　右以紫草煎汁服

活血散治如前　右以白芍藥為末每服半錢

或一字溫酒調下如只疑止痛者溫熟水

調下無時

蟬蛻○子治如前 [illegible]

右以蟬蛻十枚去泥土凡每十之用水三大

盞煎至八分去租分二服出不快者帶熱
服之若出多要消退者放冷服之神效
四聖散治瘡疹出不快小便赤澁心腹脹痛一
切惡候亦治倒靨　紫草茸一兩　木通去節
枳殼麩炒去瓤四兩　黃芪去蘆半兩　甘草半兩
右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓放
溫時時呷之
川芎升麻湯治瘡疹已出未能勻遍或毒氣壅
遏雖出不快此藥祭風透肌發瘡甚效
川芎　川升麻　當歸去蘆洗淨　白芍藥等
右為麄末每服一錢水七分盞煎至五分去
租溫服不拘時候
解毒湯治臟府蘊熱積毒發泄斑瘡稍密頭
大廠狂躁發渴咽嗌不利遍身瀆瀆苦痛
全膚不能轉側疼痛不住　生地黃四兩
犀角屑　白芍藥　牡丹皮去心各半兩
右為麄末每服一錢水七分盞煎至五分去
租放溫服之
黑龍散治小兒瘡疹綻發服冷藥伏搬三日間
危篤急進此藥　麻黃去根節三分　竹茹一分

焇稍半不　蘇木一分　烏龍上一分乃灶心土
右為細末每服半錢水五分煎至三分溫服
白虎化斑湯治瘡疹赤黑出不快毒盛煩躁或
云大虎湯有為大人藥者殊不知孫真人
言大人小兒為治不別但用藥多少耳
石膏四兩煅研　知母一兩半剉　甘草炙三分
人參去蘆半兩
右為末每服二錢水一盞入粳米二十粒同
煎至七分去租溫服小兒量大小分減如
春深秋冬月寒時加棗一煎服并乳母蒸服
大婦斷乳兒只自服
神通散治瘡疹倒靨伏陷不出毒氣稍輕大小
便通利者　地龍去土微炒一兩
朱砂一兩別研　生乾地黃一兩已上先為末
右同拌勻每服一字煎胡荽酒少許同溫湯
調下無時
如聖散治瘡疹已生反倒攧內陷吞縮啼声不
出腹脹肚急一切惡証
右用蛇蛻皮於灯焰燒先用椀一隻在下候
燒焰絕放在椀內急用椀一[illegible]覆之不令

透氣良久揭開加研勻[illegible]
錢調蘆薈香湯調下若[illegible]
子焮熱爲細末每服二[illegible]至六
分放冷澄清以匙抄[illegible]
潤咽喉肺經大解瘡子
七物散治瘡疹毒氣內攻[illegible]
之候　臘月猪血[illegible]
牙硝　辰砂　牛黃　麝香　龍腦[illegible]
餘血依舊封收之以備拜各要用
右拌勻研細以[illegible]合貯之每一錢兒用[illegible]

新水調服治下[illegible]瘡子紅活扁勞又一
方更有朱砂細[illegible]一錢[illegible]同名二[illegible]
名如上妻者不[illegible]無比又一方
[illegible]咸砂淨有[illegible]一錢研同[illegible]
無比散小便猪尾上血三五滴相拌小[illegible]
一字乳汁[illegible]口[illegible]新水調下
綠豆同
[illegible]治如前[illegible]
未殺一日研末[illegible]　甘草[illegible]
牙硝[illegible]　生龍腦一分研

[illegible]於臘月八日取猪[illegible]一升用
瓦盆盛入諸藥同拌[illegible]以一竹大[illegible]
箭成[illegible]一節都入在內用紙數重[illegible]
緊封合却入筒口[illegible]一[illegible]子以麻[illegible]
書在大糞坑屋梁上至清明日[illegible]
更入龍[illegible]射各一錢研細勻滴水和[illegible]
大每服一[illegible]入參湯化下[illegible]
倒[illegible]變黑水之則紅活[illegible]
[illegible]子治瘡疹黑[illegible]倒[illegible]不出
生龍腦[illegible]研細猪尾上取血[illegible]

未二味相和以[illegible]
研[illegible]勻於湯中[illegible]
[illegible]小猪兒尾尖血三五滴[illegible]
[illegible]新水調下治如前　又一方[illegible]
[illegible]惡候醫所不治者用[illegible]
者半合酒一半合研龍腦細末少許[illegible]
勻服之利一兩行十數[illegible]人大驗[illegible]
患又一方治瘡疹發心悶有熱或誤服[illegible]
藥發熱在心[illegible]不省人事瘡子黑[illegible]
用猪心一个取心中血以生龍腦一

字同所合作一圓[illegible]水化下未出者再
服又一方治瘡疹黑[illegible]倒陷於臘日收
猪血新瓦[illegible]中焙乾[illegible]以自然瘡泣至乾[illegible]
用[illegible]冬[illegible]研[illegible]入射香少許同匀和[illegible]
調下其瘡[illegible]紅[illegible]一上數方皆見[illegible]
香[illegible]
發之
[illegible]一圓
老[illegible]入[illegible]三五枚炙令黃[illegible]
入射香少許每服一錢[illegible]調下[illegible]

[illegible]乙方言屢見之用之[illegible]
白丁香散[illegible] 右以白丁香為末入[illegible]
[illegible]每服[illegible]等不飲調下無時
[illegible] 右以[illegible]煎湯飲之矣
[illegible]以[illegible]調下無時
[illegible]方[illegible] 右以黑[illegible]一隻[illegible]
[illegible]日[illegible]腸中[illegible]生[illegible]
[illegible]不[illegible]下於活水中淨洗[illegible]
[illegible]乾收之每用二錢研細[illegible]
[illegible]入射香[illegible]許新水調下頃刻間[illegible]

紅活
百祥圓[illegible]用此一藥治瘡疹惡候見
於皮膚之下不出或出而不長反黑[illegible]
[illegible]一切危急[illegible]百祥圓以瀉膀胱
之府[illegible]不旺用之[illegible]
[illegible]云[illegible]小[illegible]自[illegible]
已不[illegible]此[illegible]得[illegible]
[illegible]故將不[illegible]
[illegible]之
百祥圓[illegible]

右以[illegible]不[illegible]多[illegible]
[illegible]中[illegible]所[illegible]
[illegible]一二[illegible]
[illegible]下無時[illegible]
[illegible]
[illegible]以牛李子不[illegible]多少[illegible]
野生道边至秋[illegible]實[illegible]
得成熟若[illegible]九月[illegible]
[illegible]中熬成[illegible]研每[illegible]二兩入研
細射[illegible]未[illegible]一錢和[illegible]大每[illegible]兒一

圓或圓作皂子大暈大小分減用以漿ォ
煎杏膠湯化下凡瘡疹黑紫倒攧者不問
老服當取下惡血或如魚子惡物其瘡[illegible]
陷於皮下者即紅大而出
方論小兒瘡疹誤服涼藥太過身冷瘡[illegible]
不紅活脉沉細者急救金液丹服子大一
二百粒或有可生之忍至兒困極則無及
矣方在和劑集中
調肝散治瘡疹平調肝藏瘀毒氣通流瘡疹不入
眼 生犀[illegible] 草龍膽[illegible]
黃芪[illegible] 甘草[illegible] 大黃一分[illegible]
桑白皮[illegible] 麻黃一分去節[illegible]
右[illegible] 梔子[illegible]
右為散每服二錢水一盞煎至五分去滓溫
服無時
[illegible]所聞治瘡疹入眼切忌[illegible]服藥痛使時一看之
若瘡上無瘡即無妨 若有時須先服清涼
散子每日食後一服 或微利以去其毒然
後服此二藥[illegible] 或瞳膜遮其睛但
[illegible]不妨[illegible]

黃蘗[illegible] 蒼[illegible] 右[illegible]
右為細末煮黃肝爛[illegible]菉豆大每服二
十圓米泔水送下食後臨臥時服
龍[illegible]散與前藥服[illegible] 龍膽草[illegible] 蛤粉[illegible]
右為細末每服二錢猪肝[illegible]
在中以線纏定用米泔於銀石沙器內煮
火慢[illegible]肝熟為度食後少頃食之以
汁送下[illegible]須先以清涼飲子利熱方服
此二藥必效
煎神散[illegible]治瘡疹入眼
穀精草[illegible] 白菊花[illegible] 菉豆皮[illegible]
右為細末每服一錢用柿子一個粟米泔一
盞同煎至水盡取柿子食之日三服
一云淺者五七日效 遠者半月日效
仙靈脾散治瘡疹入眼 威靈仙[illegible]
右為細末每服半錢米泔調下食後
珍珠散治瘡疹入眼昏暗亦痛羞明
栝樓根[illegible] 蛇蛻皮[illegible]
右為末用羊子肝一葉批開去筋膜摻藥末
一錢[illegible]麻線纏定[illegible]任意食之[illegible]

兒未能食者以肝研爛和圓黃米大生米泔下十圓乳母服亦可日三令乳母忌食之佳

浮萍散治瘡疹入眼痛楚不可忍恐傷其目

右以浮萍草陰乾為末每服一二錢用羊子肝半片入盆子內以竹杖子刺碎爛擾水半合絞取肝汁調藥服之食後不過者一服便差若目已傷者十服差

蟬蛻散治瘡疹入眼腫侵睛成翳子

馬勃一兩　皂莢子十四個　蛇退皮全者一

右入一小罐子內泥封燒不得出煙燒存性研為末溫水調下食後

蒼朮散治瘡疹入眼生翳膜丁子先用朱砂一錢

銀粉各一錢　麝香一錢　一處拌勻入一小砂鍋子內盛訖新瓦一片蓋口黃土泥縫炭火燒赤少時取出放冷放之如左眼有病即取藥一豆大綿裹塞左耳中右眼有病塞右耳中

秘傳北仙朮散

蒼朮米泔浸焙一兩　穀精草去根二兩　青蛤粉一兩　紫蘇二兩

右為末每服用猪肝一片批開摻藥三錢在內麻線纏定米泔熟煮先於氣上熏眼然後食之

煮肝散治瘡疹入眼諸藥不效

青葙子　草決明　車前子　密蒙花各等分

右為細末用羊子肝竹刀薄批開摻藥二錢在內荷葉裹麻線纏定入器內煮熟任意喫

如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗去蘆二兩　甘草一兩炙　牛蒡子一兩炒　麥門冬去心

右為末每服二錢沸湯點細細呷入竹葉煎之更妙食後服

治斑瘡入眼

夜明砂半兩　木香半兩　淡竹葉半兩

右為細末每服半錢或一錢井水調下食後

紫雪治瘡疹毒攻咽喉腫痛水調下方見錢氏和劑集中

通關散治瘡疹心經有熱煩躁發渴口舌生瘡及大小便不通

大黃　瞿麥　木通　山梔子仁　滑石　甘草各半兩　地萹竹一兩　車前子半兩

右為末每服二錢水半盞入紫草少許同
三兩沸放溫服乳食前
甘露飲治瘡疹已發熱毒上衝牙齒宣腫不能
咽物并乳母可與服之　生乾地黃洗焙
熟乾地黃洗焙　天門冬去心　麥門冬去心
枇杷葉去毛　黃芩去心　石斛去根
甘草炙　枳殼麩炒去穰　山茵陳葉各等分
右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫
服無時

青黛散治瘡疹熱盛心神煩躁
右以青黛細研每半錢溫磨刀水調下日三
殺毒散治如前
白芍藥　甘草炙　雄黃醋煮水飛各一分
右為末每服一字或半錢蜜水調下無時
牛黃散治瘡疹毒氣入胃便血日夜無度腹痛
啼哭　鬱金一兩　牛黃一錢
右研勻細每二歲兒半錢漿水半盞煎至三
分和滓溫服日二
升麻湯治瘡疹已愈餘毒未解瘡痂雖落瘢色
黯慘或凹凸肉起宜用此滅瘢消毒

右以川升麻不限多少細剉水一大盞煎至
七分取汁以綿蘸洗拭瘡瘢
青金散治瘡疹愈而瘢不消　白蒺藜半兩
山梔子半兩　青黛半兩研　膩粉一錢研
右件勻每用少許生麻油調塗瘢上
又方治瘡疹瘢子
右以密陀僧細研為末水調夜塗明日洗之
又方　右以真玉時時磨瘡疹瘢子久則平滑
清涼飲子治瘡疹後餘毒入黃溫[illegible]
當歸去苗洗　赤芍藥　甘草炙各等分

右㕮咀每服一錢水一大盞入薄荷兩葉同
煎至半盞去滓溫服食後更看虛實以意
分減　[illegible]
神朱散治瘡疹後解去餘毒
赤小豆二錢炒　紅花二錢　射香少許
右為細末每服半錢或一字溫酒調下臨臥
只一服微利之

小兒衛生總微論方卷第八

小兒衛生總微論方卷第九

吐瀉論上

小兒吐瀉者皆由脾胃虚弱乳哺不調風寒暑溼邪干於正之所致也其證不一今條叙之

吐晛兒附

吐逆自生下便吐者此是兒初生之時拭口中穢血不盡因咽入喉故也

吐逆胸滿悶氣急者此因兒啼哭未定氣息未勻乳母怱遽以乳飼之兒氣尚逆乳不得下停滯於胸鬲之間因更飲乳前後相沓氣不宣通故氣逆而乳隨出之為吐也宜調其氣而止吐 古書亦曰大哭之後食乳者多成吐瀉也

吐逆腹脹喘息乳不化夾青水面青唇白者此因乳母胃寒取涼食冷飲寒致冷氣入乳變壞其汁而不捻去仍以飼兒或兒食者因以冷物飼之其冷乳冷食入腹與氣相搏滯於脾胃則氣逆而吐也其證若此宜温胃止吐調氣若傷重有停滯者以穩藥磨化不可下恐脾胃愈虚而生風也凡風冷亦致吐

當捻去之暫斷乳兒令乳母服藥温暖然後飼兒若不捻去非只令兒吐逆脾胃虚者冷因得入亦下利也

吐逆身熱吐涎成片者胃有熱也此因乳母熱或因飲酒熱入其乳變壞其汁而不捻出仍以飼兒或兒乘熱哺啜致熱氣入胃與氣相搏致氣逆而吐也其證若此如久有積熱者必四肢冷多渴而面黃宜微下之虚者以穩藥磨化後調其氣

吐逆身熱留……呵欠……悶口中氣熱夜間發躁者此傷風吐也因解脫失宜風冷襲之標在血氣或身熱呵欠煩悶口中氣熱也氣不得順故逆而作吐也宜調氣止吐發散風冷

吐逆唇黑面黃多啼有痰吐氣臭者此脾胃有傷也宜先下之後調其氣

吐逆早晚發熱睡臥不安者此驚吐也心熱則生驚故睡臥不安而神不寧也心神不寧則氣血逆亂而吐也宜鎮驚去熱止吐

吐逆面䀮白无精光口中氣冷口頰撮不思乳食吐水者胃氣不和也宜補脾胃

吐逆痰涎色黃稠黏上壅者胃熱也若吐痰青白綠或吐沫者胃虛冷也熱者宜微利之冷者宜溫補之

吐逆痰涎及有血者此肺熱也久則肺虛成痿昔錢乙治段斎郎子四歲身熱吐痰嗽數日而咯血他醫以桔梗湯防己圓治之不愈涎上攻吐喘不止遂請乙治乙下褊銀圓大一服復以補肺湯補脾散為治乙曰此子咯血肺虛也肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐依法只宜先下痰而後補脾肺必涎上而吐愈為順治也若先補肺為逆耳乙所用藥方本集載之此所謂識病之輕重先後為治也

哯　哯者比吐逆異也吐者乃邪搏胃氣逆而上行穀不能傳化隨氣出也哯者但氣逆而欬哯吐則穀無所出故俗謂乾哯也哯稍乃兒因哯乳汁還出胃滿而上溢出也故俗呼謂之噫嫁當便與壓乳令哯即定若頻頻哯之亦能為病

瀉

瀉色白者冷瀉也此由小兒腸胃虛弱因觧脫風冷干之或因食寒飲冷入於腸胃冷氣相搏為利下也其色白而白或腹痛者並宜調中若又傷風冷前後重者冷甚則瀉不止而為泄注也

瀉色赤者熱瀉也亦由小兒腸胃本挾虛熱而風冷乘之入於腸胃之間熱氣相搏而為利下故其色赤也宜微下之以蕩其熱後調其氣

瀉色或赤或白或水或穀者此冷熱瀉也由小兒腸胃先因有冷而後傷熱或先有其熱而復傷冷腸胃宿虛冷熱交攻而為利下宜調其冷熱和養其氣

瀉色黃赤紅黑者皆熱也赤黑者有毒也微下之然後調氣

瀉色青發熱有時睡卧不安者此驚瀉也小兒糞黃脾胃土之本色也色青者肝木乘風肝木來刑脾土宜早治之不尔則變脾風而發痰癖則難治也所謂糞青者須綠便下便色青是也若初下時黃良久乃青者非也小兒

変者皆然不可認為青糞也若瀉色青白粘
不化者此謂冷也宜温補脾胃發散風冷
瀉糞下色赤白腹大ゝ青筋見髮稀饑啼或哭
泥土時有蚘虫此疳瀉也宜止瀉退疳殺虫
瀉多日唇口及糞色皆白黄頻多者久因成冷
脾胃虚困恐变肝風發搐宜以藥防臨而温
發補助脾胃
瀉於春者熱時多患者謂時熱及飲食皆冷故也
不傷於熱必傷於冷若傷熱伏暑而瀉者則

心藏煩熱必小便不利清濁不分瀉色赤黄
宜利小便解其熱若小便快而瀉者為冷也
色必青白穀不化宜温脾胃止瀉
瀉者不可急以熱藥止之多变為痢而下膿血
也當審察冷熱証候揆度緩急施治也

吐瀉

吐瀉多病於春夏秋三時惟冬時絶少者蓋吐
瀉皆因脾胃虚冷熱所致以冬時陽氣在内
多食温暖少飲水漿故也設有患者必因傷
於乳食也若春時病吐瀉者多因於風夏月

病者多因於熱秋時病者多因於冷凡治吐
瀉者必當參其時候觀其形証察其温良寒
熱如此則無誤矣

傷風吐瀉

傷風吐瀉身温乍凉乍熱呵欠頓悶多睡口中
氣麁而熱大便黄白色恒吐乳食不消時或
咳宜散風補脾如先巳曾經下或无下證須
不可下也此由脾肺受寒不能入脾也更有
五藏兼見之証發散者化大青膏服之後解
者後服益黄散此錢乙所用藥也方在本集

傷風吐瀉身熱多睡能乳呵欠頸悶口中氣熱
飲水不止吐痰大便黄水此為胃虚熱渴吐
瀉也當生胃中津液以止其渴錢乙用白朮
散瀉服之然後發散風冷亦用大青膏又云
吐瀉昏睡露睛者胃虚熱也吐瀉合睛不露
睛者胃实熱也

傷風吐瀉身凉吐沫瀉青白色呵欠悶乱不渴
哽氣長出氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成
吐瀉當先補脾錢乙先用益黄散後發散其
風用大青膏此二病於春冬多也

傷食吐乳

吐瀉乳食不化其吐及糞皆有酸臭氣者此傷食吐
瀉也凡吐乳瀉黃赤者傷熱乳食也若吐乳瀉青
白者傷冷乳食也並宜微下之後和胃氣壅者以
緩化滯藥漸磨化之

吐瀉在初生三日內壯熱不乳大便乳不消化或白色
者是傷乳當微與下後和胃氣虛者以緩化滯藥消
磨化之　吐瀉在初生三日已上至十日身溫
涼不思乳大便青白乳不消化此上實下虛也更
有五藏兼見證瀉其所實者而補其脾胃虛者也

吐瀉有兼藏證者兼肝則搐搐證寒精喘亂兼心則驚悸
飲水兼脾則困倦饒睡搐吐瀉初解兼肺則呵欠煩悶
兼腎則不語畏明

昔錢乙治馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食乙見
兒目中黑睛少白睛多面色㿠白乙曰此子必多
病面色㿠白者神怯也黑睛少者腎虛也本怯而
虛故多病也縱長成必肌膚不壯不耐寒暑易虛
易實脾胃亦怯更不可縱於酒慾若不保養不過
壯年也面上常無精神光澤如婦人之失血也今
吐瀉不食壯熱者傷食也又虛怯則

不可下、下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則
困倦入胃則加虛但當以藥磨化之爲微有
食傷也若重傷則須下之不下則成癖也若
實食在內乃可下也下畢補脾必愈隨其虛
實無不效者乙所用藥在本集載之其方

冬熱吐瀉

吐瀉在五月中已後身壯熱者此熱也小兒藏
府十分中九分熱此因傷熱乳或胃熱入
內吐乳不消瀉深赤色宜與解熱錢乙用玉
露散

吐瀉在六月中已後身大溫而似熱藏府中六
分熱四分冷也嘔吐乳食不消瀉色黃多白
尖似渴或食乳或不食乳宜少補脾而大府
熱錢乙尖用益黃散又用玉露散更互服
冷熱如兒大熱瀉色亦黃者此熱多於五月
中後治之昔錢乙治廣親北宅四大王宮五
大尉六月中吐瀉米穀不化錢乙用溫藥一
日而加喘吐不定乙曰當用涼藥治之謂傷
熱在內也錢乙所言吐瀉多而米穀不化當
補脾胃何得用涼藥上信氣淸之用

錢乙曰不可服此三日外必腹滿身熱飲水吐逆三日外一如所言謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃即大吐瀉他醫又行溫藥即上焦亦熱故喘而引飲三日當死衆醫不能治復召乙、見有熱証以白虎湯三服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯二服四日用石膏湯及旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以朱砂爲衣竹葉湯下五圓熱退而愈乙所用方本案載之

吐瀉在七月中已後身温凉待中三分熱七分冷也不能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦而不渴錢乙於食前令多服補脾益黃散食後少服解熱玉露散更宜相度冷熱之身大温瀉後黃者秋六月中已後爲治也昔錢乙治廣親七太尉七歲吐瀉是時七月其証全不食而昏睡、睡覺而悶亂哽氣乾嘔大便或有或無不渴衆醫以爲作驚治之不愈乙曰當先補脾而後退熱與使君子圓補脾石膏湯退熱次日以水銀硫黃

[illegible]黃水調下一半乙曰兒吐瀉五月内九分下而一分補八月内九分補而一分下此者是脾虚瀉醫妄治之至於虚損下之即死故只當補脾若以使君子圓恐緩已又留温胃益脾藥止之有李醫問曰何食而瀉乙曰脾虚不能食津液少即喘逆又曰何瀉青褐水乙曰腸胃至虚冷極故也乙治而愈其方[illegible]之

吐瀉在八月中已後身冷无陽也不能食乳乾噦瀉青褐水錢乙只用益黃散補脾不可下

吐瀉所論冷熱特以錢乙以中原之地言也今較之江浙則氣候不同今江浙之地二三月尚寒四五月温暖六月入伏之後經熱之月熱盛八月熱尚未退雖冬月亦多使暖熱夏月陰多便寒不可藥以中原冷熱時候爲定論經所謂東西南北之異地温凉寒熱之異宜況寒暑自隨時令早晚難以拘定月日也假令寒暑至也謂至其熱則從熱治至其温則從温治至其寒則從寒治至其凉則從凉治此乃隨四時之氣各適其宜

瀉於夏秋大熱之時伏暑傷冷則心藏煩躁小便不利清濁不分陰陽二氣相干名曰氣乱、、於腸胃之間名曰霍乱其証乘熱傷冷氣逆而喘腹脇脹滿身熱脉乱頭痛体疼如傷寒之狀上即大吐下即大瀉重者四支厥冷脚轉筋治當調順其氣分別清濁升降陰陽若只伏暑吐瀉者則小便不利其証輕躁上証稍同而輕非霍乱此瀉色赤黄此但只名伏暑吐瀉不為霍乱也 治霍乱吐瀉若熱多而渴者五苓散寒多不渴而心腹身体疼痛及煩躁渴不能飲者可服理中湯寒甚腹痛轉筋四支拘急者理中湯加附子汗出惡寒手足厥冷下利清穀內寒外熱脉微欲絕者並四逆湯已上諸証並可與香薷散厥之以他藥不能療此証也治伏暑吐瀉若小便不利與五苓散利小便及與香薷散解伏暑煙蓮散救生丹止吐

吐瀉不拘何時則令脾胃虛弱多致生風而為脾風慢驚也以脾土衰而肝木未刑故今當先補脾胃不令困弱則風不生而病易愈也

吐瀉已定未定煩渴者皆津液內耗也不問新久宜煎錢乙白术散使滿意取足飲之多因飲好不尔即津液內耗而引飲不止內生虛熱外邪相干則証變百端以成他病漸至危困也

小兒衛生總微論方卷之九

小兒衛生總微論方卷第十

吐瀉方下

治吐方

朱沉圓治自生下便有吐逆皆因初生時拭
口中穢液不盡所致

乾木瓜末　射香　膩粉
木香末　檳榔末　各一字

右研勻熱湯和丸粟米大每服一二丸甘草
水下無時服

揭氣丸治啼哭未定便令食乳氣逆停滯心[illegible]

滿悶氣急吐逆

青橘　巴豆　胡椒　丁香

[illegible]右用醋[illegible]一椀[illegible]至醋
盡為度取出細研[illegible]乾同為細末粟米糊
和丸粟米大每一二歲兒三二丸三四歲
兒四五丸飲下日三服此藥利胃[illegible]
後復進[illegible]散一二服補氣食前

和胃膏治啼哭[illegible]乳氣[illegible]塞及胃虛氣不升
降胃[illegible]嘔吐[illegible]不得

人參去芦　藿香葉去土　水銀

枇杷葉[illegible]　白茯苓[illegible]　甘草炙[illegible]
肉豆蔻[illegible]　硫黃[illegible]

右同為末次將硫黃水銀砂子入之一并研勻
細煉蜜和[illegible]一歲兒桐子許[illegible]
湯化下[illegible]加減服[illegible]

白附子丸治[illegible]

白附子[illegible]

右先將生薑[illegible]半夏[illegible]自然
汁和劑[illegible]餅子[illegible]至熟
取出研成末入三味藥末和之如乾添少

湯丸[illegible]大每服二三十丸米湯或乳
汁送下無時

羌活膏治傷風吐逆亦能截驚定搐

羌活去芦　獨活去芦　人參去芦
白茯苓　防風去叉枝　肉桂去皮不見火
全蝎炒各一分　硫黃三錢　水銀[illegible]

右同為細末煉蜜和膏每用量大小嬰孩[illegible]
栽大豆許三二歲雞頭大五七歲兒[illegible]
大並薄荷水化下

托養丸治傷食吐逆心胃滿悶陰[illegible]

參煩熱躁悶
硫黃 水銀（各半兩同研細不見星） 附子（炮）
木香（半兩） 當歸（去蘆半兩） 大黃（一兩）
右為細末煉蜜和丸櫻桃大每服一粒生姜
湯化下無時
朱砂丸治驚吐不止
朱砂 乳香各一錢 半夏（二十一个）
右同為細末姜汁糊丸黃米大每服五七丸
乳香湯下無時
紫霜丸治如前 朱砂（半錢） 杏仁（二十个去皮尖）

右同研細糊丸麻子大每服五七丸菖心湯
下乳食前
三香丹治挾驚吐逆不止
藿香葉（去土） 丁香（各半兩） 射香（一錢研）
膩粉（半分研） 半夏（七個湯洗） 龍腦（半錢研）
右為末拌勻生姜自然汁糊和丸黍米大每
服十粒人參薄荷湯送下無時
四季散治驚吐及脾胃諸藥不效者服之立效
右以好硫黃半兩研細入水銀一分同再研
至無星如黑煤色每用一錢或半錢以生姜

自然汁同酒各少許同煎用少許調灌之令
之服畢覆卧當自汗出乃愈
集香散治脾胃不和氣虛吐逆不食漸成驚
丁香 沉香 木香 白术
藿香葉（去土） 薑厚朴（各半） 白茯苓
白荳蔻（各一分）
右為細末入射香少許拌勻以水半升蜜四
兩大棗十五个生姜十兩片於銀器內慢火
熬成膏去姜棗不用以膏和藥丸如皂子大
於當風處窨乾每服一丸米飲化下量兒大

小加減乳食前
人參白术散治胃氣不和吐逆不思乳食亦治
霍亂吐逆
厚朴（去粗皮） 人參（去蘆）
白术 半夏（湯洗七次） 陳皮（去白各一兩）
右為細末每服一錢水一小盞生姜二片煎
至六分去滓溫服
人參藿香散治脾胃不和吐逆不定
人參（去蘆一兩） 藿香葉（去土半兩）
白术（剉炒） 丁香 乾姜

枇杷葉去毛蜜汁塗炙令香熟 甘草各一分炙
右為細末每服一錢水一小盞入木瓜一片
煎至五分溫服無時去滓通口服
藿香散治脾胃氣不和吐逆心腹脹滿
藿香葉去土 半夏麴 甘草炙各一兩
陳皮去白 厚朴去皮生薑汁炙各一兩 人參去芦
白朮 各半兩
右為細末每服半錢或一錢水一小盞生姜
三片煎至六分去滓溫服無時
萬安丹治胃虛傷冷吐逆

半夏一分湯洗七次焙乾 白朮一分
附子一個炮裂去皮臍 丁香一分研 朱砂半兩研水飛
右上三味先為末入研藥拌勻生姜汁和丸
黍米大每服十粒米飲下乳食前
聖石散治如前經驗
礞石四兩炭火燒赤候時不灰 玉一兩炭火燒赤候時 丹丁香二兩
木香一兩 人參去芦一兩 白茯苓一兩
半夏湯洗七次焙乾 真陽起石一兩火內同煅 杏仁各去皮尖麩炒
阿魏一錢半 巴豆 杏仁二七個去皮尖
右同研細末湯泡蒸餅和丸如梧桐子大每服一粒

水一盞入姜棗子大擘破同煎至五分去滓
溫時時服之煎藥須用銀石器
厚朴散治胃冷氣逆吐不思食
白茯苓半兩 肉豆蔻麵裹煨半兩
厚朴去皮生薑汁炙一兩 枇杷葉炙去毛一分
右為細末每服一錢水一小盞生姜二片煎
至六分去滓空心溫服無時
人參膏治脾胃虛冷乳食不化吐逆連併不喜食
人參去芦 滑石 藿香葉去土半兩
丁香一分 甘草一錢炙 縮砂一錢半研末炒

右為末煉蜜和膏每用皂子大米飲化下無時
橘皮湯治胃冷吐逆正氣
右以橘木皮煎湯汁服之
溫脾散○治寒濕吐逆
厚朴去皮姜汁炙令香熟一兩 丁香
白朮 乾姜炮各半兩焙 肉桂一分
右為細末每服一錢煎人參湯調下無時
香參湯治寒痰吐逆
丁香 藿香葉去土 丁皮 人參去芦
白茯苓各一兩 青皮 蓬木香 甘草炙各半兩

右為末每服一錢水一小盞生姜二片煎
五分去滓溫服無時
三黃散治傷熱吐逆
五灵脂　大黃　雄黃各等分研為末
右為細末每服一字磨刀水調下無時治兼
吐尤佳
槐花散治熱吐不止
皂角燒灰存性　白礬枯　槐花炒　甘草炙各等分
右為細末每服一錢白湯調服無時
丁香益胃湯治胃虛挾熱吐逆不止
丁香　人參去蘆各一兩　桂去皮
大黃濕紙裹煨　訶梨勒皮各一分
右為細末每服一錢水一小盞生姜二片煎
至五分去滓溫服無時
人參桂姜湯治熱氣不調吐逆腹滿脹痛
人參去蘆一分　桂去皮　良姜各一兩　甘草半兩炙
右為細末每服一錢水一小盞生姜三片煎
至六分溫服無時
白术湯治吐逆熱煩而渴津液燥少
白术　乾葛根　人參去蘆各一兩　木香

藿香葉去土　白茯苓　甘草炙各半兩
右為細末每服一錢水一小盞生姜三片煎
至六分去滓溫服或用生薑湯調下無時
香朴散治冷熱吐逆和順其氣
厚朴去皮姜製一兩　人參去蘆一兩
丁香半兩　麥門冬去心半兩
右為細末每服一錢水一小盞入生姜三片棗
一个同煎至五分去滓溫服無時
抵逆丸治一切冷熱吐逆不止
半夏一兩湯浸洗七次切焙　胡椒一分二味同為細末生姜
丁香四十九个　蓮子心一百个
右為末姜糊和丸菉子大每服三二十丸煎
柿子石蓮湯送下無時
清膈飲子治伏暑吐逆　淡竹葉一兩去枝梗
香薷一兩　檀香半兩　人參去蘆半兩
半夏七个湯洗七次切焙　白茯苓半兩　甘草半兩
白粳米一合
右為粗末每服二錢水一盞分盞煎至六分去
滓溫服時時如熱冷服
火令圓治伏暑吐逆頭背痛四支冷項強不

半夏二兩薑製　硫黃一兩　白礬上一兩
右為末滴水和丸大豆大每用一二丸以針穿於灯上燎过吐逆者塩艾湯下煩躁者生姜湯下四肢冷者熱酒下頭痛者臘茶下兒小者服一丸

紫金圓治霍亂吐逆不止又治番胃及沉積赤白惡痢
五灵脂去砂石二兩半研　揀丁香一錢為末
巴豆半兩去殼并心皮如研入上二末和匀
右以棗肉和丸黃米大每用量大小虛實加減二歲上五七丸三歲上十丸煎丁香藿香湯放冷送下服藥畢須候兩時辰不得與乳食候大便過一兩次服蒲葉四聖圓如吐後躁熱心悶頭悶服四順飲子此三藥乃一粟也兒本性食[illegible]霍亂者更宜斟酌

四聖圓　[illegible]
乾姜[illegible]　藿香葉[illegible]
丁香枝扶各等分
右為末醋糊和圓如菉豆大每服三十圓煎人參或白术湯下如吐止瀉米飲下無時

四順飲子　地骨皮去骨尽　防風去芦并叉枝
山梔子仁　連翹各等分
右為末每服一二錢水一盞生姜三片煎至五分去滓臨卧溫服如大便秘澁煎灯心竹葉湯放冷服亦治諸熱心胸煩躁悶悶

乳吮散治嬰兒吐乳不定
枇杷葉一分去毛炙焦黃色　母丁香一分
右為末每服少○許或半字一字塗乳上兒兒便止

烏通汁治嬰兒吐乳黃色
右以新馬糞一塊絞汁三大小分減灌之

葛根粉治小兒吐逆壯熱不下食
右以葛根粉二大錢水二合調勻瀉入[illegible]中側轉令遍如盪粉皮法重湯內煮令熟以糜飲相和食之亦治痢

白魚灰散治百日內兒涎壅吐乳
右以書中白魚七枚燒灰研細乳汁調服一字与服或傳在乳上吮之

丁香散治胃虛氣逆嘔吐不定霍亂不安[illegible]困弱
丁香一分　人參半兩　藿香葉[illegible]

右為末每服一錢水半盞煎三五沸入乳汁
三五滴更煎一兩沸帶熱服無時頻頻服效
聖白圓治小兒吐逆
半夏（半兩湯洗十次同刀切作片子焙令乾） 丁香（半兩）
右於大□中同拌為末生薑自然汁和丸麻
子大每服十丸十五丸溫湯送下无時
白术散治小兒吐瀉或加喘促
白术（二兩） 乾山藥 白茯苓（各一兩） 人參（一兩）
木香 白扁豆（炒） 藿香（去土各半兩） 甘草（一分炙）
右為末每服一錢紫蘇湯下當有陳皮湯下亦可

附子散治小兒虛風嘔欠吐逆逆盛
白附子（炮） 南星（炮各半兩） 黑附子（炮去皮臍各一分）
右為末每服一錢水一小盞生薑二片同煎
仍不住手攪煎至半小盞分三服量大小與之
滑石散治胃熱吐逆[illegible]
白滑石 [illegible] 等分
右為末研勻每服半錢葱白煎米飲調下
枇杷葉散治一切吐逆及煩渴
枇杷葉（去毛炙） 麥門冬（去心）[illegible]
蘇葉（四十九葉） 丁香（一錢） 石蓮（去心）[illegible]

藿香葉（去土半兩） 甘草（一分炙）
右為末每服半錢煎坯子胭脂石蓮湯調下無時
白茅散治吐逆不定
丁香 花桑葉 人參（去芦）
藿香葉（去土） 白茅根（剉各一分）
右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓
量大小分服無時
白附散治小兒吐逆不定虛風喘急
白附子 藿香葉（去土等分）
右為細末每服半錢或一錢米飲調下無時

胡椒散治小兒胃氣虛冷痰盛吐逆
半夏（大者十四枚生） 胡椒（四十九粒）
右為麁末每服半錢水一小盞入生油七滴
煎至五分去滓服無時
二白剉散治小兒膈上痰壅吐逆不食漸生痞
鈌肓中滿塞咽嗌不利
大天南星（一個炮裂出火毒） 大半夏（四兩湯洗七次去滑）
右並剉作塊子以水一大盞半入生薑七片慢
火煎至一呷服之入冬瓜子同煎更妙
五香半夏圓治小兒胸滿氣不升降[illegible]

或作咳嗽

沉香 射香 丁香

木香(各一分) 藿香(去土一兩) 半夏(湯洗七次姜汁炒黃)

肉豆蔻(麵裹煨) 人參(去蘆) 陳皮(去白各一分)

右為細末姜汁糊丸黃米大每服三十丸生

姜湯下乳後

定吐香銀圓治小兒脾○胃氣弱挾於風寒生

冷食便青泄利

藿葛(各一兩) 丁香 半夏(湯洗七次切焙) 水銀(後入各半兩)

右上三味先為末入水銀研勻生姜汁糊圓

麻子大每服三五圓至十數圓量兒大小加減

服藿香湯下無時

龍虎救生丹治一切吐逆不下食

水銀(半兩) 硫黃(一兩二味同研細至無星為度)

丁香(半兩) 半夏麴(一兩) 人參(去蘆一分)

天南星(半兩炮) 白附子(一分炮裂)

右為末生姜汁煮糊和丸雞頭子大每服一

二丸煎藿香湯下伏熱吐者煎蓮子心湯

下量大小服又治妊婦阻病亦效

枇杷葉湯治一切嘔逆煩渴

枇杷葉(一兩拭去毛炙微黃) 丁香(半兩)

人參(去蘆半兩) 甘草(炙) 白茯苓(各半兩)

右為細末每服半錢煎茅根湯調下無時

定命丹治一切吐逆不止

巴豆(十個去油) 丁香(三個炒) 右為細末以黃

蠟熔劑旋圓如菉豆大每服三五丸米飲

湯下睡驚兒湯下夜啼朱砂湯下兒本莊

實者可隨證宜服

五倍子散治吐逆不定 右以五倍子二箇一

生一熟甘草一寸用濕紙裹煨同為細末每

服半錢米泔調下立差

壓錢湯治如前 右以壓錢煎湯飲之(一方用二百文)

(北方人作此壓錢於竈上[illegible])

麻仁汁治嘔逆此亦神效 右以麻子仁二兩

熬以水研取汁入鹽少許服之立效

丁香散治如前 丁香 藿香(去土) 代赭石

甘草(炙各一分) 右為末每服半分煎薄荷湯下

更與木香白朮散同服方見于治瀉門中

生姜湯治吐逆百藥不差 以生姜一兩細剉

以銀器中煎取四合服

一 羊糞酒治無故吐逆酸水不止或三五口食後
右以羊糞十顆好酒二合煎取一合頓服未愈再服
更量大小加減
哯兒附 羊乳治哯兒乾嘔煩燥
右以羊乳一升煎至減半分五服無羊乳牛乳所得小
兒減之一方与生姜汁合煎牛乳二合姜汁一合銀器
中慢火煎五七沸一歲兒服半合
鹿角粉治如前 右以鹿角粉大豆末等分相和乳
汁塗乳上令兒吮服之
枇杷葉汁治如前 右以枇杷葉拭去毛
玉真散 白朮 兩半 山茱萸 胡椒 半分

右為末每用半字以水一呷調下大者一字
消乳丸治飲乳過多兒吐奶 令常服 丁香
木香 青皮 陳皮 蓬莪茂 牽牛子
右為末糊米丸針頭大每服三五丸乳上沾吮服
蟾黃散治兒乳不止 右取田中曲蟮糞一兩研末空心
米飲調下半錢匕一二服奇效兒小減服
茅虫湯治飲乳兒吐不入腹 右取茅中虫三枚黃色以飲之須破
取虫紫参治瀉方 平胃煎湯治脾胃受風寒
白朮 當歸 川芎 人參 肉桂 芍藥
右為末每服一錢水一盞入姜三片粟米半匙煎至米熟去滓溫服

治、吮治傷風挾驚下瀉日久脾困不食及
作脾風發癇
天麻 全蝎 半錢炒 糯米 一錢微炒
甘草 木香 一錢炮 白扁豆 一錢炒
山藥 茯苓 一錢微炒 人參 一錢微炒
右為末嬰孩一字一二歲上兒半錢水半盞
棗以下棗半个煎三五沸溫服
白附子圓治傷風或驚泄瀉不止方
巳具于吐門之下
人參羌活散治風寒驚悸痰嗽脈尋常藥郎瀉

前胡 桔梗 人參
甘草 杏仁
右上四味為末後入杏仁拌勻絹羅一過每
服二大錢水一盞至八分去柤溫服
無時
訶子湯治傷冷瀉不止
訶黎勒皮 人參 木香
白茯苓 各一兩 甘草 陳皮
右為末每服一錢水一小盞入生姜二片煎
至五分溫服無時

荳蔻丹治如前
訶黎勒皮　草荳蔻仁各兩　白术
乾姜炮　川黄連去須　當歸
右為細末粟米飯和圓黍米大每服十粒飲
湯下無時
肉荳蔻散治胃寒下瀉
肉荳蔻麵裹煨　白礬枯各一兩
右為末溫米飲調下一錢或半錢空心服
益脾散治脾胃傷冷泄瀉腹痛全不入食
陳皮兩　青皮去穰半兩　訶子肉半兩

甘草剉炒半兩　丁香二錢　乾山藥二兩
右為細末每服一大錢水一小盞生姜三片
棗一个煎至六分去滓溫服與益脾圓同
服甚妙
川椒圓治夏月傷濕冷泄瀉不止
川椒一兩去目并閉口者用淨炒香熟為度
肉荳蔻麵裹煨半兩
右為細末粳米飯和圓黍米大每服十粒米
飲下無時
栢葉治泄瀉㵎下

右以栢葉煮汁服之或焙乾作末煎服
烏連圓治脾虛泄瀉不入食
生姜二兩切如荳子大　黄連去須二兩剉如荳大二味同炒令焦
肉荳蔻二個
右同為細末滴水和圓芥子大每二三十圓
棗湯下乳食前
龍香散治腸胃虛弱滑泄無度腹痛腸鳴或瀉
瀉不止
龍骨煅　赤石脂　烏魚骨
白术　香白芷　人參去蘆

右為細末每服半錢至一錢溫米飲調下乳
食前
如聖散治傷熱生風聚瀉不定或時驚悸聽卧
不寧
甘草一兩炮　乳石一兩半　井泉石一兩半
枳殼各一兩麩炒去黑色　丁香
右為細末每服半錢米飲調下併服三服立
效如驚風薄荷湯調下
治小兒水穀不調
右以枳實麵炒黄杵末米飲服半錢匕三匕或
下兒一錢匕量大小加減服

溫脾散治瀉泄食不化
蒼朮 芍草炙 厚朴去粗皮
訶子炮 木香 乾姜炮
茯苓 人參 桔梗去芦各一錢
右為末每服一字或半錢米飲調下食不化
者紫蘇鹽湯調瀉不止者木瓜湯調下
食前
二和圓治瀉不止
黃連去須一兩 南木香
右為末猪糊和圓菉豆大每服三四十丸米

百五

飲下乳食前
还乳散治洞瀉裹瀉等瘦弱乳食不
進 肉豆蔻一个 訶子三个
沒石子一个
右為細末每服半錢米飲調下如人行五里
久再一服須用陳米飲下神效
和中散治痰逆胃虛泄瀉
陳皮去白 白朮
厚朴去粗皮 甘草炙各等分
右為細末每服一大錢水一小盞生姜三片
棗一个同煎至六分溫服一方更有

減半
附子散治胃寒泄瀉不止
右以半兩附子一枚炮裂去皮臍為細末每
服一錢水一盞煎至半錢煎至五分溫服
治洞泄乳食前服
赤石脂丸治泄瀉虛滑無度
赤石脂 乾姜炮各等分
右為末糊丸麻子大每服一二十丸米飲下
空心服
豆蔻丸治泄瀉米穀不化
肉豆蔻

百六

木香 青皮 黑牽牛一兩
右為細末滴水和丸黍米大每服十丸
米飲下乳食前
建胃散治泄瀉身熱煩渴
厚朴
川黃連去須 白朮 肉豆蔻
縮砂仁 乾姜 木香
右為細末每服一錢水一小盞入生姜
各少許煎至五分去滓溫服無時
豆蔻散治泄瀉虛
白朮 良姜
乾漆 肉豆蔻

右為細末麪糊和丸黍米大每服十粒米飲下乳食前

建中丹治泄瀉腹痛[illegible] 胡椒[illegible]

蓽撥半兩 [illegible]

右為細末麪糊和丸黍米大每服十粒[illegible]下乳食前

朱萸散治脾胃弱冷不能泄瀉無度

吳茱萸[illegible]

[illegible]

甘草[illegible]

右為細末每服一錢或[illegible]

豆蔻丸治泄瀉不已[illegible]

右用肉荳蔻一枚研[illegible]

香一兩子大[illegible]相合以麵札定如白[illegible]

如胡洗大煨熟為末陳米飯和丸菜豆大每服二十丸陳米飲下空心食前

[illegible]治泄瀉久不差

木香[illegible] 訶梨勒[illegible] 白[illegible]

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十丸粥飲下乳食前

二白丸治泄瀉滑數不止

白石脂 白龍骨 各等分

右為末滴水和丸黍米大每服三五丸紫蘇木瓜湯下無時

溫白丸治久患泄瀉脾胃不進飲食或食訖便瀉下米穀不化

白朮[illegible] 半夏[illegible] 丁香半錢

右為細末生薑自然汁糊丸黍米大每服[illegible]兒三丸三五歲兒五七丸淡生薑湯下早晨各一

沒石子丸治泄瀉白膿及腸腹痛[illegible]

木香 黃連各一分 沒石子一个 豆蔻二个[illegible] 訶子肉三个

右為細末飯和丸麻子大米飲下量大小加減與之無時

白散治脾胃不和泄瀉不止不思飲食身体煩熱

人參 白茯苓 白扁豆 甘草

白朮 罌粟米

右為末同勻每服半錢或一錢紫蘇湯調下

無時

乾薑散 治水瀉無度

右以乾薑末粥飲調下半錢或一字量大小與

椒紅丸 治如前

右以椒二兩去目用醋二升煮至醋盡焙乾為末糊圓菉豆大寬合收之每服十丸十五丸米飲下 一方治嬰小水瀉妳癖以椒一分去目為末酥調少〻傅腦上日三

烏藥散 治乳母冷熱不調變壞乳汁不好兒因飲之心腹時痛下瀉如水

香附子炒去毛 良姜 赤芍藥

天台烏藥各等分

右為細末每服一錢水一盞煎至六分溫服心腹痛者○入酒少許同煎只水瀉者米飲調下量大小與服

白石脂散 治水瀉形羸不勝大湯藥

右以白石脂半兩研如粉和白粥空心與服

厚朴丸 治熱瀉

右以黄蘗削去麄皮焙杵為末用清水丸粟米大每服十丸米飲下食前

清胃散 治挾熱下瀉煩

川楝子去核 黄蘗炙剉 地榆炙 當歸去蘆洗焙

黄連去須炒

右各半兩為細末每服一錢水一小盞煎至五分溫服無時

香石散 治伏熱中暑煩躁發渴泄瀉小便不利

丁香 滑石 舶上硫黄 白芍藥 甘草炙各等

右為末每服一錢米飲調下亦治吐瀉無時

分水車前散 治暑月傷暑發瀉小水不分

右以車前子為末米飲調下半錢或一錢量大小加減

白朮膏 治暑月中熱泄瀉小便不利腹滿氣痞

白朮炒 白茯苓 人參去蘆

滑石各一分 澤瀉半兩

右為末煉蜜和膏每用一皂子大米飲化下無時

香連散 治伏暑泄瀉清濁不分

木香 川黄連去須各一兩 人參去蘆

厚朴去麄皮生姜製各半兩

右為細末每服半錢或一錢米飲調下空食前

草節湯治冷熱不調下痢

胡黃連半兩　乾姜一兩炮熟

右為細末每服半錢草節湯調下食前

樗根散治水瀉裏急後重頻數

樗根皮一兩　枳殼半兩炒　甘草一分炙

右為末每服半錢或一錢粥飲調下立止無時

厚朴散治洞瀉注下

厚朴去麄皮生薑製一兩　肉荳蔻麪裹煨一兩　訶梨勒皮一兩炒

白朮半兩　乾姜半兩

右為細末每服一字水一小盞入生姜粟米各少許同煎至五分去滓溫服食前

香蟾散治如前

右於五月五日取蟾一隻燒末飲調一錢服之兒小量減食前

阿膠丹治洞瀉暴注

乾姜一兩炮　真阿膠一兩蛤粉炒

等葉半兩　當歸去芦半兩

川黃連去鬚半兩　肉荳蔻麪裹煨半兩

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十粒粟米飲下食前

附子丹治洞泄不止手足[illegible]冷

附子炮去皮臍[illegible]　硫黃[illegible]一

乾姜[illegible]　[illegible]

白朮半兩

右為細末[illegible]丸黍米大每服十[illegible]

[illegible]無度

[illegible]散治暴瀉洞泄[illegible]

附子[illegible]

[illegible]乾姜一錢[illegible]

右為末每服一字至半錢[illegible]調下空食前

木香散治[illegible]不調下痢

[illegible]　人參去蘆　訶子[illegible]

右為細末每服半錢粟米飲調下[illegible]治痢

[illegible]治寒熱交雜陰陽不和洞泄[illegible]

[illegible]

[illegible]　肉荳蔻麪裹煨　南木香[illegible]

右為細末粟米飯和丸粟米大每服二三十丸

米飲下日夜四五服量大小與之知[illegible]

[illegible]冷熱不調水穀不消腸[illegible]

[illegible]乳食不化皆治之

木香　訶子肉各一分　黃連去須半兩炒

右為細末飯和菉豆大每服一二十丸米飲下乳食前一方更肉荳蔻三个甘草一分同為末每服半錢飲調下名香連散

石榴汁治下瀉五色

右以酸石榴五个同穰殼搗爛絞取汁每服半合量大小與之

四色圓治瀉青色

雄黃　厚朴去粗皮生薑汁炙各

右各等分為細末糊丸黍米大每服十五丸米飲下無時

木香白术散治下瀉色青如涎或如白沫

木香　白术　陳皮去白

丁香各半兩　麥蘗炒黃半兩

右為末每服半錢或一錢水半盞煎至三分溫服如吐瀉與前丁香散兼服在吐門下

六神散治瀉多日糞色與唇口皆白因成虛困亦治洞瀉吐利痢瀉

人參去芦　白茯苓　乾山藥炒

白术　白扁豆　甘草炙

右各等分為細末每服一錢水一小盞生薑二片棗一个煎至六分通口服

此藥用處甚多調氣和脾胃大良如治冷瀉以用末二錢附子末一錢匕煎之分三服服量大小与之

又治風症加天麻治痢加罌粟殼吐瀉者服之以助胃氣防變癇病

荳蔻丸治傷乳食脾胃不和泄瀉無度

木香一分　肉荳蔻一个麪裹煨

草荳蔻　檳榔

青皮去穰　陳皮去白各一分

京三稜一兩炮剉

右為細末麪糊和丸菉荳大每服五七丸姜湯下無時

黃連茱萸散治傷乳食下瀉

黃連去須一兩　吳茱萸揀去梗半兩

乾姜二錢　巴豆肥大者一个去皮

右剉細同炒至焦黃去巴豆不用外為細末每服一錢煎陳米飲調下日三乳食前

縱中丸 治有傷泄瀉

神麴 訶子皮 [illegible] 吳茱萸 [illegible]

右為末 [illegible] 和丸 [illegible] 每服三二十丸 [illegible]

[illegible] 治 [illegible] 因服 [illegible]

[illegible] 入 [illegible] 不 [illegible] 心 [illegible]

附子 [illegible]

[illegible] 香 [illegible] 人參 [illegible]

參 [illegible] 香 [illegible]

春為 [illegible]

茯苓 [illegible] 治 [illegible]

[illegible]

[illegible] 攻 ○ [illegible]

[illegible] 生其胃氣 [illegible]

[illegible] 金液 [illegible] 不 [illegible]

服 [illegible] 服至二一 [illegible] 胃氣生 [illegible]

[illegible] 十有八九金

川治小兒吐瀉霍亂[?]究存中論金液丹

救見小兒吐利劇氣已絕服之得活者數人直

不妄也須多服方驗若因吐瀉生風身冷爽[?]

変慢驚者論在於驚門具之其理中丸五苓散

金液丹方並在和劑集載之

異攻散 治吐瀉虛冷病先与數服正氣能溫

中和氣進食 人參去芦 茯苓去皮 白术

甘草炙 陳皮各等分 右為細末每服二錢

水一盞生姜五片棗二枚同煎至七分通口服無時

參苓散 治傷風冷脾胃不調一切吐瀉

卷十 百十八

人參去芦 茯苓 白附子 羌活去芦 白术各一分

肉桂 犀角鎊屑 藿香去土 川芎 芍藥 甘草炙

右為細末每用半錢金銀薄荷湯調下無時

四參散 治脾胃虛弱氣不調順傷於風冷一切吐

瀉手足厥逆 人參去芦二兩 白术一兩 白扁豆炒二兩

罌粟米四兩別研 山藥三兩 陳粟米三兩用生姜汁[?]

升麻三兩取肉 乾白茯苓一兩去皮 木香三分 川芎半兩

烏藥一兩半剉碎 甘草三兩炙 厚朴去粗皮生姜制炒二兩

白芷一兩 右為細末每服一錢水一小盞

生姜三片棗一个去核同煎至七分去滓溫服[?] 前[?]

和中散 治三焦不調停寒且吐瀉不定

藿香去土 白豆蔻 人參去蘆各二兩 木香 丁香

乾姜炮 厚朴去皮姜汁炙各半兩 甘草一分

右為細末每服一錢水一小盞入生姜三片煎至

六分溫服無時

益中湯 治脾胃不和傷冷吐瀉 丁香 [illegible]

人參去蘆 青皮去白 桂心一分 訶黎勒 [illegible] 一分

右為細末嬰孩一字二三歲半錢五六歲一錢煎木

瓜紫蘇湯調下日三無時

沉香散 治脾胃不和吐瀉不進乳食

沉香一分 丁香 [illegible] 木香 [illegible] 桂心 [illegible]

甘草 [illegible] 茯苓一分 藿香去土一錢 法如前 [illegible]

觀音散 治如前 人參去蘆 甘草炙

白扁豆 [illegible] 石蓮肉 [illegible] 各一分 茯苓 [illegible] 白芷

黃耆 [illegible] 木香 [illegible] 神麴 [illegible]

右為細末每服一錢水半盞棗半个煎三兩

沸溫服無時

人參散 治如前 人參 茯苓 石蓮肉 [illegible]

甘草 [illegible] 藿香 [illegible] 右為細末每服

一錢水半盞棗半个煎三兩沸溫服無時

白术散 治胃氣虛弱吐瀉發渴

白术 人參去蘆 木香 白茯苓

藿香去土 甘草 [illegible] 乾葛二分

右為末每服一錢水一小盞煎至六分溫服無時

半夏湯 治脾胃虛寒吐瀉及有冷痰等疾

半夏 [illegible] 陳橘皮 [illegible]

[illegible]

右以 [illegible] 每服三錢水一大盞入生姜 [illegible]

至四分溫服無時

張渙七香丸 治吐瀉不進乳食腹脹滿 [illegible]

木香 青皮 [illegible]

肉豆蔻 [illegible] 牽牛 [illegible]

右為末 [illegible] 丸如黍米大每服二三十丸生姜米飲下 [illegible]

治嬰小吐瀉 亂髮 [illegible] 鹿角 [illegible]

右同研細米飲服一錢日三

治嬰小吐瀉 右以 [illegible]

丁香安胃丸 治小兒胃虛氣逆嘔吐泄瀉 [illegible]

渴 [illegible] 精神昏困

丁皮 藿香 [illegible] 甘草 [illegible] 桂 [illegible]

右為細末煉蜜和丸 [illegible] 每服一丸溫湯化下無時

[illegible]丸治胃寒瀉白腹痛腸鳴吐酸緑水不思飲食
人參去蘆 甘草炙 白朮各一兩
右為末姜汁糊丸菉豆大米飲下三十丸無時
糯米湯治吐瀉不止
糯米一百粒 木香 黄連去須三味剉碎同炒
右同炒至米焦黄去木香黄連不用只以米
為末後用枇杷葉去毛淨炙乾等分為末和
匀白湯調半錢無時
進食丸治傷飽乳食不消壯熱腹痛脹滿吐[illegible]
木香 枳殼麩炒去穰 當歸去須洗焙 代赭石火煆醋[illegible]

淬不計遍數以碎為度別研 朱砂研水飛各半兩 巴豆霜一分
右為末糊丸黍米大一歲兒一丸溫水下無時
不二丸治傷食吐瀉不止 巴豆三十粒去皮心膜研細別
用好黄連半兩水浸濃汁染紙三張裹巴豆壓去油末研末[illegible]
[illegible]寒食麵一錢
右同研細滴水和丸菉豆大新水磨化[illegible]
感應丸治脾胃虚怯乳食過度吐瀉[illegible]
肉豆蔻仁四个麵裹煨 丁香末三錢 川[illegible]
木香三錢 百草霜四分 杏仁二十八个去皮尖別研[illegible]
巴豆十四个去皮膜出油取霜 黄蠟二兩熔[illegible]

[illegible]同麥芽[illegible]時候冷凝 右同為細末研匀先熔[illegible]
[illegible]和藥成劑恐硬時更入油少許每用旋丸
[illegible]黍米大三四粒溫水下乳食前
[illegible]散治伏暑傷熱吐瀉煩渴腹脹小便少
硫黄一分 白滑石三分 丁香 白豆蔻麵裹煨
各半分 右為細末每服一字或半錢米飲調下[illegible]
[illegible]散治伏暑冷熱不調吐瀉不止
藿香 白芷 丁香 縮砂仁各等分
右為末每服半錢沸湯點服無時
香薷散治伏暑煩躁吐瀉發渴

丁香 滑石 硫黄 白芍藥 甘草炒
右為細末每服半錢米飲調下無時
三和散治伏暑吐瀉津液燥少
白茯苓一兩 烏梅肉半兩 乾木瓜半兩
右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓
溫服無時
[illegible]散治中暑昏煩悶亂吐瀉
右以穀精草不限多少燒存性用器覆之放
冷研為細末每服半錢或一錢冷米飲調下
無時

至散治霍乱吐瀉
木香炮 丁香炒 桂去粗皮 茯苓 人參
麻黃去根節 訶子去核 當歸去蘆 甘草炙
大腹皮 川楝子去核 秦艽去蘆
地榆 藿香去梗 肉荳蔻
右為末每嬰孩一字二三歲半錢四五歲一
錢水半盞入棗半个煎數沸溫服無時
建脾膏治霍乱吐瀉
丁香 藿香去土 人參去蘆 沉香 木香
右為細末煉蜜和膏每用雞頭子大粟米飲
化服無時
人參湯治如前 人參去蘆
甘草炙 白朮三分 生姜二分
右㕮咀以水一升二合煮取半升六十日兒服
一小合百日兒分四服周晬兒分二服乳空
服之乳母忌生冷油膩
蒼朮湯治小兒霍乱吐瀉 人參去蘆
芦𦾔各半兩 扁豆藤二兩 蒼朮一撮
右為麁末每服二錢水七分煎至五分去滓
溫服立驗無時

又方名同治同 人參二兩 木瓜一个 蒼朮一撮
右㕮咀量兒大小用煎如前服立効
治小兒霍乱吐瀉
右以牛涎一合灌兒口中量大小加減
人參調胃膏治霍乱吐逆服藥不下煩渴者
宜先服此藥 人參去蘆 白朮 丁香各一兩
乾姜炮 甘草 赤茯苓各半兩
右為細末煉蜜和丸皂子大每服一丸熱
湯化破以新水沉極冷即服無時
快膈散治霍乱吐逆服藥多即吐先服此藥
甘草半兩炙 良姜炮 肉荳蔻麪裹煨
丁香
右為細末每服半錢新汲冷水調下
白朮膏治傷暑伏熱頭目昏暗霍乱吐瀉煩躁
作渴小便不利心胸滿悶
白朮 澤瀉各半兩 茯苓 人參去蘆 滑石各一分
右為細末煉蜜和膏每用皂子大煎麥門
冬湯放温化下無時
治霍乱不止 右以訶梨勒一枚去核為末沸
湯研頓服如未差再作

丁香丸治霍亂吐瀉面青四肢冷癍汗出

丁香　藿香去土各一分　人參去芦半兩

右為末煉蜜和丸豚子大每服五丸磨飲下

丁香散治霍亂不食　丁香一分　人參半兩

右為麄末每服一錢水一小盞煎至五分去滓服

鬪門散治霍亂吐瀉轉筋　附子一枚生　胡椒一百粒

右為末每服半錢漿水一小盞煎至四分溫服

七寶散治霍亂吐瀉腹內攪痛

白朮四兩　人參六錢　白茯苓各半兩

甘草一兩炮　草菓子大者二个炮過用

訶子四个炮去核　乾姜一錢炮

右為細末每服一錢水一盞入棗一枚姜三片同煎至七分溫熱服三歲下者藥半錢水半合煎之瀉不止與香連丸間服

香連丸治冷熱不調霍亂吐瀉腹內疞痛

黃連　木香一分　訶子七箇炮去核

肉豆蔻二个炮裹煨

右為細末姜汁糊和丸黍米大每服十丸十五丸米飲下無時日四五服

治霍亂不止

蠶蛻紙草治如前小兒霍亂吐瀉

右取蠶蛻紙為草一二七莖煮飲之

又方　右取蝸牛殼舊者窠殼炙為末乳汁調下一字

又方　右取芦葉細切煮熟汁飲之任意多少得止為度

香豆散治霍亂煩渴吐瀉

肉豆蔻麵裹煨各一兩　白扁豆　人參去蘆各半兩　藿香去土　甘草一分

右為末每服一錢水八分盞入生姜二片煎至五分去滓溫服

吐瀉後證附

醒脾散治吐瀉初定脾胃虛弱恐生風若

右以天南星沸湯浸洗七次為細末一歲兒半錢已上用河水七分盞入冬瓜子七粒同煎至半放溫旋旋與之

碧香丹治吐瀉後大渴不止不得眠睡甚則變驚

天竺黃　不灰木燒赤放冷　赤石脂　龍骨

茯苓各一兩為細末　鉛白霜　輕粉

各兩別研　右件入麝香研滴水

和丸雞頭子大每用一丸或半粒同蚫螺兒
二个細研沸湯浸化却用冷水沉極冷服大
渴即与神驗

丁香黄耆散治吐瀉後脾胃羸弱不能飲食漸
成羸瘦面色青白或作痢時下時止

丁香　綿黄耆剉　人參去芦　白术
當歸洗焙　鱉甲醋炙黄去裙襴各一两　胡黄連
甘草炙各半两

右為細末每服一錢水一小盞入生姜二片
棗一个同煎至五分去滓温服食前

香茂散治瀉後但胸中不快

藿香去土　蓬莪茂炮剉　茯苓焙各等分

右為細末每服半錢或一錢白湯點服無時

中和散治吐瀉定後煩渴

人參去芦　白茯苓　白术　甘草剉炒　乾葛
剉　白扁豆炒　黄耆剉焙　藿香去土各等分

右為細末每服二錢水一盞棗一个去核生
姜三片煎至七分放温服無時

小兒衛生總微論方卷第十

小兒衛生總微論方卷第十一

八痢論

小兒氣血怯嫩臟腑嫩弱因觸冒風寒飲食冷
熱以邪干正致腑胃不和凝滯停積蘊毒結作
或水穀不聚或膿血雜然變而為痢其狀有八
一曰水穀痢謂便下糞稀薄而不聚驟利如水
水穀不化也然雖是瀉便時亦覺裏急後重亂
為痢也二曰冷痢謂便下純白膿也三曰熱痢
謂便下純赤血也四曰滯痢謂便下膿血相雜
也五曰積痢謂有積滯為痢漫久或差而復發
也六曰疳痢謂疳患之瘡而下痢也七曰蠱痢謂
蠱毒蠱下蟲血或如赤豆汁或如鷄鴨肝片
也八曰休息痢謂下血黑黯中有白物如膿中
之脂也如爛魚腸之狀此腸胃潰傷患者更恐
要惜數以名之亦名休息者謂患即無休息而
至死也凡痢若噤嗽不能進者此便為死候也
治水穀痢方已具前瀉須之下

治冷痢方

王腸散治冷痢初即大便青色後乃作膿

白石脂　當歸洗焙　丁香　白术炒　草豆蔻

去皮厚朴 姜製各半兩

右細末每服半錢粥飲調下無時

厚朴圓 治藏寒泄瀉下利纖純白腹中絞痛虛

氣脹滿手足逆冷

厚朴 姜製半兩 訶子 半兩[illegible] 白龍骨 半兩

白礬 半兩

右用一罐盛之鹽泥固濟留一竅子木炭火

煆烟息爲度取出爲末麵糊和圓黍米大每服

十圓米飲下食前

烏骨散 主治如前

右烏魚骨去皮研細末每服半錢米飲調服

或入大黃用之亦治婦人瀉血

韭汁 主治如前

右以韭青取葉擣令極爛絞取汁略温每服

半合或一合無時

馬齒汁 主治如前

右以生馬齒菜絞汁略温每服一合入蜜一

匙頭許調勻空心服

石蓮散 主治如前

右以石蓮不拘多少去皮用砂糖炒過爲細

末每服一錢米飲調下乳食前累驗

胡黃連圓 治血痢下多久而不差或作藏毒

下血帶青黃色

胡黃連炒 蕪荑揀淨炒 夜明砂各一分

右末猪膽汁和圓黍米大每服十圓陳米飲

下無時

治赤白滯痢方

罌粟飲子 治赤白滯痢 罌粟殼蜜炙半兩

人參去蘆一分 厚朴去粗皮生姜製一兩 白茯苓半兩

甘草炙一分 烏梅三個去核用 御米殼三錢 阿膠三片[illegible]

蛤粉炒煙去粉

右同末每服一錢水酒各半盞煎服略温服

乳食前嘔吐者不可服

三奇湯 治白痢 御米殼二兩塗蜜炙

酸石榴皮一個塗蜜炙焦 阿膠半兩蛤粉炒去粉

右細末每服半錢烏梅甘草湯調下乳食

前

治熱痢方

時全[illegible] 治熱痢下血 黃蘗去粗皮半兩

赤芍藥四錢

右末飯和圓如麻子大每服一二十圓米飲下乳食前

當歸散　治如前　當歸去蘆并土一分焙　芍藥一分炒　黃連去須一分炒　枳殼一分去瓤麩炒黃

右細末每服半錢水五分煎至三分溫服下血多者入甘草一寸同煎乳食前

槐花散　治血痢不差　槐花揀淨炒　地榆炒各等分

右細末每服半錢一錢米飲調下乳食前

聖効散　治血痢久不差　赤石脂一兩燒赤　白龍骨一兩煅　阿膠一兩剉蛤粉炒去粉　訶棃勒煨去核用半兩　木香半兩　黃連去須半兩　乾姜半兩炮　甘草半兩炙

右細末每服半錢煎粟米飲調下食前

厚腸圓　治血痢腸滑　川楝子去核各一兩　木香　黃連去須炒　當歸去蘆并土　吳茱萸去枝梗微炒各半兩　阿膠剉蛤粉炒去粉

右細末粟米飯和圓黍米大每服一二十圓米飲下食前

烏梅飲子　治血痢不止

右以白梅一枝去核入臘茶末研爛合[illegible]沃服之昔陳應之治曾[illegible]相痢血百餘日諸醫不能療陳用此一啜而差又梁相亦病痢血應之曰此挾水穀者用三物散數服而愈

三物散　胡黃連　烏梅肉　竈下土各等分

右末每服一錢臘茶清調下食前空腹溫服

入方　治熱痢下血頻併不差

右以白梅五箇取肉臘茶二錢同研勻細每服一錢或半錢白湯點服或以醋湯沃服之量大小加減食前

黃連丹　治如前　黃連去須二兩　當歸去蘆并土一兩洗焙　白頭翁去蘆三分　蔓青根三分洗焙乾　木香半兩　川楝子[illegible]

右細末粟米飯和圓黍米大每服十粒米飲下乳食前或十五粒

聖効圓　主治如前　川黃連去須二兩　大棗去核　乾姜一兩　肉豆蔻一分麵裹煨香去麵

右細末糊圓黍米大每服五七圓米飲下乳食前兒大增之

[illegible]散　治腸胃虛冷下痢頻併腹痛不可忍

治重舌肛脫
雄黃一分研細水飛 乳香一分研細 白礬[illegible]
右同研勻每服嬰孩一字二三歲半錢陳米
飲下日三服乳食前
艾葉湯 治虛冷下痢白膿 艾葉一兩炒
當歸去蘆洗去土一兩 乾姜一兩炮 木香半兩
訶梨勒煨去核用半兩
右細末每服一錢水一小盞入粟米少許同
煎至五分去滓溫服食前大小以意加減
又方 治如前

右以臘茶一錢入熱醋少許調服乳食前更
以意加減
又方 治如前
右以沙牛角鰓燒存性為末粥飲調下一錢
或半錢乳食前
阿膠圓 治如前 赤茯苓 赤芍藥各[illegible]
右以米醋煑阿膠一兩和圓菉豆大米飲下
一二十圓乳食前
酒煑湯 治腸胃虛冷泄瀉不止變成白痢
甘草半兩炙

右粗末每服二錢水一盞生姜三片棗一箇
煎至半盞去滓放溫量大小加減服赤多者加
黑豆十粒同煎
三神丹 治如前
右以肥大無尖草烏頭三箇各去皮一箇生
一箇炮熟一箇燒作黑灰同為細末麵糊圓如
蘿蔔子大每服三粒水瀉井花水下白痢乾姜
湯下赤痢甘草湯下赤白滯痢泉姜甘草湯下
食前
木香炒蓮圓 治脾胃虛弱寒濕冷熱相搏滑

泄下痢赤白 [illegible]
訶子煨去核用半兩 木香半兩
右同細末以濕紙包粟米飯慢火煨米熟[illegible]
取出和藥圓如菉豆大每服二三十圓食前米
飲下神効
金鎖散 治赤白滯痢日久不差
黃連[illegible]
厚朴[illegible]
右同細末[illegible]一字[illegible]三歲[illegible]

湯調下日三服食前

赤石脂圓　治如前　赤石脂　乾姜炮
肉豆蔻各一兩麵裹煨香去麵用
右細末麵糊圓黍米大每服十粒米飲下食
前

治小兒下痢膿血　草澄茄一兩　破故紙半兩炒黃
黃連去鬚各半兩　木香一分
右細末每服半錢陳米飲調下食日二服量
兒加減

治小兒風邪所干下痢頻併裏急後重
以天南星一兩生為末每服半錢水一盞生
姜十片米十粒煎至半盞溫服食前

治小兒久痢藏毒下膿血不止
以好大棗一箇去核入黃丹半錢硇砂一豆
子許膩粉十文足研細置棗內內用大麥麵
裹慢灰火中炮香熟去麵并棗皮了研極細
入少軟飯圓如麻子大量兒大小加減圓數
煎槐花湯下甚者二服定食前

小槐花圓　治小兒赤白痢　赤石脂　龍骨
密陀僧　定粉　黃丹炒紫黑色用

右等分研勻糊圓菉豆大每服十圓十五圓米
飲下乳食前

治赤白諸痢　以蜂房燒末飲服量大小與之
又以雞腸草取汁一合和蜜溫服良又以雲母粉
半兩更研極細量兒大小加減煮白粥拌食
空腹食之
又以胡粉熬黍米令色變飲服之亦治蠱毒痢
良大小以意加減

治久痢不差　以沒石子二箇劑熬令黃研細
作餛飩食之

治小兒諸痢香連圓　黃連去鬚　龍骨煅　白石脂
乾姜炮　枯礬各一兩
右末以粟米粥和圓麻子大每服三十圓米
飲下乳食前量大小與之

木香黃連圓　治冷熱相雜下痢赤白裏急後
重腹痛鈞撮及腸胃氣虛乘傷乳哺
木香　黃連去鬚各一分　白附子尖二个炮
右細末粟米飯和圓菉米大或黍米大每服
十圓至二三十圓量大小與之食前米飲下
日夜三四服

□和散 治諸般赤白痢 當歸去芦頭去鬚
乾姜炮 甘草炙炒 黃連去須炒各等分
右四味各自為末如水穀利各用半錢和勻
量兒大小一錢至半錢濃煎烏梅湯調下赤
痢者加黃連倍之白痢者加乾姜倍之後重
裏急腸痛者加黃連倍之腹心絞痛者加當
歸倍之並空心食前服此方中言予究當
此藥最為大効
樗皮湯 治如前
右以新樗皮不拘多少去外黑皮細切焙乾為末
每服二錢水一盞煎至半盞去滓更量兒
量大小溫服空心食前
又方 治如前
右以雞子一个取清調黃連末令稀照乾為
作四重包撮烏梅十个有肉好者安熨斗內
炭火燒烟欲盡存性取出頓一椀中上用盞
子合之候冷研細更入水銀粉少許和勻每一
兒大小分三五服空心粥飲調下如一服
微利止後服
二色圓 治如前痢 吳茱萸揀
黃連去須一兩 巴豆四十九个去皮
右同於銚子內炒令黃赤色去巴豆不用只
將上面二味各自為末麵糊和圓如蘿蔔子
大看兒小緊慢加減圓數如白痢只服乾姜
圓赤痢只服黃連圓白多赤少者多服乾姜
圓赤多白少者多服黃連圓多服乾姜黃連
白相等者平半服之
□米湯 治如前
當歸炒一分 黃連去須 □□半兩去□
右末每服一錢米飲調下乳食前
罌粟圓 治如前 罌粟殼一兩蜜炒
陳石榴皮燒存性一兩 甘草炙三兩 同為末
右末使安和圓小蘿蔔子大每服一圓水六
分盞化開煎至四分溫服乳食前
三烏圓 治如前 川烏一个 草烏一个 巴豆十个
右各燒及九分同研細酒煮黃蠟鎔化入少
好油拌和攪勻成膏每用旋圓菉豆大每服
三圓看大小加減血痢黃連湯下白痢乾姜
湯下水穀利倒流水下赤白痢乾姜甘草湯
下

固腸圓 治赤白滯痢多日不可漸成羸瘦
黃連二兩去須 木香二兩 半夏二兩湯洗七次 乾薑二兩炮
赤石脂二兩火煆五次 厚朴去粗皮二兩生薑製 白朮二兩
右為細末麵糊和圓黍米大每服十圓米飲
下乳食前
建胃丹 治赤白等痢疾日久羸瘦
黃連一兩去須炒 白龍骨 白石脂各半兩
神麯半兩炒 烏梅肉半兩炒 乾薑半兩炮 白礬枯一分
右細末醋糊圓如黍米大每服十五圓
米飲下乳食前

妙應膏 治久痢赤白諸藥不效
黃丹半兩研 定粉半兩研 [illegible] 密陀僧半兩研
訶梨勒皮 木香各一分 巴豆[illegible]
砒霜一錢研 麝香一錢研
右同研勻細先以黃蠟四兩溶化入藥
拌勻熬成膏每用旋圓黍米大未晬兒一粒
二三歲兒二粒四五歲三粒六七歲五粒並金銀
冷甘草湯下臨臥服多溫艾葉湯下[illegible]
物亦治積痢
金華散 治瀉痢多日[illegible]

又
右好黃連為細末每服一錢水一小盞煎
半盞入蜜少許和勻放溫服之日五六服食
前
又方 治如前
右以麻子一合炒香[illegible]為末每服一錢溫蜜
漿水和服立效
木香三使湯 治赤白久痢淹延將月至天寒
不瘥
右以木香方寸許黃連半兩水半升同煎至

水乾去黃連不用只將木香薄切焙乾為末
分三服第一服橘皮湯調下第二服陳米飲
下第三服甘草湯調下乳食前
烏金散 治赤白滯痢及有所傷下痢
右以青州棗不拘箇數去核入白礬末滿以
紙裹煨存性為末每服半錢米飲調下未愈
宜取之如赤者更入好茶半錢同調服白者
不用
治積痢方
歙金丹 治久積成痢 砒霜 雄黃 [illegible]

巴豆去皮膜

右三味等分各研細末先以黃蠟看多少溶

石銀器內炭火鎔化入藥末竹篦子左右手

各攪四十九遍如此七次數足取下火乘熱

搓成小鋌以油單裹置新磁器中要用火燒

軟旋圓如粟米大或如蘿蔔子大三五粒量

大小病勢加減赤痢甘草湯下白痢或赤白

雜下並米飲下乳食前

大尊重圓 治脾中有積腸滑下痢裏急後重

臍腹疼痛 粉霜 [illegible] 黃丹 [illegible] 定粉 [illegible]

硇砂 半兩 膩粉 二錢 京三稜 末一兩 白麪 [illegible]

右為末同和滴水和圓略乾炭火上炒令黃

焦再杵羅為末棗肉和圓菉豆大每服一二

丸米飲下乳食前

朱砂萬應丸 治積痢久痢滯痢一切[illegible]痢[illegible]

日不差 朱砂末 [illegible] 硇砂末 [illegible]

蠟二棗許大

右於銚子內先鎔蠟化入巴豆[illegible]熬至黑焦

去巴豆不用却入上二味攪極勻候凝[illegible]

如用旋丸如菉豆大每服三丸白痢艾湯下

赤痢黃連湯下赤白痢黃連艾湯下水[illegible]

米飲下乳食前

針頭丸 治如前 朱砂半錢 硇砂一錢 巴豆七

兩用油煎 硫黃 只使粟子大 研末更用蠟

為丸

右旋丸針頭大每服一圓米飲下量兒大小

加減 [illegible]前

燒青丸 治諸積痢 輕粉 二錢 玄精石 一分

粉霜 [illegible] 硇砂 [illegible]

右為末[illegible]白麪二錢拌勻滴水和劑捏作餅

子文武火燒熟再研為細末滴水和丸芥子

大漿水下三四丸 一方保州邵應訪方無硇

砂却有龍腦一字餘並同亦不燒只為末水

浸蒸餅圓麻子大一歲兒一丸二三歲二丸

四五歲三丸六七歲五圓並夜深空腹冷水

送下如[illegible] 治積泄痢膿血交下腹痛煩渴

百藥不效[illegible]取轉者服之便愈並不動氣

忌一切生冷油膩毒物又名瑞白丸

治[illegible]痢方 [illegible]

蠱毒痢方

膠湯　治蠱痢下血如豆汁赤水腹痛
罌粟殼五兩細剉蜜水酒炒黃　地榆　槐花炒各
厚朴去粗皮生薑製　甘草炙　橘皮　酸石榴皮
當歸去蘆洗焙　白芍藥　五倍子去其中虫各二兩三錢
阿膠蛤粉炒二兩六錢
右為粗末每服二錢水一盞入陳粳米二十
粒餳一塊皂子大煎至五分去滓溫
食前

縮腸湯　治蠱痢如前　人參去蘆　白朮
當歸去蘆洗　白茯苓　厚朴去粗皮生薑製炙

白芍藥　甘草炙各一兩　阿膠蛤粉炒各　黃芩[illegible]
陳粳米二兩　御米殼蜜炙黃三兩
右為粗末每服二錢水一盞入生薑三片棗
一箇同煎至五分去滓溫服空腹食前日三
服

犀角散　治蠱痢如前　犀角屑　地榆剉
黃連去鬚酒浸炒　梔子仁炒　黃蘗剉炒　黃芩
當歸去蘆酒浸焙　赤芍藥　生地黃各一兩
右為細末每服一錢粥飲調下乳食前

地榆圓　治蠱痢腸中毒下血如豆汁[illegible]

諸惡湯　地榆炙剉一兩　黃連去鬚一兩　乾薑[illegible]
川升麻一兩　川練子去核半兩　苦練子去殼半兩
右為細末糊和丸如黍米大每服十丸粟飲
下量大小加減乳食前

地榆樗皮丸　治如前　地榆剉四錢　樗根白皮三錢
白芍藥剉　阿膠[illegible]炒　當歸[illegible]　烏梅肉二錢半
木香半錢　枳殼[illegible]　茯苓　肉豆蔻[illegible]
甘草炙　木香　縮砂　金櫻子二[illegible]　人參半[illegible]
右為末煉蜜丸如麻子大每服三十丸米飲下乳食前

地榆散　治蠱毒痢下血或如雞鴨肝片腹痛不止
地榆[illegible]　赤芍藥一兩　梔子仁[illegible]　茜根[illegible]
當歸去蘆一兩[illegible]　訶子[illegible]　黃連去鬚一兩[illegible]
右為粗散每服二錢水一小盞煎至六分去滓溫服乳食前

白頭翁散　治蠱毒痢如雞鴨肝片隨膿血而
下　白頭翁[illegible]　黃連去鬚[illegible]　茜根剉　蘇枋木剉
故[illegible]　犀角屑[illegible]　地榆[illegible]　甘草[illegible]
右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去
滓溫服乳食前

地黃汁　治蠱痢毒下血　右以生地黃汁一升分
五服量大小與服食前立効　治休息痢

湯丸　治休息痢下五色膿血如爛魚腸[illegible]
真腸中攪痛　粉霜一錢　輕粉一錢　朱砂一錢研
硇砂研　白丁香一錢　乳香一錢　巴豆七個去皮去油
右為末和勻烝去皮棗肉為丸粟米大嬰孩二三圓二三歲兒四五丸七九兒大者圓如麻子大餅湯送下日三服又與調胃氣藥間服大良亦治積痢毒痢蘊毒痢

神安圓　治如前　砒霜一字　龍骨二字　烏魚骨
赤石脂二字　茯苓三字　黃連去須三字　定粉三字
乾姜三字炮　黃丹三字火飛
右為細末入射香少許拌勻飯和丸黍米大每服五圓輕粉湯下亦治諸痢赤者甘草湯下白者乾姜湯下赤白雜者乾姜甘草湯下

樗根散　治積年毒痢無休息
樗根白皮大眼樗是也取其陰下根一兩[illegible]亦可
訶子七个取皮去核
右用河水三升煮取一升去滓時時呷服一方二味等分為粗末每服二錢水一大盞煎至半盞去滓溫服時時呷服痢住與淡粥以乳將息

治諸痢雜証

龍骨散　治下痢體熱煩渴　白龍骨二兩
茯苓三分　人參去蘆三分　黃連去須[illegible]　茅根三分
麥門冬去心焙
右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓服乳食前

青黛散　治下痢發渴不止時時[illegible]
青黛[illegible]　蜜陀僧研半分　漢羅[illegible]
右為末每服半錢冬瓜汁調下無時

冬瓜汁　治如前　右將冬瓜汁飲之

烏梅飲　治如前　烏梅十个　麥門冬[illegible]
蜜[illegible]
右分為二服用水一小盞煎至半盞入蜜[illegible]勻服之無時

楮葉湯　治下痢發渴得水飲便嘔逆不止
右以楮葉炙令黃香用漿水半升浸之候水綠色去葉以木瓜一箇切碎內汁中煮五七沸去木瓜後溫細細服無時

治嬰小下痢腹大且堅
右以衣中白魚摩腹上

治小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡𤻲
㽷蟨生蟲　黃連去須　蘗皮炒　苦參　鬼臼
䕡茹去　橘皮　芎藭　阿膠炒各半兩
右爲末以藍汁及蜜和丸小豆大日服五圓
至十丸冬時無藍汁用子一合爲末入藥內
治小兒久痢蝕汁濕匿生瘡
右以艾葉一味剉服二錢水一盞煎至半盞
去滓溫服更量大小加減乳食前
治小兒下痢腹脹堅硬
右以故衣帶多垢者切碎水三升煮取一升

分服
治小兒卒暴下痢　以小鯉魚一頭燒灰末之
米飲調下
以鷄子和黃蠟作煎餅與服
又以林檎楮子同杵取汁服以意服之
黃柿餅　治秋痢　以黃柿擣和米粉作餅或
作粥與食之
治小兒洞下滑痢　以羊角中骨燒存性爲末
飲調服方寸匕
治小兒脾胃虛怯泄痢腹痛

以豬肉荳蔻其大好者一箇開一竅填乳
香一塊用酵麵裹了慢火煨麵熟搗藥爲細
末麵糊和丸萊菔子大每服二十丸乳食前米
飲下
養脾丹　治小兒臟寒泄白腹脹
附子炮去皮臍　母丁香　肉豆蔻麵裹煨　赤石脂各一兩
川薑炮一兩　訶梨勒炮一兩
右爲細末粟米糊丸黍米大每服十數丸空心
下乳食前
脫肛

小兒脫肛者謂大腸肛頭脫出也此因瀉痢日
久腸滑冷氣相搏裏急下重而便難用力努
躽致肛頭脫而下出寒冷干集不能收斂得
入令收右方于後
治小兒肛頭脫出　以故麻鞋底炙焦得所撚
令入　頻頻按之即不出或燒龜頭灰研細摻
上然後按入大差
以木賊燒存性爲末摻上用手按令入
龜頭丸　治小兒因瀉痢及冷搏積久脫肛下出
不能返收腸中疼而不得入　石龜頭二个炙令焦

小蝟皮 一个炙 磁石 火煅末醋淬不計遍數以…
桂心 三两不見火
右為細末煉蜜和丸小豆大三歲至五歲兒
五七丸溫米飲下日三服一方不用鱉頭只
三味
赤石脂散 治因瀉痢努躽氣下推出肛頭不
入 真赤石脂 伏龍肝 各等
右為細末每用半錢傅肛頭上頻用按入
蛛冊散 治因瀉痢脫肛腫痛 又名蜘蛛散
右以大蜘蛛一箇瓠葉重裹線繫定入合子內
燒黑灰存性入黃丹少許研勻凡用先煎白
礬蔥椒湯洗拭乾將藥末摻在軟綿上手掌
按接入收之甚妙亦治大人又一方桑葉裹
鹽泥固燒
蒼芙丹 治久痢大腸虛冷肛門脫出
白蘞 去皮一兩 [illegible] 鱉甲 一兩醋炙黃去裙襴
蝸牛殼 [illegible] 磁石 燒醋淬十次研水飛 黃連 去須微炒
蚺蛇膽 半两 [illegible]
右為細末軟飯和丸黍米大每服十粒米飲
下乳食前

二金散 治久痢腸頭虛冷肛門脫出
龍骨 [illegible] 枯礬 [illegible] 一兩
右為細末每用一字或半錢乾摻上按入內之
又方 以白龍骨研如粉撲之
又以鱉頭燒灰細末撲之
又以治桑螺[illegible]末和豬膏傅上立縮收之此[illegible]
全蝎[illegible]兩 微黃小兩後[illegible]而坐
又以虎骨燒末水調服半錢或一錢日三恐良
治小兒大腸隨肛帶出轉久不能收之 [illegible]
栝樓取汁塗之
以豬肉汁蒸手指接之令發自入 又以乾
[illegible]姜切一升燒烟熏之則縮入 又以木[illegible]
不拘多少燒存性為末摻上按發之
[illegible]沙散 治小兒滑泄肛頭脫出
以[illegible]沙一兩去皮為末每用一錢以豬腰子
一片批開入藥末在內以線繫米泔煮熟與兒
食之次服白礬丸如脫肛氣逆遍身虛腫喘
急者死不治
白礬丸 白礬枯 定粉 寒水石 煅各等分
右為細末爛飯研細和丸黍米大每服五丸

煎烏梅湯送下乳食前

斗門散 治小兒瀉痢多時青黃韈瘦脫肛不收

訶子肉 枳殼去穰麩炒黃 地榆各等分

右為細末每服一錢米飲調下一歲下者半錢乳食前

又方 治如前

香附子 荊芥穗等分

右為粗末每服三匙以水一大盞煎十數沸淋洗

又方 以浮萍草不拘多少陰乾杵為細末剪貼上以蝴蝶兒不拘多少陰為乾末塗手心按上即止

小兒衛生總微論方卷第十一

小兒衛生總微論方卷第十二

五疳論

小兒疳疾諸論叢雜唯五疳之說為當甚詳外則傳變不同內則悉屬五藏一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛遍身多汗喜覆面而卧肚中並痒色澤青黃髮豎頭焦筋青脉熱腹中積聚下痢頻多日漸羸瘦二曰心疳其候渾身壯熱頰赤面黃心胸膈煩躁滿悶口舌生瘡盜汗多驚下痢膿血神彩衰耗三曰脾疳其候腹大如鼓上多筋脉喘促氣粗心腹壅脹多啼咳逆不穀不消唇口乾燥好食泥土情意不樂憎明好暗痢多酸臭肌肉消形枯力劣甚則大肉陷下四曰肺疳其候咳嗽氣逆皮毛焦落咽喉不利鼻[illegible]生瘡腹內氣脹乳食不進大腸不調泄利下[illegible]寒體慄糞中米出洞下白汁五曰腎疳其候上熱下冷寒熱時作齒齦生瘡耳焦腦熱手足逆冷吐逆滑泄下部開張肛不收夜啼饑哭漸成困重甚則高骨乾小兒疳疾乃與大人勞瘵相似但名疳大人勞者因腎藏虛損精髓衰枯小兒疳者

脾藏虛損津液消亡病久相傳至五藏皆損也
大人勞瘵骨削而氣餒小兒疳瘵腹斂而神羸
以其病之始也其藏之傳變不同故也至於傳
久五藏皆損則一也故五損者經言一損於皮
毛皮聚毛落肺也二損於肌肉肌肉消瘦飲食
不為肌肉脾也三損於血脈血脈虛少不能營
於藏府心也四損於筋筋緩不能自收持肝也
五損於骨骨痿不能起於牀腎也病極則大
肉陷下高骨敗壞以至死矣凡小兒疳瘵多是
下[illegible]所[illegible]小兒藏府嫩軟易虛易實一切於[illegible]

病與不[illegible]下致脾胃虛弱津液內耗皆能成疳
且如[illegible]日中時發者是脾藏虛也藏虛一[illegible]
[illegible]而內發其變法當先補其肝母之[illegible]而[illegible]
發泄[illegible]心得母氣則子[illegible]而[illegible]乃愈[illegible]
妄語其實便以大黃芒硝等冷藥利之利既多
而不能禁則津液內亡漸成疳也又如病吐
作寒熱飲水腸下有積而成痛法當用藥漸消
磨之醫見有積便以巴豆硇砂輩取藥下之下
既多而津液耗則漸成疳也又如傷寒五六日
之後有下證因以冷藥下之太過致脾胃虛而

津液耗即便引飲不止而熱生如此則熱氣內
於[illegible]肌肉外消而羸瘦[illegible]干[illegible]變百
[illegible]也又如吐瀉病久津液耗亡不能
[illegible]也如小兒食肥甘物多因傷滯積則蘊
[illegible]津液內耗亦能作疳故其[illegible]也[illegible]
肥甘之過積為疳黃乃[illegible]是矣[illegible]病皆
成疳也甘疳之狀[illegible]
淡白身色[illegible]土生[illegible]
瘡洞泄青白[illegible]沫下痢[illegible]而[illegible]生
發髮稀作穗頭大項細肚大青筋[illegible]瘦

疳飲水[illegible]瘦骨[illegible]形[illegible]也本因脾
虛津耗久則傳變而成疳也[illegible]則為[illegible]疳傳
者則為急疳又當[illegible]肥疳[illegible]熱疳者
乃因食肥甘積聚生熱而作故多病於初也錢
乙治用黃連丸其變冷疳者乃因[illegible]下之而生
冷而作故多病於久也錢乙用木香丸[illegible]治冷
熱疳者錢乙用如聖丸治小兒之病[illegible]
實必熱不可妄行轉下恐變生疳也若病初之
脾虛津少發渴欲飲者當生胃中之津液錢
乙白术散與服雖多則無妨其錢乙諸方[illegible]

戟之
又有一証其狀腹中有塊身体羸瘦毛髮焦疎腹大氣喘岑𨵵脫肛喫食變吐俗曰無辜實鐵云按玄中記有鬼鳥之禽一名姑獲一名釣星鬼但喜夜飛入有暴露小兒衣袂𥚃包其禽飛立在上令兒患此疾也予性好尋閱異書十餘年間覓不知玄中記之所出又此禽既云夜飛必有形狀世間亦莫之曾見是必巫覡假以凡名而從言者也今詳其証而對其病實乃𤻲疾之很耳特爲破其邪說以袪惑亂矣

治五藏𤻲方

地黃丸 治肝𤻲拘急𤻲氣入眼臉生白膜暈瞖赤脉等疾

熟地黃八錢 山茱萸取肉四錢 乾山藥四錢 澤瀉三錢
牡丹皮去心三錢 白茯苓去黑皮三錢

右爲細末煉蜜和丸桐子大三歲下兒一二丸上者三四丸溫水化下空心

熊膽天麻丸 治肝𤻲羸瘦摇頭揉目百脉拘急

熊膽 天麻 羌活去蘆 柳絮去梗 使君子去殼 胡黃連各一兩 蘆薈 乾蟾塗酥炙黃各一兩

右爲細末粳米飯和丸黍米大每服十丸煎荊芥湯下量大小與無時

[illegible]命丹 治心𤻲体熱驚搐煩渴或發狂大泄漸羸瘦

朱砂 麝香 牛黃 腦子 蘆薈 沒藥 硼砂 熊膽 麒麟竭各半 粉霜錢半 使君子十四个去殼 青黛三錢

右爲末滴水和丸如雞豆大每服一粒薄荷水化下日三兒大二三丸

朱黃丹 治心𤻲挾熱發熱煩渴少食羸瘦

朱砂一分研水飛 天竺黃研半兩 乾全蝎十四个微炒去毒 天漿子十四个炒 人參去蘆一兩 胡黃連一兩 青黛研 龍腦研一錢

右爲末拌勻煉蜜和丸黍米大每服十粒人參湯下無時

黃壁丸 治脾𤻲發黃身腫

陳皮去白 木香一分 巴豆二十个去皮膜出油 黃土一兩

右爲末飯和圓粟米大每服三二丸煎黑豆汁送下無時

木香煎 治脾𤻲因不知飢飽積滯内停枝大腸細下利無度

木香一兩 肉豆蔻一兩麵裹煨 乾蟾一个
胡黃連一兩 使君子去殼 五靈脂一兩 巴豆七个去皮心膜油尽
射香一分
右為末細勻滴水和劑入石臼杵一二百下
圓如黍米大每服一二丸至五七丸量大小與
溫生姜湯下乳食後一歲下者一丸二歲上者
三丸以意加之
肉豆蔻丹 治脾疳如前
肉豆蔻一兩麵裹煨 使君子去殼 青皮去瓤
牽牛子一分 四味 蘆薈一分研 射香研半錢
右研勻細糯米飯為丸黍米大每服十圓生
姜湯下食後
香連散 治脾疳泄瀉腹大腳細漸成瘦瘁
及諸脾胃不和氣不調順並皆治之
木香一分 黃連去須一兩 訶子炮去核取皮一分
肉豆蔻一个麵裹煨 甘草炙一分
右為細末每服一字或半錢米飲湯調下乳
食前
丁香丹 治肺疳皮毛枯燥咳嗽上氣
胡黃連一分 半夏湯洗七次 紫蘇子微炒一分
五味子一分 乾蟾一个 射香一分研
蘆薈一分研 朱砂一分研
右為末細勻棗肉為丸如黍米大每服五七粒
米飲下無時
定砂丹 治肺疳因嗽久成痿皮枯毛落
人參去蘆 胡黃連 一兩 五靈脂一分
胡黃連 朱砂 射香一分 蘆薈
杏仁去皮尖麩炒黃一分
右為末研勻粳米飯為丸如黍米大每服十粒
人參湯下無時
石綠散 治腎疳耳上生瘡及治肥疳頭瘡
石綠一分 白芷各等分
右為末先以生甘草湯洗瘡拭乾傅藥一日三
蟾蜍丸散 治腎疳或因腸虛受蝕下部生瘡
膀等
右以長皂莢燒存性一分 鷄骨一分同燒為灰
細研每用一字吹入下部中令深入數日大效
龍白散 治如前
根白皮一兩 黃蘗半兩
蝦蟆 乾蝸牛 一分

右為細末入定粉一分射香末一錢同研勻
每服一字至半錢粥飲調下乳食前量輕重
加減用藥
如聖散 治如前 乾蟾七个燒灰 蟬殼去土半兩
蛇蛻膽一分 大棗一个去核燒灰已上先為末 黃研一分研
定粉一分研 射香一錢研
右同拌研勻細用好醋看乾濕拌勻臼杵一
二百下成膏丸黍米大每服五七粒米飲下
量大小加減又化三二粒調塗瘡若蟲
乃愈

烏金膏 治腎疳入經絡注陰囊並頭爛色腫
通草一分燒 黃皮一分燒 大黃一分燒 各存性
右同研為末每用一錢以猪膽調成膏於
陰腫處編塗之如末退更煎蛇床子湯洗之
再調塗必効
二肝丸 治疳痢不止 龍膽草去蘆一兩 胡黃連一兩
滑芦去芦一兩 菖蒲一兩九節者
地榆半兩生者已上 雞肝一箇 猪肝一兩
右將藥末入二肝內裹定以水二盞入鹽少
許煮至肝熟於石臼中杵一二百下成膏丸

黍米大每服十粒射香湯下食前
金靈散 治腎疳頸軟只骨沉力弱項細頭重
致天柱骨倒不能擧頭
右以白殭蠶不拘多少揀直者去絲嘴炒黃
為末每服半錢或一字一錢薄荷酒調下
三頂史用生力散塗之 末
生力散 右以草烏一二箇草麻子三十箇各去
殼取肉同研細每用一錢許津唾調攤帋上
先剃頭髮於頭頂上令熱貼之 治疳瀉
赤石脂散 治疳瀉 赤石脂 川芎

右為細末量大小多少服米飲調下乳食前
三聖丸 治瀉久不愈疳瘦成痢宜常服之
川黃連去須 黃柏去粗皮各一兩
右為細末將藥入猪膽內湯煮熟取出丸
菉豆大每服二三十丸米飲下無時
附苓丸 治疳氣泄瀉瀉消其効如神
好黃連去須土一兩剉作塊子一一相似 吳茱萸
揀去枝梗一兩
右二味以蜜相和拌勻炒赤黃色去茱萸只
用黃連為末薄糊和丸

(熱)竹茹米飲送下食前

六神丹 治脾氣虛羸臟腑怯弱泄瀉虛滑乳
食減少引飲無度心腹脹滿
丁香 木香 肉豆蔻(各半兩麪裹煨)
訶子(去核) 使君子(去殼) 肉蘆薈(另研)
右為細末棗肉和丸麻子大每服五七丸溫
米飲下乳食前服此藥於夏秋間應小兒泄
瀉色白或瀉多服藥不差者但與之便定
如聖丸 治冷熱瀉痢 胡黃連 川黃連(各)
白蕪荑(去扇[illegible]) 使君子(去殼)
麝香(研) 乾蝦蟆(三個酒[illegible])
右為細末入蟾酥和丸麻子大二三歲以下
者只五七丸以上者十丸一十五丸人參湯
下食前
木香散 治脾瀉[illegible] 木香 青皮(去穰)
肉豆蔻([illegible]) 陳粟米(一合) 巴豆([illegible])
右為細末每服一字[illegible]米飲調下食前
[illegible]黃丸 治脾瀉[illegible]
巴豆(去[illegible]出油) [illegible]

蕪荑(去扇)
右件研令細水浸蒸餅
送下三二丸食前
金粟丹 治脾疳泄瀉[illegible]
母丁香 草龍膽(去蘆)
朱砂(研飛) 青黛(研各一兩)
蟾酥(去[illegible]) 訶子肉(微炒)
右為細末和蜜一半麪
大每服十粒米飲下(無時)
橘香丸 治疳積黃瘦泄
和丸菉豆大米湯下
大好食泥七
厚朴(去粗皮生薑製)
夜明砂(微炒)
糊一半相和丸麻子
時
汗腹脹泄瀉宿滯不

化氣丹 治[illegible]喘 陳皮
草豆蔻(去殼) 白朮(剉炒)
右為細末滴水和丸麻
米飲下食後
木香芥粒丸 治如前
巴豆(去[illegible]用米[illegible])
檳榔([illegible]) 人參(去蘆)
右為細末飯和丸芥子
加減三五丸木湯下
射香丸 治脾[illegible]
木香(各[illegible]兩) 薑黃
牽牛子([illegible])
子大每服十丸葱白
陳粟米(二合)
麥麩(去巴豆[illegible]用米) 陳皮
木香
大每服看虛實大小
拘時
泄瀉氣弱不食

川苦楝(取肉一兩用童子小便浸一宿焙乾) 巴豆(半兩去皮膜同苦楝浸炒大黑減紫色去巴豆不用)
蘆薈 檳榔 蕪荑(去扇各半兩) 沒石子(一分)
麝香(少許)
右為細末猪膽汁浸蒸餅和丸黃米大每服
十丸米飲下食後
吳婆散 治疳瀉不止不計度數漸成疳痢又飲
食減少褁藥不効
桃根白皮(一分) 黃柏(蜜炙一分) 蕪荑(一分去皮)
黃連(去須一分微炒) 沒石子(一個) 厚朴(去粗皮薑汁炙)
木香(一錢) 丁香(一錢) 楝根白皮(一分) 檳榔(一錢)

右為末三歲以下兒每服半錢以上至六七
歲者一錢煎紫蘇木瓜米飲調下食前日三
屢驗此藥性小溫蓋熱瀉者不可服 一方無
沒石子丁香檳榔三味
木香丹 治疳氣羸瘦血痢(經驗方)
丹黃(一分研水飛) 雞頭殼(用一枚燒存性)
胡黃連(半兩) 木香(半兩焙) 硃砂(研水飛) 蘆薈(一分)
粉霜(一分研)
右拌勻細軟飯和丸黍米大每服五七粒射
香湯下無時

龍骨湯 治疳氣瘦弱下痢白膿久而不差
龍骨(半兩) 訶梨勒皮(半兩焙炮) 赤石脂(半兩)
酸石榴皮(一分炒黃) 木香(一分) 使君子仁(一分)
右為細末每服一字或半錢射香湯調下無
時
丁香散 治如前
大棗(一个去核) 丁香(二个) 黃連(一分)
右以棗褁二藥麻纏火上燒存性研為細末
米飲調下無時
莧蔚粥 治如前

右以莧蔚菜(即益母草也)煑粥食之或取汁
飲亦妙
薔薇汁 治如前
右以生薔薇根洗淨細切以煎濃汁稍稍飲之
勝金丸 治如前及加腹脹
右以鷄子一枚打一眼子如豆大入去皮巴
豆一粒膩粉一錢在內以五十重紙裹於飯
甑內蒸三次取鷄子肉同藥研更入射香少
許細勻添少糊丸如黍米大食後臨臥溫湯
下二三丸量大小與服 一方用鷄子一枚打

破和膩粉炒乾為散米飲調一字或半錢服
雞糯餅 治如前
右以雞白一握生杵如泥同蜜和餅大如
研作餅炙熟與喫不過二三次差
樗白棊子 治如前
右以樗根白皮擣細碎麪拌和切作小顆如棊
子日曬少時又拌麪一次凡三過為度才熟
熟加鹽醋頓服量大小與同重者服之差
樗根米泔汁 治如前
右以樗根白皮煑濃汁半雞子殼和粟米泔

半雞子殼同灌下部再作即差其效如神
木香使君丹 治疳氣羸瘦雖能食不生肌肉
時時泄利無休 使君子去殼三兩炒 木香一兩
丁香一兩 厚朴去粗皮生薑製一兩 沒石子一兩
胡黃連一兩 肉荳蔻麪裹煨去麪一兩 巴豆七粒去殼切一
蘆薈一分研 射香一分研
右為末同研以粟米飯和丸黍米大每服五丸
粒煎陳橘皮湯下無時乳食前
君子丸 治疳勞發熱揭骨吹甲髮疎瘦瘁
思乳食羸瘦虛滑下痢無度 由喫食汨

厚朴去粗皮姜製 甘草炙 青黛
訶子炒去核取皮與各半兩 一本一兩半生半熟
陳皮一兩 白蕪荑去殼 使君子去殼一兩麪裹煨熟
右為末煉蜜和丸雞頭子大三歲下兒半丸
上者一丸乳汁或米飲化下若夾驚薄荷湯
之極妙
青黛散 治諸疳瀉痢羸瘦
右以青黛研為細散水調服之量大小與
歌曰
孩兒雜病變成疳 不問強羸女與男

或因積傷食不進 漸成羸瘦困眈眈
體熱口乾頻飲水 皮毛枯槁四肢攣
腹大時時更下痢 青黃白赤一般般
眼澁面黃鼻爛赤 口氣增寒臥不安
忽然瀉下如泔淀 又似膿膠溶作團
肌頭白出饒啼喔 不收哺乳淚潸潸
腹中有病須醫療 何須祈禱賽神盤
此方便是青黛散 孩兒服餌立安痊
赤虎丸 治疳積瀉痢 朱砂別研 胡黃連一
川黃連去鬚 蘆薈 膩粉各一錢 硫黃

肉荳蔻（麵裹煨）一个 巴豆（去皮）
麝香（少許研）
右為末研勻細麵糊和丸如蘿蔔子大甘草
湯下一歲兒一丸以意加減
蘆薈散 治疳氣肚脹冷熱不調瀉痢無
度
右以蘆薈一兩為末每服一錢以豬肝一兩
煮少許米煮熟空心頓服大治無辜疳
君子散 治五疳小便白濁瀉痢無度
右以使君子仁為末米飲調服食前

厚脾丸 治疳勞虛冷白濁泄瀉手足逆冷
厚朴（去皮以姜製各半兩） 肉荳蔻（一个麵裹煨）
龍骨 訶子肉
右為細末糊丸菉豆大米飲下十丸無時
蝦蟆丸 治諸疳瀉痢 蘆薈（研） 黃連（去須）
穀精草 桂心 朱砂（研各一錢） 縮砂仁
熊膽 射香
右除研藥外細剉用一大蝦蟆去了肚腸入
剉藥在內以線縫合先用好醋浸少時次以
火炙酒醋又炙至焦黑放冷杵研為末入

攪拌勻取獖豬膽汁和丸菉豆大每服五七
丸米飲下量大小加減此乃知信州王紹祖
方
治諸疳蟲動方
肥兒丸 治諸疳久患臟府胃虛蟲動日漸羸
瘦腹大不能行髮豎作穗肌体發熱精神衰
弱 黃連（去須） 神麯（炒） 使君子仁
肉荳蔻（麵裹煨去麵） 麥蘗（炒各半兩） 木香（二錢）
檳榔（大二个不見火）
右為細末麵糊和丸蘿蔔子大每服二三十

丸熟水下食空服
蘆薈丸 治五疳羸瘦蟲咬腹痛肚大青筋
一切疳疾 蘆薈 木香 胡黃連（各一分）
乾蟾（一个酒浸炙焦） 檳榔（二錢） 青黛（一錢）
青皮 使君子仁（三十个）
蕪荑 射香（少許）
右為細末用豬膽汁和丸黍米大每服十丸
米飲下無時
又方 蘆薈 木香 胡黃連
青皮 白蕪荑 雷丸 鶴虱

射香一錢研

右為細末粟米飯和丸菉豆大米飲下一二十丸無時

又方

蘆會半錢 赤石脂一分 使君子七个去殼 雷丸一錢 姜黃一錢 川練子一个去核 檳榔一錢 巴豆七个去油不見火

右為細末獖猪膽汁糊丸黍米大一歲兒二三丸以上者三四丸量大小與之冷木香湯下無時

射香黃連丸 治疳氣羸瘦白虫作

胡黃連 白蕪荑去扇各一兩半 宣連去須一兩 蘆沙一分研

射香一字研 木香半兩

右為細末糊丸菉豆大米飲下五七丸二歲上者十丸無時

榆仁丸 治疳熱瘦悴虫作腹痛

榆仁去皮 黃連去須各一兩

右為細末用猪膽七箇取汁在椀中和藥安甑上蒸九次每日一次候數足研射香半錢入之以白湯浸蒸餅和劑丸菉豆大每服五七丸至一二十丸米飲下無時

雄黃丹 治五疳羸瘦多生虫動

胡黃連 白蕪荑去扇 川黃連各一兩 乾漆半兩炒煙盡 雄黃半兩水飛研 射香一錢研

右為末并白猪膽汁和丸黍米大每服十粒浙泔水下無時

乾漆散 治疳痰蚘動腹肚疼痛

乾漆炒令煙盡 使君子去殼 白蕪荑去扇 苦楝樹東邊皮日乾去粗皮取白皮一分

右為細末每二三歲兒半錢下者一字沙糖熟水調下無時

使君子散 治如前

使君子仁

黑牽牛 輕粉七錢

右為末每用半錢於五更初蘇米飲調下無時

三根散 治疳痰蚘作腹痛啼叫不止每至月初間即甚狀如神祟

貫衆根去 紫梨根取東引用 酸石榴根

故綿 乾漆各半兩

右六味並燒存性為細末每服一錢水八分盞煎至四分去滓溫服無時

豬肚丹 治疳瘦盜汗小力大便有虫曾經大

□・川黄連去須　胡黄連　木香略炒　羌活去芦
蘆薈　肉荳蔻麵裹煨去麵　白蕪荑去扇
鱉甲醋炙黄去裙襴各半两
右為細末用猪肚一个先刷令净以好白芷
二两内肚中蒸極軟熟去白芷不用却入諸
藥縫合再蒸加泥取出同脂入臼杵二三百
下成膏丸黍米大每服十粒米飲下量大小
加減無時
緑礬丸　治疳疾有虫愛食泥土
右以緑礬為末猪膽汁和丸菉豆大每服五

四十四

七丸米飲下無時
又方　治如前
右以市合人聚時買市中羊肉半斤用繩繫
之頓地上令人把繩頭拖至家水洗净炒炙
依科與兒食之未能食者煑至汁與飲一方
肉一斤繩繫曳數里勿洗炙與食
除毒丹　治疳蚀不差傳染兄弟姊妹
鬼臼去毛一两　苦参剉半两　青箱子半两　草龍膽去芦半两
硫黄一分　緋絹一分　乾蟾一分　白礬一分
右件藥剉拌一處並燒存性為末錬蜜和之

麻子大每服十丸麝香湯下無時
治小兒疳䘌
右以鶻鵝糞乾為末炙猪肉蘸與之喫奇妙
糞多在水山石之上紫色如花就上刮取之
治小兒疳濕痛痒下部生䘌虫蝕瘡
以没石子為末吹下部中　又以地榆煮
汁洗之日二　又以鐵衣著下部中
治小兒疳濕生䘌蝕瘡
以地萹蓄一把水二升煑至半升空腹服半
合大小以意加減

四十五

治小兒疳熱伏結腸中下赤黄汁沫及如燕脂
猪血肝中瘡䘌生虫蝕痛痒
黄連去鬚　蘗皮炒　苦参　鬼臼　羌活去芦
橘皮　芍藥　阿膠各半两剉杵如粉
右為末以藍汁入少熟蜜和丸小豆大每服
五七丸米飲下無時冬時無新藍取汁用子一
合舂為末入藥內宜者
治小兒疳濕生䘌蝕下部痒痛
雄黄一分水研飛　胡粉
右同研細每用少許傅下部中

小兒疳痢不差久成疳瀉
右以艾葉半兩水一升煮取半兩量兒大小
以意加減與服
治諸疳方
五疳保童丸 治五藏諸疳一切並主
青黛研 雄黃研 射香研 蘆薈研 熊膽研
胡黃連 黃連各一 龍膽去蘆 苦楝皮根
蝦蟇灰 蝸牛炒 白鱔魚炙
夜明沙微炒 五倍子 青皮去白 天漿子炒
蟾頭一枚炙令黃

右為細末糯米飯和丸麻子大每一歲兒十
丸溫米飲下日三服無時
蘆香散 治五疳瘦悴多啼欬嗽口瘡髮稀
白术一分 石膽研 龍齒研 陳皮各一
射香研半字
右為細末每服半錢米飲調下二歲下者服
一字無時
聖功散 治五疳 苦楝根皮生於東引者米泔浸一宿
鶴虱各等分
右二味為末拌勻每服半錢熟水調下連進

三服無時
使君子丸 治諸疳和脾胃
使君子仁一兩 川芎半分 厚朴去皮
陳皮一分去白
右為細末煉蜜和丸皂子大三歲已上一丸
已下半丸陳米飲化下無時
二香青蟾丸 治久疳傷熱面青口乾吐甲
眉髮黃食土咳嗽肚大青筋紫瘦耳聾
母丁香三个 射香一字 青黛一分 蟾一個
右為細末煮棗水飯和圓粟米大溫水送下

三丸無時
蘆薈丸 治五疳不足肌肉食減口渴黃瘦
蘆薈 蕪荑去皮 青黛 檳榔
黃連去鬚 胡黃連 蝦殼 猪膽二个
射香少許
右除猪膽外為細末却用猪膽和丸麻子大
每服五七丸飯飲下無時
橘連丸 治疳氣脾胃不和飲食不化日漸羸
瘦 陳皮一兩 黃連去須一兩半
右為細末別研射香末半錢拌勻用猪膽七

搗分爲入豬膽內繫緊水煮候至熟取出以針微
刺破以熱湯洗取出入粟米飯和丸蘿蔔大每
服一二十丸米飲下無時

保童丸 治諸疳羸瘦 蘆薈 使君子 各等分

右研細以入豬膽中蒸熟候冷研爲丸麻子
大米飲下一二十丸無時

蝸牛散 治一切諸疳

右以蝸牛殼七箇洗去塵土燒存性內研麝香
[illegible]之以封[illegible]於[illegible]飯下[illegible]時[illegible]
蒸至飯熟取出細研每服一日至二

香蟾丹 治諸疳肚重肚大能多喫[illegible]細

乾蟾 [illegible] 胡黃連 [illegible] 蛇蛻 [illegible] 地龍 [illegible] 天漿子 [illegible]

朱砂 研 麝香 一分

右爲末勻細糯米糊和丸黍米大每服十丸
米飲下無時

夜明砂丹 治五疳眼目澁多淚

夜明砂 [illegible] 胡黃連 半兩 [illegible] 龍膽 [illegible]

苦楝根皮 半兩 乾蟾 [illegible] 青黛 [illegible]

蘆薈 各一分 研細

右研勻細粳米飯和丸黍米大每服十粒米
飲下無時

紫霜丸 治諸疳發熱肚大腳細[illegible]面黃宿
滯不消或作寒熱腹內疼痛經年瘦弱丁奚
惡等病

牛黃 [illegible] 朱砂 一分 射香 [illegible] 鱉甲 [illegible]

巴豆 [illegible] 枳殼 [illegible] 當歸 [illegible]

甘草 三分 木香 一分 生犀末 [illegible] 大黃 三分

右爲細末煉蜜和丸[illegible]大每服二三丸米
飲下無時

如聖丸 治疳痢羸瘦[illegible]汗体熱乳
食不消

麥糵 炒各一兩半 白蕪荑 [illegible]

右爲細末以豬膽汁[illegible]和丸[illegible]大每服一
二十丸米飲下[illegible]小兒[illegible]方有陳
皮木香各半兩又名[illegible]

鱉甲黃連丸 治諸疳[illegible]瘦[illegible]肚
大腳細不肯進乳食氣粗[illegible]
證

鱉甲 [illegible]

黃連 [illegible] 巴豆七个 [illegible]

人參去蘆 茯苓 甘草炙 川楝子肉 使君子
木香 草荳蔻炮去皮 柴胡去蘆 陳皮去白
草龍膽酒炒
右為細末猜豬膽汁和丸菉豆大每服一二
十丸米飲下如有潮熱体熱不解烏梅湯下
熊膽丸 治一切諸疳羸瘦
胡黃連各二分 牛黃一分 射香一錢研 熊膽 蘆薈
蟾酥少許研入熱煮酒和
右為細末入蟾酥糊和丸菉豆大每服五七
丸射香湯下

金瓜丸 治疳熱黃瘦解發渴久服解宜
蓮食肥肌 黃連去須 黃蘗 甘草炙
青皮去穰各等分
右為細末猜豬膽汁和勻却入膽中線繫
定於銀石器內以漿水煮五七沸取出風乾
懸一宿將膽內出藥入缽再入射香少許同
研爛勻丸菉豆大三歲下五七丸上者十數
丸空心米飲湯下日三服無時
肥肌丸 治五疳黃瘦久不美食手與脚俱浮
腫煩渴飲水常服退熱肥肌殺蟲去疳此衛

小兒之寶止 川楝子去核取肉 川芎各一兩
橘皮揀淨四兩 龍膽二兩去蘆 巴豆
右為細末麵糊和丸麻子大米砂為衣每服
十丸十五丸米飲下設服橘皮湯下無時
香蟾丸 治諸疳 大蟾
蕪荑一分去皮 黃連去須 甘草
夜明砂 使君子
射香一字研
右為細末豬膽汁和丸蘿蔔子大每服五七
丸米飲下無時

又方名同治同 乾蟾
蟬殼 雄黃 訶子 母丁香
胡黃連一兩 黃連 使君子 青黛
右為細末麵糊和丸菉豆大湯下二三十丸
無時
又方名同治同 鱉甲
蝦蟇 訶子 木香 蘆會
鐵粉研 雄黃研飛 胡黃連 射香
右都如粉細勻糊丸粟米大每服一十丸米
飲下病大羸瘦者不過五七服愈曾經効驗

牛黃煎 治諸疳食傷氣脹体瘦壯熱變成疳
多因疳氣齒爛鼻瘡 大蟾[illegible]
瀉痢丁奚潮熱等疾 胡黃連 訶子[illegible]
豬膽一个取汁[illegible]
使君子仁[illegible] 蚊石子 蘆薈 蕪荑[illegible]
熊膽[illegible] 朱砂水飛 雄黃[illegible]
木香[illegible] 麵[illegible]
牛黃一錢 麝香一錢 膽子[illegible]
右為末入蟾膏和丸麻子大米飲下五七丸[illegible]
麝金銀薄荷湯下乾瘡服藥[illegible]香湯

下疳蛔蟲引在腹苦楝根湯下五歲上者十
丸此藥丸治疳利若壯熱者不可服
黃連丸 治疳氣腹滿多因[illegible]發熱四肢
羸瘦黃作[illegible]漸漸羸瘦[illegible]思乳食
胡黃連 使君子肉 白蕪荑[illegible]
巴豆[illegible]
右為末猪膽汁和丸[illegible]子大每服三五丸米
飲下空心日二服
蘆薈丸 治五疳面黃肌瘦腹脹髮穗日暮
口臭斷爛鼻瘡咬甲揉目愛喫泥土瀉痢[illegible]

疳[illegible]蕪荑[illegible]末 乾蟾 大皂角[illegible]
[illegible] 青黛一錢 蘆薈一錢 麝香一錢
朱砂[illegible]
右為末和勻浸蒸餅和丸麻子大每三歲下
兒一十丸上者以意加至二十丸溫水飲送
下無時
龍膽丸 治諸疳發熱 龍膽草 黃連
使君子肉 青皮[illegible]
右為細末猪膽汁和丸蘿蔔子大每服一二
十丸熟水下無時

粉糖丸 治疳愛食泥土
右以膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大
米飲下一丸良久取下泥土[illegible]
龍粉丸 治疳渴飲水 龍膽草 定粉
烏梅肉 黃連[illegible]
右為細末煉蜜和丸麻子大米飲下一二
十丸
香葛散 治如前 藿香 乾葛
甘草[illegible] 白梅肉[illegible]
右同為細末煎浮萍草湯調下半錢量大

小兒服餌附

熊膽丸 治疳瘦肚大腹煩渴喫水 熊膽

雄黃 佛頭青 [illegible] 肉桂末 人參[illegible]

右爲末同勺糯米粥和丸菉豆大每服五七

丸米飲下無時只方大妙

[illegible]木散 治疳渴飲水藥不効 天仙子[illegible]

[illegible] 乾姜[illegible] 烏梅肉[illegible]

湯浸[illegible] 甘草一分

右爲細末每服半錢或一字煎木香頭湯校

冷調下無時良久推木不要飲是効

霍蚕丸 治諸疳瘡疳霍亂風等疾久不瘥差及

新乳後羸瘦乾瘡齒國不能治者同死神妙

霍蚕[illegible]

辰砂[illegible] 射香[illegible] 雄黃[illegible]

胡黃連[illegible]

右爲末以新蒸粟米飯一塊泥裹煨之取中

心軟者和藥丸菉豆大每服五七丸射香湯

送下

鷄內金丸 治十歲已上疳勞壯熱形瘦骨熱

漸成勞瘵者

宣連[illegible] 柴胡[illegible] 秦艽[illegible] 川鶴虱[illegible]

知母[illegible] 秦艽[illegible] 黃芩[illegible] 使君子肉[illegible]

右爲細末以黃雌鷄一隻重一斤許者籠之

專以大麻子飼五日殺之去毛令淨於脊背

開一孔去腸肚淨洗拭乾入藥末在鷄腹內

以線縫合用一小甑先於甑底鋪黑豆厚三

寸頓鷄在中四傍又以黑豆圍塞上亦以黑

豆蓋之自日出蒸至晚候冷取鷄出

腹中藥別煩[illegible]去筋骨頭翅以淨肉

研和藥末[illegible]乾入少酒糊丸如麻子大

菉豆大兩等每服一二十丸以意量大小加

減空心臨卧煎麥門冬熟水下如癆勞骨蒸

發熱年十五已上溫酒下忌豬肉

蝎骨丹 治一切[illegible]下痢[illegible]全除又

如有邪此乃[illegible]傳染浴[illegible]者此乃疳

毒也 乾蝎[illegible] 蝸牛殼一分細研

蘭香根[illegible] [illegible]

射香[illegible] 龍腦[illegible]

右爲末入研拌勻以米醋煮麪糊和丸黍米大

每服十粒煎[illegible]湯下乳食後量大小[illegible]

加減無時

香甲湯 治如前觖祛毒辟邪 漏芦(去芦一两)
沉香(锉一两) 牛蒡子(微炒一两) 安息香(一两)
訶梨勒皮(微炒一两) 鼈甲(塗醋炙令黃去裙襴半两)
乳香(半两研細)
右為末勻細每服一錢水八分入人參少許同煎至四分去滓温服量大小加減無時

大麝香丸 治諸疳積疳羸瘦肚大青筋頭髮頂細腹中有積毛焦氣急俗呼為丁呼為無辜此皆疳証也

麝香(半两研) 朱砂(半两研水飛) 粉霜(半两研) [illegible]去
肉荳蔻(去殼一两) 乾蟾(一两炙) 夜明沙(一两炒) 白蕪荑(一两)
地龍(去土一分) 乾蜣螂(去足炙焦)
右為細末入研者勻煉蜜和丸黍米大每服五七粒温水下無時

問命散 一切疳可分輕重逆順
瓜蒂 乾地龍 白礬灰
藜芦(去芦)
右為細末每用少許吹鼻中得嚏即吉若自出即急

治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦
以鯽魚膽汁滴鼻中連三五日効

治小兒腹疳 以蜘蛛燒熟啖之

治小兒疳熱煩渴乾瘦
以蝸牛三四十箇於一淨盤中以物蓋之令行即有涎似銀泥同膩粉和搭便丸如黍米大溫水送下三丸無時

治小兒疳渴飲冷不休水 射香 人中白(隔)
右同為末蒸餅和丸麻子大一二歲服二丸煎皂子湯送下空心服

還肌散 治小兒疳瀉及洞瀉穀不化
肉荳蔻(一个) 訶子(二个去核) 沒石子(一个)
粟殼 木香(半皂子大)
右為細末每服半錢米飲調下如人行五里又更進一服神驗仍調服須用陳米飲也

又方 治如前 黃連(一两去鬚) 木香(半两)
蕪荑(去扇) 檳榔(一个)
右為末豬膽汁和丸菉豆大每服十丸米飲下無時作三等丸量大小與服治疳痢(日足)

疳變

治泄瀉　以赤石脂研如麵粥飲調半錢服立
差一方以川芎等分同為末服妙
蘆會丸　治小兒諸疳　蘆會　檳榔
蕪荑炒秤　胡黃連　川苦楝和核剉片麵炒
使君子仁　雷丸各一分炮去黑皮　橘皮半兩洗淨
巴豆四十九个去皮膜同橘皮炒巴豆黑色只留二个半餘者不用
右為細末猜猪膽汁煮糊和丸麻子大朱砂
射香為衣每服十丸十五丸如頭面浮
腫冬瓜湯下若瀉而發渴陳米飲下[illegible]大
小加減

只方各同為四　蘆會　黃連去須
川楝子和核剉　蕪荑去殼三分　天竺黃一錢半
射香細研少許
右為細末以猪膽汁和飯研爛和劑於飯上
蒸兩次丸菉豆大以朱砂為衣每服五七丸
至十丸熱水下無時
猪血煎丸　治小兒諸疳　吳茱萸
胡黃連[illegible]　蕪荑仁
柴胡各等分
右為細末用猪猪膽汁浸蒸餅和丸菉豆大

每服十丸熟水下[illegible]小兒一切諸疳時
[illegible]
以[illegible]浸三日五日[illegible]日以杖子攪擊瀝出又
水浸[illegible]二日[illegible]氣淨時於日中曬乾為
了[illegible]用黃連[illegible]用黃蘗與姐退等分為
末每[illegible]半兩入射香半錢同研勻以猪
膽汁和丸黍米大每服一二十丸量大小加
減空心陳米飲送下　神効蟾酥一方五月五
取蟾活中姐水淘淨入竹筒封口至乾時[illegible]

末每服一二錢入射香米飲調下甚妙
消疳丸　治小兒諸般腹脹四肢腫瘦氣上
促小便不利　木香　檳榔各一兩　青皮去白
一羌黃　蘿蔔子炒　牽牛子各取末二錢半
右為末糊丸黍米大每服二三十丸食後
湯送下無時
治小兒一切疳疾　以棘針瓜蔕等分為末
每用黍米許吹鼻中日二次用
治小兒諸疳　以黃連不拘多少同烏梅煮
至黃[illegible]時只用黃連為末別以烏梅肉和

丸如麻子大每服二十丸溫水下無時量大
小加減

熊膽射香丸　治小兒一切疳上攻心腹虛脹受
食泥土四支壯熱　熊膽（研）　射香（研半錢）
蝦蟇（一枚去頭足炙焦煨熟研）　黃連（去須取末）
右同研極細以膽酥和丸黍米大每服五丸
米湯送下量大小加減無時

香蟾散　治小兒食疳羸瘦不能乳食
乾蟾（一枚炙焦）　蠍蜋（一分去翅足微炒）　蒼菜（[illegible]）
神麴（一分微炒）

右同為細末每服半錢粥飲調下無時

又方　治同前　朱砂（一錢研如粉）　射香（少許研）
端午日蟾眉脂
右將蟾眉脂和二味丸麻子大空心米飲下
一丸如腦疳以乳汁調納鼻中無時

治奶疳水瀉　以川椒一分末六日前閉口者為
末酥調少許傅腦上日三次

治疳瘦垂死　以猪母糞黃食之取足即差
甚佳取汁飲之亦治疳也以地榆黃汁和粥
粥食之

以樗白皮和倉粳米葱白並草香豉同煎飲
服

治小兒疳渴飲水無度
以大鮎魚一頭先燒一地坑令紅投魚坑中
便以蛤粉遍令一人蹲在魚上須臾取出用
竹刀刮下肉入射香少許拌匀和丸蘿蔔子
大每服五丸桶縄根煎湯送下　方二卷末
蕪荑丸服

五疳丸　治小兒一切諸疳　川楝子
川芎　等分

右為細末以猪膽取汁和丸麻子大
每服二二十丸溫水送下日三四服

治疳兒疳氣不可療者
以綠礬火煅通赤[illegible]踏碎如此三次為細
為末棗肉和丸菉豆大每服五七丸溫水下
無時日二三服

麻柳湯　一切諸疳服諸藥後皆可用此法也
右以麻柳枝各一握並剉用水兩大椀煎數
沸通手浴兒其佳浴畢用一青衣蓋之疳一或
白出為驗[illegible]

全

小兒衛生總微論方卷第十三

諸蟲論

經言人臟腑中有九蟲內三蟲偏能發動為病人臟腑實強則不能為害若臟腑虛弱則隨蟲所動而生焉故經亦別立三蟲之名一曰蚘蟲蟠居胃脘之間動則令兒吐青白沫或吐清水心腹刺痛若蟲貫心者即死二曰蟯蟲居洞腸之間多則發動為痔瘻疥癬癰疽三曰寸白蟲居腸胃之間動則損人精氣令腰腳痛弱更有一蟲形若細絲或如馬尾故俗呼謂之馬尾蟲此蟲不拘久蟲之數歲云飲食中誤吞油髮所變亦居胃中動則令兒腹中攪刺發痛不可忍受小兒蟲動者多病於諸病之臟腑虛弱故也惡痢勞吐瀉者尤甚錢乙論小兒蟲動之證面皖白心腹痛唯是口不吐沫及無清水出也故乙又言心腹痛而吐者蟲痛也心腹痛而不吐水者冷痛也但吐水不心腹痛者胃冷也又蟲痛亦與驚癇證略略相似但目不邪手不搐也以此別之則無悞矣乙治蟲痛者用安蟲散然世人用治蟲之藥多於臨卧服之並無日分故多不驗唯於每月初四五日間在五更時服之至日午前蟲盡下矣後以甲調藥兩服和之不可多也凡蟲在人腹中每月上旬頭向上中旬橫之下旬頭向下是以中下旬服藥則不入蟲口所以不驗也亦如馬生子上旬生者行在母前中旬生者並母而行下旬生者行在母後之如猫之食鼠上旬則食前段中旬則食中段下旬則食下段此物理之自然莫不知也然蟲痛極者蛔不貫心亦能斃人昔錢乙治辛氏女五歲病蟲痛他醫以巴豆硇砂之屬藥治之不効至五日外多哭而俛仰睡卧不安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無光而慢口白吐沫至六日胷高而卧轉不安召乙至詳而視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則為逆矣至次日見辛曰夜來三更而瀉乙於瀉盆中看如藥汁以杖撥之見有蟲九乙曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治也何以然師曰脾虛胃冷則蟲動今目青此肝乘於脾又更加瀉知其氣極虛也而蟲出不隨糞下亦脾胃已脫藥形

為癖癥乃食飲所作經言積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積乃五藏所生其發有常處其痛不離其部氣之所聚名曰聚乃六腑所成其發無根本其積聚常處是以積聚皆氣之所為也癖癥者其始因脾胃虛冷乳食不化而以成傷不除乎治因滯留結乃成癖癥也癖者邪癖也所居在脇下癥者正證也所居在腹中皆有其形或長或短或片其狀不一皆堅硬作痛其因乳得者名曰乳癖癥俗云妳癖者是也其因食得者名

曰食癖癥其因水飲得者名曰水癖癥若因接之或因搖動背負有觸驚而得者此乃水癖癥也是以癖癥皆食飲所作也故小兒常當節適乳哺調適寒溫若少失深適則病從而生矣或乳哺不時寒溫失宜則脾胃不和氣不調順其候口燥渴面銑白無精光口中氣冷不思乳食便當以藥和之若不即治則成胃冷吐候乳食不化或但吐水多當用藥溫之又不與治則脾胃浸深成癖其候面晄白色弱腹痛口吐痰沫得綠急當用藥溫補若下痢者更以調養

病不相應故知死病後五日若篤七日而死學者當此以為法爾今除蟲勞等已具於蟲疾門之下外諸蟲之方敘而具後

使君子　治蛔咬心腹疼痛

右以使君子火煨熟去殼與食以殼煎湯送下

紅桃散　治蛔咬心腹痛發歇有時

風化石灰一兩燒赤細研　朱砂一錢細研

右拌勻細用飯飲一大盞入艾三五葉煎二三沸看多少調一字或半錢與服但少用令則難吐

龍膽湯　治蛔蟲攻心甚痛如刺吐出清水

右以草龍膽一兩剉碎水一盞煎取一盞去滓隔宿不食至五更頭須服量大小與

三角散　治如前

右於七月七日採蒺藜子不以多少陰乾為散每服半錢或一錢匕飲服日三量大小加減無時

木香桃仁丹　治蛔攻心痛不可忍

木香一兩　桃仁一兩湯浸去皮尖麩炒令黃　檳榔一分

鶴虱 揀淨一兩　黑猪脊 一兩　苦楝根白皮 一兩半

右為細末，猪膽汁和丸黍米大，每服十粒，射香湯下，無時。

奪命散 主治如前病至危困者

狼牙草 一兩　萹蓄 一兩　苦參 一兩　雷元 半兩

薏苡仁 一兩　鶴虱 半兩

右為細末，糯米和丸黍米大，每服十粒，生地黃汁下，無時。

乳香丸 治蟲動心腹疼痛

乳香末　青皮 去穰炒　黄為末各一分

槐花 半兩炒　風化石灰 研細半兩

右為末，每服半錢，槐花湯調下，無時。

乾漆散 治如前

使君子仁 二七箇　乾漆 炒烟盡一錢　蕪荑 去扇六十片

楝根白皮 取東邊者一錢

右為細末，每服一字，沙糖熟水調下，二三歲半錢，四五歲一錢，無時。

楝皮汁 治如前

右取楝根皮，削去外蒼皮不用，只用白者，以煮濃汁，量大小與服。

[illegible]聖散 治如前痛不可忍者

苦楝根白皮 二兩　白蕪荑 去扇半兩

右為末，每服一錢，水一小盞，煎取半盞，放冷，待發時服，量大小加減，無時。

滕丸子 治如前

射香 各一　牛黃 半字研　胡黃連 半錢末

龍腦 研　蘆薈 研

右為末，同研勻，熟蜜和丸菉豆大，每服三五丸，生米泔水化服，無時。

又方 以檳榔生為末，用東引石榴根煮湯[illegible]下，量大小與服，或半錢一錢，治寸白蟲神效。

上旬空心食前服之。

治小兒蚘蟲動作 以楝實一枚，着大蒜汁沾孔中，亦治蟯蟲。

以槐子杵爛，內孔中，亦治蟯蟲。

治小兒寸白蟲 以挑葉杵爛，絞汁服之。

雷元散 治小兒三蟲

雷元　川芎 等分

右為細末，每服一錢，飯飲調，一日二服，無時。

胡粉牛黃丸 治小兒蚘動，腹內時時疼痛

胡粉 三錢　牛黃 一錢　射香 一錢

右同研為末，用豬猪膽一枚，取汁浸[illegible]

丸菉豆大五歲兒每服一丸下七丸以意加減無
時
又方　治如前　守宮子一分生為末水
三合煎取一合一日服盡　以意加減服藥
作糜食之甚香而效
治蟯虫內蝕心腹疼痛
以鶴虱為細末以肥猪肉汁調服五歲兒服
一合虫出便止更以意加減
治蟯虫及虫攻蝕下部并痛
以萹蓄一把水二升煎取五合空腹服三
二合乳食前
治蟯虫攻蝕下部
以胡粉雄黃各一分同研為末每以少許傅
下部
榴白皮　治如前痛甚不可忍啼哭不止
良姜一兩　肉桂去皮一兩　肉豆蔻[illegible]
乾漆炒烟盡　烏[illegible]
右為細末煉蜜和丸雞頭子大每服一丸二丸
米飲化下無時
香雷散　治如前　香元　[illegible]

苦楝根皮　白蕪荑去扁各半兩
右為細末每服一字或半錢用生猪肉煮湯
湯調下無時
化虫丸　治虫咬腹中攪刺疼痛
蕪荑去扁一分　檳榔二錢　川鶴虱一分
右為細末猪膽汁和丸麻子大每三歲兒五丸
五七歲十丸陳米飲下無時
川楝丸　治胃寒虫動心腹疼痛及上中二焦
焦因寒而虫動　乾漆三分杵碎炒烟盡
雄黃一分研水飛　巴豆霜一錢
右為細末糊丸黍米大每服五七丸至十丸
加減服　東引石榴根煎湯下痛甚者煎苦楝
根湯或蕪荑湯下
蕪荑散　治上中二焦虛及胃寒虫動心腹痛
痛危惡證候與蚘厥相似　白蕪荑去扁
乾漆炒烟盡等分
右為末每服一字至半錢米飲調發時服
大者一錢無時
五靈脂散　治虫動心痛散絕
五靈脂去沙石末二錢　白礬枯[illegible]

右拌匀每服一錢或半錢水八分煎至減半
温服當吐虫出
緑礬丸 治腹中有虫愛食生物
右以緑礬不拘多少為細末猪膽汁和丸如菉
豆大每服五七丸米飲下無時
蜂窠[illegible] 治腹有諸虫口中吐出
右以鹽煎[illegible]與食之
檳榔散 治寸白蟯蚘諸虫 檳榔一个 木香半
右同為末每用一錢匕煎楝根白皮湯調下
如楝根赤者不堪用即害人須在月初四五

日間至五更頭先嚼肉脯一小片只嚥其汁
少頃服藥至日午前虫下勿怪則但用盆子
或在淨地上燃見取下虫多少也 一服永絶
根本且食粥一二日不須服補藥忌生冷硬
物五七日佳
君金散 治寸白蚘蟯諸虫隨時大便糞下
苦楝根皮一兩微炒剉 鶴虱半兩揀淨
檳榔半兩 猪牙皂角三鋌燒灰
使君子仁半兩以上先末 青黛半兩研 麝香一分研
右拌匀細每服一字淡猪肉湯調下無時

補虫用 治數歲上食肥甘物多而虫動
鶴虱一兩揀淨 檳榔一兩 苦楝根皮一兩以上先杵
胡粉半兩研 白礬半兩研
右為細末拌匀麵糊和丸黍米大每服十粒
温漿水入生油一兩點攪匀送下無時
黑金散 治虫煩躁嘔服之頓已得瘥為驗
乾漆一兩 肉桂半兩 草荳蔻仁一分
石榴根一分 雄黃一分研
右都於一瓦罐內燒存性研為極細末每服
一字或半錢研麝香少許煎粟米飲調下

黄金散 專治吐利後虫動
乾漆一兩炒煙盡 白蕪荑去扇半兩
肉荳蔻麵裹煨去麵半兩以上為末 雄黃三分水飛
右研拌匀細每服半錢煎葱白湯入生油一
二點同調下須調令匀熟即得如藥冷再上
火温服不拘時
胡粉丹 治[illegible]虫發動[illegible]者或吐涎[illegible]
大棗[illegible] 水銀[illegible]同研匀細
胡粉一兩研 雄黃半兩研水飛
右同入棗膏研匀丸黍米大每服十[illegible]

楝根湯送下無時

蝟皮散　治蛟蚘耗損瘀瘦已成痔者

蝟皮一兩燒灰存性　一兩炒去皮尖去粗

蛇蜕皮一兩燒灰　露蜂房半兩燒灰

右為細末入麝香末一錢拌勻每服半錢米

飲調下無時

檳榔散　治如前

檳榔一兩炮　一兩燒灰荊芥穗一

訶子一兩炮　半兩去半兩

枳殼去穰麩炒半兩　黃耆半兩

右為細末每服半錢米飲調下乳食前

神蟾殺精丹　治諸病有蟲下如絲或如馬尾甚者便至危殆　乾蟾三枚五月五日取者研　殺精草三兩入一瓶內鹽泥固濟慢火煅通赤

胡黃連半兩　皂角三寸燒灰　瓜蒂半兩

母丁香半兩上先為末　粉霜一分研　蘆薈一分研

射香一分研

右同拌勻以猪膽汁和丸黍米大每服十粒

溫米飲下無時

食氣積癖論

小兒積聚癖瘕者其証不同積聚乃氣之所

又不與治脾胃既已虛冷飲食先已不化則

脾再稍失宜即便凡成傷也其候身体小熱

口中氣溫面黃腹脹目無精光或白睛多睡

四支重弊畏食肚熱大便酸臭或為吐瀉

水穀不消須宜穩藥消化不可便行駛藥取

轉小兒氣實脾胃壯者患之有漸若氣怯脾

胃弱者但稍失護養便成傷也昔錢乙治黃

承務子于歲因傷食而瀉他醫與止之十餘

日便青白乳不消身涼加嘔氣昏睡以請

錢而召乙乙先與益黃散補肺散三日而身

溫不嘔氣後以白餅子微下之後與益脾散

而利止得安或問何以其然乙曰此本脾虛傷

食而作利初不與下之留連十餘日上實下

虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子母故也今先

補脾肺病退身溫不嘔氣是也然後下其所

傷又問既有所傷何不先下而後補乙曰囊

青白為虛冷若先下之必大虛也故先實而

後下則不虛矣後更與補之乃安此乃治所

傷也若傷重而不與急治則停滯留結而為

癖瘕其候與食傷相似而加更困重又一向

不食但渴飲少乳或渴而飲水時作寒熱亦與潮熱相似昔錢乙治曹宣德子三歲病而黃時發寒熱不食而但飲乳及飲水不止衆醫以為潮熱用退熱藥不愈又用止渴藥反吐甚請乙至乙曰此乃癖也與白餅子下之復補脾乃以消積丸磨之果愈或問何以故乙曰不食但飲乳者乃食伏於胃脘內不能消故令發渴服止渴藥吐者衝於脾氣逆不得下故也下之乃愈又錢乙論小兒癖癥由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或常

而衰與潮熱相似不早治之必成疳勞以其有癖癥則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多則蕩滌腸胃亡失津液脾胃不能傳化水穀肌肉羸細益不能食遂漸羸瘦而成疳也錢乙所用之方本集載之及脾胃虛衰米穀不化下利者已具于前瀉門之下外合用諸方叙後

[illegible]丸 治五積六聚 巴豆去皮 大戟炒錢研各

右二味同入銚內油炒焦黃為細末糊丸麻子大每服三丸量病實大小加減與服臨卧

米飲下乳食前

三棱汁 治諸氣積氣聚氣癖

右以京三棱取汁作羹粥米麵任為與乳食之每日取棗大與兒喫大者漸加之又治十歲以下至百日兒無辜[illegible]

妨功不[illegible]

三棱煎丸 治氣積氣聚氣塊痃癖水[illegible]

豚[illegible]各一兩五錢又一切諸般氣滯塞治

京三棱[illegible]

芫花 一兩[illegible]

右件上二味入磁器內以米醋五升浸[illegible]閉口用炭火煮之[illegible]盡醋炒元花至醋盡[illegible]乾為[illegible]焙乾為末醋煮糊丸菉豆大每服[illegible]生薑湯下乳食前更量大小加減

薑橘丸 治乳哺失宜脾胃不和

右以好陳橘皮不拘多少湯浸陳者佳焙淨去白焙乾為細末每五兩入生薑末三兩和勻煉蜜丸如麻子大每服三四十丸米飲下無時更量大小加減與服

調中散　治乳哺冷熱失宜脾胃不和
木香一兩剉　人參去蘆一兩　青皮去穰一兩
丁香半兩　白朮半兩　白茯苓半兩
大腹皮半兩剉　甘草半兩炙
右為細末每服一錢水一小盞入生薑三片
煎至五分去滓服無時
益胃散　治如前
白朮　沉香各半兩剉　白芍藥剉　人參剉去蘆　當歸去蘆洗焙　木香
蓬莪茂炮剉　宿砂仁各一分
右為細末麵糊和丸黍米大每服十粒至二十粒
湯送下無時
楠木汁　治胃冷正氣
右以楠木皮煎熟服之
益兒丸　治胃冷氣不和食不消化亦治疳氣
神麴炒黃　白蕪荑去扇炒各一兩　黃連去須一兩
陳皮　木香各半兩
右為細末豬膽汁和藥末成劑再入膽內繫
口定以漿水煮數沸取汁和丸菉豆大每服一
二十丸米飲下腹脹木瓜湯下無時一方有
百子　蘆薈各半兩

益脾散　治脾胃虛冷腹痛不利全不入食
陳皮一兩　青皮去穰半兩　訶子肉半兩
甘草半兩剉炒　丁香二錢　乾山藥三兩
右為細末每服二錢水一盞入生薑二片棗
一箇同煎至五分去滓溫服無時
消食丸　治傷飽乳食不化壯熱腹脹疼痛
木香半兩　枳殼去穰麩炒黃　當歸去蘆
代赭石火煅紅米醋淬不計遍數以手撚得碎為度
朱砂研水飛各半兩　巴豆一分取霜
右為細末糊丸黍米大一歲兒一丸溫水下
乳食前服
大麥麵　治乳食過飽煩悶腹脹但欲睡
右以大麥生麵水調服一錢如無麥蘗亦得
如無只用白麵炒微香調服一錢小兒食不
知飢飽但燒糞二枚為末服之
香橘丸　治宿食不消癖滯
木香　陳橘皮各半兩　牽牛子炒黃取末一分
白朮一分　草豆蔻仁一分麵裹煨　姜黃一分
右為細末滴水和丸黍米大每服十粒葱白
湯下大小便秘澀不通乳食前服之

快膈丸 治宿食不化心腹脹滿少□□乳
食 青皮（溫湯浸軟去白焙乾秤）一兩
胡黃連二兩 蓬莪茂（一兩炮） 巴豆（五十粒去殼）
右為細末麵糊和丸黍米大每服三五丸乳
汁下大者白湯下量大小加減乳食前
小[illegible]射煎丸 治宿滯不化滿悶身熱
烏梅（不連核去仁） 巴豆（二十一粒去殼并心膜）
丁香二十个 胡椒四十个
右為末醋糊為丸芥子大每服三四丸飯
下臨卧

消乳丹 治傷乳停滯能消乳積化宿滯大妙
蝦蟆十箇燒灰 木香一兩 蓬莪茂一兩半炮
青皮去穰一兩 青黛一兩 肉荳蔻（麵裹煨去）
麵一兩 膩粉二錢 續隨子一分炒 射香（研）
右為細末麵糊和丸黍米大每服五七丸乳
汁下無時
蚵稍丸 治乳食所傷涎痰壅滯諸般積聚
急驚食癇
黑鉛（二錢以水銀二錢結砂子） 輕粉二錢 粉霜二錢
天南星一分 木香四錢 白丁香（四錢炒） 青黛二錢

全蠍一錢去毒 乳香一錢 巴豆霜一錢半 滑石二錢
射香半錢 腦子半錢
右為細末麵糊和丸黍米大每服五七丸乳
汁或米飲下治驚風搐搦者更入天麻白附
子各二錢此藥與千金紫丸同然効更妙
大真珠丸 治[illegible]
輕粉三錢 夏麴末一錢 滑石末三錢
全蠍七个 巴豆（十四个去皮膜出油取霜） 天南星末二錢 射香[illegible]
右為細末蒸餅和丸菉豆大一歲兒一丸煎
湯送下乳食[illegible]

小真珠丸 治宿食凝滯不消乳癖積聚大小
便秘澁腹脹氣悶取癖癥中之積
木香 白丁香直者 丁香各半錢
滑石末二錢 巴豆（十四个去皮膜末從一宿研極細）
輕粉（半錢留少許為衣）
右細勻以濕紙裹米飯燒取中間軟者和
丸麻子大一歲兒一丸炮皂子湯放溫送下
挾風搐秘澁難動者先服涼藥一服乳癖者
虛實加減丸數臨日臨卧更服
[illegible]湯丸 治諸般積癖腹脹頭疼

天南星末二錢匕 白附子末二錢匕 滑石末二錢匕
全蝎七个 輕粉一錢 朱砂一錢半研
巴豆二十四个去皮心膜出油盡取霜
右為末麵糊和丸黍米大每服三五丸葱湯
送下臨卧
水晶丹 治一切積癖及百物所傷
天南星一錢 滑石一錢 水銀粉半錢
蕪荑仁去扇半錢 巴豆十四个去皮膜取霜
右為細末爛飯和丸菉豆大每服二三丸
其湯泡生葱湯送下服時須令空心不可與

乳食放稍飢臨卧服利過只[illegible]便食
果子等物以藥補之
比亭丸 治一切積癖黃瘦
比亭一錢匕末 朱砂一錢匕末 膩粉一錢
牙硝一錢匕 巴豆二十个取霜
右同匀細末用蒸餅劑裹藥煨熟去焦硬者
取中心軟處近藥潤者用藥和劑如硬滴入
水得所丸菉豆大每一歲兒一丸荆芥湯下
乳食前
消堅丸 取積癖下痰涎隔實消食乳癖

硇砂一錢末 水銀沙子兩皂子大 明膠五錢末
巴豆霜一錢 輕粉一錢 細墨少許
右同為細末麵糊和丸麻子大一歲兒一丸
[illegible]水下食後
妙丸 取虛中積滯化痰涎乳癖
白丁香半錢 朱砂一錢水飛 定粉半錢研
粉霜一錢半 輕粉一錢 射香少許
右為末粟米飯和丸黍米大捻作餅子如大
紫色粟米飲下一餅乳食前
妙香丸 取虛中積及治發寒熱心腹脹滿疼

痛 辰砂一兩水飛 牛黄 龍腦
射香各一分 金箔十四片 粉霜 膩粉各一分
蠟二兩 巴豆一百二十粒去皮膜出油取霜
右於銚子內先鎔化蠟入巴豆霜拌匀及入
諸藥攪匀和劑逐旋丸小旋當旋丸麻子大每
丸米飲下要藥勢緊合捻冰扁若兒大或疾
重者加之皆用針刺一小孔以行藥力如
取積癖丸菉豆大治吐逆下消中虛煩積
滯丸妙
遼砂丹 取虛中積滯及治臟腑虛滑久痢

取轉裏急後重久積惡痢或赤或白不止神妙
無比　通明辰砂（顆塊有墻壁者一分）
通明硇砂（一錢各研細）
右件研細用蠟半兩先於盞內鎔化成汁次
去皮全者巴豆二十一粒入內煎至紫色漉
巴豆出研細與上二味拌勻將蠟用三分中
取一分再鎔成汁傾藥於內急攪令勻下火
凝冷刮出成劑磁合貯之如用取即綿手三
丸菉豆大濃煎甘草湯放冷送下臨卧時
久積病大者藥隨病共下小可病輕者不動

便安治暴痢惡痢濃煎艾湯先呷三五口候
冷下藥治水痢者冷水下兒大稍增丸數
蒜貼膏　治乳癖　石燕子（一个）　半夏（各等分）
右為末用蒜一頭杵爛攤在舊緋絹帛子上
比兒患處大小煎作餅子捻藥上貼患處候
病兒口鼻中蒜氣時揭去縮了作效更不得
喫藥
神應散　治如前　硫黃（栗子大一塊）
鵬砂（皂子大一塊）　鵓子（一个去殼）　蜜陀僧（皂子大一塊）
右為細末每服半錢乳汁調下服了

後處卧少時當取下黑物效
丁香餅子　治如前　大丁香（二錢）　蜜陀僧（一錢研）
木香（一錢半）　硫黃（一錢半）　白丁香（一錢揀直而頭尖者）
硇砂（半錢研）　甘草（一錢半炙）　射香（少許）
右為細末湯浸蒸餅丸菉豆大捻作餅子每
服一二餅乳香生姜湯下乳食前
救銀丸　治如前　水銀（一錢用錫與結沙子）
續隨子（四十九个去殼）　白丁香末（一錢）　膩粉（一錢匕）
麝黃白（各一錢）　巴豆（十四个去皮膜出油盡）
右為細末棗肉和丸菉豆大一歲兒一丸溫

水下乳食前
丁香散　治如前　黑丁香（七个）　蜜陀僧
硫黃　白丁香（各一分）　肉豆蔻（一个麵裹燒去麵）
右為細末每服半錢油木瓜調下乳食前
白丁香散　治如前　白丁香（四个直者）
石燕子（一个火煅醋淬七次）　硫黃（一皂子大）
膩粉（十个）　蜜陀僧（半兩）　黑丁香（二十一个）
右為細末無料分作十服用麵絲湯調下或
煮麵湯亦得服了取下如蝦蟇胎之類惡物
是效

三稜散 治奶癖結塊久服藥不差
京三稜（一兩炮剉碎） 鱉甲（一兩醋炙去裙襴）
赤茯苓（去黑皮一兩） 白朮（半兩） 木香（半兩）
枳殼（麩炒去瓤半兩）
右為細散每服一錢以水一盞入生薑少許煎
至五分去滓溫服不計時與也
聖餅子 治乳癖宿瘦 粉霜（一分） 硇砂（一分）
膩粉（五分） 石燕子（一个火煅） 玄胡索（三分去皮）
巴豆霜（一分）
右為細末入生麪一大錢拌勻滴水和劑分
十二處捻作餅子用刀子煿熟每服一餅滴
皂子湯下
鼠肉汁粥 治諸癖
右以鼠肉煮汁作粥與食
聖劾丹 治癥結癖積久不差
當歸（去芦一兩） 木香（一兩） 桂心（一兩）
甘遂（一兩浸炒黄色） 朱砂（一兩研水飛）
京三稜（半兩炮裹搥剉） 鱉甲（半兩塗酥炙黄去裙襴）
桃仁（一分湯浸去皮尖研） 巴豆（二十个去皮
心膜用紙裹壓去油研

右為末拌勻細研用黃蠟（一兩）慢火鎔化入
藥攪勻成膏丸黍米大一歲兒一粒二三歲
者二粒四五者三粒六七歲者五粒温米飲
下乳食前
大腹湯 治癥癖腹脹小便不利
大腹皮（一兩剉炒） 檳榔（半兩） 枳殼（麩炒去瓤半兩）
人參（去芦半兩） 知母（半兩） 陳橘皮（半兩湯浸去白焙）
甘遂（一分慢火煨令黄）
右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去
滓放温服無時
治幼小胎中宿熱乳母飲食麄惡及多辛苦
乳汁不起兒乳哺滯不為肌膚心腹否滿萎
黄瘦瘠四支萎瘁服之充悅
芍藥（二兩半） 大黄 人參（去芦各一兩）
柴胡（去芦二兩） 鱉甲（酥炙去裙襴） 茯苓（各一兩半）
甘草（半兩） 乾薑（半兩有熱者去乾薑用枳實麩炒）
右為末煉蜜和丸大豆大一歲已下兒服一
丸上者二丸乳服
牛黄鱉甲丸 治幼小癖實壯熱不食不消中惡
忤氣 牛黄（半兩） 鱉甲（一兩酥炙去裙襴）

麥麴炒 柴胡去芦 枳實麩炒 大黄煨
芎藭各一兩 厚朴去皮姜製 茯苓 桂心不火
芍藥 乾姜各半兩炮
右為末煉蜜為丸如小豆大以意量大小與
服日二服無時
丁香散 治小兒妳癖一服取効不動臟腑不
損胃氣 胎上硫黄一豪大塊 丁香二十一个
密陀僧棗大
右研細量大小臨卧以荊芥湯調下來日下
黑物乃病故也未不再發

治小兒乳癖脇下結塊不消 膩粉一錢
雄雀糞一分微炒兩頭尖者是
右同研勻細去皮棗肉和丸粟米大新汲水
下一丸取下惡物是効更量大小壅實用之
治小兒閃肭成癖腹大瘠喘
以鸛雀脚骨及觜煑汁服之亦可燒灰存性
研為末飲服
治小兒積癖髮黄羸瘦及生瘡疥瘂
以生枌楡杵爛醋和傅上若癖移則就傅之
以苦瓠未破者煑令熱解開熨之亦入

在內熨之
治小兒乳癖 橘皮湯浸 青皮去穰
牽牛各一兩三分半生半熟末
右用蒜一顆每瓣入巴豆一粒煨熟去巴豆
研如泥和藥末丸豆大朱砂為衣每服一丸
細嚼消送下一方用蒜去青皮同巴豆研爛
和丸臨卧以茶清下一丸更量大小加減乳
食前

衛生總微論方卷第十三

小兒衛生總微論方卷之第十四

心腹痛論

小兒心腹痛者由臟腑虛而寒冷之氣所干邪氣與臟氣相搏上下衝擊上則爲心痛下則爲腹痛上下俱作心腹皆痛更有一證發則腹中結痛乾啼無泪腰曲背弓上唇乾額上有汗此名盤腸内吊之痛亦由冷氣入臟所爲也今叙諸方于後

木香丸　治心腹痛及脾痛

木香一分　蓬莪朮一分　茯苓去黑皮半兩　檳榔半兩　當歸去蘆一分　陳皮一兩　黃連

右爲細末酒糊丸黍米大每服五七丸柳枝湯下不拘時候

蓬莪散　治氣刺心腹痛

右以蓬莪朮炮熟趁熱剉爲細末每服一錢熱酒調下無時

寬中湯　治心腹疼痛不可忍悶亂啼哭不止

良薑　木香各半兩　丁香　桔梗去蘆

青皮去白炒黃　甘草炙各一分

右爲細末每服半錢溫酒調下無時

當歸木香丸　治如前

當歸去蘆一兩　蓬莪朮一兩煨剉　木香半兩　人參去蘆半兩

桂心不見火半兩　黑牽牛一錢炒微黃

右爲細末麵糊和丸黍米大每服十丸生薑湯下無時

當歸丸　治腸胃冷氣而痛啼哭不休

當歸去蘆　芍藥等分

右爲細末麵糊和丸菉豆大米飲湯下不拘時候

乳香湯　治如前　木香　五灵脂去砂石

乳香各一錢別研　天南星炮中心末一錢

右爲細末同研匀每服半錢水半鍾生薑一片煎至三分去滓溫服無時

溫胃丸　治腹痛哭不止

人參去蘆一兩　白朮一兩　木香一兩　良薑半兩

五味子去枝梗　當歸半兩

右爲細末麵糊和丸黍米大每服十丸米飲湯下無時

橘香湯　治如前　青皮去穰一兩炒　吳茱萸洗焙炒

木香一兩　當歸去蘆一兩　乾姜半兩　丁香半兩

右為末每服一錢水八分生薑二片煎至五分去滓稍熱服無時

烏藥散 治乳母冷熱不調致壞乳汁因心飼兒致兒心腹疼痛或時下利但令乳母服藥調和乳汁哺兒

香附子炒去毛 良薑 赤芍藥 烏藥各等分

右為細末每用一大錢納水各半盞煎至六分去滓溫服無時兒能服藥者並與之

鯉魚腸 治腸胃中有蟲而作疼痛

右以鯉魚腸菱食之

鈎藤膏 治盤腸內吊腹痛

乳香研 沒藥研 木香 薑黃各四錢

木鱉子仁十个

右為細末煉蜜為劑收之一歲兒半皂角子大煎鈎藤湯化下無時量大小加減以用之

香散

魏香散 右以鹽水化阿魏一錢去砂石浸蓬莪朮半兩一宿夜取出焙乾為細末每服半錢煎米飲紫蘇湯調下空心服

[illegible]丸 治盤腸氣痛日夜叫啼不止

右以阿魏為末用大蒜半瓣大炮熟研爛和末丸麻子大每服五七丸煎艾湯送下無時

乳香蠍梢丸 治盤腸內吊痛不可忍

乳香一錢 蠍梢十四个 沒藥半錢 沉香半錢

右為細末煉蜜和丸黍米大嬰孩三丸一歲兒五丸三歲兒七丸乳香湯下不拘時候

桃符丸 治如前

銀硃一錢研 乳香一錢研 大蒜一顆煨熟研爛為膏

右上二味和勻入蒜膏再研硬軟得所丸黍豆大每嬰孩三丸半歲五丸一歲七丸二三歲七丸薄荷湯下無時

腹脹論

小兒腹脹有虛有實皆因[illegible]動於脾胃致脾胃虛而氣攻所作也實者悶亂喘滿治可下之錢乙用紫霜丸白餅子虛者不喘治不可下又不可以丁香木香橘皮荳蔻大溫藥治之以脾胃虛氣未出故令腹脹而不喘只好用藥使上下分消其氣則愈錢乙用塌氣丸若誤下之則脾虛氣上附肺而行脾肺子母皆虛也肺主目胞腮之類脾主四肢色黃虛甚則目胞腮頰[illegible]黃

一訝脹錢乙用塌氣丸若虛氣已出附肺而行
□□胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣小兒
多為虛實脾虛則不受寒溫服寒則生冷服溫
則生熱當識此勿誤也胃久虛熱多生疸病或
引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣上行於四肢
而目腫若水狀腎氣浸浮於肺即大喘也錢乙
亦用塌氣丸未愈漸加丸數病愈後面未紅者
虛衰未復故也若治虛腹脹塌氣丸未愈腹中
有食積法糞小便黃時微喘脉伏而實飲食
食者亦可下蓋脾初虛而後有積法也所治宜

先補脾後與下之下後又復補脾即愈也若不
先補而便下之則大虛矣又不可補肺恐生虛
喘也錢乙所用方本集藏之外錄諸方于後
家寶塌氣丸　治小兒啼哭未定或氣急未調
遂以乳飲或寒冷相干腹脹氣急乳食不化
巴豆十片　胡椒十粒　丁香十个　青皮十枚□□□□
右將青皮每箇入巴豆一片胡椒一粒丁香
一箇裹了以麻線纏定却裹十箇畢頓銚內
入釅醋一碗煮至醋乾取出細切同諸藥焙
乾為末粟米糊和丸粟米大每三伐下兒二

三丸上者五丸五歲兒七丸七歲兒十丸米
飲湯下無時
褊銀丸　治痰涎氣壅鬲實上熱乳食停滯腹
脹喘急　巴豆（去皮心膜研）　好墨（八錢研）　射香（研半錢）
水銀（半兩用鉛二錢半結沙子）
右將巴豆霜與墨再研勻次入沙子射香又
拌研至細勻以陳米粥和丸菉豆大捻褊一
歲兒一丸二三歲三丸煎薄荷湯放冷送下
不得化破食後服
厚朴丸　治風冷寒邪客於藏腑腹脹滿悶氣

不宣通　厚朴（去麤皮薑汁炙）　丁香一兩　木香一兩
白朮一兩　青皮（去白半兩）　牽牛子（一斤炒）
右為細末煉蜜和丸菉豆大每服十丸煎陳
皮湯下無時
分氣丸　治腹脹腹滿　巴豆（十个去皮及心膜出油）
木香一錢　附子（一隻重半兩炮去皮臍）
右為細末麵糊和丸麻子大每服三二丸熟
水送下
又方治腹脹（又名塌氣丸）
歇（半兩）　胡椒一兩　木香半兩　巴豆（一分去殼出油）

右爲細末麵糊和丸黍米大每服三五丸乳
白湯下無時
胡粉散 治腹脹
右以胡粉鹽炒色變以摩腹上或以車轂中
脂和輪下土作丸吞之
韭根汁 治如前
右杵韭根汁和猪脂煎服或燒父母指甲灰
乳頭上飲
半夏丸 治腹脹及暴腹脹欲死
右以半夏湯洗少火炮爲細末酒和丸粟米

大每服三五丸兒小者 汁下大者生姜湯
或米湯下未差加之日二服只用末貼臍亦
佳
又方 治心腹脹滿煩悶欲死
右以雞子殼燒不滿服一錢或半錢
褟氣丸 治脾胃氣虛腹脹滿悶
全蝎 黑牽牛 蘿蔔子
陳皮 青皮 方三稜
蓬莪朮
右爲細末麵糊和丸蘿蔔子大每服一二十

丸生姜湯下無時
塌氣丸 治腹脹氣喘如腫
胡椒 草蓬一分 黑牽牛 木香
右爲細末糊丸菉豆大每服五七丸姜湯送
下無時
塌氣丸 治脾虛腹脹或面目四肢發腫
胡椒 蝎尾
右爲細末麵糊和丸粟米大每服五七丸至
一二十丸陳米飲下無時量大小加減一方有
木香一錢 一方全蝎一枚胡椒十粒同爲末

米飲調下
五百丸 治氣虛腹脹 胡椒
丁香 黑牽牛 蘿蔔子 各一百粒
右爲細末薑汁和丸菉豆大每服
白朮膏 治脾胃不和腹脹氣痞小便不利
白朮 白茯苓 人參 滑石 澤瀉
右爲末煉蜜和膏每用
豆蔻散 治腹脹煩渴小便少而吐瀉
白滑石 三分 丁香 半分 肉豆蔻
右爲細末每服一字或半錢米飲調下

□□丸　治陰陽氣痞不通腹脹脇悶嘔吐不□
瀉手足時厥　硫黃　水銀[illegible]
木香　當歸[illegible]　大黃[illegible]右為末研
勻煉蜜和丸櫻桃大每服一丸生薑湯化下[illegible]
木香丸　治小兒氣脹腹滿不下食能去惡氣
木香　訶梨勒（煨去核各等分）　右為末以砂糖
木□湯和丸菉豆大每服一二十丸米飲下[illegible]
葛根汁　治小兒熱氣痞滿腹脹
以生葛根杵爛絞汁飲下
桂心丸　治小兒食雜果腹脹氣急
以桂心為末飯和丸菉豆大熟水下五丸未
差再服不拘時候
治嬰小腹中脹滿　以父母指甲燒灰乳上服
治小嬰腹中脹滿或未乳服藥者　以乾姜[illegible]
不以多少濃煎湯熏下部通手時洗肚[illegible]
治小兒腹脹滿急不能服藥
以生姜爛熱綿裹內下部冷即易
塌氣丸　治小兒腹脹　丁香一錢
蘿蔔子（半兩用巴豆一分同炒至黑色去巴豆不用）
右為末水浸蒸餅和丸菉豆大每服五丸橘皮湯下[illegible]

治小兒上熱痰悶氣壅腹脹滿
以蘿蔔杵汁量大小加減服
腫脹病論
小兒腫病有二一者氣[illegible]因脾胃虛而氣攻腹
[illegible]脹[illegible]行時藥下之致[illegible]氣上附於肺行入四
肢面目而作腫也并氣亦然二者水腫因上焦
[illegible]渴[illegible]脾胃[illegible]而不能約制其水腎反
乘脾[illegible]行上附於肺主皮膚脾主四肢故
水溢[illegible]四肢皮膚而作腫也甚則腎水浸浮
於肺則[illegible]大喘為難[illegible]也
訶肺散　治小兒[illegible]欬嗽喘氣逆嘔吐面目
浮腫　白姜蚕[illegible]　玄胡索[illegible]
右為細末每服一錢或半錢煎淡薑汁放溫
調下如嬰孩乳[illegible]半字不拘時候
熊膽丸　治小兒[illegible]氣脹瘦肚腫哭水
熊膽　雄黃[illegible]　佛頭青[illegible]麝香[illegible]
桂心　人參[illegible]　右拌研勻糯米粥和丸
菉豆大每服[illegible]丸米飲下食後
[illegible]丸　治小兒[illegible]氣腹脹四肢肺滿氣急喘
[illegible]不利[illegible]　木香　青皮　蘿蔔子[illegible]

牽牛子（各取末二錢半） 右為末糊丸黍米大

薑湯下二三十丸食後

緋綬丸 治小兒疳[illegible]黃瘦肚大手腳浮腫

川楝子（去核） 芎藭 [illegible] 四味[illegible] 龍膽 [illegible] 巴豆 [illegible]

為末糊丸麻子大硃砂為衣每服十五丸或二十丸 [illegible]

又方 治小兒手足身體浮腫 以小便澁[illegible]之之良

又方 治如前 以巴豆五十箇去皮心水三

升煮取一升綿蘸拭腫上隨手即消

又方 治小兒渾身頭面及陰囊虛腫

以[illegible]子一兩去殼[illegible]蜜半兩炙盡為細末

每服一錢米飲調下食後只三服效

內消丸 治小兒頭面手腳虛腫

青皮[illegible] 巴豆[illegible] 木香 防己 丁香

右以青皮巴豆同炒[illegible]巴豆焦黑去

巴豆不用將青皮諸藥為細末蒸餅和丸麻

子大每服三五丸[illegible]小加減兒孩兒煎陳

米湯[illegible]女孩兒煎艾葉湯下七八歲者十丸（[illegible]）

紅綿散 治渾身虛腫氣喘而不食

[illegible] 檳榔（一錢） 輕粉（半錢）

右為末每服一字或半錢薄荷煎湯調下一

服利止後服用家宝觀音散或人參散調補

忌生冷堅硬之物

通草散 治一身黃腫透明

通草（濕者炙乾為末） 木豬苓（去黑皮為末各等分）

右為細末再入研細去土地龍射香少許每

服半錢或一錢米飲調下神效亦治腎腫

聖餅子 治氣腫 大戟子（半兩） 甘遂末（一分） 牽牛末（一錢）

右拌勻每用半錢以白麵半錢水和作餅子

如錢大煮令熟放冷細嚼薑湯下（小者一餅大者[illegible]）

金華散 治水氣腫滿通身明亮 大黃（末一錢）

牽牛末（四錢） 朴硝（研末八錢） 巴豆肉（五個研）

右同拌勻每服一字生薑蜜水調下（[illegible]）

葶藶丸 治水氣腹腫小便澁滯

右以葶藶子半兩微炒杵如泥入棗肉再杵

和丸（如梧桐子大）每服五丸棗湯下空心臨後

郁李仁丸 治一切諸腫 郁李仁（湯浸去皮）

檳榔（半兩） 牽牛子（微炒） 右為細末滴水和

丸每服十粒煎葱白湯下空心服

海蛤散 治身體腫滿大小便不利

海蛤 桑白皮（各一兩） 漢防已（半兩） 赤茯苓（去黑皮 半兩）
白术（半兩） 甜葶藶（紙上炒） 川朴硝 木猪苓（去黑皮 各一分）
右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓
温服乳後食
杏仁膏 治小兒卒然面目浮腫杵杏仁膏傅之
治小兒渾身虛腫及頭面陰囊並腫 木香（一兩）
檳榔（…以紫黄…去…） 青皮（…去…）
右同為末每服半錢或一錢陳米飲調下食…
治小兒因瀉痢後身躰虛腫 硫黄（一兩） 焰硝（…）
右同研細蒸餅和丸蘿蔔子大蚌粉為衣（每服十丸米飲下…）

虛羸論
小兒虛羸者由諸病之後或誤行轉藥或吐而
利致脾胃虛弱不能傳化穀氣飲食不入肌
膚消瘦乃成虛羸也有冷者時時下痢唇口
青白有熱者身躰温壯肌肉微黃此冷熱虛
羸也錢乙治冷者木香丸夏月不可服如有
症則少服之治熱者胡黄連丸冬月不可服
如有症則少服皆錢乙治齊即其人好…
散旅有子忽患臟熱齊白取青金膏三服…
一服…之服畢至三更瀉五行其子困睡…

…脾多生驚又與一服再瀉兩行
…而身熱齊言尚有其熱又欲與青金膏…
妻曰屢藥瀉十來行未…生病…召乙…
之乙曰已成虛羸也先多煎白术散時時與
服後用香瓜丸十日愈乙又治朱監簿子五
歲發熱腦亦昏紅眼醫以前藥…曰此心熱
也遂用牛黃圓及以一物瀉心湯下之來日
加無力而不能食又下之乃使利黃沫召乙
看之乙曰此心經虛而有留熱在内必被涼
藥下之致此虛羸也乙先用白术散生胃中

津液以生犀散治之朱曰大便黃沫何如乙
曰胃氣正即瀉自止此虛熱也朱曰醫用瀉
心湯何如乙曰瀉心湯者黃連一物耳性寒多
服則利能寒脾胃也坐久前醫至曰固…已
曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不愈又加
面黃頰赤五心煩熱不食而引飲前醫曰既
虛熱何大便黃沫乙笑曰便黃沫者服瀉心
湯多故也乙復與胡黃連丸愈乙又治一子
夜發熱曉即如故前醫作熱治以涼藥…之
不愈其候多涎而喜睡醫又以鉄粉丸…之

此病益甚至五日大引飲香白不食召乙者
之乙曰此駒皆有熱不可下之若下之則頻
脾胃致虛羸也乃用白朮散更以朮一兩煎
藥汁三升使任意取足服朱曰飲多不作瀉
否乙曰無生水不作瀉縱瀉亦不作怪也但
不可下耳朱曰先治何病乙曰止渴治痰退
熱清裏皆此藥也至晚服盡乙看曰更可服
之又作三升服盡稍愈第三日又作三升與
服其子不渴無涎遂投阿膠散二服而安乙
上三證皆因誤行轉下之禁亡失津液致虛

虛發渴不食而成羸瘦錢乙並先煎白朮散
與服以生胃中津液得胃氣正然後各治本病
爲治也如齊郎中子臟熱渴香瓜丸朱監簿
子心虛熱與生犀散胡黃連丸次子肺怯與
阿膠散並皆安愈故附於此舉凡轉下過多吐
瀉等諸病煩渴者皆津液內耗也不問陰陽
煎錢乙白朮散使滿意取足飲之彌多彌好
今特爲詳而論之使學者法焉錢乙所用方
本集載之外治虛羸諸方具于後

丁香黃耆散 治脾胃虛弱不能食漸致肌瘦虛羸

丁香　綿黃耆剉　人參去蘆　白朮　當歸洗焙
鱉甲醋炙焦去裙襴各一兩　胡黃連　甘草炙各半兩
右為細末每服一錢水一小盞生姜二片
同煎至五分去滓溫服食前

集香煎 治如前　丁香　沉香　木香
藿香去土　厚朴去粗皮生姜汁製　白朮　白茯苓　白豆蔻去皮
右為細末入研細射香一錢拌勻以水一升
蜜半斤大棗三十枚生姜二十片於銀器中
慢火熬成膏去姜棗不用攪勻頻當風處陰
乾每用皂子大米飲化下乳食前

國老丸 治瘦瘁虛羸瘦少氣
右以甘草炙焦黃為末煉蜜和丸菉豆大每
服五丸溫水下日三服一歲兒五丸已上者
七八丸以意加減無時

欬嗽論 咳欬上氣附

夫欬嗽者內經以爲肺感微寒而所作也若七
八月之間肺氣旺盛之時病嗽者其病必實非
久病也其症面赤痰盛而身熱治當下之錢乙
用葶藶丸若病久者不可下若十一月十二月
欬者乃傷風寒嗽也風寒從背第三椎肺俞穴

今嗽而吐痰宜以麻黃輩發散後用涼藥壓之

入其瘡頰悶惡風憎寒晝輕夜甚治當汗之錢乙用麻黃湯若有熱症則面赤飲水涎壅咽喉不利錢乙兼用甘桔湯若嗽於五七日間其病身熱痰盛唾黏或痰盛不甚喘面赤或時飲水錢乙亟以褊銀丸下之若肺盛嗽而後喘身熱悶亂面腫或飲水不飲水者錢乙用瀉白散若

錢乙治張氏孫兒九歲病肺熱欬嗽前醫以珠犀龍麝牛黃藥治之一月不愈其症欬嗽喘盛悶亂飲水不止全不能食召乙治之乙用使君子丸益黃散張曰本有熱何又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無效乙曰涼藥久則胃寒不能食小兒虛不能食當與補脾候飲食如故即瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食以瀉白散瀉肺遂愈張曰何以不虛乙曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

又傷風寒欬嗽無熱症而但嗽者錢乙用麻黃湯又化痰藥治之若肺虛而嗽有哽氣時時長出喉中有聲者此久病當補也錢乙用阿膠散

昔錢乙治杜氏子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃風寒入肺也風在肺中今嗽而吐痰宜以麻黃輩發散後用涼藥壓之即愈他醫卻以諸藥下之其肺即虛而嗽甚至春三月間尚未愈乃召錢氏看之其候面青而光嗽而喘促哽氣又時長出氣錢曰病困十已八九矣所以然者面青而光乃肝氣旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽者肺之病自十一月至三月久即肺虛痿又曾下之脾肺子母俱虛復為肝所勝此為逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也乙急與瀉青丸瀉肝後與阿膠散實肺次日面青而不光乙又與補肺其嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛唇白如練乙曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛絕肺病不得時而肝勝之今三瀉其肝而肝病症不退三補其肺而肺病未虛此不久生故言死也此症病於秋者十救三四病於春夏者十難救一果大喘而死

又肺氣不足謂寒邪所乘致欬嗽喘滿短氣者治補肺昔錢乙治李轉運孫八歲病嗽而喘滿短氣他醫以為肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各二服治之三日加喘召乙治之乙曰此肺氣不足

邪即便喘渴當補肺脾勿服凉藥李曰已服竹
葉湯牛黃膏乙曰何治也前醫至曰退熱退涎乙曰
何熱所作醫曰肺經熱而生涎乙曰不然生[illegible]
乙曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱[illegible]
治肺而反調心也竹葉湯[illegible]
醫有慚色乙依所論而治[illegible]
又[illegible]
而吐痰涎喘者[illegible]
下之或乙用[illegible]乙用[illegible]
乙治[illegible]

血前醫以[illegible]上攻
當不止請[illegible]之乙[illegible]一大[illegible]以[illegible]
脾藥治之[illegible]此子[illegible]乙曰
肺雖喀血有熱也久則虛[illegible]
當下其涎若使不吐涎爲甚[illegible]能[illegible]又
先驚也痰實[illegible]亦使發搐故依法只宜先下
其痰爲順此治先下後補與前論先補後下其
意相反者經以謂病有緩急治有先後也治病
症如錢乙所以得聖人之旨趣李者宜爲法耳
嗽而吐青白綠水者此胃冷有停飲也乙[illegible]

褐丸下之嗽而吐痰涎乳食者此有傷宿滯不
化也乙用白餅子下之
若久嗽肺虛亡津液者乙用阿膠散補之治嗽
大法盛則下之久則補之風則散之更量大小
虛實意以施治是以慎護小兒須常著夾背心
雖夏月熱時於單背心上當背更添襯一重蓋
肺俞在背上恐風寒傷而爲嗽嗽久不止亦令
生驚若有驚內兒病嗽者十中一二得全亦非
小疾也
又有停飲作痰者由兒乳飲失宜致脾胃不和

停滯其飲不散留結成痰若隨氣上干於肺而
嗽者此爲痰嗽若不嗽者則肺壅不利咽塞喉
涎臟腑寒滯
又脾胃冷熱不調涎不歸胃致涎流口角而[illegible]
於止冷若鼻上色青及大便青白熱者鼻上赤
色及大便赤黃已上除錢乙所用方本集載之
外今敘諸方于後
金華散 治嬰小欬嗽
鬱金 半兩 防風 去蘆叉枝一分炙 半夏 一分 巴豆 二七粒 皂角 一錢
右以水一升於銀器用[illegible]煮令水乾去巴

皂角不用外三味別用溫湯洗淨焙乾爲
細末每服一字二三歲半錢四五歲上者
一錢薄荷蜜水調下不拘時候

藿香散　治不因風寒所得肺胃氣不和而欬嗽

藿香去土一兩　甜葶藶　枳殼二斤去穰麩炒　蛤粉一兩

右爲細末嬰小服一字二三歲半錢米水調
下不過二三服安兒大以意加之無時

紫金丸　治諸欬嗽墜化痰涎

右以葉子雌黃不拘多少研細入鍋子內於
火中燒令成汁候冷取出再研細飲和丸

蘿蔔子大熟水下丸二宜欬嗽

杏仁煎　治小兒欬嗽上氣

右以去皮尖炒黃杏仁一升熟搗用蜜三合
先入一合搗令強次入一合搗如膏又入一合
搗熟每食後用少許頓兒口中燃嚥之日三

生薑煎　治幼小欬嗽

生薑一兩　乾薑六錢炮　桂心一分　甘草四錢炙
杏仁去皮尖炒黃一兩　款冬花去枝梗　紫菀各四錢

右爲末以蜜一兩入藥在內微火上煎之如
飴量大小多少與含化無百日兒如棗核大日二服

款冬花丸　治小兒咳嗽日差夜甚

款冬花　紫菀各一兩半　桂心半兩　伏龍肝一分

右同爲細末煉蜜和如泥每取棗核大傅乳
上令兒吮之漸漸令兒飲一日三次

麥門冬湯　治初生兒十日上至五十日卒得
謦欬吐乳嘔逆暴嗽晝夜不息

麥門冬去心二兩　紫菀去蘆半兩　甘草二錢半　桂枝各一兩

右爲末每服二錢水一盞煎至七分以綿蘸
滴兒口中晝夜四五過仍節乳哺

五味子湯　治小兒風冷入肺咳嗽氣喘面青

喘逆晝夜不息飲食不下

五味子去枝梗　當歸去蘆各半兩　麻黃去節　乾薑炮
桂心　人參去蘆　紫菀　甘草各一分　細辛去苗半分
大棗三枚　右爲麄末每服二錢水一盞煎至半
盞去滓溫服量兒大小

人參半夏湯　治小兒痰涎咳嗽不止

人參去蘆　半夏麯　白朮各半兩　藿香葉去土一分
丁香　杏仁霜各半分

右爲細末每服二錢水一鍾生薑五片陳粟
米五十粒煎至七分去滓時時與服日三

忌醋鹹炙煿生冷

款肺散 治小兒風壅痰盛欬嗽氣急壯熱煩赤悶憒嘔吐面目浮腫乳食減少

白殭蠶 去絲嘴炒 玄胡索 去皮二兩

右為末每服一字或半錢淡虀汁調服之無時嬰孩只乳汁調半字

治小兒咳嗽聲不出

杏仁 一兩湯浸去皮尖另研 紫苑 去芦

右將紫苑末入杏仁汁中更入蜜一合同煎成膏每服半茶匙糯米飲調下無時

皂莢豉湯 治小兒咳嗽 右以皂莢燒灰研細末每服半錢或一錢豉湯調下無時

露蜂房散 治如前 右以露蜂房二兩淨洗去蜂糞泥土以快火燒為灰研每服一字米飲下

葶藶散 治如前 甜葶藶 去油炒 麻黃 去節 甘草 一分炙 貝母 去心 杏仁 去皮尖一分炒黃

右為細末每服半錢水半盞煎至三分去滓溫服

訶子膏 治如前

右以訶子一兩每箇分作兩片甘草一分水一大盞煮至水盡為度焙乾為末煉蜜和丸如雞頭子大每用一大豆許薄荷湯化下無時

生姜浴湯 治如前 右以生姜四兩煎湯沐浴

一捻金散 治風痰欬嗽煩赤痰盛喘促氣急吐嘔腹脹乳食減少 白殭蠶 直者去絲嘴 甘草 炙 玄胡索 去皮一分 右為細末每服一捻虀汁調下嬰孩只乳汁調下半字食後

惺惺散 治傷寒風熱痰壅咳嗽

桔梗 去芦 細辛 去葉 人參 去芦 甘草 炙炒 白茯苓 去皮 白朮 瓜蔞根 各半兩

右為細末每服二錢水一盞薄荷三葉煎至半盞溫服如要和氣更入生姜二片同煎一方更有防風一分

保肺丸 治肺胃受風熱痰盛欬嗽喘促聲不止又治久欬不愈 白殭蠶 去絲嘴炒三兩

山藥 半兩 白茯苓 去皮一兩 紫蘇葉 一兩 藿香 去土 百部 半兩 黃芩 一兩 防風 去芦一兩 杏仁 去皮尖炒一兩 百合 半兩 五味子 去枝梗一兩 右為細末煉蜜和丸如彈子大每服半丸一丸煎桔梗湯化下食後臨卧服

貝母湯 治肺感風邪咳嗽喘滿

貝母去心一兩 半夏一兩白礬湯洗七次焙乾 乾姜半兩炮
麻黄去根節 款冬花去枝梗半兩 甘草半兩炙
右為細末每服一錢水一小盞生姜三片杏
仁一箇去皮尖同煎五分去柤温服不拘時
菖蒲煎 治肺中風邪肩息喘鳴或發欬嗽
石菖蒲一兩寸九節者良 款冬花去枝梗一兩
紫菀去土淨洗焙乾一兩 人參去芦一兩 桂心一兩
右為細末煉蜜和劑入石臼中杵一二百下
丸皂子大每服一粒煎糯米飲化下食後
絳朱丹 治驚風涎痰咳嗽喘滿

天南星二兩炮 半夏二兩湯洗七次去滑 枯白礬二兩半
滑石二兩火煅通赤 鉛白霜一分
右為細末麪糊和丸麻子大硃砂為衣每服
十粒姜湯送下食後臨卧服
人參羚角散 治時氣寒壅咳嗽痰逆喘滿
恃風熱 前胡去芦八錢 桔梗五錢
人參去芦一錢 甘草三錢炙黄 杏仁破去皮尖四十分麩炒
右先將上四味為末入杏仁末拌勻人羚羊角
過每服二錢水一盞煎至七分去柤温服食
後亦能調和五臟六腑進美乳食又治

風熱服尋常涼藥即瀉減食者尤宜與服
油滚丸 治痰盛咳嗽亦治乳嗽
五灵脂末一錢 雷丸末一錢 巴豆三十箇去皮膜取霜
右為細末滴水丸芥子大每服三五丸油滚
井水送下臨卧而服
龍爪散 治涎喘咳嗽
右以猪蹄甲四十九箇洗淨控乾每箇猪甲
內入半夏白礬末各一字入一罐子內封閉
不透烟火煅通赤放冷為細末入研細射香
一錢拌匀每服半錢糯米飲調下空腹

辰砂半夏丸 治寒痰咳嗽
瓜蔞根炙去 天南星湯洗 半夏湯洗七次
乾姜各半兩 右為末生姜自然汁糊丸麻子大
辰砂為衣每服十丸生姜湯下不拘時候
玉珠丸 治痰涎嗽
硝石一分 右為細末滴水丸麻子大每服三 半夏一兩湯洗七次
五丸生姜湯送下不拘時候
百部丸 治肺寒咳嗽微喘 百部焙乾秤三分
麻黄去根節秤三分二味生為末 杏仁四十个去皮尖微炒黄
煮三五沸控乾研細 右同勻細末煉蜜和丸皂子大温

化下二三丸日三服錢乙加松子仁五箇
和丸含化大妙
露蜂房丸 治肺胃虛寒咳嗽喘滿咽逆不食
露蜂房(炙) 蟬殼(去土三錢炒) 蛤蚧(一雙重四錢塗酥炙乾)
丁香 木香 人參(去芦)
雄黃 麻黃(去節根) 馬兜鈴子
五倍子(一錢各) 五味子(去枝梗) 貝母(去心糯)
杏仁(童小便浸三宿去皮尖炒) 半夏麯(各二錢半)
款冬花(去枝梗半兩) 右爲細末煉蜜和丸菉
豆大每服二三十丸生姜湯下日三四服食

利卷十二 百一二

後
紫蘇湯 治風傷肺氣痰喘咳嗽上氣
桑白皮(一兩半) 白茯苓(半兩) 白殭蚕(半兩去絲炒)
甘草(一分炙) 杏仁(半兩去皮尖研後入) 人參(去芦一分)
桔梗(去芦半兩) 白术(半兩) 陳皮(半兩去白)
右爲細末每服一錢水一盞生姜三片杏仁
二箇煎至六分去滓時時温服
白朮五味湯 治氣逆上喘咳嗽
白朮 五味子(去枝梗炒) 人參(去芦)
款冬花(去枝梗各半兩) 細辛(去土葉一分)

右爲細末每服一錢生姜三片煎至四分
滓放溫時時服
桔梗湯 治咳嗽痰壅呀呷咽喘不利
桔梗(半兩) 甘草(半兩炙) 紫蘇葉(半兩去土焙炙)
石膏(半兩) 半夏(半兩湯洗七次) 皂莢(一分燒灰存性)
右爲末每服一錢水一盞生姜三片煎至五
分去滓放溫時時服無時
淡竹瀝 治咳嗽短氣胸中吸吸咯唾稠涎
桔梗(去苦者) 右以淡竹瀝一合服之日三四次
木香半夏丸 治肺胃有寒咳嗽

利卷十四 百十四

木香 半夏(湯洗七次焙乾) 肉豆蔻(麪裹煨各一兩)
藿香(去土) 丁香 白术(各半兩)
右爲細末生姜自然汁和丸黍米大每服二十
丸煎人參湯送下不拘時候
白蜆殼散 治卒然暴嗽不止
右以白蜆殼不拘多少杵研極細每服一錢
米飲調下無時
五靈脂丸 治久嗽漸成羸弱恐變爲勞
五靈脂(去砂土半兩) 蟾頭(一枚酥炙黃) 蟬殼(去土半兩微炒)
款冬花(去枝梗半兩) 青黛(一分研) 雄黃(一分研水飛)

右同研勻細糯米飯和丸黍米大每服十丸
煎人參湯下食後

人參半夏丸　治痰飲咳嗽

人參去芦　半夏湯泡七次　白朮　川姜炮
南星微炮各半兩　右為細末生姜自然汁煮糊和
丸黍米大每服十丸姜湯下月內百晬兒丸
針頭大乳上吮服不拘時候

馬兜鈴　治肺壅咳嗽氣喘大便不利

馬兜鈴　紫蘇子炒　人參去芦各一兩
木香　款冬花去枝梗半兩　杏仁湯浸去皮尖入一分

右上五味先為末入杏仁末拌勻研煉蜜和
丸黍米大每服十丸生姜湯下不拘時候

百合湯　治肺經風寒痰壅不利

百合　紫菀洗焙　白朮　人參去芦各一兩
白茯苓去黑皮　青皮去穰　甘草炙　麥門冬去心各半兩
右為末每服一錢水八分盞竹葉三片薄荷
二葉煎至五分去滓溫服不拘時候

爽神湯　消寒痰滌肺壅清神爽意

白朮　人參去芦　白茯苓各一兩　桔梗去芦
瓜蔞　甘草各半兩　細辛去苗一錢

右為末每服一錢水八分荊芥薄荷各少許
煎至五分去滓溫服不拘時候

蘇香湯　治肺壅消痰涎

紫蘇葉去土　木香　人參去芦各半兩
五味子去枝梗　甘草　陳皮各一錢
右為細末每服半錢生姜自然汁少許荊芥
湯調下不拘時候

蟬殼湯　治肺氣壅滯不利

人參去芦　五味子各一錢　陳皮　甘草炙　蟬殼去土各一錢
右為細末每服半錢生姜湯調下無時

神麴湯　治痰涎壅滯氣不和順嘔吐腸滿悶

神麴兩炒　木香一兩　半夏一兩用姜汁
萋蔻一兩　青皮去穰半兩炒　甘草半兩炙
白茯苓去皮
右為細末每服半錢鹽少許沸湯調溫服無時

白金丹　消肺壅痰實治胸膈不利

桑白皮兩　前胡去芦兩　半夏一兩湯泡七次
白朮一兩　人參去芦半兩　陳皮半兩
甘遂一分炒　右為細末煉蜜和丸黍米大溫
水下五七丸周晬以上一二歲兒三丸已上者

以意量加不拘時候

前胡半夏丸 治風熱痰実肺氣壅滞涎流如

前胡 去芦一両 半夏 一両湯洗七次薑汁浸

文黄 [illegible] 麦門冬 去心一両 川朴硝 半両

右為細末生姜自然汁和丸黍米大每服十

丸煎人參湯下不拘時候

犀角丸 治風熱面赤胃[illegible]不和大小便秘澀

痰実涎盛三焦壅滞[illegible]瘡毒 [illegible]

生犀末一分 人參 去芦[illegible] 黄連 去鬚一両

枳実 麸炒 檳榔 [illegible] 大黄 二両酒浸一宿[illegible]

右為細末煉蜜和丸如麻子大每服五七丸[illegible]

用熟水下未動加丸[illegible]利為[illegible]之[illegible]

治小兒痰壅壯熱諸病

以雞子乱髮煎食久[illegible]於臭服之良

枳殻湯

治痰実壯熱心腹脹満[illegible]不調順不早治為

生[illegible] 枳殻 一両去瓤麸炒 乾姜 半両炮

甘草 半両 前胡 去芦一両 木香 一両

半夏 一両湯洗七次 右為細末每服一錢水一小

盞生姜三片陳皮一片煎至六分去滓温服

不拘時候

温脾丸 治脾胃宿冷口角涎流 若足須[illegible]錢四[illegible]

生姜名曰[illegible] 丁香 一両 木香 一両

半夏 一両用生姜六両同杵爛炒令黄 青皮 去穣半両炒

白术 半両 乾姜 半両微炮

右為末煉蜜和丸黍米大每服十丸米飲下

不拘時候

丁香湯 治如前 丁香 一両 白术 半両

肉荳蔲 麺裹煨半両 半夏 半両白礬水浸一宿焙乾為末

乾姜 半両炮 甘草 半両 人參 去芦半両

右為細末每服一錢水八分姜二片煎至五

分去滓温服不拘時候

治小兒口中涎出 以白羊屎内口中

麻黄湯 治小兒風中肺經喘急肩息氣上不安

麻黄 去根節二両 半夏 [illegible] 生姜 [illegible]

甘草 一両 注心 半両 五味子 [illegible]

右㕮咀每服二錢水一盞煎六分去滓服

馬通粟粒丸 治小兒喘急肩息氣逆脇下

痛寒熱往來不進乳食漸成羸瘦

馬通中粟粒 三分　杏仁 湯浸去皮尖
紫菀 去芦　細辛 去苗葉　石膏
秦艽 去芦　半夏 湯泡七次　茯苓 去皮
五味子 去枝梗各一分
右爲末煉蜜丸小豆大每服十丸生姜湯下
日三服加至十二丸不拘時候

小兒衛生總微論方卷第十五

黄疸論

小兒有身躰肌膚面目悉黄者此黄病也因將息過度飲食傷飽脾胃受熱與穀氣相搏蒸鬱於外脾胃象土其色黄發現肌膚故爲是病也須不可灸灸則熱轉甚矣若身躰痛背膊強大小便澁腹脹滿一身及面目爪甲皆黄小便如屋塵色著物皆黄此疸病也若發渴小便澁腹滿脉沉細爲難治也黄病者稍輕疸病者極重又有自生下面身深黄者此胎疸也因母臟氣有熱熏蒸於胎故也經言諸疸皆熱色深黄者是也若身微黄者胃熱也若但面黄腹大渴而食泥土者脾疳也此二項各在本病具之外並黄疸病叙方於後

三黄散　治黄病

川大黄 一两剉碎微炒
黄芩 半两　黄連 去須各半两　右爲細末每服一錢
水一盞煎至五分去滓放温食後時時服

子芩散　治如前

黄芩　瓜蔞根
茯神 去心白术各一两甘草炙　胡黄連 各半两
右爲細末每服一錢水一盞煎至五分去滓

松柏帝鬼一縛束不得急急如令書了勿令
人知立在兒床下倚前兩畔床立之男左女右
辟邪膏 治客忤及治中惡邪魔鬼氣其候似
癇但目不視上而視脈弦急中之卒暴者立效
降真香剉 白膠香別研 沉香
虎頭骨酥炙 鬼臼去毛 草龍膽去蘆
人參去蘆 白茯神去心內木各半兩
右為細末次入研研飛過雄黃末半兩研細麝
香一錢拌勻煉蜜和丸雞頭子大每服一粒
煎乳香湯化下及丸一彈子大用絳囊盛
之帶兒衣上仍於臥處常燒妙

三疰論

小兒疰病有三一者鬼疰小兒神魂氣弱暴晦
抱持出入無時為鬼惡邪氣所干其候多有卒
痛攣易錯常或心腹刺痛夭矯悶亂欲死面名
中惡甚者卒致於死緩者淹引歲月更互流帶
以至於死又注傍人二者尸疰人腹中有尸曰
尸疰小兒血氣嫩弱邪氣外傷留滯身中尸蟲
穀引相乘為病其候沉沉默默不知的病之處
或寒或熱或心腹悶痛淹引歲月遂至於死又
注人三曰蠱毒疰謂諸毒蟲之中有一能邪
其餘者取為之最名之曰蠱或因人作或因引
注隨飲食入而兒腹中食人臟腑其候心腹刺
痛煩悶欲絕利下無時或便血片急者即死名
曰中蠱之毒緩者淹引歲月以至臟腑乃死又
注傍人今敘諸治方于後

虎頭枕 治中鬼氣為邪氣為魔
右以虎頭骨為枕與兒枕之
千金湯 治小兒暴驚啼絕死因人從外來邪
氣所逐令兒得疾衆醫不治
右以蜀椒左顧牡蠣各六銖碎之酢漿一升
煮取五合分服
豆豉丸 治中惡疰氣寒熱
右以濕豉丸雞子大摩兒腮上及手足心六七
遍又摩心腹臍上旋旋以言祝之了即破其
豉丸有之當有細毛弃道中
又方 治中惡邪眾氣或於痛悶忽然而卒絕
右以生菖蒲根杵爛取汁灌之
又方 治如前 右以羊屎燒烟以熏鼻中
又方 治如前

小兒在並當令兒避之勿見若誤有觸犯並令兒
患客忤或有犯而患者急視其兒口中懸癰
右有腫核如麻豆大者便須刺摘令斷之用綿
纏釵橫頭展去其血兼服諸藥為治

治小兒客忤腹痛夭矯面色變易

以香豉數合水拌令濕擣熟丸作丸子如鷄
子大用摩兒顖上及手足心各七遍又摩
兒心臍上下行轉摩之食頃破其丸視其中
當有細毛即擲弃丸於道中痛乃便止

治小兒卒中客忤塗法

竈中黃土　蚯蚓糞等分

右研細水調塗兒頭上及五心中大良

又方浴法　治如前　以馬糞三升燒令烟
絕用酒三升煮數沸去滓將以浴兒

以豭猪糞二升熱湯灌攪適溫煖浴兒

又方　治小兒客忤服法

以牛口涎塗乳上飼兒

以銅鏡鼻燒令赤內酒中能飲者令自飲不
能飲者含而灌之

治小兒中客忤吐青白沫及乳食皆出腹中[illegible]

氣欲絕者

以桂心一兩為末一二百日兒以半錢用水
一小盞煎至五分去滓溫分四服不拘時候
量兒大小加減

又方治小兒[illegible]

右以白[illegible]服半錢至一錢

又方治如前　右取書中白魚十枚傅乳頭令
兒吮服　[illegible]

又方治如前　右取[illegible]汁以[illegible]與服或以熱
[illegible]一塊[illegible]

麝香乳　治客忤[illegible]

右以麝香以新研細[illegible]調抹兒口中如
大豆許良

又方治如前　右以[illegible]不半錢許服量大
小加減

治馬毒客忤　右以馬[illegible]於兒面前燒令兒聞
其烟氣每日用之取差

治客忤夜啼禳法

右用本家廚下燒殘火柴頭一箇以[illegible]
上朱書云[illegible]

收伏帝鬼一縛束不放急急如令書了勿令
鬼知立在兒床下倚前端衷而立之男左女右

蘇合香丸 治客忤及治中惡邪厲鬼氣其候似
癇但目不視上困視脉弦急中之卒暴者並宜蘇合

麝香 別研 白膠香 別研 沉香
虎頭骨 酥炙黃 鬼臼 各一分 草龍膽 各一分
人參 各一分 白茯神 去心內木各半兩

右為細末次入研飛過雄黃末半兩研細射
香一錢拌勻煉蜜和丸雞頭子大每服一粒
煎乳香湯化下及丸一粒如彈子大用絳絹袋盛
之帶兒衣上仍於臥處常燒妙

三疰論

小兒疰病有三一者鬼疰小兒神魂氣弱見鬼
拘持出入無時為鬼邪氣所干其候腹痛刺
痛嘔易無常或心腹刺痛大嬌悶亂欲死直名
中惡甚者卒致於死緩者淹引歲月更變沉滯
以至於死又注傍人二者尸疰人腹中有蟲曰
尸疰小兒血氣嫩弱邪氣外傷留滯身中尸蟲
發引相乘為病其候沉沉嘿嘿不知的病之處
或寒或熱或心腹悶痛[illegible]引歲月遂至於死又
注人三曰蠱毒疰謂諸毒蟲之中有一能為邪
其餘者即為之最名之曰蠱或因人作或因引
注隨飲食入而兒腹中食人臟腑其候心腹刺
痛煩悶欲絕利下無時或便血片急者即死名
曰中蠱之毒緩者淹引歲月以至臟腑乃死又
注傍人今敘諸治方于後

虎頭枕 治中鬼氣為邪氣為魔
右以虎頭骨為枕與兒枕之

千金湯 治小兒暴驚啼絕死因人從外來邪
氣所逐令兒得疾衆醫不治
右以蜀椒左顧牡蠣各六銖碎之酢漿一升
煮取五合分服

豆豉丸 治中惡風氣寒熱
右以濕豉丸雞子大摩兒腮上及手足心六七
遍又摩心腹臍上旋旋以言祝之了即破其
豉丸看有細毛棄道中

又方 治中惡邪鬼氣或於死忽然而卒絕
右以生菖蒲根杵爛絞汁灌之

又方 治如前 右以羊屎燒烟以熏鼻中

又方 治如前

右視其死者上唇裏弦有粒子如黍米以針挑破之復蘇

又方　治如前　右以皂莢末或生半夏末少許吹兩鼻中

又法　治如前　右凡中惡邪或魘死者不得用灯火照之亦不得近前急喚或與接氣恐被注忤多致殺人但只與痛咬脚跟及足拇指甲邊多唾其面即活

又方　治如前　右以好酒浸綿半盞及手挼其汁灌鼻中

又法　治如前　右以芦管吹兩耳并取病人髮二七莖燃作任手刺鼻中

又方　治中惡鬼邪遊痛如刀刺或胸脇腹中絞痛急切手不可近而按摩

又方　治如前，右以好酒灌鼻孔亦治中惡吐血下血

又方　治如前，右以鹽一錢水一盞攪和令勻服并以冷水噀之取吐即差

又方　治如前　右以蓬莪茂酒研令服

又方　治如前　右取竈下黄土水調服之

又方　治中惡鬼邪為崇及鬼疰尸疰

右以韭仁研碎水煮頓服當吐即差不吐或吐不[illegible]再作或以韭仁汁煮米為粥與食

梟頭散　治尸注沒溺時發寒熱

右以梟頭一枚燒灰杵末新汲水調下半錢

雄黄丸　治尸疰　雌黄研水飛　雄黄研水飛　川大黄煨各銼　鬼臼去毛各一兩　麝香一分研　桃仁三十枚湯浸去皮尖研　白頭翁去苗各半兩　巴豆十枚去皮膜[illegible]

[illegible]不為細末研令勻以羊脂五兩鎔化和藥成膏丸如黍米大每服三五粒荊芥湯下無時

立効散　治尸疰　川大黄一兩燒[illegible]

[illegible]　赤芍藥[illegible]

硃砂一兩別研　[illegible]　麝香一分別研

右為細末拌勻每服[illegible]下無時

神[illegible]　治[illegible]　[illegible]

[illegible]　右件研勻新水調下一錢或半錢吐

出[illegible]物効

[illegible]　雄黄一兩水飛研　麝香一兩研

羚羊角一兩　鬼臼[illegible]　赤芍藥一兩　桔梗半兩

[illegible]

右除[illegible]射[illegible]二味[illegible]勻每服半錢

濃煎甘草湯調下無時
射罔湯　治如前　犀角一兩半　鬼箭羽一兩
安息香一兩　苦參半兩　牡丹皮去心　芫花醋炒為末
雄黃一兩研水飛　射香半兩研
右件爲細每服一錢水一盞煎至五六分去滓
放溫時時服
甘草湯　治中蠱毒欲死
右以甘草半兩剉碎用水一盞煎至五分去
滓溫服當吐出毒物
定靈丹　治中蠱毒　硃砂一兩研水飛

雄黃一分研水飛　黃丹一分研　苦藥子一分
續隨子一分去皮　山豆根一兩　吳蚣一條去頭足炙
斑猫一分去頭翅足糯米炒　巴豆一分去皮膜出油　射香一分研
右爲細末拌研勻於端午日重九日合之最
佳事急者不拘節候忌見雞犬婦人用糯
米粥和丸如梧桐子大若未能語兒中毒即化
能語兒但將藥一粒入門即患兒先開其口
是驗以臘茶清送下壹丸不得齩破須臾
患兒必言心頭作響毒物便下或從口自吐
出或自大便下微即是血若即加以服狀之

形不一兼隨物下凝血中裹之取出丸以
香水洗淨救之一丸可救四五兒口噤者勿
灌之如知用蠱之人即不得根究必弄發不
可治
治中蠱下血欲死　以藍澱汁頻頻服半合
治中蠱每腹中堅痛面目青黃淋露骨立病
無常以桃上寄生為末茶點服日四五
桔梗丸　治鬼疰尸疰蠱疰皆療
桔梗炒　鬼臼　皂莢去皮　巴豆去心膜　附子炮
右為末煉蜜和劑入臼杵萬下每服二丸或

一丸如黍米芥子大卻臥勿側眠至食時
病在膈上者即吐在膈下者即瀉取下惡物
如科斗蝦蟇形或長一二尺下後大虛羸乏
但作鷄羹飲五合與補飲或食粥三四日乃
瘥病未除再服
夜啼論
小兒夜啼者症候甚多其所專者不出三種
者冷謂脾臟冷則腹痛而啼其候面青白手
腹冷口中氣亦冷曲腰而啼不肯吮乳
從生下多啼入夜則甚者此胃寒也亦

聖濟經言積冷而夜啼夜則少陰冷則作痛故
夜間痛甚令兒啼哭也二者熱謂心藏熱則
燥而啼其候面赤小便赤口中氣熱心腹亦煖
仰身而啼不肯吮乳又有多飲驚悸傷眠或臟
中忽然叫啼此風熱也亦曰驚啼心主熱其候
驚故熱則生驚又心為火熱則火旺故熱邪躁
甚令兒啼哭也三者鬼祟謂有鬼氣所持其候
寢臥不穩或作疼痛且鬼祟者陰物也入夜則
旺小兒精神怯弱血氣微弱夜間被鬼所持故
令兒啼哭也外客忤姦動重舌口瘡等病亦皆
能為夜啼其治方各逐本項下具之非若此三
等之為專也今敘方于後

蒜香膏　治冷症腹痛夜啼

右以大蒜一顆慢火煨香熟取出切細研爛
於日中暴或火上焙乾可丸時即以好乳
香半錢研細和蒜入臼杵研極勻丸如芥
子大每服七丸乳頭粘服或乳汁送下食空

當歸丸　治如前

當歸去蘆頭焙乾秤　白芍藥　人參去蘆各一分
甘草炙　桔梗去蘆　陳皮去白　不去白中分

右為細末每半錢水煎時時服之

龍角丸　治小兒五驚夜啼

龍角一分　黃芩半兩　牡蠣一分半火煅研粉用　蚱蟬去土二枚
牛黃小豆大五丸　川大黃一分半

右為末煉蜜和丸麻子大每服二丸大小
以意加減

芎藭散　治小兒夜啼至明則安

芎藭　白朮　防己各半兩

右為末以乳和與兒服以意量大小多少又
以用手搯入兒臍中摩兒頭脊大驗兒三二
十日已裏未能服者以乳和麻子大一丸置
兒口中乳汁送下

又方

交道中土　伏龍肝各一錢

右同研細水調少許飲之

治小兒夜啼　以蟬蛻去土為細末用生蜜
水調塗兒下唇

又方　治如前　男左女右臂上書尸吉二字
更於手心內書天字一箇

又方　治小兒驚啼夜啼
以臘月縛豬繩燒灰水調服

……皮三寸燒灰替乳上飲之瘥如神

灯花丸　治如前能祛邪止痛

亥灯花二十箇　乳香皂子大兩塊

同為末粟米飲和丸芥子大每服七丸桃心湯下無時

萬金散　冶臟寒多緣面色青白遇夜多啼状若神祟

沉香剉　丁香　人參去蘆　五味子去枝梗　當歸去蘆洗焙各一兩　白朮剉　赤芍藥各半兩　桂心一分

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分放溫時時滴口中兒大稍稍飲立效

當歸散　治臟寒氣啼不止久能變癎

右以當歸為末每用小豆許乳汁調抹兒口中日夜三五服

三黃丸　治熱症心燥夜啼及諸熱症

黃芩　大黃去皮濕紙裹煨熟一分　甘草炙各一分

右為細末麪糊和丸菉豆大每服五七丸人參湯下亦治狂啼

又方　治熱煩腹痛夜啼

右以真牛黃少許如小豆大乳汁化服又於臍下書一田字立差

又方　治熱症心燥夜啼

右以灯花三兩顆用灯心煎湯調抹兒口中乳汁送下日三錢氏亦治臟冷夜啼但須[illegible]上令兒吮之又經驗方以灯心燒灰塗乳上吮兒

蠍散　治風熱躁如湯火夜啼不乳

天南星一箇每个中心剜作窩子入朱砂末滿[illegible]

[illegible]

全蠍去毒一錢為末　白附子大者二十个為末　膩粉一錢

右拌研勻每服一字金銀薄荷湯調下

綠霞散　治如前

柏葉一錢末　蝎末一錢　天南星炮去皮為末一分　白殭蚕去絲嘴為末[illegible]　金末一錢　雄黃末一錢水飛

右拌勻細每服一字或半錢薄荷蜜水調下無時

開明丸　治風熱氣啼

右以去节麻黃為末煉蜜和丸小豆大日服一丸熱水下服至五六丸即差

牛黃膏　治兒睡着時忽然作聲哭而吾面赤口乾状若神祟此雖夜啼非名夜啼也乃風熱邪氣乘心臟而作名曰驚啼

真牛黄研　蟬殼去土研　朱砂研水飛
粉霜研飛各分　人參去蘆　甘草炙各半兩
龍腦半分研
右為末拌勻煉蜜和丸雞頭子大每服半粒
或一粒薄荷湯化下乳食後
安神丸　治如前　麥門冬去心
馬牙硝　白茯苓　乾山藥　甘草半兩炒
寒水石各五錢研　朱砂一兩研末飛　龍腦一字研
右為細末煉蜜和丸雞頭子大每服半丸沙糖
水化下無時

虎睛散　治驚癇夜啼
右以虎睛爲細散竹瀝調少許抹口中
又方　治如前　右取東壁土小豆許內口中又
取內臍中
又方　治如前　右以父亂頭髮燒灰研末酒
調服一字更量大小溫水亦得
又方　治如前　右以雞糞白燒灰研末米飲調服
明砂丸　治心神不寧多驚心癇夜啼不止
朱砂通明者　麝香　杏仁去皮尖炒黃好研了半錢
右為末軟飯和丸黍米大每服三五丸以荷湯下

丁香散　治驚啼夜哭發歇不止
右以麝香研細用半字清水調下日二三服
鐵粉丸　治諸驚夜啼
丁頭代赭石半兩火煅醋淬不記遍數以易碎爲度
鐵胤粉一錢　白附子一錢
朱砂一錢水飛　麝香一字研　龍腦一字研
右為細末拌勻蒸棗肉和成膏旋用周歲半
皂子許至二三歲一皂子許金銀薄荷湯化
下不拘時候
七寶輕青丹　治驚啼夜哭及諸熱等疾

螺青半兩　蛤粉一分
鉤藤炒爲末一錢　白附子三字
鉛錫灰二錢　丁香一字炒
天竺黃一錢
右為細末入麝香半皂子許研細拌勻米粉
煮糊和丸豌豆大每服一丸薄荷湯磨水
下無時
又方
治夜間卒驚啼哭似有痛處而不知疾狀
右取雄雞冠血臨兒口上滴少許入口中

良差

又方　治如前

右以乱髮燒灰為末塗乳上令兒吮之當[illegible]

者飲調亦得

瓢帶法治鬼祟邪為夜啼

右取瓢帶懸戶上

又法　治如前

右以胡粉水調二大豆許與服日三

馬骨末　治小兒諸夜啼

右以馬骨為細末傅母乳頭上令小兒吮

服即止

又方　治如前

右取狼糞中骨燒灰研為細末服[illegible]米許

便止

又方　治如前

右取雞窩中草安於卧席之下勿令乳

母知之

[illegible]汗論

小兒有遍身喜汗出者此榮衛虛也榮衛相隨通行經絡營周於身環流不息榮陰衛陽榮虛則津液泄越衛虛則不能固密故喜汗出遍身也錢乙用香瓜丸若睡中汗出不自知覺者此肌肉虛而盜汗也如盜者竊物使人不知覺也又有但額上汗出者此厚衣溫煖將養過宜也上二[illegible]錢乙並用止汗散若上至頭下至項有汗而不曾過胷者此六陽虛汗也六陽脉皆上至於頭故也若上至項下至臍有汗者此胃虛汗也當與補胃[illegible]錢乙以[illegible]子六[illegible]遍身汗出次者汗上至項下至臍小者但頭面有汗至項下而無他證以[illegible]散治之不効[illegible]請乙治之大者與香瓜丸[illegible]與益黃散小者與右齊湯各五日而愈錢乙治方本集載之外收諸方敘之後

沉香黃耆散　治榮衛虛遍身喜汗

沉香 剉　綿黃耆 [illegible]　人參 去苗　當歸 去苗洗淨焙　赤芍藥 各二兩　木香　桂心 各半兩

右為細末每一大錢水一小盞[illegible]

作棗一梅同煎至半盞去滓放溫食前時時
與服
蓯蓉丸　治血虛甚汗　肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮
去外皮炙乾　牡蠣火煅一兩　麻黃根去根節
綿黃耆各半兩　白茯苓各半兩　右為細末煉蜜和
丸黍米大每服八十丸米飲送下食前
木棉花　治盜汗　右取木棉花開而再合者
焙乾為末每用一錢猪皮煎湯調下食後臨臥
牡蠣散　治盜汗　牡蠣煅一兩　麻黃根一兩
甘草半兩　右為末每服二錢以水一盞煎至
七分去滓放溫無時
升麻湯　治肌熱盜汗　升麻　綿黃耆去蘆
人參去蘆各一兩　熟乾地黃　天竺黃各六錢
牡蠣粉研各半兩
右為細末拌勻每服半錢或一錢煎竹葉湯
調下無時
柴胡人參散　治如前　柴胡去蘆
人參去蘆　白术　白茯苓　青皮去穰
桔梗去蘆　麥門冬去心　川芎　白芍藥
甘草炙　桑白皮　升麻

右等分為末每服一錢水一盞煎至七分去滓
服食後
紫蘇飲　治肌熱煩躁多渴盜汗擦鼻腹滿
柴胡去苗　藿香去土　甘草　烏梅肉
紫蘇葉去土　乾葛　人參去蘆　茯苓
麥門冬去心　秦艽去蘆　地骨皮去骨
防風去蘆并叉枝
右等分為末每二錢水一盞煎至七分去滓
放溫時時與呷
沉香鱉甲丸　治潮熱盜汗
沉香剉　草龍膽去蘆　鱉甲童子小便浸一宿塗酥
炙焦去裙襴各一兩　綿黃耆一兩剉　川黃連去須半兩
川大黃半兩濕紙煨
右為細末煉蜜和丸黍米大每服十丸用麥
門冬去心煎湯送下無時
柴胡黃連膏　治盜汗潮熱往來
柴胡去苗　胡黃連等分
右為末煉蜜和膏丸雞頭子大每一二丸銀
器中用酒少許化開入水五分重湯煮二三
十沸放溫服無時

黄耆散 治虛熱盜汗
牡蠣粉 黄耆 生乾地黄 焙乾等分
右爲細末每服一錢水一小盞煎至六分去
滓温服無時
虎杖散 治虛熱盜汗
右以虎杖剉細水煎服 不量大小多少與服
黄連粉 治盜汗
黄連 去須 牡蠣粉
貝母 去心 各等分爲細末
右如三味各一兩即入米粉一兩研勻細以
粉身

龍膽散 治如前千金治血汗
牡蠣粉 茯苓 各三兩
右同爲細末於生絹袋一寸盛之有汗處撲
身
牡蠣粉 治諸汗
牡蠣粉 三兩 麻黄根 一兩 赤石脂
糯米粉 各一兩
右勻爲細末入龍膽末一錢拌之每用一時
頭新綿包撲有汗之處 盜汗最佳
又方 亦同治同 牡蠣粉 二兩 麻黄根 一兩

蛇牀子 乾薑 各半兩
右同爲細末用如上法
治小兒臓熱多汗犀角飲子
茯神 去心內木 龍齒 各一兩 麥門冬 去心 一兩半 犀角屑 三分
甘草 半兩 白术 一分
右爲末每服一錢水一盞煎至七分去滓温
服無時
不語論
小兒有不能語者其證有三 一者心氣不足
心聲爲舌本氣其而舉之則舌本動而語聲作矣

令氣怯而不能營用於舌故不能語也此證已
在五氣項下具之 二者卒不能語因風寒之
邪干於咽門通絡舌本使舌本緊急故卒不能
語也又一證咽喉爲氣之道路會厭爲聲之門
戶暴爲風客於咽厭則失音而語聲不出非不
能語也 三者因病後不能語此因服清藥以
利小便致胃虛而不能上接於陽故不能語昔
錢乙治王氏慢驚病愈後有聲而不能語衆以
爲失音乙曰既失音何開目而能飲食又牙不
噤口不緊而能嚥藥衆醫皆不曉乙曰此因用

清藥利小便致虛腎氣不能上接於陽故也遂
用地黃元補腎而漸漸能言一月而愈其方本
集載之外枚方具後
菖蒲散 治感風寒客於咽門卒不能語
菖蒲 桂心 遠志去心甘草水煮各一分
右為細末每一錢水一中煎至五分溫服無
時
桂散 治風寒客於喉厭語声不出
川芎三分 遠志去心甘草水煮三分
麥門冬去心三分 人參去蘆半兩
右為細末煉蜜和丸小豆大半以空心米飲
下五丸日三兒大加之久服取効
渴論
小兒有渴而飲水者此因臟腑有熱熱則臟燥
故多体熱發煩亡耗津液即令作渴欲飲水以
解之也又有瘡瀉吐瀉發渴霍亂發渴者各逐
本項具之閻孝忠云凡小兒諸渴因亡失津液
引飲者但多煎錢氏白朮散與服使任意取足
飲之弥多弥好其方本集所載熱渴者叙分了
後

連湯散 治嬰小發渴心燥
右以掺鎔研極細每服一錢一字三四歲下者
半錢煎蓮花湯調下冬月無花用蓮肉代之
香薷湯 治渴甚津液燥少
木香 乾葛根剉 人參去蘆各一兩 白茯苓
藿香葉去土 甘草炙各半兩
右為細末次用麝香半錢研細入藥拌勻每
服半錢或是一錢生薑湯調溫服無時
葛根湯 治体熱煩渴
葛根 人參去蘆各一兩 麥門冬去心 白茯苓
澤瀉 甘草炙各半兩
右為細末每服一錢水八分入生姜二片薄
荷三葉煎六分去滓溫服大小服無時
茯苓丸 治肌熱臉赤煩渴驚悶
草龍膽去蘆 黃連一兩 人參去蘆二兩 當歸去蘆洗焙
兩右為細末煉蜜和丸菉豆大每服一二十
丸竹葉湯下無時
葛根飲子 治熱渴久不止
右以葛根半兩判碎水一盞煎至六分去滓
頻頻服無時

神蠐散 治一切諸渴

右以大蛀螨於臘日端午日用黄泥固濟煅通赤放冷去泥為細末取活田螺煎湯調下半錢只一二服差

治小兒煩渴久不止

右以石蓮心三十箇炒黄搗碎一分水一中生姜少許同煎至六分去滓每服半合徐徐服

血溢論

小兒諸血溢者由熱乘於血氣也血得熱則流溢隨氣而上從鼻出者為衄從口出者多則為吐血少則為唾血若流溢滲入大腸而下者則為便血滲入小腸而下者為溺血又有血從耳目牙縫齗舌諸竅等出者是血隨經絡虛溢自皮孔中出也今叙方于後

[illegible]散 盆消 一分研 亂髮 一分燒灰研 紅藍花 一分[illegible]

右同研細以綿纏子揾藥塞鼻孔中

槐花散 治如前 槐花 一兩炒 蒲黄 半兩 川乾姜 一分

右為細末每服半錢新水調下无時

又方 治如前

右以滑石為細末飯丸綠豆大每服三二十丸微微嚼破新水嚥下未能嚼者擂碎與之

又方 治如前

右以生蘿蔔剉碎研取汁入酒相當量大小温服立止

[illegible]散 治唾血吐血

阿膠 半兩蛤粉炒如珠子去蛤粉 黄芩 一分

人參 去蘆半分

右為細末每服半錢陳米飲調下无時

紫參散 治如前 紫參 山梔子仁

生乾地黄 一兩 荊芥 燒灰 亂髮 燒灰

蒲黄 各半分 龍骨 研各一分

右搗羅為細末每服半錢或一錢煎竹茹湯調下

[illegible]

黄連散 治吐血

右以黄連一兩去鬚為細末每服一錢水七分入豉二十粒同煎至三分去滓溫服無時

又方 治如前

右以蒲黄細研每服半錢用生地黄汁調下

無時

又方治如前　右以蚯蚓皮炒焦黄為末乳
汁調下

又方治如前　右以黄明膠新綿各一兩並燒
灰研為細末每服半錢或一錢糯米飲調下
日三

又方治如前　右以燈心淨椀內燒灰以細蓋
之研為末每服半錢或一錢射香湯調下

臍帶灰　治大便下血
右以臍帶燒灰研末塗乳下與兒吮之南人
以蒲為臍帶又經烝溜或敗爛者良

又方治如前　右以東紅燒赤內水中飲服

又方治如前　右取雄雞翅下血點服或以蘿
頭一枚炙黄黑為末飲調半錢服

車前散治小兒尿血
車前子一分　牡蠣煅令焦各一分　甘草一分炙　川朴硝一
右為細散每服一錢水一小盞煎至五分去
滓溫服

又方治如前
右以甘草二兩炙黄為細末煉蜜和圓菉豆
大每服五七丸溫水下日二三服生劑以水六
合煎取二合去滓服

神白散治諸吐衂便溺等血妄行
槐花半兩微炒　蛤粉一兩
右為細末每服半錢或一錢生地黄汁湯調下

青龍丹治小兒熱或一切血妄行秘方
甘草一兩炙　茯苓　乾葛　龍腦薄荷葉
藿香各一兩　縮砂五錢　山茵陳葉
寒水石各一兩
右為細末麪糊和丸櫻桃大別研青黛為衣

又方治諸血妄行從耳目口中出者
右以赤馬糞燒灰研為細末溫酒調下一字
或半錢看大小與服

地黄散治舌上出血如針孔
生熟地黄一兩　明膠半兩炙
右為末溫湯調下一二錢

又方治如前
右以豉一合水一盞煎數沸溫服半盞或一
盞亦治下血

又方治如前

右以小豆一合爲末水三盞和擣汁飲之
戎鹽丸　治舌上有數黑孔血出如湧泉
戎鹽　黄芩　黄蘗　大黄各兩半　人參
桂心各　甘草半兩炙
右爲細末煉蜜和丸菉豆大飲下五七圓日
三服舌上孔穴大血不止者仍燒鐵烙之
苦竹葉汁治牙齒斷縫間血不止
右以苦竹葉不拘多少水煮濃汁入鹽少許通口
潄盈
又方治如前
右以童子小便半盞煖熱通口潄盈
噀法治九竅四肢指岐間皆出血此暴驚所致
右勿令患人知覺以井花水猛噀其面
治小兒尿血　以髮燒研井花水調服
以川升麻五分水五合煎取一合去滓一歲
兒頓服盡

寒熱論

小兒寒熱者由風邪外客於膚理痰飲內
漬於藏府致血氣不足陰陽更勝而所作
也陽勝則發熱陰勝則發寒陰陽交爭邪
正相干則寒熱往來時發時止然此症與
瘧相似而發寒不致戰慄發熱不至悶亂
所以異也今叙方于後
人參前胡散治寒熱往來
人參去蘆　柴胡去苗　前胡去蘆各一兩
桔梗去蘆　半夏湯洗七次　地骨皮去骨
甘草炙各半兩
右爲細末每一錢水一盞入生姜二片
煎至半盞去滓服無時
秦艽湯治如前
鼈甲一兩醋炙焦黄去裙　大黄半兩剉碎微炒　秦艽去蘆一兩
竹茹一分　麻黄去根節半兩　甘草一分
右爲粗末每服一錢水一盞入葱白二寸
煎至五分去滓温服無時
又方治如前及治赤[illegible]

右以桔梭燒灰研末以乳汁調服一
錢治中熱亦佳
香甲散治寒熱肌瘦　木香一兩
鱉甲一兩醋炙黃去裙襴　川黃連半兩剉炒
當歸去芦洗淨焙半兩　檳榔三个
陳皮湯浸去白焙乾半兩　柴胡去苗半兩
知母半兩　甘草半兩
右為粗末每服一錢水一盞生姜二片煎至
六分去滓溫服無時
二姜圓治瘴疾發寒熱似瘧

乾姜　良姜　各等分
右細剉同炒黃為細末麵糊圓菉豆
大每服三五圓煎橘枝湯送下空心服
亦治瘧
冬瓜汁治生下至五月以裹作寒作熱咗
來無時
右以冬瓜炮熱絞汁與服或剉拆枝煎
汁浴兒
瘴病論
瘴者由夏傷於暑客於膚表汎[illegible]

[illegible]秋又寒溼乘之動前暑熱邪正相搏所
交爭曾遇有時更相勝負陽勝則發熱陰勝則
發寒陰陽互勝則發寒熱熱則煩躁悶亂寒則
慄慄戰悚陰陽會遇交爭已過邪正相離則寒
熱俱歇若邪動氣至又復發作故瘧休作有時
也其發晏者邪氣會遇遲也其發朝者邪正會遇
早也其間日發者邪氣入深而行差遲不能日
作故間日方發也今敘方于後
麻仁湯治小兒發瘧不止　麻仁湯浸去皮尖別研仁者炒熟[illegible]一兩
鱉甲[illegible]醋炙　桂心半兩　黃芩半兩

川升麻半兩　赤茯苓去黑皮半兩
右為粗散每服一錢水一小盞煎至五分去
滓溫服無時
豉豆膏治如前　大蒜一枚去皮研　巴豆三片去皮心
右同溼紙裹煨熱一處研為膏圓麻子大每
服二三錢圓醋湯送下吐瀉即差後用藿香
補之
藿香湯　藿香去土　肉豆蔻麵裹煨　甘草各一兩
右為細末每服半錢水一盞煎至七分溫服
連服三服無時

朱衣使者治如前 砒半兩細研 草豆末一分 黑豆末一分
右同研勻細滴水研黍米大辰砂為衣間日
發者於好日夜臨臥時面北冷醋水送下二
圓頻日發者只於當日夜服如上法兒極小者
与一圓端午日合佳
又方如前治 右以生鹿角為細末發已前乳汁調服半錢
又方治如前 右以雞腔中黃皮炒極燥為末乳汁調服之
又方治如前 右以蜒蚰皮一兩取每條長五寸以上者
燒灰存性研細末每服一錢新水調下未發前服三
歲上半錢下者一字

又方治如前 右以黃丹二分蜜水和之与服
萬金丹治瘧疾或挾積發瘧久不差
阿魏一錢 朱砂一分研末飛
砒霜一錢用醋煮 丁香半兩 巴豆
霜 木香半兩 相思子十四个
右為細末煉蜜和圓黍米大未發前服水下
一二粒一歲加一粒至十歲已上十粒絕早
服忌熱物一晨時
知母圓治瘧疾熱甚者 知母一兩
鱉甲一兩去裙襴 川大黃一兩 朱砂半錢水飛

赤茯苓一兩去黑皮 川芒硝半兩 川升麻半兩
龍腦一錢研
右為末拌勻細煉蜜圓黍米大每服五七圓
生姜湯送下得利即愈量大小加減
小兒瘧疾灸兩乳下一指三壯壯如小麦大
恒山湯治小兒瘧疾
恒山一兩剉 小麦三合 淡竹葉切一升
右為粗末水煮去滓臘中兒服一蜆殼半月
者二蜆殼滿月者半小合以意增之
烏梅圓治瘧疾寒甚者

烏梅肉一兩焙干 母丁香半兩 桂心半兩
當歸半兩 乾漆半兩炒烟出盡
右為細末入研細射香末半錢拌勻煉蜜和
圓黍米大每服十圓粥飲下
茶清散治諸瘧疾
人言一兩 黑豆一升 河水四升
右同煮至水盡炒乾為末每服一字或半錢
熱多者臘茶清調下寒多者草茶清調下間
日者投發夜臨臥服頻日者但臨臥忌熱物
一晨時此方宜斟酌

冤見愁治乳妳嬰小患瘧疾計可治服此的驗
神應 代赭石[illegible] 朱砂[illegible]
砒霜[illegible] 右三味用瑾紙七重同裹捋
大內煨至紙乾取出碾細[illegible]每次入臘
射香半字金箔五片同研[illegible]為細末[illegible]一字
於發日早以麻油一滴調[illegible]最先上
草菓子散治脾寒發瘧
草菓子[illegible] 甘草[illegible] 大棗[illegible]
右並剉碎分三服水一盞煎至半盞放溫服
更量大小加減

符法治諸瘧 儘 探 謹
右於發日不得梳頭洗面漱口及弄水藥日
未時用朱砂書上第一字於淨紙上剪下於
病心并兩手心兩娘上并額上并前後心共
一十處帖了 然後喫飲食如未止書第二
字亦除根本并有書及第三字者

弄舌論
小兒弄舌其症有二一者心熱心繫舌本熱
則舌本乾澁而緊故時時舌舒緩之二者脾
臟[illegible]連舌[illegible]則舌亦乾[illegible]故時時吐弄
舒緩之皆欲飲水心熱則發渴脾熱則津液耗
[illegible]飲二症相似宜加審別以熱者面赤睡即
口中氣熱時時煩躁喜[illegible]咬牙上竄治宜
[illegible]大便閉硬[illegible]黃色面黃身亦微黃
[illegible]之不可用冷藥又不可轉下若[illegible]下
[illegible]脾胃虛津液[illegible]加五心煩熱面黃肌瘦
[illegible]為病也若大病[illegible]已用藥弄舌者大凶也今
[illegible]方于後
人參知母散治心熱弄舌
知母 一兩 藍葉 半兩 人參 去蘆 鉤藤 一分
川升麻 一分 乾葛 一分 黃芩 一分
右為細末每服一錢水八分入竹瀝三兩滴
煎至五分去滓溫服無時
瀉黃散治脾熱弄舌
藿香葉[illegible] 山梔子仁[illegible] 石膏 半兩
甘草 三兩 防風[illegible] 四兩
右並剉以蜜酒微拌勻炒香燥為細末每服
一錢水一盞煎至六分去滓放溫取清汁
服 一方有山藥二兩
[illegible]病論

小兒魃病其論有二一者聖惠云小兒生十餘
月已後母又娠因以乳兒令兒生病其候精神
不爽身體痿瘁骨立髮落名曰魃病又曰繼病
又曰交妳二者巢氏云小兒在母胎娠之時其
母䑛惡神導其腹中胎氣至兒生下往往經歲
微微下利寒熱往來毛髮鬇鬡堅頭不悅其候
須以藥治今叙方于後
虎骨丹治魃病　虎頭骨一兩塗酥炙黃　鬼臼一兩
草龍膽一兩去蘆　鬼箭羽一兩　琥珀一兩
白膠香半兩令研

右為細末同研勻煉蜜和圓黍米大每服五粒
乳香湯無時　乳香湯送下
又方治如前　右取伏翼燒灰研細末粥
飲調下半錢日三若炙令香熟嚼爛哺兒亦效
如得重一斤者尤佳又得黃精自然汁塗炙之
最良
又方治如前　右取百勞鳥毛與兒帶之又名鵙
骨蒸論
小兒自周晬已上至十餘歲血氣滌盛內受衣
溫頓將養過宜食餘肥甘果食諸物臟腑生

熱熏蒸肌骨身體發熱夜有盜汗漸漸瘦瘁
乃成骨蒸若不治則為急勞今叙方于後
秦艽散治潮熱壯熱減食
秦艽去蘆切焙　甘草炙各一兩
乾貓兒薄荷葉半兩不見火
右為細末每服一二錢水一中盞煎至七分
去滓溫服食後
地骨皮湯治骨蒸体熱肌瘦　地骨皮去土
胡黃連各一兩　鱉甲去裙襴醋炙黃　柴胡去苗
犀角屑鎊　秦艽　川大黃炮

知母各半兩
右為細末每服一大錢水一盞煎至七分去滓溫服
麥煎散治童男室女骨蒸肌熱盜汗減食瘦瘦
鱉甲醋炙　大黃紙裹煨熟　恒山　柴胡去苗
赤茯苓去黑皮　乾生漆炒煙盡　當歸洗焙
白朮　生地黃　石膏各一兩　甘草半兩炙
右為末每服二錢水一盞入小麥五十粒煎至
六分去滓溫服食後臨臥有虛汗者加麻黃根
連尤散治骨蒸肌瘦漸為急勞　黃連去鬚一兩
秦艽去蘆一兩　天靈蓋一兩塗酥炙　甘草半兩炙

右為細末每服半錢粥飲調下无時

腹皮青黑論

小兒腹肚虛脹薄為風寒邪氣所乘而真氣微弱不能滋其血氣失榮養之致邪氣著而不去故腹皮卒然青黑也此候危惡今叙方于後

二聖散治腹肚皮膚忽然青黑

右以胡粉苦參各一兩為細末每服一錢溫酒調下無塗患処

又方治卒腹皮青黑不能喘急宜急用此方

右以大青為末納口中酒送之

又方治卒腹皮青黑不急治須臾即死

右以酒和胡粉塗之乾則再塗仍灸臍四边各半寸并鳩尾下一寸共五処各灸三壯

難乳論

小兒難乳有二者兒初生客風邪熱中臍流入心脾之經即令舌厚唇燥而急口不能乘乳故乳而不能吮飲也二者兒初生時拭掠口中穢血不及蕪而入腹則令兒心腹痞滿也氣促急故口不能吮乳飲之也今叙方于後

五福化毒丹治心脾經熱舌厚唇燥急不能乘乳

生乾地黃焙秤 熟乾地黃焙秤各半兩 天門冬去心秤

麦門冬去心秤 玄參去芦 甘草炙

甜硝各三錢 青黛一錢半

右先大味為細末後硝研入硝黛拌勻煉蜜和圓雞頭大每服半圓或一圓食後米飲服之无時

又方治兒飲乳不快喉舌似緊不相從便

右以沙牛角燒灰存性研細末塗乳上蓋兒口中捻汁飲吮嚥下

又方治胸腹痞滿短氣促急不能飲乳

右取雞子殼燒灰酒服半錢

又方治心胸熱痞飲乳不快

右以生根葛根杵爛絞汁飲灌之如無以乾葛煮羅之亦得

治小兒不能乳　右以雀矢四枚末之著乳上令吮之兒大增服

治小兒初生不飲乳及不小便

右以乳汁二合葱白一寸四破於銀器內煎取一合藥注溺之立効

大小便論

小児大便有秘澁者有不通者皆由府臓有熱乘於腸胃〻熱則津液少〻則糞燥結实而鞕大便難下則爲秘澁甚者則不能通乃爲不通也小便有滴瀝者有不通者由小腸与膀胱有熱二經俱主水〻入小腸傳於膀胱循水道出而小便也熱氣乘之則水耗少而行澁故滴瀝而下也甚者水道乾而不通也若熱入小大　腸則皆壅滞不得宣利故大小便俱不通也

金花散治大便秘澁便難

皂角仁一錢炒　檳榔一个生　甘草一錢

右爲細末每服一字或半錢沙糖熟水調下

栢子仁膏治如前

栢子仁揀淨　松子仁　胡桃仁各等分

右研和膏每彈子大熱湯化下未飲再服

人參荆芥湯　右以人參荆芥各自爲末每用人參末半錢荆芥末一錢和勻水一盞煎至七分放温量大小時〻與服

木香麁散治大便不通

木香　訶子[illegible]各半分

右爲粗末每半錢或一錢水煎去滓放温時〻服

又方治如前　右以猪苓一兩爲末水少許煑雞矢白湯調下一錢差

又方治如前　右以醇不拘多少先搦乾曝爲末麪糊爲圓菉豆大每服五七丸至十餘丸米飲下

木通散治小便澁滞滴瀝不得通快

木通　滑石　甘草炙　焰硝研各半兩　三葉草一分

右爲末細勻每服一字或半錢沸湯點服

滑石散治如前

芣苢子　甘草炙　山梔子仁

滑石　瞿麥　葵子炒

欝金

海金沙炒各一錢

右爲細末每服半錢煎灯心葱湯調下乳食前

如聖散治如前

海金沙炒　滑石等分

右爲細末每服一字或半錢煎灯心湯調下

乳前食後

八正散治如前又治心經邪熱又治熱淋

瞿麥　木通　山梔子仁　地扁竹

車前子　甘草　滑石各二錢　大黄一錢

右爲細末每服一錢水七分入薄荷二葉同煎

治小兒小便不通三日欲死
葵根一握剉　壁魚七枚別研
右以水一大盞煎葵根取汁六分入壁魚末再煎三五沸去滓放溫服
治小兒小便赤澁不通　蒲黃　滑石各等分
右研勻細每服一錢煎燈心湯調下冰糖水亦得亦治淋痛乳食前
治小兒卒不得小便　以葱安臍中灸之
治小兒小便赤澁不通
滑石二兩　木通一兩　葵子一合
右為粗散每服一錢水一小盞煎五分去滓溫服無時
冬葵子散治小兒卒小便不通小腹急悶
冬葵子一兩　木通半兩
右為粗末每服一錢水一小盞煎至五分去滓不拘時候
捻頭散治小便不通　延胡索去皮　川苦楝去核
右為細末每服半錢或一錢捻頭湯調下如無捻頭即於湯中滴油三兩點食前服一字
車前草小麥各一升水二升煮取一升二合去滓煮粥服日二量兒大小加減

葶藶散治如前　葶藶半兩炒　青皮去瓤炒黃半兩
右為細末每服半分或一分空心葵湯調下乳食前
殭蠶散治如前　白殭蠶炒去絲嘴　海蛤研各半分
右為細末每服半錢或一錢煎車子湯調下亦治血淋若沙淋者煎羊蹄草湯調下無時
又方治如前　右以綿黃耆為末每服一錢水一盞煎至五分溫服無時
又方治如前　右以烏梅肉為末每服一錢水調服神效
又方　右以地扁竹煎湯放溫服如熱不欲之
白朮散治小便澁滯不通胃腹痞滿
白朮半兩　白茯苓一分　澤瀉半兩
人參去蘆一分　滑石一分
右為末煉蜜和膏每皂子大米飲化下亦治脾胃不和不美乳食
朱砂散治小便赤澁不通心神煩躁
朱砂一分研　滑石研半兩　犀角屑半兩
黃芩一分　車前子一分炒　甘草一分炙
右為散拌勻每服半錢煎竹葉湯調下乳食前
葵石散治小便不通悶亂
滑石一兩　木通一兩　葵根一握剉　榮牛子半兩炒

右為粗散每服一錢水一大盞入灯心葱白各
少許煎至六分去滓放温食前服
鷄腸草散治小腸膀胱有熱小便難澁服冷藥
過多却致小便不能禁止　鷄腸草一兩
牡蠣粉三分　龍骨煅火　麦門冬半兩去心焙
白茯苓半兩去黑皮　桑螵蛸水洗炙半兩
右為粗散每服一錢水一盞入生姜二片棗
一个煎至六分去滓温服亦治遺尿乳
食前
郁李仁丸治大小便秘澁不通
郁李仁二兩湯浸去皮　大黄一兩　檳榔三兩
青皮去瓤半兩　右為細末煉蜜和丸菉豆
大每服十丸至十五丸姜湯下無時
芎黄散治如前　芎藭一兩　川大黄三分剉微炒
郁李仁三分湯浸去皮微炒黄
右為散每服一錢温水調下乳食前
朱粉丹治如前心神煩躁脇肋悶臥中多驚
朱砂半兩研細水飛　膩粉一錢　續隨子半兩
右為末研拌匀煉蜜和丸黍米大每服七粒
温水送下食後

木通剉散治大小便不通　木通　瞿麦
滑石　山梔子仁各三錢　茯苓去黑皮
甘草各四錢　續随子三錢　車前子一分
右㕮咀每服一錢水一盞煎至半盞去滓温
服更量大小加減乳食前
紅綿散治如前　朱砂研水飛　鬱金　輕粉各一
馬牙硝半兩　右入麝香少許研匀細末
服半錢薄荷蜜水調下無時
又方治如前　右以硝石為末每服半錢清油調
如稀糊并入好酒一茶脚許攪匀服之[illegible]
又方治如前　右以不蚛皂角去皮酥炙為末
用二錢取獨頭蒜一顆泥盆内同皂角末研
擣蒜尽以釅米醋少許和之捻作餅子如錢大
子貼臍中立通
又方治如前　右以露蜂房燒灰研細酒調一
錢或半錢日二
郁○李仁膏治撮搽小兒大小便不通
郁李仁一兩湯浸去皮　滑石半兩研
大黄去粗皮取实者一两剉碎酒浸半日焙乾焦為末
右先將郁李研為膏和二味丸黍米大每服

一二十圓量大小与小者乳汁下大者薄荷湯下要球風熱疲实服似微溏極穩

五淋論

淋病有五一曰熱淋血淋二曰寒淋膏淋三曰氣淋四曰劳淋五曰石淋 五淋之中小兒有所患者惟寒熱氣之三症外劳石二症虛極所致小兒未親色慾故兄患者惟石淋恐兒本怯腎弱者有之亦千金中死一矣令並具五淋之症于下 熱淋者因熱乘小腸膀胱二經皆主水、入小腸傳於膀胱行於水道出於陰中而為小便也故陰為水液之路膀胱為津液之府熱則水道燥煩水液行澁娶不道不利小便淋瀝因名曰淋其候出少而害囊小腹急痛引臍連莖中痛也療者溺血故亦曰血淋血得熱則流散滲入於胞隨溺出而下也 寒淋者因寒客于於二經而作其候先寒戰而後溺之是邪氣与正氣交争也寒氣勝則發寒戰正氣勝則寒戰解而得溺溺則出少澁滯小腹連莖中而痛寒甚者溺白如稀膏故亦曰膏淋亦如痢下熱則便血

寒則便膿也痢下者寒熱搏於大腸也石淋者寒熱搏於小腸也 氣淋者小兒因怒而滯氣入二經留滞不散邪正相搏胞內氣脹其候每溺則臍下憋膨水道澁不能下莖中相引而痛常有餘瀝也 劳淋者因房事過度腎之精竭氣通於陰水道乾澁之所為也腎与膀胱為表裏今腎虛則精竭膀胱亦虛不能約制其水故水液頻數而下水道乾燥則不能通利其候尿在莖內數欲不出引小腸連莖而痛也 石淋者小者為沙大者為石皆云腎主水水為熱結化而為石其言腎近而不知其本也且腎有二藏左者為腎右者為命門主水而為壬聖濟經云壬者一水一石之謂欽不知一水一石之道告本遠生之之妙本太一精真始兆於水立於石是腎中本有石之物也患者乃真精化而真物出焉其候沙石從水道中出塞痛悶絕故痊者鮮矣

琥珀圓 治熱淋疼痛

琥珀研半兩 乳香研半兩 桃膠半兩研

右件研勻糊為丸菉豆大每服一二十丸空

燈草湯下

又方治如前 右以黄芩二兩細剉分之用水二升煎取一升、服食前

蒲黄散治血淋澁痛

蒲黄半兩 冬葵子半兩 生地黄半兩

右為細末每服一錢水一盞煎至六分去滓溫服食前

又方治如前 右以雄鷄屎尖白如粉者炒微黄研細末酒糊圓菉豆大酒下三五丸日三服連四五服取効

玉□丹治寒淋膏淋如神又治下痢

牡蠣粉四兩研 乾姜末二兩炮

右拌勻麵糊為丸麻子大每服一二十丸米飲送下食前時

二膠散治氣淋小腸澁不通 阿膠 李膠等

右為末每服半錢葱白湯調下食前時

又方治氣淋 右以蠶退紙燒灰研細每服半錢或一錢煎去心麥門冬湯調下食前

又方治如前 右以馬兜鈴炒焦黄為細末每服半錢或一錢麝香酒調下溫酒亦得

冬葵子散治沙石淋痛不可忍

冬葵子一兩 石南葉 榆白皮去赤皮

石韋去毛 木通剉各半兩

右為細末每服半錢葱白湯調下 一方只煎

冬葵子汁服

二石散治如前 滑石一兩 石韋去毛一兩 一方更

右為末每服半錢煎大麦湯清調下

治小兒淋閉 露蜂房 亂髮灰等分

右為末每服一錢水調服之日二

又方治如前 以冬葵子一兩 水一小盞煎至五分去滓溫服無時

又方 以衣中白魚摩臍下及小腹

又方治如前經効小兒諸淋

治小兒遺尿 雞腸草 皂莢

桂心 人參 雞腸草一兩 車前子

石韋去毛半兩 右同為末煉蜜丸如小豆大每服

又方 以小豆葉搗汁服之 以鷄腸燒灰

研末漿水調服一錢面北斗服日三

小兒衛生總微論方卷第十六

小兒衛生總微論方卷第十七

䪿疝論

小兒䪿疝因怒啼躽氣衝擊腎經氣下通於陰囊故令腫大堅硬　又偏腫者氣乘陰而作也其有水者腎主水下通陰因怒啼躽氣腎水隨氣而下作

海蛤散治氣擊於下陰腎腫大而堅硬

海蛤三分研　蘹香子三分炒　薏苡仁一兩

白朮半兩　檳榔半兩麵裹煨

右為細末每服半錢溫酒調下早晚乳食前

又方治外腎腫硬漸欲成癩

右以蚯地龍去土不以多少為細末唾調塗之常避風冷濕地

勝金桃仁膏治卵癩腫大

右杵去皮尖桃仁為膏傅之

川楝子丸治疝氣偏墜一大一小

川楝子麩炒　續隨子去殼　輕粉二錢匕

右為細末麵糊和丸黍米大每服十丸葱白湯下不過十服愈

荊三稜散治如前

荊三稜炮　斑猫去頭足翅等分

右為細末每服半錢米飲調下

三香昆布丸治如前

藿香葉半兩去土　薰陸香三分　青木香三分

昆布三分去鹹洗　牽牛子微炒半兩

右為細末棗肉和圓麻子大每服十丸空心溫酒下

治小兒狐疝傷損生癩

地膚子一兩　白朮三分　桂心三分

右為末煉蜜圓如小豆大溫服乙圓量兒大小增減

又方治疝癩　芍藥　茯苓各三分　防葵一作防風

大黃各半兩半生半炙　桂心　烏微

右為末煉蜜和丸如大豆每服一圓日三四

三聖圓治小兒卵核堅腫陰卵偏大

黃蘗　香豉　牡蠣　防風

桂心各半兩

右同為末煉蜜和圓如大豆許三歲兒服[illegible]

又方治小兒癩　以蜥蜴一條燒灰研為末[illegible]

治小兒外腫　以雞翅六莖燒灰服之[illegible]

治小兒卵癩　上爪桂　芍藥　當歸[illegible]

右㕮咀每服二錢水一盞煎[illegible]

又方治如前　以三月上除取白頭翁去苗搗之隨左右偏處傅一宿作瘡二十日愈亦論[illegible]

又方治小兒外腎腫　雞嗌衣傅上

治小兒偏㿗或氣攻小腹疼痛

蛇床子為末半兩　馬鞭草一握取汁一合

右相和如膏塗病處

又方治如前　以狀元丸去殼一兩微炒杵為細末每用蔥煎至極濃汁調膏子塗腫處

治小兒陰積腫大不消

以鵬沙一分以水研化塗之立效

治小兒陰囊腫大氣脹

以蔥一莖研細和甘草一錢細剉同煎湯洗

又方治如前　牡蠣灰　防風去蘆各等分

右為末每服半錢米飲調服無時

治小兒卒陰腫痛而腫　赤小豆末半兩　桂心末一分

右以生薑取汁二大盞煎取入二味相和

急膏塗病處即消

治小兒陰囊腫痛虛熱以白礬末用甘草煎汁塗之

又方治卒氣腫痛連小腹如刺

右以生射干搗汁服之亦可作丸服

又方治如前　右以蔥葉煎濃汁一升去滓放溫

分每服半合隨服量大小加減

蜘蛛散治㿗疝或腫堅或偏腫或大小時時上下

蜘蛛焙乾　桂心半兩

右為散每服一字或半錢米飲調下或蜜丸

玉粉散治水㿗上下不定

蝦熱牡蠣粉二兩　炮熟乾姜末一兩

右拌勻冷水調稀調得所塗病處以小便大利即愈此方善用糊為圓服之治疝淋者宜用

㿗腹血及婦人帶下

陰腫生瘡論

小兒有陰腫及生瘡者由腎經虛而邪氣乘之腎氣通於陰邪搏衝於下則陰為腫甚者攻以生瘡又有因風濕外干皮膚則陰為之瘥痒搔之以成瘡者並叙方于後

桃仁圓治小兒陰腫

桃仁三分湯浸去皮尖雙仁者麩炒黃　白蒺藜半兩微炒去刺

牡丹去心半兩　桂心半兩　郁李仁二分湯浸去皮微炒

右為細末煉蜜和丸如黍米大每服十圓溫酒下食前

胡連散治陰腫生瘡

胡黃連半兩　胡粉半兩

白礬灰一分

右為細末每用少許油調塗患處一方只用

黃連胡粉芎末香脂油和傅

又方治妒前　右以人屎或狗屎燒灰傅之

又方　右以馬骨或狗骨燒灰研細傅之

治小兒陰腫　以狐莖炙焦黃杵細末服之

以莧青擣傅上　以衣中白魚傅之

以研取桑白皮汁塗上

治小兒陰瘡痛癢搔之黃赤水出不差

五倍子　蠟茶　等分

右為末更入膩粉少許先以葱白椒湯洗

洗之帛子拭乾用藥傅之

治小兒陰上生瘡痛腫不能療

右以鱉甲一枚燒灰研末雞子白和傅之

治小兒陰瘡　右以黃蘗水煮汁洗了拭乾白

蜜塗之

治小兒腸痔瘡腫生於陰門痛癢入腹不可

忍一宿殺人　右以茴香苗葉擣取汁量

大小與服日二三其滓傅腫處冬月無苗

葉取根用

又方治小兒陰腫生瘡

右濃煎狼牙草湯洗之冬月取根用或[illegible]

治小兒[illegible]陰腫痛[illegible]

赤小豆末　[illegible]

右先[illegible]入土木和[illegible]傅[illegible]

治小兒[illegible]

治小兒[illegible]

以[illegible]皮[illegible]傅之以[illegible]末[illegible]

又方治[illegible]生瘡

右以[illegible]甘草[illegible]

[illegible]者[illegible]下[illegible]

又方治陰腫[illegible]　蛇床子

細辛　吳茱萸　[illegible]

右為末[illegible]

[illegible]

又方治陰囊生瘡

右[illegible]

又方治如前　右以黃蘗剉碎煎湯洗浴

陰氣論

小兒陰氣者[illegible]不[illegible]下[illegible]

精氣[illegible]之氣從[illegible]

[illegible]

養之人而有染着者令叙方了後
綠銀散治腋氣 劉錦 密陀僧煅三 白及一[illegible]
右為細末每用半錢津唾調塗腋下三五日
一次以瘥為度
又方 右以輕粉一錢匕分兩處并香酒調一
半服之好酒調一半塗腋下以不臭為度
又方 右以左挑角通錢五文火燒通赤[illegible]
中碎之凡七次杵羅為末用老生姜一塊切
去所斷將生姜以所斷処擦腋下有毛[illegible]
倒者乃是病也拔去其毛以生姜自然汁[illegible]

二十八

塗之屢驗 治小腋氣汗氣只以生姜[illegible]
塗腋下亦可 顖門腫陷論
小兒初生皆有顖門者蓋藏氣未充骨髓未完
養未備藏故也藏腑皆以脾胃為養兒自生
以後得五穀所滋則藏氣充而骨髓充[illegible]
兒至能食則顖門合也顖門者繫於脾胃[illegible]
濟經言衛顖之天五ゝ者土也脾胃屬土小
兒有顖腫者由脾胃不和冷熱不調或[illegible]
飲乳或啼急咳嗽致陰陽氣逆上衝而顖腫
也熱則腫而軟冷則腫而硬又有顖[illegible]

因瀉痢或小便頻數或[illegible]服清藥以利小
或本怯氣弱或[illegible]病纏綿皆使藏虛而不[illegible]
上榮於顖故令[illegible]陷也此皆小兒惡症得愈
者鮮矣 治小兒顖腫
右以青[illegible]冷水調[illegible]之及兼服化毒丹[illegible]
治小兒顖腫[illegible]及陷
乾熟地黃[illegible] 山茱萸去核 乾山藥各四錢
澤瀉 牡丹皮去心 白茯苓[illegible]三
右為末煉蜜丸如豆大三歲ゝ者三丸溫
水化下空心及兼[illegible]錢氏益黃散

治小兒顖陷 以[illegible]及黃[illegible]子清[illegible]
滯頤論
小兒滯頤者[illegible]冷[illegible]兒[illegible]之[illegible]冷則
不能約制[illegible]口角流出漬於頤頰
浸[illegible]
治小兒[illegible]口出涎流[illegible]角下生瘡
以桑白皮汁塗口中
又方治如前 以東行牛口中沫塗兒口及頤上
治小兒口角下黃肥瘡[illegible]
[illegible]角燒灰和[illegible]傅

溫脾圓治脾冷多涎流漬頤下生瘡
丁香　木香　半夏（用生薑大半兩同杵為餅）
青皮（去穰）　白朮　乾薑（剉碎微炒各半兩）
右為細末煉蜜和丸黍米大每十丸[illegible]
溫脾散治如前　丁香[illegible]
半夏[illegible]白朮　乾姜炮　人參去芦
甘草（炙各半兩）　右為末每服一錢水八分
生姜二片煎至五分去滓溫服食前
又方治口中涎出流漬頦下不乾
右以白羊屎內口中服前藥仍更洗瘡淨以

燒錫末傅之
腸癰論
小兒腸中有癰瘡者由寒熱之氣搏於腸間氣血結滯而生也其候食少腹中痛悶小腸微強者是也
治小兒腸生癰瘡　右以鯉魚腸煮令食之
針刺喉傷論
小兒有因動作誤吞針刺骨刺竹木等刺傷而入肉或已折在內不出者叙方于後
右以白梅肉爛杵和象牙末傅上若針即以

象牙屑水調傅之或以磁石末傅之仍更以
瞿麥為末水服方寸匕或煮汁飲之日三
又方以松脂如乳香[illegible]傅之帛裹三五日[illegible]
諸物鯁喉論　小兒有誤吞諸物在喉中不能下不能出妨
飲食氣出不快甚者塞刺疼痛時[illegible]不任使
致死治　磁石治誤吞針刺喉中
右以磁石如棗核大磨令光鑽作竅子以線
穿繫定令兒含之針[illegible]出去　誤吞錢者[illegible]
又方治誤吞竹木入喉　右燒秤鍾通赤漬之[illegible]
又方治誤吞金銀銅鐵等物在喉中不下

右以南天燭根燒灰研細熟水調服一錢匕下
通氣散治如前及治鈎綫之類在喉
鵝毛一[illegible]燒灰　磁石一皂子大燒　象牙（燒存性）
右為細末每服半錢新水調下
又方治誤吞金銀[illegible]在腹內不下
右以石灰一皂子許[illegible]皂子許同研為末
又方治如前　右以[illegible]一兩水調[illegible]
又方治魚骨鯁喉不下　右以硼砂[illegible]許[illegible]
咀嚼嚥之立下
又方治如前　右以故魚網[illegible]

治如前　右以鷄鵝毛燒灰水調服

又方治一切諸般骨刺竹木簽刺鯁不下

右於臘月取鱖魚膽掛當風處陰乾每用收許

酒煎化溫呷得逆便吐鯁乃隨出未吐再服

其鯁刺雖經在腹內久痛黃瘦者服之亦出

極妙　無鱖魚取青魚鯉魚鱔魚膽亦可並治喉痺

又方治魚骨鯁　右以貫衆煎湯摩頭上

又方治一切諸物鯁喉

右以瞿麥為末水調半錢或一錢服

大聖玉屑无憂散治諸物鯁喉及一切咽喉諸

病解毒治百病　玄參去蘆　貫衆

白茯苓炒黃　縮砂仁　滑石

荊芥　川黃連去須　山豆根

甘草炙　鵬砂各半兩　寒水石一兩火煅

右同為末每用半錢抄口中新汲水一口嚥下

治誤吞叫子骨刺魚骨稻芒麥芒銅鐵及石

稻釘刺等諸物鯁喉及治咽喉一切諸疾

喉痺乳蛾等疾又解巴豆杏仁諸藥之毒

能殺人者又治蛇蝎諸虫咬傷毒氣入腹

并心腹脹滿膈塞癥瘕風涎痰痹

瘤子　以稻科上蒼蜘蛛十餘个取絲

科子枝上放之候絲垂下取東边絲為線子

繫定瘤子上七日後換其瘤自落洗只宗待

制有如無瘤如拳用此法　繫之至三換遂

乾萎於枕畔得之一似乾栗

諸虫咬螫論

小兒有為諸毒虫咬傷者多於夏熱之時取凉

解脫就地坐卧忽然悮觸濕因被咬其

痛不可忍直至終夜乃歇甚者連引一边痛

無少止又有毒瘡瘡中腫潰苦楚或有虫因

臥悮入耳中不出者並叙方于後

治蛇咬兩傷　以生猪血調雄黃末傅之如倉

卒間只用猪血亦效　若猛用雄黃

即不驗以冷水先洗瘡了揾乾用茱萸一合

水半盞研取汁服之將滓傅瘡上

一方用酒調茱萸末服之油調末傅瘡上

治蛇咬毒氣內攻腫痛不任

一以人屎厚傅之用帛裹即消　以白礬

等分研末於刀頭上燒令熔返滴瘡上

治蝎螫　以吃勒藤令患人自嚼爛傅之

能治者但服此藥立見效驗能潤燥病
五苓散丸亦益五藏辟温疫熱所不治
治小兒一切珠璫錢等梗喉
右以磨銅牙蛻赤內水中放冷飲之
疣子論
小兒有附貼皮膚生核如麦豆大其色与皮肉
一無異謂之疣子有一兩个生者又有數个連
續生者誤破其裏狀如結筋亦有微血亦自
肉相似此由風邪搏客血氣變化所生又有
一種初生核小日久漸長滋蔓而大名曰疣

子亦由邪搏血氣變化所生則氣血贒活故
漸長大也今叙方于後
以針或小刀子決疣子四面微微血出取患
瘡人應白膿汁傳之莫得近水三日外膿潰
其根動自落
以白梁米粉於銚內炒令赤色用衆唾相和
傳上厚一寸許即消
治疣子連續生十數个者
以艾炷一枚如麦豆大灸最先生者一个名疣
母餘即自消後　大者稍增艾炷

以乾姜令患人自嚼細塗之
治蜈蚣咬　以醋磨生鐵汁塗之亦治蜘蛛咬以獨
頭蒜摩咬著處痛止爲度以活蜘蛛一箇安止
在咬著處則自然收毒并患痛乃即減至蜘蛛
肚脹將放之別取一水碗用不爾則直脹死不休
傷生命故放之又同蒋用遂蜘蛛放水中即解其
毒不死　治蜘蛛咬　以活蚯蚓入蔥葉筒中緊
捻兩頭勿令泄氣搖動則自然化爲水滴
在咬著處又治蜈蚣入耳不出點藥滴入即出
治壁鏡咬　以生姜汁調皂角末塗之破者

治蚰蜒入耳以釅醋灌耳中即出以小蒜汁灌之
以牛乳汁灌之以龍腦大豆許綿裹左入塞右
右又塞左立效以香油灌之
又方治如前　道人頭　揀菜　車前子各等
右爲末唾調置耳門中則自出傳方人直尋
蚰蜒自送入耳消此藥試之乃出
治百蟲入耳　以椒末醋調灌耳中　如行十里久
自出　以豬肉炙香放捧耳邊聞則出
又方治如前　白礬　雄黄　各等兩
右研爲細末生油調成膏用皂子許塞耳自出

撲墜損傷論

人之血氣循身周流而无停止小兒有因落床或從高墜墮或打撲損傷致血氣失度隨損処停留或流行入腹聚蘊不散致亂變證[illegible]時作疼痛晝三微寒翕翕微熱重者有至筋傷骨損牽動不能叙方于後

蒲黃散治小兒因打撲墮墜血氣停滯或敗血入腹不散作疼痛寒熱瘀血成瘕瘡黃

蒲黃　當歸去蘆洗焙　生乾地黃各一兩

琥珀研　赤芍藥　桂心各半兩

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服无時

茯神丸治如前　茯神去心木　當歸去蘆洗焙

麦門冬去心各一兩　人參去蘆　黃芩

草龍膽去蘆　桃仁湯浸去皮尖麩炒另研各半兩

右為細末拌勻煉蜜和丸每服[illegible]十圓用生地黃汁少許同酒送下无時

三黃散治小兒因損傷敗血不出但傷不斷皆服之立效

黃連去須半兩　黃芩三分

甘草半兩　玄胡索去皮半兩

右為末每服一分用童子小便半小盞酒三分之二同煎四五沸熱服取下惡物立差

灵仙散治撲墜內有傷損

當歸去蘆洗淨三分　白芷　漏蘆[illegible]

右為末每服一錢溫酒調下食前

又方

以生地黃不拘多少杵爛絞汁用溫酒調服量大小与之其效如神如內損血衝心甚者氣絕不認人下咽即醒[illegible]

浸藥丸治撲墜損傷骨節痛疼或已可而有時發作痛不可忍時發赤腫數服立效[illegible]

浸藥　澤蘭葉　香白芷

骨碎補　草烏去皮尖　破故紙炒

敗龜酥炙黃　虎骨塗酥炙黃　續斷

白頭翁去蘆　烏金石各一兩　自然銅醋淬七次

右為細末醋糊圓桐子大焙乾[illegible]為衣生薑溫酒下三五圓筋骨疼痛用[illegible]

接骨散貼之

虎骨散　虎骨塗酥炙黃一分　金毛狗脊去毛一兩

穿山甲一兩燒　骨碎補一兩

右為末以倉米煮粥臨熟更入末[illegible]煮如糊

攤紙上然後燒紙灰在紙上向大蒜搗指大如大豉
搗作餅子以艾灸之不痛三上即安此二方屢
用大效不治大人

四黃散 治食藥毒及發血熱大便下血寒熱
黃連 去鬚十二錢 黃芩 黃蘗 黃芩 各十
豬苓 麥門冬 甘草 各等分
芒硝 [illegible]
右為末每服二錢水一升煎取一盞去滓內硝令烊
春[illegible]服[illegible]大小便血

藥毒論

小兒誤嘗諸毒藥及血氣太盛因服藥不當
其味之毒或煩躁悶亂或口舌麻木或刺
甚者吐利有不定血也

玄胡索散 解諸藥毒煩躁悶亂吐利嘔血
玄胡索 去皮 甘草 生 白礬 枯各半
右為末每服半錢水一小盞煎至六分去滓
溫服時時

麥茶散 治諸藥毒煩躁口舌麻木或如刺痛
草茶 一兩 白礬 一兩
右為末每服半錢或一錢新水調下立解

又方 解白毒藥 以白扁豆為末水調一二錢服
又方 了藥者故紙燒灰細研冷水調下半錢服

龍腦散 治藥毒吐血如神
大黃 濕 半夏 湯洗七次薑汁浸一日 甘草 炙 金星石
銀星石 寒水石 鉛白霜
不灰木 燒 青蛤粉 各半兩
右為細末入細研龍腦末一字拌勻每服一字
或半錢新水調下錢乙更有甘松藿香
葉末各一錢減大黃一半

小兒衛生總微論方卷[illegible]

小兒衛生總微論方卷第十八

頭上諸病論

頭瘡 小兒頭瘡者由藏腑有熱上衝於頭外被風濕復相乘之搏於血氣而生其瘡[illegible]

頭瘡此候與禿瘡特異且禿瘡者有白[illegible]硬痂遍滿其頭此頭瘡者但一兩處生[illegible]並不白硬而乾時時常有膿血濕汁[illegible]

長頭瘡小兒失於沐髮者便生此瘡也

玄精石散治小兒頭瘡 太陰玄精石

寒水石各一分研 輕粉 射香各少許

右為細末先以淡漿洗去瘡痂拭乾油調塗

塗之甚者不過再

栝樓散治如前 栝樓一枚 鹽豉一合入栝樓中[illegible]

塗下黃土一分 膩粉一分

右為末入射香一字拌勻每用少許油調塗

之濕者乾摻

淡豉散治如前 淡豉炒黑焦乾 絳礬各一兩

膩粉三錢 右上二味先末入粉研勻

以桑柴灰淋汁熱洗瘡淨用甘草末[illegible]

後以生油調藥塗之濕者乾摻

黃連散治如前 黃連去須二兩 胡粉一兩

右為細末先洗去瘡痂拭乾傅之即差再發再[illegible]

胡粉散治頭瘡久不差經隔年歲

松脂 苦參 黃連去須各一兩半

大黃生 胡粉各一兩 黃芩 水銀各一兩[illegible]

白礬半兩 蛇床子三分

右為細末以臘月豬脂和研至不見水銀星[illegible]

又方治頭瘡久不差 膩粉少許

胡桃和皮灯上燒過[illegible]

右為細末以生油調塗仍剃去瘡上髮塗之

只一二次差

又方治如前 以[illegible]塗之仍先用皂莢

湯洗訖塗藥 以馬骨燒灰研末醋和傅之

以虎脂熔令凝塗之日三四次

以蔓[illegible]末和合之有日出而愈不作瘡[illegible]

又以雞卵七枚去白皮於銚[illegible]和油塗之

亦治乾瘡不出汁者

以鴨卵殼燒灰研末豬脂和傅之

又以雞屎研末傅之 以醋少許和淨水洗去

瘡上以溫水洗之拭乾用百草霜入輕粉

研細用少許生油調塗 以兎熱煎湯洗之

以竹葉燒灰研細以豬脂和塗

以黑豆炒焦存性為末入膩粉研勻細生油調塗之

治頭瘡出膿水不差差而復發

以杏仁一百枚燒灰入膩粉一分同研勻細[illegible]生油調塗

治頭瘡漸引不較

以烏蛇[illegible]燒灰調塗之亦治浸淫瘡及諸瘡

治頭上惡瘡以黃泥裹豆豉煨熟放冷取豉研末以純菜油調傅上

軟癤

小兒頭上生軟癤者由風邪冷熱之氣客於皮膚搏於血氣壅滯經絡蘊結而生亦如身上生癤無異但生在頭上始則赤腫而硬其邪微者散則自消其邪甚者腫亦內搐潰膿血作痛以頭上皮緊至熱多不能去膿根小有惡汁不盡因而復發或在根邊別生連綴不差常常烘膿故名曰軟癤

如聖膏治軟癤

菜油一兩　黃臘半兩

歷青一錢　黃丹半錢　羊筒骨[illegible]

右一處熬成膏於紙上攤貼瘡上[illegible]

一片於瘡口上貼定面剜破如[illegible]

以豬糞燒之熬藥不得犯銅鐵器

又方以青蒿稀了連皮薄切焙乾[illegible]為細末每用時先以溫湯洗瘡去其膿血用藥少許入輕粉三分之一拌勻以傅瘡上牛皮膠水調貼瘡上熱帛子上貼之愈

又

以沙油瘡鈸子中取出熱時傅之

以生油餅剃子一个燒灰研細[illegible]調塗於瘡上

來日膿自出便[illegible]愈

又以兔毛皮不拘多少燒灰研細入膩粉[illegible]

又方用殺[illegible]調用糊合於瘡上[illegible]

治頭皮虛腫如蒸餅裹水之狀[illegible]

赤禿瘡

論 小兒頭有赤禿瘡者其凡蟲論云是蟯蟲動作為瘡此是邪搏於上于頭之皮膚搏於血氣傷其血脈而所生也榮為血受病則為赤禿衛為氣受病則為白禿然在內邪猶難于故患赤禿者以衛在外邪易得治故患白禿者○多其始生如癬之斑點點白皮屑漸漸汁出以成

其瘡遂至滿頭髮落[illegible]
皆是孔眼大小不等狀如蟲之窠有膿汁出[illegible]
痛而痒，乃不可忍無知有蟲為孔也又
鍾俗呼為鬼舐頭小兒有頭瘡過夜欲[illegible]
之則引及滿頭有赤而或云便赤禿也
治小兒白禿頭上圈圈然以蒜揩白処[illegible]之
又小兒白禿乾燥不[illegible]汁
以雞子七枚去白[illegible]器中熬和油塗之
治小兒白禿以蔓菁子[illegible]末湯洗去痂塗之
又以[illegible]香[illegible]同脂和[illegible]傅之

以白鴿羽燒[illegible]傅一宿已作瘡者二十日[illegible]
以榆白皮杵末醋和塗蟲出 ○以馬齒莧[illegible]
和白頭翁花一处燒灰研細用臘月猪脂和[illegible]
先用猪油洗瘡後傅之
又以蕪菁[illegible]二[illegible]葉心取汁傅之大效一方[illegible]
用蕪菁杵汁傅以人屎燒灰末之用臘月[illegible]
猪脂和傅
治赤禿 以白馬蹄燒灰細研臘月猪脂[illegible]傅之
治瓦瘡頭 以兒糞[illegible]猪脂和傅以臘月猪屎燒
灰末傅

以屎燒灰研細和臘月猪脂塗傅

耳中諸病論

耳聾小兒有恐患耳聾沉听者由風邪乘於
太陽之經也邪隨其經入於耳內邪正相搏氣
停塞滯則令耳聾不能聽聞於音者也甚者
則為沉[illegible]耳中沉沉然輕小之音則不辨重
大之聲絕聞也

[illegible]散治風邪入耳令兒耳聾
菖蒲 [illegible] 遠志 [illegible] 柴胡 去苗
麥門冬 去[illegible] 防風 [illegible] 細辛 去苗
甜葶藶 [illegible] 磁石 [illegible] 杏仁 [illegible]
右為細末每服半錢煎葱白湯調下乳食後日
二三服

烏蘚湯治如前 大川烏頭 [illegible]
[illegible] 遠志 [illegible]
右二味入射香末少許研勻每服一錢水一
小盞入薄荷二葉棗一枚煎數沸放溫服或
只以溫酒調服

菖蒲圓治如前 [illegible]
右二物[illegible]為末[illegible]丸[illegible]用一粒綿裹[illegible]

耳中一日一易

又方 菖蒲末一分 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁

右二物合研如泥每服用 麻子許綿子裹

塞耳中一日一易

萆麻膏 治如前 萆麻子去殼去皮 棗肉各五枚

右同研爲膏每用棗核許綿裹內耳一日一易

治耳久聾 以巴豆一粒蠟裹 以針刺令通透塞耳

中 以猫兒捉住老鼠咬之取其鼠膽汁滴耳

中 一云只以鼠膽用之亦同 以地龍一條

入鹽少許俱入葱管中時動搖則化爲水用點

耳中 一以苦醋一椀用鹽一匙 [illegible] 萆麻子大燒赤

投醋中令病耳就上使氣薰入 [illegible] 耳內塞之一日可治

又以葱白於灰火中煨令熱將 [illegible] 白頭塞耳中

一日三易 以芥子搗爛人乳汁和綿裹塞耳

中一日一易 ○以荊芥子中蛀虫之粉和油滴耳

中日二 亦治沉聽新聾 ○以 [illegible] 脂和 [illegible] 三枚許

一擣作丸綿裹塞耳中 治久聾

又以醋醬微火煎附子至軟削令尖塞耳中

耳中瘙痒 [illegible]

小兒 [illegible] 或鳴或痛者由風邪入耳與正氣

相干搏於血氣者則爲鳴搏於經 [illegible]

痛也 治耳中 [illegible] 以龍骨白礬爲末 [illegible] 下

以柳樹蚛虫糞水調取汁調白礬末少許滴

耳中 [illegible] 以鹽二三升蒸熱包裹以耳枕

之冷則易 亦治洪 [illegible] 之聲

治耳鳴如流水或如風聲 以生烏頭乘濕削

尖 [illegible] 濕削如棗核塞耳中旦用夜易

易不過三日愈 及治耳痒兒即用乾者

治耳中常痛 以生地黃截 [illegible] 數易之 薰

熟裹微煨用

耳中腫瘡出膿汁

小兒有耳中腫或生瘡出膿汁皆由風濕相搏

入於耳邪正相干搏於氣則傷於經絡輕則

爲聾重則生瘡若津液結滯變爲膿血汁

又有因水或眼淚入耳停搏 [illegible] 氣亦爲濃汁

名停耳又名膿耳也

治耳內腫及生瘡出膿汁或只痒痛虛鳴塞耳

中一切諸病並皆治之 龍朱散

龍腦一字 朱砂 [illegible] 竹箭幹內蛀虫糞

三錢 [illegible]

右同研細末以斡耳子挑藥入病耳中如有
膿水者先以新綿撚子纏之淨盡方頗入藥
每夜臨臥時一次

治耳中腫或生瘡 以白礬燒灰研細每用少許
以筆管吹入耳內日三四次或以綿裹塞耳中生
瘡者以胡桃油調藥搽耳

治小兒聤耳內生瘡或有膿汁
礬香散 白礬一兩燒灰 蛇床子一分為末
右相和入麝香末五分同研細每用一字摻入
瘡耳

藍𦬇散治如前 紅藍花一兩去蒂焙乾

黃蘗一兩剉 烏魚骨半兩 黃芩半兩為末
雄黃半兩水飛 射香一分研
右拌勻每用少許以新綿子纏撚子揾藥
耳中一日二易

麝香散治如前 蜘蛛一个 坯子臙脂半錢
射香半字
右燒極乾研勻細每用半斡耳許以鵝翎筒
吹入耳

桃紅散治如前 白礬一錢炒灰 坯子臙脂
射香一字

右研勻細每用少許以綿撚子擬耳中膿淨
摻藥入耳內

箭蚪散治如前 箭竹內蛀虫糞屑二錢
坯子臙脂二錢 凌霄花乾者二錢
海螵蛸二錢 射香一字研後入
右為細末拌勻每用時先以綿撚子擬耳中
膿盡乃以紙撚蘸藥入耳中日三

紅綿散治如前 信砒一錢匕
坯子臙脂三錢匕 射香一字匕
右為末拌勻以柳絮捻和勻每用黃米許摻
入耳中如說已生瘡膿汁不差者依此傅瘡
上紙片封之效

油引散治如前 石燕子雌雄一對
琥珀 膩粉 射香各少許量入
右同研勻先以綿撚子擬耳中膿汁盡四時側
臥摻藥一字許入耳中以好一滴引下立效

綿裹散治如前 桂心一分 青羊屎一分炒令黃
右同末每用一字綿裹塞耳中

治小兒停耳膿汁出
以琉黃細研每用少許摻入耳中日一次

以白殭蠶末一錢射香一字研勻少少摻入耳
以赤小豆末上毒蜂房灸黃杵末溫酒調下半錢
以蚯蚓糞研細吹耳中甚效
治小兒耳上生瘡　以雞子白傅之

小兒眼目病論

小兒眼目生病者多因恣食甘酸藏生邪熱熏炙肝經衝發於目或為赤腫痒痛或䀹淚隱澁或生赤脉或生瞖膜又痰飲壅滯肝致臟氣不得宣通者則精彩得明當故黑睛雖全而視物𥇍𥇍此名睛盲若昼日明至暝不見物者此邪干經之陰也謂之雀目言如鳥雀之目瞑時无所見也又有障眼者乃氣毒攻其睛也又有痲肝之氣衝於目者亦能生其瞖膜以為遮障也

惜金散治眼赤腫痛不可忍
白蒺藜子半兩　黃芩一錢半
右為末每用一字沸湯點洗之
又方治如前右取嫩槐芽或嫩葉煎湯放溫洗之白睛如血淚多者最宜用
又方治如前治赤眼腫痛紅疼便截
右以銅綠研細秤二錢半用乳香皂子大二塊同研勻極細點之立効
又方治赤目　右以黃芩為末煎湯淋腳神效
又方治如前　天南星一分去皮臍　乾蝎一分半
右為末每用一字茶調下服了擡頭數次盡
又方洗熱毒眼右以細朴硝沸湯泡澄去滓熱洗之
又方洗風毒熱赤　銅綠一錢　滑石二錢　大黃一兩
右研極細每用少許沸湯點洗
洗心散治心經積熱目赤腫痛
荊芥穗一兩半　甘草一兩生　麻黃一兩去節
右為細末每服半錢或一字蜜水調下
洗肝散治三焦壅熱眼目赤腫隱澁多淚
芍藥一分　羌活去蘆　防風去蘆頭各一分
大黃半分　甘草半分
右為細末服小一字二三歲半錢上者一錢水半盞入灯心黑豆各少許煎數沸食後放冷服須緩石沙銚中煎仍与四順散間服弁用青涼膏貼太陽穴
四順散　當歸去蘆頭焙　芍藥

大黃紙裹煨　甘草炙，各等分

右為末，每服一錢，水一盞，煎至半盞，去滓溫服。更量大小加減，無時。

清涼膏 治眼赤腫痛，貼太陽穴。

右須立秋日已後，取芙蓉葉陰乾為末，每一字或半錢，井花水調，貼太陽穴。

地黃散 治塵熱目赤腫，或赤脈白膜四邊散漫者，猶為易治；若遮黑睛多，致失明，宜用此。

生乾地黃切焙秤　熟乾地黃切焙秤

當歸去蘆焙秤，各等分　黃連去須　大黃去皮，紙裹煨，秤

防風去蘆并叉　羌活去蘆　生犀屑

蟬殼去土　沙苑蒺藜炒，去刺　木賊

穀精草去根　白蒺藜炒，去刺　玄參去蘆，半錢

木通　甘草剉炒，各一錢半

右為細末，每服一字或五分，羊肝湯調下，日三，乳食後。

玄精石散 治眼生赤脈。

玄精石一兩　甘草半兩

右為細末，每服半錢，竹葉湯調下。

羌菊散 治眼生浮翳障膜。

羌活去蘆，一分　菊花揀淨，半兩　防風去蘆并叉枝，一分　山梔子炒，去殼，一分

甘草一分半，炒　白蒺藜炒，去刺，半兩

右為末，每服半錢或一錢，蜜湯調，日三。與決明丸間服。

決明圓

決明子揀淨　車前子　菊花揀淨　川芎

黃連　當歸去蘆，洗淨　大黃

黃芩各半分

右為細末，煉蜜和丸麻子大，每服五歲下三五丸，上者七八丸，煎人參湯或麥門冬湯送下。

又方 治目生黑花浮翳澀痛。

右以貝子一兩燒灰，研極細，入龍腦末少許，點之。

又方 凡小兒數歲，眼中生膚翳，未堅者，不可妄用，但以珊瑚研如粉，每日少少點之，三日見效。

鎮肝散 治瘀熱眼生翳膜。

胡黃連　梔子仁各一分　甘草炙　馬牙硝

青葙子各半分　真珠研，一分　牛黃一分，別研

右為末拌勻，每服一錢，水八分，入荊芥、薄荷各少許，煎至半盞，去滓溫服，食後。

又方 治目睛上生白膜。

右以白礬一分，水四合，於熟銅器中煎取半合，下白蜜調之，用綿濾過，每用芥子許點之，日三。

以上治目暴重昏 右以猪膽白皮紙蘸合[illegible]
作小錠如鹿[illegible]服天境作[illegible]
真珠膏治眼赤不見物睛盲者 真珠末一錢
甘菊花 一分 香豉 一分 井泉石 一分
右為末拌勻用白蜜一合鯉魚膽一枚同[illegible]
於石銀器中慢火熬成膏次入龍腦[illegible]
一錢攪勻每少許時時點之
又方治目盲 右以猪膽一枚取汁[illegible]火上煎
之可圓[illegible]大成丸心大每[illegible]
又方治睛盲神法也如用之視物如[illegible]

右於正月八日二月八日三月六日四月四日
五月五日六月二日七月七日八月二十日
九月十二日十月十二日十一月[illegible]十二月晦日各這
上件神日用桑柴灰一合煎湯於磁器中澄
令極清稍熱洗之如冷即重湯煮令得所
不住手沃之如遇上件神日不得不洗此神
日本法也
決明散治暴因至瞼不可物 蒼朮[illegible]
決精草 一兩 地膚子 決明子 半兩
蒿本 兩

作為細末每服一錢水一盞入荊芥少許同煎
至五分去滓溫服食後
又方治如前 右以黃連不拘多少器內滲成
汁取下入蛤粉相和得所團成錠子每用
以刀子切下一二錢許以猪肝一二兩批
開摻藥在內麻縷扎水一椀銚內煮熟去
熱氣熏眼候溫然後肝食之神效日二服
又方治如前 右以[illegible]於新瓦上炒令黃色
入雄黃半兩同研為細末每用藥一分
猪肝一片批開摻藥[illegible]

又方治如前 右以[illegible]為細末每用一錢猪
肝一片薄批摻藥在中麻縷纏定入砂瓶
中煮熟[illegible]與食 此方治諸藥不效
者服之如神
神金匱本散治氣障眼又治肝熱目赤生病
蒼朮[illegible]
木賊[illegible]
右二味同為細末每用米飲調下一錢
仁齋治毒氣障眼亦治瘡眼
[illegible]仁 杏仁 桃仁[illegible]

郁李仁五个去皮尖　燕荑五个取肉　海螵蛸

北亭小豆大一塊硇砂是也

右於乳鉢內研極細將白家看多少挑匀銷

或綿濾過別入龍腦細末輕粉細末點之

治小兒雀目

以夜明沙炒過爲末猪膽汁和丸

井泉石散治瘡熱攻眼生障瞖致損睛瞳

井泉石一兩　決明石　甘菊花

夜明沙　黄連　晩蚕沙

右爲細末每用一錢米泔一盞入猪肝少許

煎至肝爛熟爲度放温時服

又方治瘡眼右以烏鯽魚骨牡蠣各等分

細末糊丸皂子大每用一丸用猪肝一葉

同藥入　泔煑至肝熟爲度和肝食之

目病引論

小兒有腦熱注目則瞼澁常閉不開又有諸物

因入眼眯之不出又有悞被諸物觸觸傷

損目睛者叙方于後

治腦熱注目常閉不開

右以大黄一分麁剉以水三合浸一宿一歳

兒每日分半合餘坐頂上乾即更塗

以意加服　治悞飛麥芒入目不出

右用新布覆目上持蠐螬於布上摩之其芒

出著布上甚良

又方治諸物入眼中摩之不出右用好墨清水研

汁銅筯點之即出　又方治悞被諸物觸

觸傷目　右深作坑原熟之日二仍避其風寒

黒睛破損亦愈

鼻中病論

肺氣通於鼻鼻氣不和調風冷所乘停滯鼻中

搏於津液使涕液結聚氣不通快不聞臭

香謂之鼻塞若風冷搏於血氣而生息肉塞

滿者謂之齆鼻若冷濕相搏則鼻內生瘡

而有膿汁出也若腦熱攻鼻中乾燥或生

瘡痂鞕而無膿汁也

辛夷散治鼻塞

辛夷葉一兩洗焙乾　細辛去苗半兩　木通

白芷半兩　木香　杏仁

右爲末拌匀用羊髓猪脂各二兩同諸藥於

石銀器內熳火熬成膏赤黄色

少許攪勻放冷每用少許塗任鼻中兒下
兒因嗍吹著顖子鼻塞者只塗顖上
菊花散治鼻塞涕渴
甘菊花揀淨　防風去蘆并叉枝　前胡去蘆
細辛去苗　桂心各半兩　甘草炙一分
右為末每服半錢入乳香少許煎荊芥湯
調下食後服
羨蘼子散治鼻塞不聞香臭水出不止
右以羨蘼子半兩搗為細末以水一小盞煎至
減半令患人仰臥滿含飯一口以藥汁灌

鼻中不過再用瘥又病此兒大者有此病小者未有
治鼻中生瘡有膿者取黑牛耳中垢先撚鼻中貼之
犀角升麻散治腦熱攻鼻燥痛生瘡鼻中惡氣
犀角屑一兩　馬牙硝半兩研　川升麻半兩
黃連去須半兩為末　朱砂半兩研　牛黃一分研
龍腦一分研　右拌勻細每服半錢溫竹葉湯調下
消肺膏治齆鼻不聞香臭鼻中生瘜肉
瓜蒂半兩　細辛去苗
甘草一分炙　附子一个炮去皮臍
右為細末入龍腦少許拌勻煉蜜和丸皂子

八綿裹納鼻中
又方治齆鼻有宿肉出氣不快不聞香臭
右以白礬末和面脂綿裹塞鼻中數日宿肉
隨藥自出
面上瘡論
小兒面上忽遇有經絡虛隙謂鼽寒熱所乘搏
於氣血則生其瘡或如火燒或出膿或黃
水日久不能瘥差今敘方於後
治面上生瘡如火燒
右以赤[illegible]油調傅一名山香霎

又方治如前
右以黃柏末一[illegible]蜜水和傅以差為度
又方治面上生瘡[illegible]汁
右蛇蛻皮炙焦為末和脂豬脂傅上
又方治面瘡出黃水
右以鯽魚頭燒灰研末和醬清汁傅之一日易
又方治面生諸般瘡　右以兔絲湯洗之
又方以大麥燒作灰為末生油調粉調塗神妙大
麥只炒黑焦亦得　又方治面瘡[illegible]
[illegible]一合[illegible]　黃柏一兩判

右為細末每用先以熱灰汁洗瘡淨拭乾傅之
亦治身上如此瘡
又方治面瘡赤腫焮痛　以地榆八兩細剉水
一斗煮至五升去滓適寒溫洗之

唇口病論

風毒濕熱隨其虛處所著搏於血氣則生瘡瘍
若發於唇上生瘡乍差乍發謂之緊唇又
曰瀋唇其發腫者唇常腫大飽亭或上有
瘡較甚者以至唇腫若發於唇里兩廻生
瘡者名口瀋唇若發於口內名口瘡者也

曰瀋口俗云因乳食有瘡熱子則生繫口瘡
也並叙方于後
葵根散治緊唇　葵根燒灰一兩　烏蛇去皮一兩
黃藥半兩為末　鱉甲炙
右為末每用半錢猪脂少許和塗唇上時時用
青黛散治赤口瘡　以青黛一分研末入腦子少許研勻傅上
治小兒及老人諸人口瘡咽痛
吳茱萸去枝梗　地龍去土等分
右為末米醋入生麵調塗足之心
治小兒口傍瘡久不較

亂髮燒灰　故絮灰　黃連去鬚　乾薑等分
右為末每少許乾傅上不過三次愈
治小兒緊唇
右以馬芥汁先刺唇血出以汁傅之日二次
治小兒熱口瘡　以鼓錘燒灰研末傅瘡上
治小兒諸口瘡　以五月五日蝦蟆炙燥為末傅瘡上
燕窠治蓐瘡　治小兒唇口邊肥瘡
白礬一兩燒灰　蛇床子一兩為末
右為末乾摻瘡上立效亦治頭瘡瘡
綠雲散治如前　黃蘗半兩　螺青二錢

右同研勻細每服一字或半錢摻瘡處
又方治口中赤爛　右取黏竿上乳含之
又方治白口瘡　右以黃丹一兩入龍腦少許研
勻蜜和調傅瘡上
又方治口中瘡通白者或白漫、兼亦治瘡齒
右以白殭蠶炒黃色拭去毛盡為末蜜和傅
之立效或以父髮拭口　中淨棗汁塗之
又方治諸口瘡　右以天南星去皮只取中
心龍眼大一塊為細末醋調塗腳心
又方治如前　右以白礬銅綠等分為末搽上

又方治如前　右以湯瓶內鹼爲末臨臥時以
好膩粉於掌心底門舌齒牙[illegible]

香椒散治如前
椒椒　銅綠　臭[illegible]各等分
右爲細末如患咬瘡生瘡[illegible]
擦乾諸

血餘散治緊唇口瘡吻兩角生
右以亂髮燒灰研細和豬脂傅之

又方治如前　右以[illegible]燒灰傅之

牙齒病論

小兒牙齒病者由風熱邪毒干於好陽之[illegible]
[illegible]入於齒[illegible]搏於血氣則生宣爛又云[illegible]
食酸甘肥膩冷熱[illegible]物致有[illegible]
又不刷揩去之亦[illegible]爲[illegible]
血若風濕相搏則爲牙疼如風毒入於[illegible]
邪正氣交爭則爲風痛有蟲動齒者則[illegible]
兼更有一[illegible]口崩牙齒者名曰走馬[illegible]
則兼齒門之下皆之外敘方于後

治牙出[illegible]宣爛臭氣有血
白[illegible]角者[illegible]　牛膝骨一錢

右並於炭火燒煙盡以盞覆之候冷用瓶一
張鋪濕地上頓藥出火毒一夜爲末如常擦
牙用之三上差

又方治如前　蕪荑半兩炒黑　白礬半兩生
右爲細末入射香少許拌勻先以水漱口齒
淨然後用少許擦牙

又方治如前　右以風化石灰一塊大如[illegible]
通赤取出放冷爲末每用少許旋入射香少
許傅牙根瘡上

麥紅散治牙齦腫爛膿血
朱砂一錢研水飛　綠豆粉一兩　腦砂半分研　腦[illegible]射[illegible]
右爲末每用一字傅患處或揩點之

射香散治如前　銅綠半錢　綠豆粉一兩
膽礬半錢火煆過用　[illegible]子一字
右爲末入射少許研勻每服一字揩點患處
有涎即吐

甘露散治小兒胃熱牙齗宣露出血口臭臉腫
赤眼口瘡不欲乳食肌體煩熱及瘡疹已未
發皆可服
熟乾地黃　生乾地黃　天門冬去心
麥門冬去心　枇杷葉刷去毛　枳殼麩炒去瓤

苦參　石斛　各一兩　甘草各半兩
右為末每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服食後量大小加減
治小兒牙宣常有鮮血齒齦臭穢
雄黃一錢　射香半錢
右同研細以紙條子生油塗過摻藥在上火用末莫竹小紙其子看大小用掉在病處
治小兒牙齒宣疳　以黃連為末入射香少許
治蟲蝕牙疼　右以馬齒莧草煎湯含漱之
又方治如前
蒼草　升麻
細辛去苗　甘草各一分
右為剉末　槐黄[illegible]煎湯漱之冷即吐別含漱
藁本散治如前
白附子　川芎　藁本去苗　蒼草各等分
青黛一錢　蘆薈一錢　射香各一字
右拌勻細每服一字或半字揩患處
又方治如前　右以肥皂一个去子滿填鹽在內炭火燒煙盡放冷研細每用一字或半錢
揩患處有涎即吐

舌病論
小兒舌上偶生瘡腫者由風毒邪熱搏於血氣隨其虛處著而生病也發於舌上紫腫者曰紫舌脹若腫脹大木悶而鞭者名曰木舌或治風濕相搏而生瘡者名曰舌瘡若風多而舌腫如吹胞者名曰鼓舌其紫舌木舌鼓舌腫甚者則滿口塞閉氣門皆能殺人
治紫舌腫　右以牛乳飲之　又方治如前
右以新鯽魚薄起肉片子頓舌上數數易之
治舌上生瘡不能飲乳
右以白礬研末和雞子置醋中塗兒足心
又方治如前　右以蒲黃傅之
又方以桑白皮汁塗乳上吮服
又方治如前　右以胡粉細研用豬筒骨中髓調傅之日三
治木舌腫鞭滿口逡巡氣符則殺人
右以釜底煤和鹽等分以酒調表裡塗舌須臾即消熊酒亦得
又方治如前　川朴硝半兩　真紫雪一分　白鹽半
右和研勻細每用半錢入竹瀝三兩滴白湯

許調徐舌上咽津不妨

治舌卒腫如吹胞滿溢出氣不得通無可治者

右以半夏十枚湯洗去滑以苦酒一升煮取五合稍稍含漱之不得咽津戕人咽喉加以生薑一兩同煮亦得

又方 右煎甘草濃汁含之又方以糖醋滿口含之又方治紫舌木鼓腫滿悶氣諸藥不效當用此散 右以舌兩邊以指刮破或以鈹刀決破出其毒血慎勿傷舌下中央脉也若血出不止已及數升者燒鐵篦烙瘡数過已絶之燒鐵篦約度不可大過

小兒衛生總微論方卷第十八

小兒衛生總微論方卷第十九

咽喉病論

小兒咽喉生病者由風毒濕熱搏於氣血隨其經絡虛處所著則生其病若發於咽喉者或為喉痺或為纏喉風或為乳鵝重者或為腮喉痺又或變癰腫或腮頷腫或喉中生一切諸病隨症具方于後

治喉痺腫悶 以露蜂房燒灰研細末每服一錢乳汁調服

以蛇蛻皮燒灰研細末每服一錢乳汁調服

以鯉魚膽七枚和釜底土塗患處

以川升麻含一片

以韭一把杵爛熬傅上冷即易

以白礬皂莢子大含之

以陳白梅一个取肉裹白殭蠶一枚含咽津

以地龍一條研爛內雞子白和勻頓服入喉中

以繩纏扎手大指屈於節上針挑刺出血即差

鐵粉散治如前

鐵葉粉一分 鵬砂一分

右為末每服半錢冷水調下日三 白礬生半兩

蛇蛻散治如前

蛇蛻一分

仁擣肉炒一分 牛蒡子炒半兩 甘草一分生

右為散每服一錢匕綿裹湯浸少時含咽津汁小兒吮之

又方治喉痺咽腫出氣不快

右以鼠粘子二兩炒焦甘草半兩炙黄同為細末每服一錢新水調下更入蜜少許

又方治喉痺不能語　以大豆煎汁放冷含之

以蠶膽少許生姜薄荷汁化服得吐便愈

青魚膽得效得以青黛釀之

治纏喉風赤氣不通　蚍蜉　蜘蛛　當歸　[illegible]

右為末溫酒調下半錢得吐良

又方治如前　蓖麻子去皮三个　朴硝二錢

右為末新水調下一錢未效再服

又方治如前　天南星生　白殭蚕生去絲嘴各等分

右為末每服一字或半錢生姜自然汁調下

又方治如前　右以白殭蚕二箇去絲為末生姜自然汁調更入蜜少許拌勻分二三服或只用半錢一字旋調服之

定命散治纏喉乳鵝等病

川大黄[illegible]　黄連去鬚　白殭蚕[illegible]　甘草[illegible]各一分　膩粉五錢匕

右為細末每用一字竹筒吹入喉中如毒氣攻心肺喉中生瘡嚥飲不得者以兒乳汁調藥一字雞翎蘸探入喉中得吐者治不吐者死

又方治纏喉乳鵝喉痺咽喉頷項腫悶閉塞氣不得通者　右令患人先呷好麻油少許後以蒼耳葉燒灰研細末水調下半錢立效大者增之

犀角散治馬喉痺其候如喉痺更加連咽項頷煩腫甚咽喉閉塞但數數發氣叱喉極惡

犀角屑　射干　桔梗[illegible]　馬蘭根　甘草　川升麻半兩

右為粗末每服一錢半水一盞入竹葉五片煎至六分去滓入[illegible]細細含嚥

又方治如前　右以[illegible]水二盞煎至半[illegible]大小分服

治懸癰腫妨悶　以乾姜半夏等分為末以筯點藥著上半夏以白礬湯洗數次去滑

以硼砂半錢綿裹含之細細嚥津

又方治懸癰[illegible]

右以白礬灰鹽各半兩研細筯頭點上擬正
亦治腫悶口七八滴
治咽喉腮頰腫悶　右以蒜塞耳鼻中
又方治如前
右以馬牙硝搗取兩頭取在中者搗汁服之
又方治如前　右以蒲黃寒水石等分為末
臘月以薄荷水調藥用鷄翎掃上乾即再掃
綠雲散治喉痺馬喉纏喉風重舌木舌一切
咽喉之疾　螺青
盆硝　生蒲黃　生甘草一各等分

右為細末每服一錢生姜自然汁調細細含咽
若已閉塞不通者用竹筒入藥吹入喉中重
舌木舌生姜汁調塗之患處腫痛咽頷者貼之
口瘡舌上生瘡用此藥塗之最效李方叔閣
孝忠皆以此方救人甚多以磁合蜜封收貯
如聖湯治咽喉一切諸疾
甘草一兩　桔梗去蘆一兩
右為粗末每服二大錢水一盞煎至七分去滓溫服
龍石散治如前并治口舌瘡腫
寒水石燒通赤研一兩　朱砂二分研　腦子研半分

右為細末每用少許摻患處病在咽喉者
細吹入喉中無津日五七次臨臥一兩次用妙
如聖圓治咽喉一切諸病
川大黃一分　白礬一分　馬屁勃一分
蝸牛十箇　陳白梅肉
右於五月五日午時取蝸牛以白梅肉同研
爛入藥和丸如綠豆大每用一丸綿裹含化
無津者病重不能咽即研藥作末以筒吹
入喉中滾水三兩盞送之或以淨水
之亦佳

通關散治如前
枯白礬　雄黃水飛　藜蘆去蘆
白殭蠶去絲　猪牙皂角去皮
右各等分為細末每用一字鼻內搐之甚者
以管吹入喉中涎出或血出立愈
治小兒咽喉腫痛塞悶
以桑上螳螂窠一兩燒灰馬屁勃半兩同研
勻細煉蜜和丸桐子大三歲下煎犀角湯研下
三圓大者加之
治小兒飲乳不快覺似喉痺

以沙牛角燒刮取灰塗乳上吮兒無不即差
射干湯治如前咽喉一切諸疾
射干　川升麻各一兩　馬牙硝
馬尾勃各半兩
右為末每服一錢水一盞煎至六分去滓溫服
金露丸治如前　寒水石[illegible]　雄黃[illegible]
硼砂二錢　甘草末四錢　腦子一字
右件同研勻煉蜜和圓桐子大食後含化一圓
荊芥[illegible]治口中生瘡[illegible]
[illegible]　甘草[illegible]　牛蒡子[illegible]

右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去
[illegible]
又方治[illegible]　[illegible]牛蒡子[illegible]
右[illegible]細末每服一錢水一小盞入青鹽少許
煎至六分去滓放溫時時呷
又方若[illegible]　右以[illegible]酒[illegible]　為末又別以藤
蘿[illegible]末各自每服[illegible]蔥末二錢膽礬末一
[illegible]和勻以[illegible]一字[illegible]筒吹入喉中[illegible]
項癭論
小兒項癭[illegible]逆以[illegible]致氣逆不散

[illegible]結而生其水在項[illegible]然漸[illegible]
有餅又云葛根在地泉流浸之人因取[illegible]
以食飲則生項癭故近山居人多有之以葛
生在山中故也
昆布圓治項癭
海藻[illegible]洗去鹹　昆布一兩洗鹹味
草龍膽去蘆一兩　檳榔[illegible]
甜葶藶一兩隔紙炒　牽牛子[illegible]
右為細末麵糊和圓黍米大每服十圓以[illegible]
又方治或生項癭已及一二年
右以黃藥子[illegible]斤須萬州緊重者為上若輕

虛者即是別州所出力慢須用一倍取無灰酒
一斗入藥同瓶口以糠火煨燒一伏時不可
極酒不可有灰待冷即開瓶令患者時時飲
常令[illegible]氣不可令絕酒氣經三五日看之竟[illegible]
止飲不爾便令兒項細也劉禹錫亦著效[illegible]
其驗如神[illegible]燒酒[illegible]香氣出瓶頭有津[illegible]
止不必[illegible]一伏時也仍禁喜怒但以[illegible]子
逐日[illegible]乃知[illegible]也
惡核瘰癧論
小兒臟腑不和及遇項邊經絡虛隙為[illegible]

氣所干為血氣相搏於頸邊結成核子或遇
風寒所加則不消不消名曰惡核若更風溫
相加搏於津液與腑臟相乘則潰化膿血或
結而發或[illegible]生六七枚[illegible]連續不差
名曰腫瘰俗呼瘰子此病藏血氣內外相搏
之病也

皂角膏治頸邊生核子不消

皂角[illegible]　糯米（一合炒黑）　草烏頭（二錢生）
黃皮（二錢炒黑色）

右為末量多少以井花水調點核上未消再

水晶丹下之利過以觀音散補之仍尋

水晶丹

天南星（為末一分）　滑石（生為末二錢）
水銀粉[illegible]　蕪荑[illegible]　巴豆[illegible]

右先研巴豆極細次入蕪荑仁便研勻入粟
米研勻爛飯和圓黍米大每服二五圓量大
小加減臨臥稍飢蔥白湯送下利過忌生冷
硬物仍以觀音散補之方已具前

如聖散治如前

綿黃耆（一兩剉）　連翹（一兩）　鶴蝨（半兩炒）
川大黃（半兩剉炒）　糯米（半兩用斑貓七個炒黃去斑貓）　犀角[illegible]

右為細末每服一錢水八分入酒三四滴同
煎至五分去滓放溫時時服

紫檀散治如前

紫檀香　木香　川朴硝（研）
巻柏（各一兩）　赤芍藥　川大黃（各半兩）

右為細末每服少許以雞子白調塗瘰癧所
塗患處

取瘰癧內消　右以長三寸鯽魚一個去腸以
和皮巴豆填滿麻皮扎定以一束稈草燒留
存性出放冷研為細末爛飯和圓黍米大
每服一丸粟米飲下臨臥未利加一丸[illegible]

又方治如前　右以斑貓一兩去翅足用粟米
一升同炒令米焦黃去米不用只以斑貓為末
入薄荷細末四兩[illegible]烏雞子清和丸如
米大空心茶清下一丸一日加一丸至五丸
止一日加減至一丸後每服五丸

胡麻圓治瘰癧　胡麻[illegible]　[illegible]

右以為末煉蜜和丸麻子大每服七圓
至一十圓熱水下日三見效為度
更用黑母牛糞燒灰研末傅之

一切瘰癧經效方
右以牡蠣火煅通赤取出濕地上紙襯出
火毒一宿每四兩用玄參三兩同爲末麪
糊和丸菉豆大早晚食後酒下各下三十丸
藥盡則病除根本
又方治瘰癧已破未破其效如神
右以如前煅過牡蠣四兩用甘草二兩煎
一錢爲末茶點服日二服
治小兒瘰癧以蝸牛殼一兩用牛乳半升於
瓦中慢火熬令乳盡取蝸牛殼研如粉入大
黄末一分更研勻每服半錢皂莢子仁湯調
下大小便中出惡物差
又方治如前
以白殭蚕去絲觜炒過爲末每服半錢白米飲調[illegible]
龜胷論
小兒有龜胷者因乳母有宿乳[illegible]去之仍以
飼兒忽遇風熱邪毒相干乘傷於肺經致肺
氣滿停重壅胷骨漸高起狀如龜殼曰
龜胷
百合圓治小兒龜胷 百合一兩

川朴硝半兩 杏仁半兩湯浸去皮尖 木通半兩
桑白皮半兩 川大黃半兩 天門冬去心半兩
右爲細末煉蜜和圓黍米大每服十圓米飲下
又方治如前 右以龜尿摩擦胷骨取龜尿法以蓮葉內
頓一物安龜在上用鏡照之則尿自出流蓮葉以物盛
用之甚佳
龜背論
小兒有龜背者由兒在嬰小時髓骨未成強令獨
坐則背隆阜而偶爲風邪干襲于血氣相搏
入骨髓壅滯不散致背高隆起若龜之狀
故曰龜背又名隆背若如陀有峯塊起者是
名駝背乃胎孕之病不可不治
松蘂丹治身龜背
松花一兩洗焙乾 [illegible] 枳殼一兩麩炒去[illegible]
獨活去蘆一兩 防風去蘆并叉枝一兩 川大黃半兩煨
前胡去蘆半兩 麻黃去根節半兩 桂心半兩
右爲細末煉蜜和丸黍米大每服十粒米飲下
又方治如前 右以龜尿摩背脊骨取尿法在前
手足拳攣論
小兒有手脚拳攣者由本氣不強筋骨力弱血氣
不榮而爲風邪所乘[illegible]絡經絡則筋脉縮急
骨本無力則手拳而不能展用脚攣而不能
伸舉也若生下便然[illegible]攣者此胎孕中病不可
治也

薏苡仁圓治手攣不能展開
薏苡仁一兩 當歸去蘆洗焙一兩 秦艽去苗一兩
防風去蘆叉一兩 羌活去蘆一兩 酸棗仁去皮一兩
右爲細末煉蜜和丸雞頭實大每服一圓[illegible]
香荊芥湯化下兒大增之
海桐皮散治脚攣不能伸舉
當歸去蘆洗焙 牡丹皮去心 海桐皮
牛膝去蘆酒浸焙各一兩 山茱萸 熟乾地黃 補骨脂[illegible]
右爲細末每服一錢水八分入葱白二寸煎
至五分去滓溫服

風疲癮疹論
小兒風疲癮疹者小兒肥膚嫩血氣柔弱或因
腠表而腠理疎開或天熱而汗津潤出冬爲
風邪所干搏於血氣彼凝於皮膚之間不能
消散而成瘍成狀相連而生其狀如生薑片
輕者名曰㿔不至改色重者名曰癮疹改赤
赤紫發搔痒搔之不解甚者使人心神悶亂
右先看其色澤白者以牛膝酒浸一宿焙乾
爲末每服一分或半分溫酒調下若色赤
者以釜下黃土研細末生薑蜜水調下一分或半分

又洗方治如前 荊芥 薄荷葉各等分
細辛去苗 白芷
右爲粗末每用兩大匙水一桶取羊蹄菜一
斗連根葉枝莖細剉同煎至葉爛傾盆中先
以帛常蘸熱湯淋浴身體候有汗出即用水
湯淋洗、畢避風忌海鮮毒菜毒物
又塗方治如前
右以白礬一兩二錢煖酒投化用馬尾揾塗之
防風湯治如前
防風去蘆叉枝 鼠粘子 荊芥穗

人參去蘆各一兩 甘草炙 天麻各半兩
右爲細末每用一錢水八分入生薑薄荷各
少許同煎至五分去滓溫服
治卒發風疹 右以石灰不拘多少和酸漿水[illegible]
治小兒癮疹若不治入腹即能殺之
以指湯洗了用蓼子授爛傅之又以杈枝剉
未煎湯洗之又以蠶沙二盞水二椀煮去一椀洗之
又方治如前
右以吳茱萸半升酒二升中煮取五合以綿揾[illegible]
三奇散治風疲癮疹遍身搔之不銷痒

凌霄花　白匾豆　甘草各等分
右為細末每用一字或半錢[illegible]湯調服
又方治風疹癮疹心神迷悶
右以巴豆二兩搥碎用水七升煮取三升以
綿揾拭之
犀角散治風疹不差甚者如滿身之神驗方
犀角屑一兩　烏蛇肉半兩[illegible]
天麻半兩　白附子半兩　白殭蚕半兩
朱砂一兩研　龍腦　麝香各一錢
右拌勻煉蜜和圓黍米大每服十粒[illegible]下

又方治風疹入腹身發舌乾赤[illegible]
右以蔓荊子為末溫酒調下一錢或半錢
又以蚕沙二升水二斗煮一斗洗之
十木癬論
小兒血氣熱為風濕所干搏於血氣蘊於皮膚
之間而生疥癬又云蟯蟲動內外相乘發
雄黃膏治小兒遍身疥癬如要痒而搔之膿血出
雄黃一兩研水飛　雌黃一兩研水飛　松脂一分研
川烏頭一[illegible]去皮臍為末　亂髮一分
右以清脂六兩於銚子中[illegible]熬成油入烏[illegible]

豬脂亂髮[illegible]消盡以綿濾去粗入二[illegible]
末[illegible]磁器中候冷成膏每用少許塗擦
瘡[illegible]亦治癬
又方治同
膩粉一兩　雄黃末一錢　黃丹一錢
蠟一塊　巴豆十粒去皮
葱五根切碎
右用油一兩入葱巴豆煎焦濾去滓入蝕…
藥攪勻候蠟溶取下磁器中或放冷成膏
每用抓破疥癬塗之
碧粉散治如前　蛇床子一兩炒

狼毒半兩　麻黃半兩　青黛半兩
右為末膩粉少許拌勻好油調塗擦神效
又方治如前
大腹子二分　蛇床子二分　硫黃一分半
右為細末入輕粉少許好油調勻臨臥抓破
擦疥上及以藥少許塗手心脚心用手擦[illegible]
熱甚者不過二兩次
治癬新生　右以[illegible]硼砂各一[illegible]同研抓破塗之
又方治[illegible]　右以蛇床子為末和豬脂為膏塗之
又方[illegible]　右以桃樹青皮為末和醋傅之

又方治圓而癬
右以羊蹄根乾生爲末与白礬等分[illegible]
又方治諸癬 右以決明子爲末入少水銀粉研勻
以物擦破癬上塗之立差
又方治如前 斑猫 五个去翅足微炒
鹽豉 四十九粒浴令潤 砂糖 皂子大一塊
右先研斑猫■將細入二味同研成膏令[illegible]
一大豆許津唾調塗上大效
又方治妳癬 黄連 去須 赤芍藥 等分
右爲細末入輕粉少許豬芝麻[illegible]汁調塗先

洗淨拭乾以藥傳之不過數次而愈
治下練癬瘡常對在兩脚 右以白礬灰塗之立差
治上練癬常在頭上 右以[illegible]一兩甘草半兩
同爲末先以溫漿水洗之以帛子拭乾用藥傳
之立乾便差甘草炙過用
又方治如前 右以大枇子不限多少燒存性爲末好
油調傳之
又方治疥癬因用硫黄砒霜藥病愈後[illegible]之
氣不散欲去之 又以藁本煎湯浴之及用洗之

金瘡論

小兒有悞被尖刀物傷其肌膚甚輕淺者皆有
血出不至危殆其重深者有損傷於經脉血
出不止又有因傷中風者則口噤身[illegible]云
破傷風也
治諸金瘡 檳榔 黄連 去須一兩 木香 半兩
右爲細末如治一切金刃所傷血出疼痛以
末傳之血定不痛不膿如脚下指裏血未定
速將藥裹便得連接
又方治諸金所傷血出不止 檳榔
黄連 去須 石膏 各二兩 黄蘗 去皮

右以爲細末隨多少摻傳瘡上血定便入水不妨
又方治如前 右以白芍藥爲末貼傳即住
又方金瘡深者不可以藥速合則内潰傷肉
右但以黄丹滑石等研細末傳之
天鵝散治諸金瘡 右以晩蚕蛾不拘多少爲細
末摻傳傷上用絹帛封裹隨手血止瘡合[illegible]
又方治如前 右以五倍子刷淨爲末掩瘡處
血立止較即無痕
又方治如前右磁石末燒過灰氈帯[illegible]
倉卒之間得一味傳之皆可

治破傷風口噤身強 右以天南星一个防風
二寸同為末先用童子小便洗瘡口後用藥
傅之追出赤水是效
又方治如前 右以肉蓯蓉切作片子曬乾用
一小盞子底上穿一孔合著火燒藥如香煙
從孔中出熏瘡口累效驗
又方治如前 右以猾鰾膠二錢火上炙焦為末
熱湯調下分二服連服一方用一佰一合
內燒鰾至烟漸研細末熱酒調下汗出愈
又方治破傷風腰脊反張牙關噤急四肢強直

右以鷄糞白半升大豆二升半和炒令變色
乘熱用酒沃之微煮令豆味出量性飲之
追風散治破傷風 草烏頭四箇二个生用二个炮去
椒二十八粒 右為末貼瘡上風毒自出
又方治如前 右以黑豆四十粒朱砂一字同研
為末酒半盞調下一字差
又方治如前 右以白麵燒鹽各一撮新水調塗
又方治如前 右以蘇木剉煎濃汁灌瘡中十
數盞不令絕候瘡中黃水出是效
又方 瘡口作白痂死血者極最急以生[illegible]

白蘞研熱酒調下一字或半錢
又方治破傷風經驗 右以狗頂上毛燒灰貼瘡
湯火傷論
小兒有偶被湯潑火燒成瘡者輕則初乃泡起
破有黃水而為瘡也重則便皮破肉傷而為
瘡也切不可便用冷物泥蜜之類塗之恐令
熱氣不出伏留漬爛深傷經脈宜加意治之
叙方于後
麻子膏治湯火瘡經驗
大麻子一合 梔子白皮一兩 香白芷一兩

甘草[illegible]
右為末以豬脂八兩同熬黑色黃以綿濾去
滓盛磁器中[illegible]許塗瘡上
又方以洗麵腳日曬乾炒焦黑研細好麻油調
塗更解熱毒以蕎麥燒灰研細油調塗之止
痛無瘢經驗以水煮大豆汁塗之易差無瘢
以醋和泥傅之治忠憲家婢抱一孩兒誤落
炭火上燒瘡便以醋和泥傅之終無瘢痕
栢子學曬乾通油研之要用時旋為末以好油
掃上如[illegible]清涼[illegible]

以蛇蛻燒為細末油調塗之如水無瘢

又小方麪炒焦黑研和粉生麻油調塗雞
翎掃上大妙又以風化石灰不拘多少
銚子中炒黄色也上出火毒單研細末生
麻油調塗凡傷至重徹痛不已致筋
骨皮肉者皆治

又

以捉一大活鼠先用銚子煎芝麻油一斤至
熱放打死鼠放於前油內煎直至毛骨俱
消濾去渣不用入乳香末沒藥末各半兩
攪勻出火毒成膏磁器盛封紮定掘
一坑深一尺許窖之經三月取出凡遇湯
火傷塗之立效亦治金瘡

小兒衛生總微論方卷第十九

小兒衛生總微論方卷第二十

疳䘌論

小兒有諸疳䘌者由內有疳氣因而蟲動外被風毒所干內外相東搏於血氣蝕發之所作也若發於口鼻牙齒者初則瘡小漸漸蝕大甚蝕有緩急緩者名曰常疳急者名曰走馬疳有至鼻口齦臘牙齒脫落者若發於緣身四支者只名疳瘡若發於陰物者名曰下疳其疳皆不甚痛但微癢而已不覺之間蝕以深大若不早治皆能為害也

澤瀉散治疳蝕其鼻生瘡及鼻下赤爛

澤瀉　川鬱金生　甘草炙
山梔仁炒各一分

右為細末每服小一字二三歲半錢五七歲一錢甘草湯調下日二及用青金散傅之

青金散

銅青　白礬生各一錢

右為末每以少許傅瘡上

黃連散治如前

右先以米泔水洗瘡訖用黃連細末傅之日三四

蘆會散治如前
右以蘆會為末吹鼻中鼻下有瘡即傳
又方治如前
右以熊膽半分湯化塗患處
又方治如前
右以墨牛耳中垢傳瘡上
又方治如前
右以鯽魚膽滴鼻中連三五日甚効
石膽散治疳蝕口鼻生瘡赤爛
石膽一兩　亂髮燒灰半兩　莨菪子半兩炒

地龍去土微炒一分
右為細末入麝香半錢同研勻細每用一字
傳瘡上
又方治疳落口齒蝕透
右以白殭蠶去絲嘴炒黃為末蜜和傳之
又方治疳蝕齒斷爛瘡潰
右以髮不拘多少燒作灰入麝香末少許同研
勻傳瘡上立効
龍骨散治走馬疳蝕口齒潰爛
砒霜一字　粉霜半錢　龍骨一錢

定粉一錢半　蟾酥一字
右先研砒細入龍骨研細方入諸藥入龍腦
半字同研勻細每用少許傳上
治小兒牙疳蝕斷肉潰血出
人中白取法用尿盆內人尿面白者刮取白者
乾柿半兩　麝香半錢
右為細末入糯米飯研勻和劑搓細小短條
子臨時隨牙縫大小剳在病處縫中甚効
又方只用末傳之
治小兒走馬牙疳

右以雄黃不拘多少研細以連紙條子捻上
蘸作紙撚上燒過入鉢中同麝香少許研細
摻瘡上
治小兒走馬疳蝕牙齗潰爛
以膽礬為末薄切作片子反覆捏末於
火上炙令乾研更入麝香研勻傳患處立效
已驗
以五倍子中虫末研細更於麝香拌勻
漿水漱口小兒未能漱者以帛子揾漿水
之須令留漿水氣以藥傳之若斷爛即

已深矣若小兒面上忒骨鑽出 坐[illegible]
如爛梨醬者即用此藥貼之一方用五倍子炒
存性為末傳之
又方 以不蚛皂莢一鋌燒灰臘礬四錢為末
塩一錢 子大用紙包了黃泥周濟炭火煅青
烟起為度頓冷地上碗覆一宿出火毒三日
同研勻細每用先以塩湯漱口了以藥[illegible]
患處至痛後用塩湯漱之妙 以楊梅少許
燒灰存性入麝研勻傳之
治小兒急疳蝕口鼻數日至盡欲死
以文蛤燒灰臘月豬脂和傳
治小兒疳蝕鼻爛 以臘礬一塊燒令煙盡研
末巻病處一二日差
治小兒疳蝕口鼻作瘡黃瘦
石膽一分 蘆薈一分
右同研細末摻病處但頻用即爛肉自然或
臟便[illegible]亦不[illegible]差愈
治小兒疳蝕鼻下兩邊赤者名曰疳鼻
以黃連去鬚為末先以米泔洗淨用末[illegible]
日三四次

又方治如前 石膽一分 黃連去鬚一分
右同研勻細生油調塗之 [illegible]
又方治如前 五倍子三分為末 黃丹一分火飛
右同研勻細以綿裹貼病處或塗之亦得日
四五次
治小兒疳蝕滿口徹鼻 [illegible]
蟾酥[illegible]
五靈脂[illegible]
右相和於[illegible]子內慢火熬[illegible] 每用先去却[illegible]
上爛物後以藥塗之 日[illegible]四五次
治疳瘡 以胡粉熬八分 猪脂和傳油亦得
又方 以蚯蚓洗淨焙乾為末每用先以[illegible]
湯洗瘡拭乾用藥摻之 [illegible]菜子[illegible]傳之
鼴鼠膏治走馬急疳蝕口鼻
鼴鼠一 射香[illegible] 白礬[illegible]
右為細末用獖豬膽汁調藥適稀稠以紙[illegible]
子塗上即差
又方治走馬急疳蝕口鼻數日 同欲死
右以藍澱傳之令遍日十次 夜四次取差
又方治走馬急疳蝕牙齒斷落 損骨

右以天南星一箇當心取作坑子安[illegible]一
塊在內用麵裹燒之候雄黃作汁取二味[illegible]
了合在淨地上出火毒了別研麵裹研為末
次入麝香少許勻之傅擦上量多少用

熊膽膏治走馬急疳蝕口鼻牙齒
熊膽半兩 蚺蛇膽一分研 蘆薈一分研
牛黃一分研 龍腦[illegible]研

右同末更入射香末一錢拌勻以井花水一
小盞攪和藥勻入瓷器中重湯煖火熬成膏
膏每服一豆大薄荷湯化下兼塗瘡上一方

更有黃蘗一分治綠身瘡瘢用少許塗之

蟾蜍散治走馬急疳蟲傷府藏上蝕口鼻牙齒
蟾蜍 乾蟾燒灰半兩 黃石子半兩[illegible]
白礬半兩 生硫黃一分細研 熊膽半兩
雄黃一分研水飛 蘆薈一分研 射香一分研

右件勻細末每用一字煎荊芥湯調下及傅
瘡鼻中瘡生瘡若以少許吹入鼻中日三

蠶蛾散治走馬急疳蝕口齒惡血臭氣[illegible]
開牙齒脫落 黃連末去須三錢 銅綠一錢
水銀一錢用棗肉一箇研 射香 研

右同勻細先淨[illegible]以藥傅瘡上用生[illegible]
香菜覆之[illegible]傅內外

三白散治走馬急疳蝕口牙齒臭爛侵巡狼
狽者 砒霜 粉霜各一兩先研細末 石灰罐煅青二錢用

右件合先左研千下却右轉研千下當極細
膩如粉每用以雞羽尖掃少許瘡上其瘡
[illegible]慎勿多用恐毒入腹無令嚥津比藥見
小兒難用

治[illegible]瘡立效方
黃連一兩半分 膩粉二兩 麝香少許

右為細末先含水洗瘡淨乾貼之

又方治如前
大棗內蛆踏洗淨焙乾 蝦蟆只用四腳炙乾 密陀僧 史君子去殼

右各等分為末先以溫水洗瘡淨用藥摻貼
之又以滴水和元豆大煎史君子湯下五七

又方治急疳瘡
右以蚺蛇膽研細水調傅之

治下疳定效散
好臘茶一兩 訶子一兩去核
膩粉一錢 射香少許

右同為末先用漢葱[illegible]賊川椒三味煎湯洗

熱熏瘡候通手洗令散血辟邪蒸熱

又方治如前

右先以韮菜根打碎百沸湯泡淋洗瘡子搵乾用蜜陀僧不以多少研細末入粉少許匀乾摻傳之效

又方治如前

右以朗生姜一錢去皮火焙研極細匀以油調塗仍先以葱湯洗瘡帛子搵乾然後用藥忌酸鹹油膩等物

癰癤論

小兒生癰癤者由六府不和風毒邪熱干於肌膚搏於血氣入客經絡之間留結而生小者為癤大而無頭者為癰初生則赤腫焮痛外則皮薄而光內則肉腐敗潰變而為膿無頭者須鍼刺破有頭者不必刺也熱則膿出膿血得盡者隨即便差若膿血不盡瘡口合者雖暫得差終須再發或根邊別生若邪毒入深附骨留結者則為附骨癰若出膿之後冷所乘傳得日久不差者則為疽瘡若皮膚雖合而毒氣入裏攻肉轉深以

入汁者此変癰瘡也

右以甘草一兩剉各二寸長用水八分一椀將甘草蘸水文武火上炙至水盡為粗末別用水一椀煎至半椀放温時時量性服取微利其毒自消未利再服

又方治癰癤欲成未見其頭但腫痛不已

官桂　陳皮去白

右件末水調傳腫處

又方治如前

右以大黄朴硝等分為末每用二錢入麵一錢新水調塗

雄黄膏治癰癤纔發赤腫作痛便用龍角散忌冬散三方大效

寒水石煅過兩研　雄黄　天南星半兩生末

黄丹　乳香半兩研

右件匀細蜜調成膏攤帛子上貼之

龍角散

甘草一兩炙　地龍去土焙兩　角刺　荆芥穗一兩

右為粗末每用一合水一盞酒一盞煎至二盞半去滓再至二盞入研細乳香末一錢匕調匀量大小減與服五七歲兒半盞已下分二服日三神驗

忍冬散　忍冬藤一兩　甘草節半兩　大黃生半兩
右同為細末每用三錢匕水一大盞煎至七
分調乳香末半錢匕服如上法
又方治癰癤無頭要生頭
右以蓖麻子一粒新汲水吞下即生頭破而
膿出要兩處破服二粒要破處即逐粒加之
又方治癰癤無頭
右以川山甲猪牙皂角去皮弦各一兩共炙
焦黃為末每用一錢熱酒調下服藥罷其瘡
便破甚妙仍以冬瓜藤為末傳瘡就即水調
傳之諸癰瘡皆可用
乳香膏貼癰癤
松脂半兩研　乳香一兩研　膩粉半兩研
密陀僧半兩研　生地黃汁半兩
右拌勻先用一銚子煎好油四兩黃蠟二兩
至熔熟下諸藥攪勻入射香細末一錢熬成
膏取下磁器盛之窨一宿每用看大小剪貼
于癰藥在上貼之一日兩換
又治癰癤
沉香半兩　黃耆半兩
白歛一分　川朴硝一分　川大黃一分炮　甘草一分
右為粗散每用一錢水一小盞入射香少許

五分去滓溫服
又方治背上生癰癤凡瘡生背上者非善瘡也
右以多年煙熏壁土并黃蘗二味等分為細
末生姜自然汁調成膏攤紙上貼之更以茅
香湯調下一錢匕大妙
治附骨癰
右以猬皮燒灰每服一錢匕以破者以爆爛
乞杖和文蛤爛搗貼封之
治癰瘡久不差敗壞成痿
大蝦蟆一個自死者　亂髮一塊如雞子大　猪脂一斤
右同煎之至消盡去二物再取下入鹽一合
攪勻於冷成膏每用先以龍骨研作粉因瘡
四面厚一分許以膏藥著瘡中日二易有多
出如髮出盡愈
又方治如前　右以白楊葉杵末傳之
又方治如前雞舌香散
沉香各一兩　麻黃去根節　雞舌香　木香
海藻洗去鹹　大黃各半兩
右為粗散每用一大錢水一盞入竹瀝二三
點煎至五分去滓溫服無熱通溫熱淋漓其瘡
治癰疽瘻瘡餘論癰疽方並在損傷門　溫生取

右同研細末每用芥子心許紙上瘡口

惡瘡論

小兒有緣身生諸惡瘡者由府藏有熱衝發於外〻被風濕所干內外相乘搏於血氣隨其經絡壅痺停滯留結而生或大或小或痒或痛破潰成瘡或膿或血或腐或敗挾毒所作者久而不差官曰惡瘡若毒行攻經亦皆能殺人

治兒身生小瘡作痒痛

宣連去鬚一兩　膩粉一分　白及一兩　蕪荑去皮半兩

右為細末先洗[illegible]拭乾生油調塗

治生大瘡作焮痛

黃丹一兩　膩粉一錢匕

右研勻細嚼杏仁取汁調傅

治生瘡如火燒

右以赤葵菜葉杵末油調塗之

治脾毒風瘡如癩

右以好桑葉洗淨蒸一宿日曬乾為末每服一錢溫水調下無時

治惡瘡不識者

右以蜣蜋杵爛絞汁傅之亦治痔瘡

諸惡瘡

右以黃牛蹄甲燒灰細研三燒令極細末入麝香少許拌勻乾摻瘡上

又方治如前

右以地骨皮先刮取浮皮別收之次取浮皮下白皮如粉者為細末又以其下赤堅皮細剉共浮皮一處相和為粗末粗細各貯之每用一粗末一合煎濃汁乘熱洗瘡直候湯冷以軟帛拭乾用細末傅之每日洗傅一次瘥

又方治如前

右炒豉焦至烟絕為細末傅之不過數次差

又方治如前

右以陳小麥半升不犯鐵器中炒黑已若白麥灰半錢同為細末每用少許貼瘡上

又方治如前

黃連去須　黃蘗厚者去粗皮　山梔子去皮　甘草各一兩

右各剉如豆大於沙石銚子內炒令煙絕如黑炭樣放冷研細入射末一錢拌勻先以溫漿洗瘡去膿血淨軟帛拭乾摻藥在瘡上以紙片子蓋了軟帛子包繫護之[illegible]

從入水井傍別一坑坎穿坎注於瀆瀆滿即出
得此藥効愈
治久惡瘡不瘥
右以ㄙ內鬮膩粉和為劑却入骨內深處
火煨熟取出先以溫水洗瘡淨後乃傅之妙
治惡瘡膿血
右以巴豆二十粒搥碎用清麻油二兩煎至
黑焦去豆濾過入黃丹一兩以東引柳條攪
攪之煎成膏每用以絹帛攤藥貼之以差
御燒灰傅之

治小兒魚臍瘡其瘡形狀似魚臍故此亦惡瘡也
以蛇蛻皮炙焦黃一兩燒灰細研用雞子清
旋調以許塗之
治小兒魚臍瘡
以寒食餳燒灰研末傅之以白萵苣莖搗絞
汁先以針刺瘡四畔滴汁於瘡口上
治小兒風氣相搏身生瘡瘍
地龍去土一兩 白殭蠶去絲嘴炒半兩 川芎一兩 甘草一兩炙
右為細末薄荷湯調下一錢或半錢
治惡瘡久不較肉黑爛攄色只

右先以不灰木檳榔各一分為細末摻貼瘡
上候肉紅膿住即用後木香散
木香二錢 檳榔二錢 黃連去鬚四錢
右同為細末乾摻貼上用之必効
烏蛇散治諸瘡久不差變瘻瘡
馬齒莧一兩 烏蛇肉一兩酒浸炙去皮骨
蜂窠半兩炙去刺 亂髮半兩燒灰
曲頭棘針半兩燒灰 綿帛半兩燒灰
右為細末每量瘡大小用生油調藥攤帛子
上貼瘡上

貼久瘻瘡
黃蘗 白膠香 密陀僧各半兩 赤石脂
右為細末乾貼瘡上
又方治諸瘻瘡
右以蝸牛三箇磁合子內收入麝香少許在
了火內燒過研為細末水和小圓子每用一
圓內瘡中又方以牛膝末傅之妙
又方治如前
右以赤小豆黃連等分為末溫漿水入鹽洗
瘡淨摻藥或只以白膠香末傅之亦効

約金散治痔瘡癢出膿水痛不止諸藥無效者
有虫
右以羊羔兒骨不拘多少入藏瓶內鹽泥固
濟炭火燒合宜研細每用末五錢入射末一
錢雄黃末一錢同研拌勻將君瘡大小先以
通手湯洗膿血候口合洗之軟帛拭乾藥貼
瀉痛瘡二當　次生肉三日外瘡合　一

浸淫瘡

小兒生浸淫瘡者由肺有熱熏發皮膚復為風
濕所搏於血氣而生瘡初生甚小後有膿汁
浸淫漸大膿汁著處便生故謂之浸淫瘡也又
一証風毒濕瘡頗似浸淫瘡亦膿汁浸引而生
但瘡疹周此浸淫瘡稍大尔
治浸淫瘡痛不可忍發寒熱
右以刺薊為細末新水調傅瘡上乾則易之
雄黃膏治浸淫瘡極効
雄黃（一兩研水飛）　雌黃（一兩研水飛）　川烏頭（一箇炮去皮臍為末）
松脂（一分研）　亂髮（一分燒灰）
右以豬脂六兩於銚子內熬成油後入下三
味煎至髮消盡以綿濾去滓入二黃末攪勻

盛磁器中成膏每用少許塗瘡上日三次
又方治如前
右以燕脂於燈下用鏡子照瘡口念呪曰
浸淫瘡好夜粧明鏡照紅粉粧每念一遍抹
胭脂塗瘡上如此七遍胭脂抹周遍其瘡由
愈此法極驗甚者不過再
苦瓠散治風毒濕瘡
苦瓠一兩　蛇蛻（半兩燒灰）　露蜂房（半兩微炒）　梁
右為細末每用半錢生油調塗瘡多添之
四生散治△
錦黃耆　白附子
羌活去蘆　蒺藜各等分
右為細末每服一錢溫酒調下

熛漿瘡論

小兒生熛漿瘡者由風熱毒氣客於皮膚搏於
血氣而所生也始生如火燒　湯盪作泡而起
毒即皮破熛漿出以成瘡亦甚疼痛漸引相侵
而生有至遍身潰爛皮肉不可救者故又名爛
瘡宜速治之又一証生瘡瘡長如魚臍黃水
四面亦熛漿泡起此雖與熛漿相似而有
熛漿瘡者先起漿泡破而成瘡此瘡先

後即四面續生漿泡其狀狹長渾似魚臍故名
曰魚臍瘡標漿瘡即不似魚臍也
治標漿瘡神効屢驗
右以栢葉洗淨切碎細研傅之隨手便乾更
取汁半盞水解服之
又方 以桃仁去皮尖熟研和面脂傅之
又方 治標瘡黄爛
右燒艾葉灰傅之一方燒馬骨灰傅之
生地黄膏 治標瘡毒發引遍身
生地黄 去土洗淨 川升麻 藍葉

梔子仁 大黄各一兩
右研細以猪脂八兩同於銚内慢火煎色變
濾去滓以磁合盛放冷成膏每用少許塗瘡上
治小兒面目緣身卒生標泡
右以羖羊角燒灰研細末雞子白和塗神驗
李無 和亦妙
治小兒標瘡如魚胞赤爛成瘡熱痛不可忍
右以磨家驢糞或塊結而不散者不以多少
懸乾地上堆定用手塑作屋狀以灯點着
至欲過盆子合殺令作黒灰勿令白研為

每用一錢和膩粉二錢殘灯油調塗如冰
熱痛甚妙
治小兒標漿瘡起如丁蓋發頭上一兩日後面
上胷背緣身皆生其瘡熱痛
朱砂 半兩研水飛 胡粉一兩半 水銀 半兩
右一處研入水二三滴研至不見水銀無星用臘
月猪脂三兩於銚内慢火熬熔去滓入藥末
攪勻成膏磁合盛放冷即用少許塗之
治緣身生火標瘡如麻豆有膿汁作痒痛一身
尽徧
甘草 芍藥 白歛 黄芩

黄連去須 黄蘗去粗皮 苦參各等分
右為細末用蜜和傅之日二夜一亦可作湯
散煎湯洗之
治小兒標爛瘡 以鉄燒赤淬水中二七遍溫
洗以燒艾熟灰傅之又以酒煎茱萸拭上又以
桃仁杵爛和面脂傅又以赤小豆煮汁冷洗不
過三次差
凍瘡論
小兒有凍瘡者多生於耳輪或脚上由冬月嚴
寒之氣傷客於肌膚搏於血氣所作初

須漸破而成瘡頗難得差至春暖時自可到冬
月冷時復發故名凍瘡
黃蘗膏治凍瘡
黃蘗末　白斂末各一兩
白及末半兩　生芝麻二合杵爛取汁
右同研勻細以蒸韲㔉一枚好酒一盞一處
拌爛成膏每用少許先以童子小便洗瘡了
後以藥塗
又方以雀兒腦髓塗之立差
疿瘡論
小兒夏月多生疿瘡此由盛熱汗津出而腠理

開被風熱毒氣干於血氣所生其狀細碎若粟
如粟芥之類色赤而痒多生額頭胸背之上甚
者徧身俗號痱子痒而搔之亦能成瘡
治疿瘡
以兎絲子煎湯洗之亦治頭瘡及女人面
瘡
治疿瘡痛不止
乾藕節末三兩　生油麻三合
右先杵油麻爛后下藕節末更入生蜜和
調得所塗之三五次差

龍腦散治疿瘡
龍腦一錢研　黃蘗半兩末　白麪二兩
膩粉一兩研末
右件勻每以新綿蘸藥撲上破者傳之即差
又方
右以蚌粉研細用雪水稀調臨臥塗之能效
熱湯浴畢塗之更佳無雪水用新水
又方
右以雪水磨檀香塗疿上
漆瘡論

小兒有偶謂漆傷者本不耐漆或因見聞或因
使新漆器被漆氣所觸便着其毒而生瘡赤狀
似瘑疹破而作瘡微有滲汁亦煩疼痛俗呼為
漆咬瘡也
化毒散治漆瘡痒痛
木通一兩剉　藍葉半兩　麥門冬半兩去心
犀角屑一分　馬牙硝一分　甘草一分炙微赤剉
右麄散每服一錢水一小盞煎至半盞去滓
溫服
柳膏治如前

……苦參一兩 黃芩一兩
右剉散每用三匙水兩碗煎至一碗去滓研
入好薑汁半匙攪勻再熬成膏以磁合藏候
冷用以許塗瘡上

又方 以好麻油生留塗上

以黃芩末剉碎煎濃汁放冷淋之

月蝕瘡論

小兒有月蝕瘡者或生于耳鼻或生手指隨月生
死世云月初生之時兒以手指月乃生其瘡故
因以名之

治耳伴生月蝕瘡
右以黃連為末傅之

治手指生月蝕瘡或腫或破隨月生死
右以竹雞一把苦酒中煮數沸熱出以傅之

治諸處月蝕瘡
右於月望夕取兔屎內蝦蟇腹中同燒研細
傅之

又方治如前
右於五月五日取蝦蟇燒灰研細末和豬膏
傅之

又方治如前
右取蛇蛻皮燒灰研末和豬脂傅

又方治如前亦治月蝕九竅皆有瘡
右燒蚯蚓糞研末和豬脂傅

治月蝕瘡生兩耳出膿水不止
水銀 胡粉一兩入水銀研令星盡 松脂一兩研末
黃連去須為末一兩
右並同研令細以粉瘡上若乾以豬脂和膏傅仍先以鹽湯洗瘡拭乾塗之

方只用胡粉和土傅之

又方治耳後月蝕瘡
敗鼓皮一兩燒灰 蝦蟇一箇燒灰
右同研為末以豬脂和膏塗之

蠼螋瘡論

小兒生蠼螋瘡者因居處屋壁之間有其蟲
曰蠼螋其形寸許腳甚多而細瘦其遊走之時
偶遇人影則尿之隨所尿著處人身則瘡而生
瘡多在腰間初生一赤小瘡纍纍如黍粟稍豆莖葉
不已長出濃汁成瘡因其蟲名而名之也此方
人便為泥逕瘡也未知的否今兩存具之

治[illegible]水瘡
[illegible]竈中土水和傅之亦以猪脂苦酒
和傅
又方 右取白扁豆葉搗傅之最佳
又方 治蠼螋瘡繞身則死 一云[illegible]
取蒺藜葉搗傅之 蟹葉用亦

水毒論

小兒有諸般瘡疹因洗面或洗手脚或澡浴等
偶然水入瘡中即發腫而疼痛名曰水毒宜早
治之不尔則潰爛其瘡宜出膿汁[illegible]

久不能較也
治湯水入瘡為水毒發腫痛
右以香附子乾姜各一分皆燒存性研細末
傅之

赤遊論

小兒患赤遊腫痛者由內有積熱熏發於外
然風毒所干內外相乘搏於血氣則皮膚赤腫
其風邪毒氣隨經絡行遊不定故為赤遊也若
重者隨血氣虛處流注為赤腫或作赤瘤毒
引大毒痛雖思若遊至於心或毒入腹者皆能
殺人
治赤瘤遊遍身上下不定若至於心即危
右以芒硝投湯汁散攪汁拭之亦治丹毒
又方治如前
右以[illegible]洗之
治小兒綠色赤遊引腫起
以米粉熬令黑色研細唾和傅之
治小兒赤遊漸一尺引不止
以牛膝甘草二味等分㕮咀 一方甘草炙減半
每用一兩水一盞煎五分去滓調[illegible]伏龍肝
末塗之大効
又方治如前
以亂髮燒灰以伏龍肝末用膏油和傅
治赤熱瘡腫遊行身上下至心即死
以草鞋亂髮燒灰醋和傅之以伏龍肝研末
雞子白和傅乾即易又以生景天研爛傅上
亦治丹發一方用一握綾汁拭之以水中苔
杵爛傅之又以擂菜杵爛傅之以白豆末水
和傅之乾即易
治頭面緣身生赤毒搶起作片

以栝樓根二兩伏以□□□為末醋調傅
乾即再傅
治赤流腫半身紅漸漸展引不止
以紅藍花末醋調傅之又以菘菜□□□
又方治如前赤腫遊行上下遍身不定
右以芭蕉根汁煎塗之
防己散治如前
防己（半兩） 川朴硝
犀角屑 黃芩 黃耆 川升麻（各一分）
右為細末每服半錢煎竹葉湯調下
木通散治赤遊成片爛赤色如火燥腫毒漸引大

木通（一兩） 川升麻 川大黃（剉，微炒）
川朴硝（各半兩） 梔子仁 甘草（微炙，各一分）
右為粗散每服一錢水一小盞煎至五分去
滓溫服之
蠲毒散治如前
赤芍藥 川大黃（生） 鬱金
蘿蔔 猪牙皂角（去皮子）
右為細散每用少許生油調塗之
又方治如前
右以五味子去枝梗焙乾為末熟水調服下一
錢痛自消神效

又方治如前
右以黃蘗寒水石等分為末用薄荷水研調
雞翎掃塗之乾即再
治赤遊腫遍身入腹即殺人
右取竈下黃土研為末油調塗勿令乾若入
腹及入陰者以慎火草取汁一盞分服如无
生者用乾者末之水調服

赤毒論

小兒丹毒者由風熱毒邪客於腠理搏於血氣
發於皮膚之所作也又千金論小兒黃疸惡毒
皆熱積所成或冬間向火烘衣夜間盖覆太暖
或乳母妄食燒炙飲酒皆令兒病丹發甚其熱
如火輕輕手近則痛不可忍又有五色丹雖赤
色者最多皆燃熱作痛甚者遍身壯熱煩渴悶
亂更有諸火丹其名証甚多不可盡述皆赤丹
之異名也其毒入腹者亦能殺人宜速治之
治赤丹此熱毒所作其色純赤如丹塗之故名
赤丹
右以蕎麥麵醋和傅之一方用蕎麥麵用鵝
脂和餅索串吊起放乾要用時研末

以雞羽翎掃上効如神

又方 以胡荽汁傅之又以寒水石半兩

大黄一分 研細末米醋調傅以藍淀或慎火草

水苔生地黄梔子仁但得一味為末水調傅

之皆可

治白丹[illegible]如吹此風熱所作而風多者其色

則白 [illegible] 伏龍肝一兩

右同為細末每用半錢生油調塗之

治黑丹痛癢此本熱毒復有冷以乘之互相疑

抑故黑色 川升麻 川芒硝 漏芦 大黄各二兩

黄芩 梔子仁各一兩

右為粗末每用兩匙水三盞煎至二盞去滓

稍熱以軟帛蘸搨患處以消為度

治丹五色變易不常此風毒冷熱相搏 [illegible]

伺故色無定也

棗木根湯 丹參[illegible]兩 菊花揀淨一兩

右細剉半匀每用[illegible]匙水二盞煎數沸適溫

熱避風處淋洗

又方治如前

右以蜜和乾薑傅之

[illegible]

右以雞子白和赤小豆傅之

治赤丹

以[illegible]勒[illegible]輕輕摩破醋研調[illegible]勒汁塗之

又以淬鐵水飲一合得打鐵處淬鐵槽中水

[illegible]川

治黑丹此本熱毒[illegible]於血氣熱輕而挾於風多

故色黑也

以[illegible]火二兩 屋四角茅草二兩燒灰同

研細末[illegible]白調塗日三五次[illegible]以猪槽下

泥塗之

治白丹此本熱毒搏於血氣熱輕而挾於風多

故色白也

以猪槽汽灰研末雞子白調塗

治殃火丹生於兩脇腋及髂上

以川朴硝研細竹瀝調下半錢更量大小加減

治天竈火丹發於髀間囊尻間正赤流陰頭腫或

出[illegible]

以[illegible]汰一升水煮去滓取汁洗之

[illegible]又用[illegible]

以赤小豆末一兩牛角二兩燒灰同研勻細
雞子白和塗
治尿竈火丹發膝股起臍間走腿頭
以屋四角茅草燒灰研細雞子白和傅
治天竈丹發兩臂及背膝如火炙
以[illegible][illegible]眼睛草葉和醋研爛傅之亦治赤瘤
治五色丹遍身壯熱如熨燒若遶臍即殺人
以[illegible]藍葉杵爛水和傅之
治丹毒從臍中起
以伏龍肝研末用屋漏水和傅之乾即再用
取効為度如無屋漏水新汲水亦得
治丹隨起於兩脇心背不速治即殺人
以殺羊角屑八兩水五升煎至一升絹濾去
滓入煉了豬脂五兩和勻傅之
治丹毒忽生頭上皮赤漸起暈有碎瘡初發如
錢觸開及身長一寸一尺良久遍体入口耳則殺
府胃爛即死此候可畏宜速治之
以甘草一兩擘破入水一大盞煎湯漏、、
乳母漱口呷含鼓漱、、吐洗病處以手[illegible]
摩指不得把指甲恐傷破仍更甘草湯[illegible]

三用即差
治丹毒
以鯽魚肉細切五合小豆屑三合同杵如泥
水和傅上
千金漏蘆湯治小兒熱毒赤白諸丹癰疽瘡癤
漏蘆 連翹 白斂 芒硝
甘草炙各分 大黃剉 升麻 枳實麩炒
麻黃去根節 黃芩各三分三字
右㕮咀以水一升半煎取五分量兒大小增
減服
治一切諸丹
以馬齒莧杵爛傅之治赤丹熱如火遶腰即損
以黃芩末水調傅之以蓖麻子五箇去殼并
皮研細入麵一匙水調傅之以水煑蒜根洗
之以栗子刺殼煎湯洗之以柳葉一斤水一
斗煑取三升去滓挹洗病處日五六次以[illegible]
[illegible][illegible]水和傅之以蒴藋葉浮萍草五葉藤海
藻葉但得一味為末水調傅之
又方治諸丹已破作瘡出黃水疼痛
右以豆豉炒焦煙絕為細末油調傅之

千金麻黃湯治諸卅惡毒發處如火輕手近則痛不可忍急與砭刺出血仍與此湯幷搨湯治之

麻黃去根節 升麻 葛根各一兩 射干

雞舌香 甘草炙各半兩 石膏半合

右㕮咀以水三升煮取一升三歲兒分三服日三

搨湯治諸般數十種丹毒

大黃生 甘草生 當歸 芎藭

白芷 獨活去芦 黃芩 赤芍藥

升麻 沉香 木香

木蘭皮各一兩 芒硝三兩

右㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝攪拌以綿搵搨之乾則易仍適溫熱用取差止

消毒散治諸丹發赤腫作痛甚及赤遊腫背及

川升麻

川大黃剉炒微炒 黃芩各半兩 川朴硝各一分 麥門冬

右爲粗末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

鱗體論

鱗體者謂皮膚之上如蛇皮鱗甲之狀[illegible]又[illegible][illegible]此由氣血否澁不能通潤於皮膚矣又生下便有者此兒在母腹形像未具之時母曾[illegible]有[illegible]或服藥餌有犯鱗甲細碎織毒之物[illegible]激而化之故又謂之胎垢謂生下身皮[illegible]若鱗者也此必難治

治小兒身上皮膚若蛇皮之鱗

以[illegible]絲[illegible]為末煎湯適溫煖浴之

一云[illegible]蛇[illegible]煎

疕靨論

疕靨者謂皮膚之上生赤色或黑色之點大小不等如滓粒之狀緣身猶可若生面上則爲惡之女子尤甚此由風邪搏於津液之氣而[illegible]又言因傅明粉皮膚虛而謂粉氣入於腠理[illegible]生又有生下便有者此由兒在胎中形像未[illegible]之時母食雜有毒感氣而化又有父母遺休[illegible]其[illegible]此下二類不可治也

治小兒皮膚上生赤疕

以馬尿洗之日四五次

又方治小兒生下赤黑疵

以針刺父脚中血滴疵上即消

又以狗熱尿傅之疵自卷落

小兒衛生總微論方卷第二十

新編婦人大全良方二十四卷辨識修製藥物法度一卷

（宋）陳自明撰

元勤有書堂刻本（四庫底本）

婦人大全良方二十四卷、大學士英廉家藏本

宋陳自明撰。自明字良父、臨川人。官建府醫學教授。是編凡分八門。首調經、次衆疾、次求嗣、次胎教、次妊娠、次坐月、次產難、次產後。每門數十證、總二百六十餘論、論後附方案。婦人專科始唐昝殷產寶、其後有李師聖之產育寶慶集、陸子正之胎產經驗方、大抵卷帙簡略、流傳亦尠。自明採摭諸家、提綱挈領、於婦科證治、詳悉無遺。明薛己醫案曾以己意刪訂、附入治驗、自為一書。是編刻於勤有書堂、猶為自明原本。前有嘉熙元年自序、稱三世學醫、家藏醫書若干卷、又徧行東南、所至必索方書以觀。其用心亦可云勤矣。

世之醫者於婦人一科有專治婦人方有產
寶方治以專病得專攻也方以寶言愛重之
也蓋醫之術難醫婦人尤難醫產中數證
則又險而難彼所謂專治者產寶者非
不可適用也然而其說疏漫而無統節目詳略而未
備醫者盡於簡易不能深求遍覽有才進一
方不效輒束手者有無方可據揣摩臆度者
有富貴之家鄙藥賤而不服者有貧乏之人憚藥
貴而無可得服者有醫之貪利以賤代貴失
其正方者古云看方三年無病可治治病三
年無藥可療又云世無難治之病有不善治
之醫藥無難代之品有不善代之人此之謂
也僕三世學醫家藏醫書若干卷既又編
行東南所至必盡索方書以觀暇時閑閱淨
室翻閱涵泳究極未合採摭諸家之善附以
家傳經驗方秤而成編始自調經訖于產後
凡八門門數十餘證總二百六十餘論論後
有藥藥不惟其貴賤惟其效綱領節目燦
然可觀庶幾病者隨索隨見隨試隨愈僕
於此編非敢求異昔人也盡以補其偏而會
其全聚於散而斂於約期使無憾云爾愚者
千慮必有一得君子毋以人廢言嘉熙
元年八月良日建康府明道書院醫諭
臨川陳 自明良父序

新編婦人大全良方綱目

凡八門

調經門　凡醫婦人先須調經故以為初

衆疾門　經脈不調衆疾生焉故以次之

求嗣門　衆疾既無須知求嗣故以次之

胎教門　求嗣已明須知胎教故以次之

妊娠門　胎教已明須知妊娠疾病故以次之

坐月門　妊娠疾病已明須知坐月故以次之

產難門　坐月已明須知產難故以次之

產後門　產難已明須知產後疾病故以次之

新編婦人大全良方目録

辨識修製藥物法度

卷之一　　臨川　陳自明良甫編

○調經門　凡醫婦人先須調經故以為初

月經序論第一

精血篇第二

產寶方序論第三

王子亨論第四

月水不調方論第五　凡四方

紫石英元　加減茱萸湯　薑黃散

桃仁散

月水不通方論第六　附諸方論

養生必用論經病第七　凡十方

當歸散　琥珀散　救急方

產寶方　梅師方　萬病元

紅花當歸散　鱉甲元　桃仁散

室女月水不通方論第八　凡二方

通經元　聖惠一方

室女經閉成勞方論第九　凡十方

柏子仁元　澤蘭湯　沉香鱉甲散

金花散　劫勞散　資血湯

麥煎散　鱉煎元　八仙飲子

茅香飲子
血枯方論第十　凡四方
烏賊魚骨元　茯苓元　乾地黃湯
磁石元
月水不利(不通附)方論第十一　凡四方
白薇元　牡丹散　牛膝散
月水行或不行心腹刺痛方論第十二　凡六方
溫經湯　桂枝桃仁湯　地黃通經元
琥珀散　萆薢元
月水不斷方論第十三　凡六方
牡丹元　續斷元　禹餘糧元
牡蠣元
婦人殺血心痛方論第十四　凡二方
崩暴下血不止方論第十五　凡三十六方
小薊湯　阿茄陀元　琥珀散
五靈脂散　荊芥散　獨聖散
神應散　金華散　如聖散
如神散　香附元　竹茹元
如聖無比散
崩中帶下方論第十六
崩中漏下生死脉論第十七　凡三十三方
鹿茸元　柏葉散　益母草散
白芷散　乳香散　破故紙散
白蘞元　伏龍肝散　茯苓散
千金溫經湯　紫金散　沉香牡丹元
白芷暖宮元　竹茹元　地黃元
婦人白濁白淫方論第十八　凡一方
蒲黃散
婦人天癸過期經脉不調方論第十九　凡二方
當歸散　茱萸鹿茸元
婦人血分水分腫滿方論第二十　凡三方
椒仁元　葶藶元

卷之二

眾疾門　經脉不調眾疾生焉故以次之

極一方論第一
產寶方論第二
博濟方論第三
寇宗奭論第四
通用方序第五　凡十七方
四物湯　佛手散　丹參散
勝金元　金釵煎　交加散
玉露通真元　補中元　二聖散
二聖大寶琥珀散　白朮煎
沉香琥珀煎　滋血湯　烏雞煎元

卷之三

婦人中風方論第一　凡十方
至寶丹　蘇合香元　五積散

芎藭清心元　大八風湯　排風湯
三生飲　參蘇飲　木香煮散
附子理中湯　加減小續命湯
小風引湯　千金竹瀝湯
婦人中風角弓反張口噤方論第二　凡八方
小續命湯　葛根湯　桂枝加烏頭湯
附术散　桂心白术湯　附子防風散
八物白术散　白殭蠶散　烏蛇元
婦人中風口噤方論第三　凡三方
天南星散　走馬散　烏蛇散
婦人中風不語方論第四　凡三方
神仙解語丹　防風湯　竹瀝湯
婦人風痺手足不隨方論第五　凡二方
三痺湯　三五七散
婦人中風自汗方論第六　凡六方
獨活湯　續命煮散
婦人臂痛方論第七　凡□方
栢子仁元　舒經湯　茯苓元
控涎丹　白芥子散　流氣飲子
婦人賊風偏枯方論第八　凡三方
大八風湯　增損茵芋酒　續斷湯
婦人偏風口喎方論第九　凡二方
防風湯　深師續命湯
婦人血風心神驚悸方論第十　凡二方
茯神散　龍齒元　朱貢琥珀散
婦人失血過多心神不安方第十一　凡一方
寧志膏
婦人風邪顛狂方論第十二　凡四方
防風散
婦人飛尸血厥方論第十三　凡六方
太一神精丹　蘇合香元　雄朱散
白薇湯　倉公散

卷之四

婦人血風身體骨節疼痛方論第一　凡五方
芎藭散　羚羊角散　通靈元
當歸沒藥元　大効虎骨散
婦人血風白虎歷節走疰方論第二　凡七方
海桐散　四生元　麝香元
芍藥知母湯　附子八物湯　獨活寄生湯
婦人血風癮疹瘙痒方論第三　凡八方
何首烏散　附子酒
婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四　凡七方
養正丹　鈎藤散　斗門方
蔓荊子散　四神散　川芎散
婦人血風頭痛方論第五　凡九方
許叔微方　七生元　芎辛湯
如聖餅子　玉真元　硫黃元
白附子散

婦人項筋強痛方論第六 凡五方
追風散 急風散 [illegible]附散
都梁元 木瓜煎
婦人腰痛方論第七 凡二方
如神湯 獨活寄生湯
婦人腰腳疼痛方論第八 凡三方
酸棗仁散 骨碎補散
婦人腳氣方論第九 凡十一方
牛膝散 大腹皮散 半夏散
犀角散 木香散 紫蘇散
桑白皮散 薏苡仁散 四白散
蒼朮元

卷之五
婦人勞瘵序論第一
二十四種蒸病論第二 凡二十一方
雞蘇元 防風湯 溫金散
桔梗飲子 瓜蔞湯 子芩散
含化元 河車元 補肺湯
四君子湯 養正膏 豬肚元
婦人骨蒸勞方論第三 凡十五方
天靈蓋方 獺肝元 黃耆元
柴思元 鱉甲散 麥煎散
筒骨煎
華佗方 沈蘇良方 地黃煎元

石膏散 青蒿散 鱉甲煎元
逍遙散 枳殼散
婦人血風勞氣方論第三 凡十四方
人參荊芥散 鱉甲元 琥珀元
香甲散 地黃煎 荊芥散
荊芥黃散 如聖散 乞力伽散
大効油煎散 血風勞方 又香甲散
馬鞭草散
婦人風虛勞冷方論第四 凡二方
澤蘭散 紫石英元
婦人冷勞方論第五 凡七方
桃仁散 木香元 熟乾地黃元
硇砂煎 [illegible]耆散 大香甲元

卷之六
婦人熱勞方論第一 凡四方
[illegible]耆散 半夏散 豬肚元
秦艽散
婦人客熱方論第二 凡三方
麥門冬散 犀角散 黃耆散
婦人寒熱方論第三 凡四方
地骨皮散 生地黃散 柴胡散
荊芥散
寡婦寒熱如瘧方論第四 凡一方
生地黃元

婦人惡寒方論第五　凡一方
婦人血風頭悶方論第六　凡四方
川烏頭元　赤芍藥散　酸棗仁散
當歸散
婦人血風攻脾不能食方論第七　凡四方
婦人夢與鬼交方論第八　凡十方
茯神散　桃仁元　辟瘟丹
婦人傷寒傷風方論第九　凡八方
桂枝紅花湯　黃芩芍藥湯　當歸湯
瀉心三黃湯　乾地黃湯　燒裩散
青竹茹湯　當歸白朮湯
婦人熱入血室方論第十　凡五方
小柴胡湯　乾薑柴胡湯　海蛤散
婦人咳嗽方論第十一　凡九方
黃耆散　蛤蚧元　含化元
貝母湯　定喘湯　補肺湯
金不換散　橘皮湯
婦人勞嗽方論第十三　凡二方
四滿元
婦人喘滿方論第十四　凡六方
神秘湯　杏子散　千緡湯
寒膏元　神授湯　九寶湯
婦人風痰方論第十五　凡八方
旋覆花湯　天南星元　柴胡半夏湯
金沸草散　人參散　大半夏湯
四七湯
婦人心胸嘈雜方論第十六　凡二方
旋覆花湯　半夏茯苓湯
卷之七
婦人嘔吐方論第一　凡八方
益智子散　丁香散　竹茹湯
撥花散　半夏元　人參七味元
婦人霍亂方論第二　凡六方
加減理中元　千金[illegible]順湯　縮脾湯
香薷散　訶子散　胡椒湯
婦人翻胃吐食方論第三　凡二方
白垩散　白芷散
婦人血[illegible]方論第四　凡一方
牡丹煎
婦人鼻衄方論第五　凡七方
刺薊散　伏龍肝散　茅花湯
婦人吐血方論第六　凡十二方
雞蘇散　千金翼湯　柔脾湯
四生元　犀角地黃湯　青餅子
婦人痃癖諸氣方論第七　凡四方
乾薑甘草湯
麝香元　神効方　葱白散
桂枝桃仁湯

婦人疝瘕方論第八　凡四方

乾漆散　硇砂元　巴豆元

良方黑神元

婦人八瘕方論第九　凡一方

桃仁煎

婦人腹中瘀血方論第十　凡二方

桃仁散　桃仁元

婦人癥痞方論第十一　凡三方

川山甲散　蓬莪茂元　丁香元

婦人食癥方論第十二　凡二方

硇砂元　礞石元

婦人積年血癥塊方論第十三　凡七方

乾漆元　琥珀元　硇砂元

没藥元　五靈脂元　三稜煎

水府丹

婦人血氣心痛方論第十四　凡六方

烏藥散　阿魏元　雞舌香散

陳氏二神元　抽刀散　靈苑方

婦人血氣心腹疼痛方論第十五　凡二十方

延胡索散　琥珀散　没藥散

瑞金散　八仙散　不換金散

定命散　大効琥珀散　蠲痛散

没藥散　牡丹散　至聖湯

葛草湯元　延胡索散

當歸煎元　神聖北亭元　琥珀散

婦人血氣小腹疼痛方論第十六　凡四方

蔵靈散　當歸散　靈苑方

石灰散

婦人兩脇脹痛方論第十七　凡六方

草豆蔲散　菴䕡子散　人參紫金元

氣針元　木通散　三稜散

婦人心腹脹滿方論第十八　凡□方

白术散　檳榔散　木香散

卷之八

婦人淋瀝小便不通方論第一　凡十一方

木通散　石韋散　桃膠散

金沙散　雞蘇散　火府丹

婦人轉脬不得小便方論第二　凡五方

滑石散　葵葉散

千金翼方　葱白湯　石韋湯

婦人小便數方論第三　凡三方

鹿茸散　桑螵蛸散

婦人遺尿失禁方論第四　凡七方

鹿茸元

婦人小便出血方論第五　凡九方

鹿茸散　髮灰散　生乾地黃散

當歸散

婦人大便不通方論第六　凡八方

牽牛子散　通神散　牽牛元
大麻仁元
婦人風入腸間或秘或利方第七　凡四方
蘇麻粥　大五柔元　二仁元
蜜兌法
婦人泄瀉方論第八　凡八方
香朴元　桂香元　豆蔻分氣散
五香散　豆蔻元　胃苓散
人參豆蔻散　木香散
婦人協熱下利方論第九　凡三方
三粉丹　四味阿膠元
婦人滯下方論第十　凡十二方
白頭翁湯　神术散　六神元
三黃熟艾湯　四順附子湯　三建丹
加味參附湯　香茸元　參香散
豆蔻餅　調中湯
婦人嘔噦方論第十一　凡七方
橘皮乾薑湯　半夏生薑湯　橘皮竹茹湯
生薑橘皮湯　退陰散　猪苓湯
婦人大便下血方論第十二　凡八方
防風如神散　木香烏荊元　地榆湯
腸風黑散
婦人痔瘻方論第十三　凡五方
鱉甲散　猬皮元方

婦人脫肛候方論第十四　凡五方
聖惠一方　集驗方　孫真人方
婦人陰腫方論第十五　凡六方
菖蒲散　麻黃湯　白礬散
婦人陰癢方論第十六　凡十方
大黃散　備急方　崔氏方
礬石散
婦人陰冷方論第十七　凡六方
五加皮浸酒方　僧深方
坐導藥方　坐藥法
婦人陰挺出下脫方論第十八　凡六方
當歸散　黃芩散方　千金翼方
婦人陰中生瘡方論第十九　凡五方
集驗方　肘後方　黃芩湯
雄黃散
婦人傷丈夫頭痛方論第二十　凡二方
集驗方　桑白皮湯
婦人交接輒血出痛方論第二十一　凡二方
千金方
婦人交接他物傷方論第二十二　凡二方
集驗方
婦人小戶嫁痛方論第二十三　凡四方
千金方

求嗣門　疾病既無須知求嗣故以次之

陳無擇求子論第一
褚尚書求男論第二
婦人無子論第三
千金翼求子方論第四　凡廿四方
男女受胎時日法　推王相時日法
推貞宿日法　七子散　慶雲散
盪胞湯　坐導藥　紫石英元
延年方　內灸元　秦桂元
養真元　白薇元　地黃湯
金城太守白薇元　千金翼白薇元
茱萸元　紫石英元
温隱居求嗣保生篇方論第五　凡一方
續嗣降生丹

卷之十

胎教門　求嗣已明須知胎教故以次之

姙娠總論第一
娠子論第二
受形篇第三
論胎教第四
孕元立本章第五
凝形殊稟章第六
氣質生成章第七
轉女為男法第八

卷之十一

脈例第一
診婦人有姙歌第二
驗胎法第三　凡一方
胎殺避忌產前將護法第四
月遊胎殺第五
十干日遊胎殺第六
十二支日遊胎殺第七
六甲旬遊胎殺第八
太史局日遊胎殺第九
食忌論第十
孕婦藥忌歌第十一

卷之十二

姙娠門　胎教已明須知姙娠疾病故以次之

姙娠隨月數服藥及將息法第一　凡二十方
烏雌雞湯　補胎方　艾湯
黃連湯　雄雞湯　茯神湯
菊花湯　調中湯　阿膠湯
安中湯　安胎當歸湯　麥門冬湯
柴胡湯　旋覆花湯　葱白湯
杏仁湯　芍藥湯　葵子湯

半夏湯　錯骨湯
妊娠惡阻方論第二
白术散　人參丁香散　醒脾飲子
保生湯　二香散　近效方
安胎飲
妊娠痰逆不思食方論第三　凡五方
半夏茯苓湯　張氏方　茯苓元
茯苓散　集驗方　柴胡湯
胎動不安方論第四　凡三十方
集驗方　安胎方　鉤藤湯
護胎法　産寶方　黄耆湯
又産寶方　安胎織罩散　銀苧酒
養生必用方　産寶方　寄生湯
順氣飲子　文仲寄生湯　秦艽湯
止痛湯　膠艾湯
妊娠漏胎下血方論第五
妊娠卒然下血方論第六　凡十一方
妊娠驚胎及僵仆方論第七　凡七方
催生神妙佛手散　竹茹酒
秦艽湯　鈎藤湯
妊娠胎上逼心方論第八　凡七方
紫蘇飲　當歸湯
妊娠忽然下黄汁如膠或如豆汁胎動腹痛方第九　凡二方

妊娠誤服毒藥傷動胎氣方論第十　凡二方
奪命元　[illegible]痛方　阿膠散
妊娠心痛方論第十一　凡七方
川芎當歸湯　白术湯　千金方
妊娠心腹痛方論第十二　凡十[illegible]
當歸芍藥散　白术散　草豆蔻散
阿膠散
妊娠中惡方論第十三　凡三方
當歸散
妊娠腰腹及背痛方論第十四　凡十方
當歸散　通氣散　大地黄元
小品苧根湯
妊娠小便痛方論第十五　凡[illegible]
當歸散
妊娠心腹脹滿方論第十六　凡三方
倉公下氣湯　訶梨勒散
卷之十三
妊娠數墮胎方論第一　凡五方
千金方　劉[illegible]方　廣濟方
紫石英元　卷柏元
妊娠胎不長養方論第二　凡五方
集驗方　養[illegible]　白术散　黄耆散
養胎人參元　白术元
妊娠胎動安不得却須下方論第三　凡七方

牛膝湯　桂心散　小品方
文仲方
妊娠墮胎後血下不止方論第四　凡九方
龍骨散　千金方　救急方
妊娠日月未足欲產方第五　凡四方
集驗知母元　槐子元
斷產方論第六　凡四方
小品方　斷產方　千金方　廣濟方
妊娠咳嗽方論第七　凡八方
款冬花散　桂心散　馬兜鈴散
麻黃散　百合散　紫菀湯
妊娠吐血衄血方論第八　凡二方
馬勃方　白茅花湯
妊娠子煩方第九　凡七方
竹葉湯　竹茹湯　麥門冬散
柴胡散　人參散　黃連湯
益母元
妊娠煩躁口乾方論第十　凡四方
升麻散　知母散　葛根散
人參黃耆散
卷之十四
妊娠中惡方論第一　凡四方
防風散　白朮酒
妊娠風痙方論第二　凡十方
麻黃散　防風葛根散　小品湯
葛根湯
妊娠腹內鬼胎方論第三　凡三方
雄黃元
妊娠傷寒方論第四　凡二十方
加減四物湯　阿膠湯　葱白湯
前胡湯　蘇木湯　黃龍湯
柴胡石膏湯　枳實散　旋覆花湯
麥門冬湯　梔子大青湯　芍藥湯
當歸茯苓散　白朮散　柴胡散
麻黃散　升麻散　生地黃湯
良方白朮散　竹葉湯
妊娠時氣方論第五　凡三方
秦艽散　葛根飲子　消熱飲
妊娠熱病方論第六　凡九方
葱白蘆根湯　梔子仁飲子　大黃飲子
妊娠傷寒熱病防損胎方論第七　凡七方
升麻散　前胡散　石膏湯
梔子仁飲　伏龍肝方
妊娠熱病胎死腹中方論第八　凡四方
黑神散　催生湯　鹿角散
烏雞方
妊娠瘧疾方論第九　凡四方
集驗方　千金方　黃芩散

七寶散
姙娠霍亂方論第十　凡四方
人參散　白朮散　木瓜煎
止渴飲　縮脾飲

卷之十五

姙娠泄瀉方論第一　凡二方
厚朴元　草菓飲
姙娠下痢赤白及黃水方論第二　凡十五方
地榆散　赤石脂散　熟艾湯
黃連阿膠散　艾葉湯　梔黃方
厚朴散
姙娠大小便不通方論第三　凡十方
豬苓散　葵子散　當歸散
姙娠小便不通方論第四　凡八方
杏仁元　苦參元　葵子散
八味元
姙娠子淋方論第五　凡五方
地膚大黃湯　黃芩湯
姙娠遺尿方論第六　凡三方
白薇散
姙娠尿血方論第七　凡五方
千金方　艾葉酒　地黃酒
續斷湯　熟地黃湯
姙娠胎水腫滿方論第八　八[illegible]　凡十一方

天仙藤散　茯苓散　崔氏方
澤瀉散　防己湯　千金鯉魚湯
商陸赤小豆湯　腎著湯　指迷方
姙娠腹內鐘鳴方第九　凡一方
襲齊總孕癖方第十　凡一方
姙娠不語論第十一
姙娠傷食方論第十二　凡一方
木香元　白朮散　大棗湯
姙娠臟燥悲傷方論第十三　凡一方

卷之十六

坐月門　姙娠至月須知坐月故以次之
產寶方周頲序第一
將護孕婦論第二
滑胎例第三　凡八方
滑胎枳殼散　張氏方　内補丸
易產滑胎方　神寢元　榆白皮散
豬肚方　保氣散
月空方位例第四
逐月安產藏衣忌向方位第五
推婦人行年法第六
體玄子借地法第七
禁草法第八
禁水法第九

入月預備藥物第十
催生符第十一

卷之十七

產難門 此門所論產難故以次之

產難論第一
楊子建十產論第二 凡一方
催生方第三 凡三十八方
催生柞木飲子 如神散 如聖散
曹秀才方 催生丹 乳香方
如神開骨膏 蛇蛻方 遇仙丹
如聖膏 小金散 陸氏方
兔血散 集驗方 備急方
如意散 七聖散 神妙乳珠丹
小品方 文仲方
郭稽中產難方論第四 凡二方
勝金散 神應黑散
產難子死腹中方論第五 凡十八方
當歸葵子散 錫粉元 十全方
趙和叔傳方 何氏方 水銀方
文仲方 崔氏方 一字神散
鄧知縣傳方
產難生死訣第六

卷之十八

產後門 產難既明須知產後疾病故以次之

產後將護法第一
產後調理法第二
產後通用方論第三 凡二十二方
黑神散 烏金散 桃仁煎
增損澤蘭元 醋墨方 四味湯
玉露散 地黃煎 理中元
黑龍丹 當歸散 勝金元
黑散子 朱砂元 豊粉散
地黃酒 地黃元 琥珀散
大當歸方 許仁則方
產科序論
胞衣不出方論第四 凡二十二方
奪命丹 牛膝湯 花蕊石散
牛膝散 救急方 延年方
治胞衣不下訣
產後血暈方論第五 凡十六方
清魂散 廣濟方 獨行散
張氏方 近效方 崔氏方
奪命散
產後顛狂方論第六 凡三方
何氏方

產後狂言譫語如有神靈方論第七 凡一方
產後不語方論第八 凡二方
七珍散 胡氏孤鳳散
卷之十九
產後乍見鬼神方論第一 凡三方
調經散 柏子仁散
產後臟虛心神驚悸方論第二 凡十方
茯神散
產乳七寶散 琥珀地黃元
產後心驚中風方論第三 凡五方
產後中風恍惚方論第四 凡四方
千金方 天麻元
產後所下過多虛極生風方論第五 凡一方
濟危上丹
產後虛汗不止方論第六 凡六方
麻黃根散 千金方 止汗散
人參湯
產後冒悶汗出不識人方論第七 凡十方
產後汗出多而變痓方論第八 凡十四方
小續命湯 大豆紫湯 小品方
中風口噤角弓反張方論附
荊芥散 小品方 羌活酒
寶方 千金雞屎醴 張文仲方
經效方
產後中風方論第九 凡七方
郭稽中產後中風方論
經效方
產後中風筋脈四肢攣急方論第十 凡四方
產後熱悶氣上轉為腳氣方論第十一 凡一方
卷之二十
產後遍身疼痛方論第一 凡二方
趁痛散 五積散
產後腰痛方論第二 凡二方
廣濟方 救急方 大豆酒
陳氏如神湯 桃仁湯 五香連翹湯
產後惡露不絕方論第三 凡九方
廣濟方 文仲葛氏方
獨聖湯 牡蠣散
產後惡露不下方論第四 凡八方
芍藥湯 備急丹 荷葉散
廣濟方 沒藥元
產後餘血上搶心痛方論第五 凡一方
產後惡露不盡腹痛方論第六 凡十方
大岩蜜湯 失笑散 蜀椒湯
[illegible]澤蘭湯 產寶方
地黃散 卷荷散 芸薹散
產後兒枕心腹刺痛方論第七 凡十八方
延胡索散 天仙藤散 蒲黃散
黑神散 桃仁芍藥湯 廣濟方

必効方　千金方　千金茱萸酒
薑黃散　獨聖散　凡六方
產後小腹疼痛方論第八
延胡索散　香桂散　紫金元
產後寒疝方論第九　凡三方
羊肉湯　産寶方
產後兩脇脹滿氣痛方論第十　凡六方
經効方　當歸散
產後積聚癥瘕方論第十一　凡三方
桃仁散　三稜散　桂心散
產後血瘕方論第十二　凡八方
鼈甲元　產寶方　千金方
凌霄花散　葛氏方　蓬莪茂散
產後餘血奔心煩悶方論第十三　凡九方
[illegible]散方　經効方
產後虛煩方論第十四　凡七方
薤白湯　竹根湯　人參當歸湯
甘竹茹湯　千金必效方　赤小豆散
蒲黃散
卷之二十一
產後口乾痞悶方論第一　凡一方
見睍元
產後血渴方論第二　凡五方
產寶方　楊氏家藏方黃芩散
栝樓根湯　千金竹葉湯　延胡散
產後乍寒乍熱方論第三　凡九方
增損四物湯　大調經散　產寶方
知母湯
產後方論附
草菓飲子　生熟飲子
產後蓐勞方論第四　凡十一方
石子湯　許仁則方　人參鼈甲散
增損柴胡湯　熟地黃散　白茯苓散
黃耆元　補益方　胡氏牡丹散
黃耆煮散
產後虛羸方論第五　凡十五方
人參散　熟乾地黃湯　補虛元
羊腎湯　羊肉當歸湯　黃雌雞湯
產寶方　救急方　當歸散
佛手散　當歸羊肉湯
產後風虛勞冷方論第六　凡十一方
黃耆散　木香散　人參散
枸杞子元　補益白薇元　產寶方
延年澤蘭元　博濟方
產後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七　凡一方
抵聖湯
產後嘔逆不食方論第八　凡四方
丁香散　開胃散

產後霍亂方論第九　凡四方
白术散　附子散　溫中散
良薑散
卷之二十二
產後傷寒方論第一　凡七方
人參當歸散　小柴胡湯　增損柴胡湯
竹葉防風湯　陽旦湯　芍藥湯
千金蜀漆湯
產後頭痛方論第二　凡三方
川芎散　芎附散　一奇散
產後咳嗽方論第三　凡四方
二母散　集驗方　經効方
產後喉中氣急喘促方論第四　凡四方
旋覆花湯　參蘇飲
產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五　凡二方
經驗方　海上方
產後咳逆方論第六　凡六方
丁香散　石蓮散　產寶方
咳逆方　羌活散
產後血崩方論第七　凡八方
固經元　芎藭芍藥湯　乾地黃湯
白芍藥散　阿膠元　菖蒲酒
瑞蓮散
產後月水不調方論第八　凡二方
琥珀散　[illegible]黃元
產後月水不通方論第九
產後四肢浮腫方論第十　凡九方
小調經散　加減茱萸湯　枳术湯
奪魂散　漢防已散　張氏方
產後腹痛及瀉痢方論第十一　凡七方
調中湯　桃膠散　白頭翁湯
張氏的奇散
產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第十二　凡十一方
黃連元　經効方　張文仲方
救急方　必効方　廣濟方
赤石脂元　膠蠟湯　當歸湯
許仁則方　續命湯　杜元方
卷之二十三
產後痢疾作渴方論第一　凡三方
必効方　經効方
產後大便秘澀方論第二　凡七方
麻仁元　麥蘖散　阿膠枳殼元
許學士方　蜜兌法
產後大小便不通方論第三　凡十方
葵根湯　集驗方　桃花散
產後遺糞方論第四　凡二方
廣濟方　集驗方
產後諸淋方論第五　凡十五方

茅根湯　集驗方　滑石散
張允恩方　廣濟方　木通散
產後小便數方論第六　凡二方
桑螵蛸散　括樓湯
產後小便不禁方論第七　凡四方
廣濟方　千金方　固脬散
產後小便出血方論第八
產後陰脫玉門不閉方論第九　凡[illegible]
硫黃散　千金方　廣濟方
當歸散　集驗方　陳氏玉龍湯
熨法集驗方　桃仁膏　樗枝散
皂角散
婦人陰蝕五疳方論第十　凡九方
千金方　洗搨湯　甘濕散
狼牙湯
產後乳汁或行或不行方論第十一　凡十五方
漏蘆散　產寶方　靈苑方
湧泉散　下乳方　崔氏方
千金漏蘆湯
產後乳汁自出方論第十二　凡六方
產後吹奶方論第十三
括樓散　天南星散　皂角散
經驗方
產後妬乳方論第十四　凡十方
赤龍皮湯　天麻草湯　飛烏膏散
黃連胡粉膏
乳癰方論第十五　凡二十五方
連翹湯　張氏橘香散　陳日華方
陳日華方　金黃散　乾膿散
丹參膏　經效方　瓜樓散
卷之二十四
拾遺方　烏喙元　木香散
二黃散　大腹皮飲　大黃甘遂湯
竹茹湯　膏髮煎　瓜子湯
固真丹　大效內補元　濟陰丹
烏雞煎
產乳集將護嬰兒方論
初生浴兒良日　木瓜元
延胡索散

新編婦人[illegible]

勤有書堂繡梓

辨識修製藥物法度

凡藥有宜火宜酒者有用子用皮者有去子去皮者有去苗蘆者有別研入藥者有煎成湯去滓後入者若此之類各各不同今備于前無復更註于逐方之下

辰砂 [illegible] 雄黃 [illegible]

石硫黃 [illegible] 伏龍肝 [illegible]

太陰玄精石

已上並研令極細[illegible]

禹餘糧 代赭石 [illegible] 自然銅

紫石英 [illegible] 雲母石 太一餘糧

已上並用火煅[illegible]七次[illegible]

赤石脂 [illegible] 陽起石 [illegible]

青礞石 [illegible]

梁上塵 [illegible]

白礬 [illegible]

滑石 [illegible]

蘇合香 [illegible]

桑寄生 [illegible] 木通 [illegible] 竹茹 [illegible]

罌粟 [illegible]

阿膠 [illegible] 葛根 [illegible]

麻黃 [illegible]

人參 [illegible]

北細辛 [illegible] 地榆 [illegible]

柴胡 前胡 羌活 獨活 威靈仙

秦艽 [illegible] 防風 [illegible] 藁本

升麻 [illegible] 漏蘆 [illegible]

桔梗 [illegible]

已上並洗去蘆頭細切焙乾秤用

木香 [illegible]

沉香 [illegible] 丁香 檀香 白芷 藿香

官桂 [illegible] 薄荷 紫蘇

荊芥 [illegible]

已上諸香並不可見火[illegible]

北艾 [illegible] 敗醬 [illegible] 鬼箭 [illegible]

澤蘭葉 紫蘇 藿香 荊芥 薄荷

香薷 梧葉 茵芋 大青 葶草

樗枝　菴䕡　石楠葉　冷草[illegible]去毛

枇杷葉 [illegible]

已上並去梗取葉以紙隔炒[illegible]

[illegible]

黄連 [illegible]　白菖蒲 [illegible]

[illegible]

柏上茴香　北茴香　葫蘆巴 [illegible]　破故紙

蛇床子　薏苡仁　紫蘇子 [illegible]

[illegible]

菴䕡子　葶藶子 [illegible]　黑牽牛

牛蒡子　芫花 [illegible]

已上並隔紙炒香

五味子 [illegible]　木鱉子

巴豆 [illegible]　兎絲子

車錢子 [illegible]　香附子

[illegible]　石斛

骨碎補　甘松

金毛狗 [illegible]

肉蓯蓉 [illegible]　卷柏

當歸 [illegible]　川牛膝 [illegible]

並去蘆[illegible]

火焙乾[illegible]

五加皮　桂 [illegible]　海桐皮

黄蘗皮　楊梅皮　白鮮皮　杜仲

厚朴　桑白皮 [illegible]

並削去粗皮[illegible]

生薑[illegible]

甜瓜子　瓜蔞子　冬瓜仁　杏仁

桃人　郁李仁 [illegible]

酸棗仁 [illegible]　柏子仁 [illegible]　皂角 [illegible]

川椒 [illegible]　白豆蔻

益智 [illegible]　硇砂　大腹子

肉豆蔻 [illegible]　吳茱萸　訶子

[illegible]　川楝子　大黄

三稜 [illegible]　[illegible]

[illegible]

紫荷車 [illegible]　神麴　鬱金　狼毒

穀芽 [illegible]　白[illegible]　半夏麴　麥牙

附子 [illegible]　草烏　川烏　天雄 [illegible]

五味並用[illegible]

天南星 [illegible]　吳茱萸 [illegible]

半夏

一[illegible]

半夏麴 [illegible]　熟地黄 [illegible]　生地黄 [illegible]

[illegible]

[illegible]　滴乳香 [illegible]　延胡索 [illegible]

貝母 [illegible] 山藥 川芎 芍藥

知母 [illegible] 小薊根 [illegible]

拘杞根 [illegible] 牡丹皮 [illegible]

石蓮 [illegible] 烏藥 麥門冬 天門冬

遠志 [illegible] 黃芩 [illegible]

已上有心者並宜去心只取肉者乾秤用

青橘皮 [illegible] 橘皮 [illegible]

二味用溫水洗淨却於砂盆內擦去白焙乾秤

枳殼 [illegible]

[illegible] 猪苓 茯苓 [illegible]

茯神 [illegible]

已上三味並去黑皮細切焙乾秤

蒼朮 [illegible] 白朮 [illegible]

[illegible]

二朮並去蘆切[illegible]乾和以米泔浸炒令[illegible]用

甘草 [illegible] 黃耆 [illegible] 甘菊花 [illegible]

旋覆花 [illegible]

諸花並去枝蒂

血餘 [illegible] 童子小便 [illegible]

龍齒 龍骨 [illegible]

[illegible] 不可[illegible] 虎性用者

天靈蓋 虎前脛骨 虎頭骨 鱉甲 虎脊骨 [illegible]頭

鹿茸 [illegible]

[illegible]

並用[illegible]炙

桑[illegible] [illegible] 鹿角膠

阿膠 [illegible]

[illegible]

[illegible]並[illegible]

桑[illegible] [illegible] 真珠母 [illegible]

[illegible] 犀角 [illegible] 羚羊角 [illegible]

[illegible]

[illegible]

地龍 [illegible] 穿山甲 [illegible]

[illegible] 殭蠶 [illegible]

[illegible] 水蛭 [illegible] 班猫 [illegible]

蟲虫 [illegible] 紅娘子

[illegible] 全蝎 [illegible]

[illegible] 蟬蛻 [illegible]

[illegible] 烏蛇 [illegible]

石[illegible] 白花蛇 [illegible]

二蛇並用酒浸[illegible]去皮骨取肉炙香用

經久不[illegible]

晚蠶沙炒　鱉甲（米醋炙） [illegible]
（肥者為）五靈脂（研，水飛去砂石） [illegible]
（有用之）乾漆（炒令煙盡） 豬羊腎及肝（去脂膜）
[illegible] 鯉魚鱗（燒） 蝟皮 猪左懸蹄甲
露蜂房 黃蠟 牛角䚡
並用火燒存性研爲細末用
鹿角霜（研） 麝香（研） [illegible]
蜀椒（去目，炒出汗）
荷葉 蓮蓬 棕櫚 [illegible]
並用灰細研末用
用荷葉中心蒂去葉
益母草（去根，其子名茺蔚子） 鬼臼（去毛）
鬼箭羽 五倍子（炒） 麒麟竭
沒藥 安息香 乳香 琥珀
五味並細研

晉 寧 臨 川 陳 自明 良甫 編註

○調經門

（凡醫婦人，先須調經，故以爲初）

月經序論第一

岐伯曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長；二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下。天謂天真之氣降，癸謂壬癸水名，故云天癸也。然衝爲血海，任主胞胎，腎氣全盛，二脈流通，經血漸盈，應時而下，所以謂之月事。若乎和之氣，常以三旬一見，以像月盈則虧也。若遇經脈行時，最宜謹於將理，將理失宜，似產後一般，受病輕爲宿疾，重可死矣。蓋被驚則血氣錯亂，經脈斬然不行，逆於身則爲血分、勞瘵；若其時勞力，則生虛熱，變爲疼痛之根；若恚怒則氣逆，氣逆則血逆，逆於腰腿，則遇經行時腰腿痛重，過期即安也；逆於頭、腹、心、肺、背、脅、手足之間，則遇經行時，其證亦然。若怒極則傷肝，而有眼暈、脅痛、嘔血、瘰癧、癰瘍之病，加之經血滲漏於其間，遂成竅穴，淋瀝無有已也。凡此之時，中風則病風，感冷則病冷，久而不愈，變證百出，不可言者。所謂犯時微若秋毫，感病重如山岳，可不畏哉！

精血篇第二（褚澄遺書）

飲食五味，養髓、骨、肉、血、肌膚、毛髮。男子爲陽，陽中必有陰，陰中之數八，故一八而陽精升，二八而陽精溢；女子爲陰，陰中必有陽，陽之中數七，故一七而陰血升，二七而陰血溢。皆飲食五味之實秀也。方其升也，智慮開明，齒牙更始，髮

黄若黑筋弱若發蛭其溢也凡充身體手足耳目之餘雖針芥之歷無有不下凡子形肖父母者以其精血嘗於父母之身無所不歷也是以父一肢廢則子一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其母然雖鳥獸無天癸而成胎何也鳥獸精血往來孕胎止精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗小便道澁而為淋精已耗而復竭之則大小便道牽疼愈疼則欲大小便愈便則愈疼女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而之腫或雖合而難子合男子多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

產寶方序論第三

大率治病先論其所主男子調其氣女子調其血氣血人之神也不可不謹調護然婦人以血為基本氣血宣行其神自清所謂血室不蓄則氣和血凝結則水火相刑月水如期謂之月信不然血凝成孕此乃調燮之常其血不來則因風熱傷於經血故血不通或外感風寒內受邪熱脾胃虛弱不能飲食食既不充榮衛抑遏肌膚黃燥面無光澤時發寒熱腹脹作痛難於子息子藏冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹中如塊忽聚忽散其病乃瘕血澗不流而搏腹脹時作寒熱此乃成瘕或先後爽期雖通而或多或寡究此之原蓋本於此

王子亨方論第四

論曰經者常候謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故其來必以月太過不及皆為不調過於陽則前期而來過於陰則後時而至其有乍多乍少斷絶不行崩漏不止亦由陰陽衰盛所致為詳說於下

月水不調方論第五

夫婦人月水不調者由勞傷氣血致體虛風冷之氣乘也若風冷之氣客於胞內傷於衝任之脉損手太陽少陰之經衝任之脉皆起於胞內為經絡之海手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主上為乳汁下為月水然則月水是經絡之餘若冷熱調和則衝脉任脉氣盛太陽少陰所生之血宣流依時而下若寒溫乖適經脉則虛若有風冷虛則乘之邪搏於血或寒或溫寒則血結溫則血消故月水乍多乍少故為不調也

紫石英圓 治婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說是陰勝陽是陽勝陰所以服藥少得有效蓋陰氣勝陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣勝陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當和其陰陽調其氣血使不相勝以平為福

紫石英	禹餘粮	人參	龍骨
川烏	官桂	桑寄生	杜仲
五味子	遠志	澤瀉	當歸
石斛	蓯蓉	乾薑 [illegible]	川椒
牡蠣	甘草 [illegible]		

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服叁伍拾圓，空心米飲吞下。指迷方同

吳茱萸湯 治衝任衰弱，月候愆期，或前或後，或崩漏不止，赤白帶下，小腹急痛，每至經脉行時頭眩，飲食減少，氣滿心忪，肌膚不澤，悉皆主之。出聖惠方

吳茱萸　麥門冬　乾薑　白茯苓
牡丹皮　南木香　苦梗　甘草
當歸　北細辛　防風　官桂
半夏

右㕮咀，每服四大錢，水一盞半，生薑伍片，棗子壹枚，煎至柒分，去滓，空心溫服。

治婦人室女經脉不調，臍腹冷痛，惡心，腹常脹滿，至晚則增，宜服小烏沉湯，吞下交煎圓。

牡丹散 治血臟久冷，月水不調，臍腹刺痛。

川大黃　蓬莪朮　紅花
桂心　川芎　延胡索　牡丹皮
當歸　白芍藥

右為細末，每服壹錢，水一盞，酒半盞，煎至柒分，空心熱服。

桃仁散 治婦人月水不調，或淋瀝不斷，斷後復來，狀如屋漏水，四體虛翕，不能飲食，腹中堅痛，不可行動，月水或前或後，或經月不來，舉體沉重，惟欲眠睡，多思酸物。

桃仁　粉草　半夏　赤芍藥
生地黃　澤蘭葉　川牛膝　當歸
桂心　牡丹皮　人參　蒲黃　川芎

右為粗末，每服伍大錢，水一盞半，生薑叁片，煎至柒分，去滓，空心溫服。

月水不通方論第八

夫婦人月水不通者，由勞傷血氣，致令體虛，受風冷邪氣客於胞內，傷損衝任之脉，并手太陽少陰之經，致胞絡內血絕不通故也。衝任之脉起於胞內，為經脉之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經為表裏，主上為乳汁，下為月水。風冷客於經血，血性得溫則宣流，得寒則澀閉，既為風冷所搏，血結於內，故令月水不通也。又云：腸中鳴則月水不來，病本在胃，胃氣虛，不能消化水穀，使津液不生血氣故也。又云：醉以入房，則內氣竭絕，傷於肝，使月水衰少不來。所以爾者，肝藏於血，勞傷過度，血氣枯竭於內也。又先唾血及吐血、下血，謂之脫血，名曰血枯，亦月水不來也。所以爾者，津液減耗故也。但益津液，其經自下也。診於腎脉微澀者，是月水不通也。又左手關後尺內浮為陽，絕無膀胱脉也，月水則閉。又肝脉沉而急，隱之亦然，時小便難，頭眩痛，腰背痛，足寒，時疼，月水不來，時恐得之，時有所墮也。其月水不通，久則血結於內，生塊，變為血瘕，亦作血癥。血水相并，壅澀不通，脾胃虛弱，變為水腫也。所以然者，脾候身之肌肉，象於土，土主尅消於水，水血既并，脾氣衰弱，不能尅消，故水氣流溢，浸漬肌肉，故腫滿也。

產寶方論

論曰：經脉不通日久，此非細事，實為沉痾。若是室女經脉不通，初因食飲酸醎之物，遂致血脉乾涸，變成勞疾。若因

經脉正行誤食熱毒生冷遂成此疾腹內顆塊誤認
爲胎時日稍深必見困篤

養生必用論經病第七

初虞世云女子十四天癸至任脉通月事以時下故令有子天癸者物之門然月者以月至經者有常也其來不可過與不及多與少反此皆謂之病不行尤甚百疾生焉血既不能滋養百體則髮落面黃身羸瘦血虛則發熱故身多熱水不足則燥氣燔燥氣燔則金受邪金受邪則肺家嗽嗽則爲肺癰肺痿必矣醫見經不行則用虻虫水蛭等行血藥見熱則用除熱諸寒藥實出妄意就中不行以藥行之爲害滋大經水枯竭則無以滋養其能行乎譬猶索萬金於乞丐之人雖捶楚並下不可得也但服以養氣益血諸藥天癸自行又有一種婦人盛實月經瘀閉利之則行自有諸證學者宜審焉

當歸散 治血脉不通

當歸 川山甲 蒲黃 辰砂
麝香少許

右爲細末研停每服貳錢熱酒調下如不喫酒薄荷醋湯亦可

琥珀散 治心膈迷悶腹臟撮痛氣急氣悶月信不通等疾

天台烏藥 當歸 莪朮

右爲細末每服貳錢溫酒調下服後以食壓之大忌生冷油膩等物若是產後諸疾用炒薑酒調下

救急療婦人月經不調或一月不來或隔月不來或多或少臍下絞痛面色痿黃四體虛吸羸瘦不能食方

當歸 川牛膝 牡丹皮 桃仁各壹兩半
大黃 芎藭 土瓜根 芍藥
朴消 桂心 虻虫 水蛭

右㕮咀以水九升煑取叁升分溫伍服忌如常法

療月經不通腹中痛方

牛膝 大黃 桃仁
川芎 當歸 水蛭 細辛各伍分

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服貳拾圓空心溫酒下

治月水不通方 已試有驗

厚朴 不以多少濃煎去滓空心溫服

治婦人經候不來數月臍腹疞痛或有一塊上下相拄飲食減少腹滿惡心大便秘澀者宜服此方亭圓用石菖蒲馬鞭草煎湯送下叁拾圓兩服必通

萬病圓 治女人月經或閉月候不來繞臍寒疝痛徹及產後血氣不調腹中生瘕結而不散及癥瘕等病

乾漆 牛膝

右爲末以生地黃汁壹升入貳味於銀石器內慢火熬候可圓即圓如梧桐子大空心米飲或溫酒下貳圓日再勿妄加病去止藥

紅花當歸散 治婦人血臟虛竭或積冷於血經候不行或斷續不定時作腹痛腰胯攻刺小腹緊硬及室女月經不通並宜服之

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝

甘草　　　蘇木　　　白芷

桂心　　　赤芍藥　　　劉寄奴

右為細末，空心熱酒調下二錢，服食前臨臥再服。若血久不行，濃煎紅花酒調下。孕婦休服。一名凌霄花散

鱉甲圓　治婦人月經不調，肌肉黃瘁，脇下積氣結硬，時發刺痛，漸成勞狀。

鱉甲　　　桂心　　　三稜　　　牡丹皮

牛膝　　　訶子肉　　　琥珀　　　大黃

土瓜根　　　桃仁

右各等分為細末，煉蜜圓如梧桐子大，煎桃仁湯送下拾伍圓，破血積氣塊尤妙。

桃仁煎　治月水不調，阻滯不通。

大黃　　　朴硝　　　桃仁

虻蟲

右為細末，用醋伍升入銀石器內，慢火熬成膏，可圓即圓如梧桐子大。當日晚不須喫食，五更初以溫酒吞下五圓，至明日午際取下如赤豆汁，或似雞肝、蝦蟆衣，其病下了即止。如未下再服，候鮮紅即住服，仍以調氣湯散補之。

室女月水不通方論第八

論曰：夫衝任之脈起於胞內，為經脈之海。手太陽小腸之經、手少陰心之經也，二經為表裏，心主於血，上為乳汁，下為月水也。女子十四而天癸至，腎氣全盛，衝任流通，經血既盈，應時而下，名之月水，常以三旬而一見，謂之平和也。若從則者由勞傷血氣壅結，故令月水不通也。

治婦人室女月候不通，疼痛或成血瘕　通經圓

桂心　　　青皮　　　大黃　　　川椒

莪朮　　　川烏　　　乾漆　　　當歸

桃仁　　　乾薑

右為細末，分為四分，用壹分以米醋熬成膏，和餘分藥末成劑，臼中治之，圓如梧桐子大，晒乾，每服貳拾圓，淡醋湯下，加至叁拾圓，溫酒亦得，空心食前服。

治室女月水不通

雄鼠屎壹兩，燒存性，為細末，空心溫酒調下壹錢。

室女經閉成勞方論第九

寇宗奭曰：夫人之生，以氣血為本，人之病，未有不先傷其氣血者。若室女童男，積想在心，思慮過多，多致勞損。男子則神色先散，女子則月水先閉。何以致然？蓋憂愁思慮則傷心，心傷則血逆竭，血逆竭則神色先散，而月水先閉也。火既受病，不能營養其子，故不嗜食；脾既虛則金氣虧，故發嗽；嗽既作，水氣絕，故四肢乾；木氣不充，故多怒，鬢髮焦，筋痿。俟五藏傳遍，故卒不能死，然終死矣。此一種於勞中最難治，蓋病起於五藏之中，無有已期，藥力不可及也。若或自能改易心志，用藥扶接，如此則可得九死一生。舉此為例，其餘諸勞可按脈與證而治之。○張氏云：室女月水久不行，切不可用青蒿等涼藥。醫家多以為室女血熱，故以涼藥解之，殊不知血得熱則行，冷則凝。方言之甚詳，此說大有理，不可不知。

若經候微少，漸漸不通，手足骨肉煩疼，日漸羸瘦，漸生潮熱，其脈微數，此由陰虛血弱，陽往乘之，少水不能滅盛火，火逼水涸，亡津液，當養血益陰，慎無以毒藥通之，宜柏子仁圓、澤蘭湯。

柏子仁圓

柏子仁（炒，別研） 牛膝 卷柏（各半兩） 澤蘭葉 續斷（各二兩） 熟地黃（三兩）

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，空心飲下三拾圓。

澤蘭湯

澤蘭葉（三兩） 當歸 芍藥（各一兩） 甘草（半兩）

右為粗末，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服。

治室女榮衛不調，經候凝[illegible]，[illegible]，[illegible]肢體不利，五心虛煩，飲食[illegible]，多困少力[illegible]

沉香 甘草（[illegible]） 檳榔（[illegible]分） 木香（[illegible]）

鱉甲 常山 當歸 柴胡

人參 半夏 桂心 生地黃

白茯苓 青皮 陳皮（各等兩）

右為細末，每服貳錢，水壹盞，生薑叁片，煎至柒分，溫服，空心日叁服。

[illegible]散 治室女胃[illegible]

藿香 零陵香 延胡索 芍藥

白芷 川芎 當歸 桂心（各等分）

蓮子心 晚蠶蛾（各[illegible]分）

右為細末，溫酒調下壹錢，日貳服。

劫勞散 治心腎俱虛，勞嗽二三聲，無痰，遇夜發熱，熱過即冷，時有盜汗，四肢倦怠，體劣黃瘦，飲食減少，夜臥恍惚，神氣不寧，睡多異夢，此藥能治微嗽有唾，唾中有紅線，名曰肺痿，若上件疾不治，便成羸劣之疾。

白芍藥（六兩） 綿黃耆 甘草 人參

當歸 半夏 白茯苓 熟地黃

五味子 阿膠（各貳兩）

右㕮咀，每服叁大錢，水一盞半，生薑拾貳片，棗叁個，煎至九分，無時溫服，日進三服。○陳總領日華云：鄉人楊元鼎女及笄，病證甚危，一歲之間，百藥俱試，無有效者，亦嘗從寺求治法，無有應之者，偶遇名醫得此方，只一料遂除根，專錄此方傳人。

[illegible]血湯 治婦人血熱氣虛，經候澀滯不通，至使血聚，肢體麻木，渾身疼痛煩倦，或室女年及經脈未行，日漸黃瘦，將成勞疾，切不可便投紅花破硬等藥，[illegible]為患也，若是前證，則[illegible]實發熱，五心煩燥，飲食減少，宜服此藥滋養而通利之。

馬鞭草 荊芥穗（各四兩） 桂心 枳殼

川芎 當歸 赤芍藥（各貳兩） 牡丹皮（壹兩）

右為粗末，每服肆錢，烏梅壹個，水貳盞，同煎至壹盞，去滓，空心食前，日四服，有此證服至半月，經脈自通，此方至妙，不可輕視，非一二服便見特達之效，而鄙之，仍服後，未有諸疾因此藥皆去矣。

[illegible]散 治丈夫男室女骨蒸熱，婦人血風攻疰，四肢心胸煩壅

鱉甲　大黃（煨）　常山　赤茯苓
柴胡　白朮　當歸　乾漆（炒令煙盡）
生地黃　石膏（各壹兩）　甘草（半兩）〇出蘇沈良方
右為細末，每服貳錢，水壹盞，小麥伍拾粒，煎至陸分，食後臨卧時溫服。有虛汗加麻黃根壹兩。此黃州吳判官方，治骨熱黃瘦、口臭、肌熱盜汗，極效。麥煎散甚多，此方吳君寶之，如希世之珍，其效可知。

【[illegible]圓】治男子婦人童男室女五勞七傷，傳疰飛尸尸注，八極骨蒸，肺痿黃瘦，虛勞無力，肌肉不生，婦人血蒸，五心煩熱，血風勞氣，室女月閉，黃瘦氣塊，腹痛，經脉不調，乾嗽，咽膈不利，癥瘕積塊，臉赤口瘡。已上等疾無不效驗。

黃耆　柴胡　枳殼　知母
白茯苓　沉香　人參　附子
木香　升麻　肉桂　胡黃連
杏仁　當歸　常山　羌活
京三稜　烏梅肉　安息香（[illegible]）

右十九味，修製了，各秤壹兩，為末，用活鼈壹箇重拾兩或半斤者，以河水養七日，須逐日換新水，用童子小便五升，無灰酒伍升，銀石器內，慢火熬，百沸，先更入桃柳枝東南上者各剉二合，烏梅伍拾箇，搥破，此二味用綿裹，同鼈煎，煮至一半，去桃柳枝等叁味，鼈爛取去，將肉研如膏，骨併殼焙乾，為末，再入汁中，熬如漆色，或更入酒少許，此在臨時斟酌，盛放瓷器中，搜和前藥，入臼中杵千下，圓如梧桐子大。丈夫婦人十五歲已上，貳拾圓至叁拾圓，溫酒下；婦人荊芥酒下，所覺當于須臾，助多少勿令剩，却但少些子不妨，却則發渴，若有剩，恐壞不全故也。凡服此藥，熟候三日，更須服八傷飲子。

【八傷飲子】
常山　白朮　秦艽　洪州鬼臼
赤芍藥　甘草　紫蘇　銀州柴胡
右等分，依淨為粗末，每服半兩，水壹碗，烏梅肉貳个，煎白雞白桃柳枝各依寸同煎，至壹盞，去滓，溫服，滓再煎。

治女子經脉不行，胷膈滿悶，身體麻木，或有寒熱證候。
厚朴　牡丹皮　茅香　藿香
甘草（炙，剉）　陳皮　生半夏　麥芽　當歸
蒼朮（炒）　赤芍藥（各二分）　當歸（半兩）
右㕮咀，每服半兩，水壹大盞，生薑叁片，煎服。熱甚加北柴胡參錢半。

血枯方論第十　羅先大師傳有效　出[illegible]龍古方

腹中論曰：有病胷脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，四肢清，目眩，時時前後血，病名曰血枯。此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。（注云：夫藏血受天一之氣以為滋榮者也。其經上貫膈，布脇肋。今脫血失精，肝氣已傷，故血枯涸而不榮，胷脇滿，以經絡所貫於也；妨於食，則以肝病傳脾胃，病至則先聞腥臊臭，出清液，則以肝病而肺乘之。先唾血，四肢清，目眩，時時前後血，皆肝病血傷之證也。）

治婦人血枯，胷膈四肢滿，妨於食飲，病至聞腥臊臭氣，先

唾血出清液或前後泄血目眩轉月事衰少不來

烏賊魚骨圓 岐伯方

烏賊魚骨 去甲 蘆茹 壹兩

右為末以雀卵和成劑圓如小豆大每服伍圓加至拾圓以鮑魚煎湯下以飯壓之

治婦人胃腸支滿閉腥臊病唾血目眩不能飲食泄血不已日久血枯 **茯苓圓**

茯苓 熟地黃 白茯苓 兔絲子

附子 當歸 白石英 研 五味子

禹餘糧 烏賊魚骨 人參

右為末煉蜜為圓如梧桐子大酒下貳叁拾圓米湯亦可空心日中臨臥各壹服

治婦人先有所脫血或醉入房勞傷故月事衰少不來宜

熟地黃湯

乾地黃 澤蘭葉 白茯苓 人參

五味子 附子 禹餘糧 當歸

右等分為粗末每服四錢水壹盞煎至柒分空心溫服

磁石圓 治婦人陰氣衰弱血枯不榮月事不來

磁石 白茯苓 附子 乾地黃

人參 當歸

右各壹兩為細末煉蜜圓如梧桐子大酒下叁拾圓米湯亦可空心日中臨臥各壹服

月水不利方論第十一

夫婦人月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受風冷客於胞內損傷衝任之脉手太陽少陰之經故也衝任之脉為經脉之海皆起於胞內手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水風冷客於經絡搏於血氣血得冷則壅滯故令月水來不宣利也診其脉寸口弦者腹痛主月水不利[illegible]又肝脉沉[illegible]沉為陰主月水不利腰腹痛尺脉滑血氣實經絡[illegible]又尺脉來而斷絕者月水不利也[illegible]如故而又脉絕不至者月水不利也當患小腹引腰痛[illegible]攻胸膈也

桃仁圓 治婦人月水不利四肢羸瘦飲食減少漸覺虛乏故令無子

桃仁 白薇 當歸

桂心 附子 萆薢 白朮

吳茱萸 木香 細辛 川芎

檳榔 熟地黃 牡丹皮 紫石英

人參 石斛 白茯苓 澤蘭葉

川牛膝

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服叁拾圓空心臨食前溫酒吞下

療女人臍下冷氣脹滿月經不利血氣上攻欲嘔不得睡

當歸 乾漆

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下拾伍圓

牡丹散 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮　川大黃（炒）　赤茯苓　生地黃

桃仁　當歸　桂心　赤芍藥

白朮（各壹分）　石韋（去毛）　木香（各半兩）

右㕮咀，每服叁大錢，水壹盞，薑叁片，煎柒分，去滓，空心溫服。

治婦人月水不利，臍腹疞痛。牛膝散

牛膝（壹兩）　桂心　赤芍藥　桃仁

延胡索　當歸　牡丹皮　川芎

木香（各叁分）

右為末，每服方寸匕，溫酒調下，食前。

月水行或不行心腹刺痛方論第十一

論曰：夫婦人月經來腹痛者，由勞傷氣血，致令體虛，風冷之氣客於胞絡，損於衝任之脈，手太陽少陰之經。衝脈任脈皆起於胞內，為經脈之海也。手太陽小腸之經，手少陰心之二經也。此二經為表裏，主下為月水。其經血虛則受風冷，故月水將行之際，血氣動於風冷，風冷與血氣相擊，故令痛也。若經道不通，繞臍寒疝痛徹，其脈沉緊，此由寒氣客於血室，血凝不行，結積血為氣所衝，新血與故血相搏，所以發痛。譬如天寒地凍，水凝成冰。宜溫經湯及桂枝桃仁湯、萬病圓。

溫經湯方

當歸　川芎　芍藥　桂心

牡丹皮　莪朮（各半兩）　人參　甘草

牛膝（各壹兩）

右㕮咀，每服伍錢，水壹盞半，煎至捌分，去滓溫服。

桂枝桃仁湯

桂枝　芍藥　生地黃　桃仁

甘草（壹兩）

右為粗末，每服伍錢，水貳盞，薑叁片，棗壹枚，煎至壹盞，去滓。

……以氣……血……後之宜……桃仁湯。不瘥，宜地黃通經圓。

通經圓（已試驗，有人月……用之……）

熟地黃……虻蟲……水蛭……

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，空心溫酒下伍圓，未知加至柒圓。

琥珀散　治婦人月經壅滯，每發心腹臍疞痛不可忍，及治產後惡露不快，血上搶心，迷悶不省，氣絕欲死。

三稜　赤芍藥

劉寄奴　牡丹皮　官桂

甘菊花　熟地黃　蒲黃　當歸

右前伍味，用烏豆壹升，生薑半斤切片，米醋肆升，同煮豆爛為度，焙乾，入後伍味，同為細末，每服貳錢，空心食前溫酒調下。一方不用菊花、蒲黃，卻用烏藥、延胡索。

亦佳予家之秘方也○若是產後血氣痛只宜服產
血衝心貳服便下常服尤佳產前後救人急切不少此
易合宜多合以救人○見宜昌朴約用伍兩

又壹方　延胡索　當歸各等分

右貳味為粗末每服叁錢水壹大盞煎至柒分
去滓稍熱服○陳氏方有桂名如神湯最治腰痛○雷
公炮炙論只用延胡索壹味治心痛○僕詳此方大能
治血氣攻腹痛無補功專治疾有效

蒲黃圓　治婦人無時月水來腹痛

龍骨　艾葉各壹兩為末　蒲黃貳兩微炒

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓食後用
鹽米飲吞下

月水不斷方論第十三

夫婦人月水不斷者由損傷經血衝任脈虛損故也衝任
之脈為經脈之海手太陽小腸之經也手少陰心之經也
此二經為表裏主下為月水若勞傷經脈衝任氣虛故不
能制經血令月水不斷也凡月水不止而合陰陽則冷氣
上入於臟令人身體面目痿黃亦令絕子不產也
若經候時行時止或淋瀝不斷腹中時痛其脈沉細此因
寒熱邪氣客於胞中衝任不調此非虛弱蓋邪氣伏留滯
於血海譬如有積久而下利不定有所去即愈宜**牡丹圓**

牡丹皮　牡蒙　附子炮　大黃各
葶藶炒　苦梗　茯苓各壹兩　當歸
厚朴　吳茱萸　川椒炒出汗　人參
川芎　北柴胡　桂心　乾薑炮各半兩
細辛各壹兩　虻蟲　水蛭各壹拾枚炒

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下拾圓未知
漸加至貳拾圓以知為度

治婦人月水不斷口乾心煩四肢羸瘦飲食無味漸加乏
弱　**續斷圓**

川續斷　當歸　烏賊骨　黃耆
牛角䚡燒　五味子　甘草　龍骨煅研
赤石脂　熟地黃各壹兩　地榆各半兩　艾葉
附子　乾薑　川芎各叁分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓食前溫酒下

治婦人久冷月水不止面色痿黃四肢羸瘦心神虛煩飲
食減少　**禹餘糧圓**

禹餘糧火燒醋淬　鹿角膠搗碎炒黃　紫石英　續斷
赤石脂　熟地黃　川芎　乾薑
黃耆　艾葉　柏葉炒　當歸炒
人參　白茯苓各壹兩半

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓空心米飲下

治婦人血海虛損月水不斷　**牡蠣圓**

牡蠣粉　赤石脂　代赭石各壹兩　阿膠
川芎　當歸　鹿茸　續斷
乾薑炮　甘草各貳分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五拾圓食前溫酒下

療經血不止

黃芩四分　當歸　[illegible]　蒲黃各分

生薑貳分　艾葉壹分　生地黃[illegible]　伏龍肝[illegible]

右㕮咀用水貳升煎取捌合分為貳服[illegible]

療經血不止謂曰[illegible]

婦人經血正淋瀝　當歸蓮蓬殼灰[illegible]

熱酒一盃調八字　自然安樂更無疑

又壹方

蓮蓬殼　棕櫚花

右貳味等分為末每服貳錢空心米飲調服

婦人殺血心痛方論第十四

凡婦人血崩心痛甚者名殺血心痛小產血過多而心痛

甚者亦然

烏賊魚墨炒[illegible]醋湯調下[illegible]

崩暴下血不止方論第十五　凡三十六方

論曰夫婦人崩中者皆由勞傷衝任脈血氣俱虛故

也衝任之脈為經脈之海故血氣之行依經絡內榮臟腑

若[illegible]則陰陽和平[illegible]血[illegible]其勞動過

[illegible]傷衝任之經[illegible]則其血[illegible]

[illegible]之故中暴下[illegible]其寸口脈微長尺脈短[illegible]

[illegible]在上[illegible]脈[illegible]如此即小腹痛引

腰背痛[illegible]

若經候過多遂至崩漏色明如水下得溫則凝甚者至於

昏悶其脈數疾小為順大甚者逆此由陰陽搏為熱所乘

攻傷衝任血得熱則流散譬如天暑地熱則經水沸溢易

傷於陰令人下血當補其陰宜服小薊湯阿茄陀圓

小薊湯

小薊莖葉洗切研取汁[illegible]　生地黃汁[illegible]　白术半兩

右叁件入水壹盞煎至半去滓溫服

阿茄陀圓

胡椒　紫檀　鬱金　茜根

小蘗皮[illegible]

右等分為細末滴水圓如梧桐子大阿膠湯化下貳圓

[illegible]散　治崩暴下血[illegible]

赤芍藥　香附子　荷葉枯　男子髮皂莢水洗

當歸　棕櫚炒焦　烏紗帽[illegible]

右等分除棕外其餘並切碎片新瓦上煅成黑炭存性

三分為細末每服叁伍錢空心童子小便調下如人行

十里再進[illegible]不過七八服即止如產後血去多加米

醋京墨[illegible]

夫人如若此疾者百藥不效偶得此方旋即安愈

張聲道云大率治血崩先用此藥如治痢有積不先去

之徒服斷下藥一時暫止久則毒氣愈盛至危殆血

崩亦經脈錯亂不循故道淖溢妄行一二日不止便有

積瘀之血凝成窠臼更以藥滯住轉見增劇宜先以五

積散加醋煎投一二服次服靈脂散及順氣藥去故生

新自能平治此切當之說

五靈脂散　治婦人血山崩及治丈夫脾積氣　張氏云治

血崩者[illegible]靈脂炒令煙盡為末每服[illegible]

錢溫酒調下此藥兼能解蛇毒及蛇蝎蜈蚣咬並傷處立
愈 壹方每服叁錢水酒童便各半盞煎至捌分通口服
名抽刀散治産後有病服叁服兼發血或一方服脇肋脚痛
不可忍者或只用童子小便尤佳或中風即入草烏頭半
錢重同煎此劉知縣方 張氏云亦治腸風下血如不能
飲酒者煎烏梅柏葉湯調下如心煩口乾者加蒲黃炒
減半用一方燒存性研細酒調下然此與荊芥難學燒之
存性極妙

又壹方

五靈脂拾兩爲末水伍大盞煎至叁盞去滓澄清再
煎成膏入神麯貳兩爲末和圓如梧桐子大每服貳
叁拾圓溫酒下

又治婦人崩中連日不止 [illegible]

用荊芥穗於燈盞多着燈心好麻油點燈就上燒荊
芥焦色爲細末每服叁錢童便調下

獨聖散治婦人血山崩不止 [illegible]

防風 去叉蘆 右不以多少爲細末酒煑白麪清調下
貳錢空心食前日貳服更以麪作糊酒投之極驗
已上叁方似非止血之藥如靈脂荊芥防風皆是
去風之藥然風爲動物衝任經虛被風所傷致令
崩中暴下僕因覽許學士傷寒脉歌曰脉浮而大
風傷榮榮血也而用此藥方悟古人見識深奧然

壹方

熟艾 雞子大 阿膠 半兩 乾薑 壹錢

右爲粗末用水伍盞先煑艾薑至貳盞半入膠消洋溫
分貳服空心服壹日服盡

又壹方

牛角䚡 烏賊骨 [illegible]

右爲細末入麝香少許溫酒調下壹錢匕 [illegible]

[illegible]治婦人血崩 [illegible]

桂心不以多少甘鍋內煆微存性爲末每服一二錢
米飲調下

壹方治崩中下血 [illegible]

黃芩不以多少爲細末每服壹錢霹靂酒調下 [illegible]

金華散治婦人血室有熱崩下不止服溫藥不效者

延胡索 瞿麥穗 當歸 乾葛
牡丹皮 [illegible] 石膏 [illegible] 桂心 [illegible] 蒲黃 半兩
威靈仙 [illegible]

右爲細末每服貳錢水壹盞煎至柒分空心溫服日貳服
凡血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同不可一槩用藥僕
嘗療一婦人崩漏暴下諸醫投姜桂附子等藥服之愈
甚召余診之六脉緊數遂用此藥兼局方龍腦雞蘇元
數服即安本事方單用黃芩者亦此意也

如聖散治婦人血山崩

棕櫚 烏梅 各壹兩 乾薑 壹兩壹分 並燒過存性

右爲細末每服貳錢烏梅酒調下空心食前服久患者
不過叁服即愈
壹方用烏梅燒灰爲末烏梅湯調下
壹方用棕櫚燒存性爲末湯破酒令淡調下叁錢空心服
壹方用棕櫚[illegible]爲末酒調貳錢服
治婦人血崩[illegible]散方
當歸　芍藥　乾薑　棕櫚各等分
右各煅存性爲細末秤過醋湯調以有節朱筋左攪
四十九轉食前服
千金翼治婦人崩中去血不止
大小薊根[illegible]用酒壹斗漬伍宿任意服之千金方有
白茅根[illegible]陸兩半酒煎服
縮砂散 治血崩
新縮砂仁不以多少於新瓦上炒香爲細末米飲調
下叁錢
壹方用益智炒爲細末鹽米飲調下
如神散 治婦人血崩不止赤白帶下
香附子　赤芍藥各等分
右爲細末每服貳錢鹽壹捻水壹盞煎至柒分溫服無
時候日貳服拾服見效
壹方
用香附子去毛炒焦爲細末用極熱酒調下貳錢放溫
服不過兩服立愈昏迷甚者叁錢匕如山崩不可者亦
能解之米飲調亦可○許學士云治下血不止或成五
色崩漏常服資血調氣見婦人[illegible]
[illegible]圓 治婦人室女一切血氣經脈不調臍腹疼痛面色
萎黃心忪乏力腹脹脇滿頭暈惡心飲食減少崩漏帶下
大腸便血積聚癥瘕並皆治之處人服餌自見其功爾
[illegible]
香附子不以多少先擦去毛用好醋煮出焙碾爲末醋
煮糊爲圓如梧桐子大每服叁拾圓米飲送下無時候
婦人數墮胎以氣不升降所以胎氣不固此藥尤妙壹
方有艾同煮亦可
治血崩方
夏枯草爲細末每服貳錢米飲調下無時候
治崩中下血不止小腹痛
芍藥[illegible]　柏葉[illegible]
右水壹升煎取柒合入酒伍合再煎取柒合空心分爲
兩服壹方爲細末酒調貳錢有方有鹿角膠等分炒燥
爲細末酒調服方寸匕治白帶臍腹疼痛面黃瘦悴
[illegible]
治崩中下血久不止或赤或黑臍下痛
側柏　芍藥　龜甲　桑耳
乾地黃　黄芩　續斷　當歸
艾葉　牛角鰓　禹餘糧
右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓煎黄耆湯空
心下
治崩中晝夜不止醫不能治

芎藭貳兩　生地黃汁貳合

先用酒伍升煮芎藭壹升去滓下地黃汁再煎叁貳沸

分為叁服不耐者漸進[illegible]

壹方

丁香貳兩為細末用酒叁升煮取壹升空心頓服之

效[illegible]用丁香百顆酒煎服[illegible]

治忽患崩中血不止結作血片如雞肝色碎爛

芎藭[illegible]　阿膠　青竹茹[illegible]　續斷

地榆　小薊根[illegible]　當歸[illegible]　生地黃

伏龍肝[illegible]

右用水[illegible]升煑取叁升去滓分作叁服先服此藥後服

補宮圓子

阿膠　鱉甲　川芎　當歸

赤石脂　人參各[illegible]　續斷　甘草

鹿茸[illegible]　龍骨[illegible]　龜甲[illegible]　地榆[illegible]

烏賊骨[illegible]

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下貳拾圓

日貳服當煎川芎汁服之尤佳

治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立

芍藥　白芷　黃芩　鱉甲

川芎　烏賊骨[illegible]　乾地黃　牡蠣

五色龍骨　乾薑[illegible]　桂心[illegible]　附子[illegible]

右為細末空心酒調方寸匕

又壹方

白芷　牡蠣　龍骨　芍藥

赤石脂　阿膠　當歸　川芎

鱉甲　烏賊骨　人參[illegible]　艾葉肆分

乾地黃[illegible]　乾薑　黃芩[illegible]

右為細末空心酒調方寸匕

[illegible] 治婦人崩中赤白帶下[illegible]

當歸　白朮　青木香　蚕蛾[illegible]

墨棕刷[illegible]　川山甲[illegible]　地榆　[illegible]如

川芎　白茯苓　粉草　血餘[illegible]

牡蠣[illegible]　綿子[illegible]　熟地黃[illegible]　赤石脂[illegible]

右件以燥藥用綿子裹定入瓶子內用鹽泥固濟用炭

則半斤存性取出同用餘藥為細末醋煑圓如梧桐子大

每服肆拾圓空心溫酒吞下

經驗方治婦人下血[illegible]

[illegible]狗[illegible]分作兩服當歸酒調

[illegible] 治血山崩

[illegible]　伏龍肝[illegible]同為細末酒調貳錢匕

千金治崩中去血[illegible]千金翼無[illegible]

白茅根[illegible]　小薊根[illegible]

右貳味細切用酒伍升煑取肆升去滓分溫肆服

婦人崩中無問久近悉皆治之

伏龍肝[illegible]　小薊根　桑寄生　續斷

地榆　艾葉[illegible]　阿膠　當歸

赤石脂　厚朴各[illegible]　生薑伍兩

右㕮咀以水壹盞煎取柒分去滓分作叁服

崩中帶下方論第十六

論曰崩中帶下者何答曰其患有五夫病之中人皆有受病因起之候須盡其源以論方藥婦人方書唯言帶下有色之與形此不參考賢聖之理也且五崩是婦人極重之患療之最難後之學者莫識其源致夭者甚多方集衆服餌當在濟人之道備以思慮於茲彌久其功頗有精妙夫此病者起於風氣寒熱之所傷或產後早起不避風邪風邪之氣入於胞門或中經脉流傳臟腑而發下血名為帶下若傷足厥陰肝之經其色則青如泥色若傷手少陰心之經其色赤如紅津若傷手太陰肺之經其色則白形如涕若傷足太陰脾之經則其色黃如爛瓜若傷足少陰腎之經則其色黑如衃血此為其因也○問曰風邪氣之所中是人皆受之何為婦人獨患此病答曰五臟六腑男女雖同其中細微各有差別緣婦人有胞門子臟風冷中之則為所病若男子則為他病矣○又問何以名為帶下復有冷熱者何答曰脉有數經名字不同奇經八脉有帶在腰如帶之狀其病生於帶脉之下其有冷熱者則隨氣注也又況崩中者亦帶之下別名也諸君子有留心於醫術者備之者以此推之萬不失一

崩中漏下生死脉方論第十七

論曰夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脉虛損故也衝脉任脉為經脉之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經上為乳汁下為月水婦人經脉調適則月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脉血非時而下淋瀝不斷謂之漏下也○致五臟傷損五臟之色隨臟不同若五臟皆虛損者則其色隨血下診其脉寸口弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛虛寒相搏其脉為牢婦人則半產而漏下又云尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏白下赤又漏下赤白不止脉小虛滑者生脉大緊實數者死也又漏血下赤白日下血數斗脉急疾者死遲者生也又云尺寸脉虛者漏血漏血脉浮不可治也

若飲食過多其色紫黑甚者崩下吸吸少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脉微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中氣不調和不可禁 [illegible]

鹿茸 [illegible]　赤石脂　禹餘糧　艾葉

柏葉　附子　熟地黃　當歸

續斷

右為細末酒糊圓如梧桐子大空心溫酒下叁拾圓

治婦人崩中漏下不問年月遠近

柏葉　續斷　川芎　當歸

生乾地黃　鱉甲　鹿茸　禹餘糧

阿膠　赤石脂　牡蠣　地榆

艾葉　龍骨

右為末每服貳錢食前粥飲調下○壹方有丹參如鹿茸散煉蜜圓如梧桐子大每服叁肆拾圓空心溫酒吞下

益母散 治赤白帶下不止

益母草開花時採陰乾爲細末空心溫酒調貳錢日
參服
療帶下赤白年月深久不差
乾薑壹兩 白芍藥貳兩
右各炒黃色同爲末空心米飲調貳錢日兩服
張氏方
乾薑 芍藥各等分 又云加香附子貳分
甘草減半 右各炒黑色同爲末空心米飲調下方寸匕
白芷散 治婦人赤白帶下
白芷壹兩 海螵蛸貳箇燒 胎髮壹團燒
右爲末空心溫酒調下貳錢
[illegible] 治赤白帶下
[illegible]
萆薢 [illegible]
右爲細末每服貳錢陳米飲調下 [illegible]
破故紙散 治赤白帶下
破故紙 石菖蒲等分並炒
右爲末每服貳錢用菖蒲浸酒調溫服更入斑猫伍分 [illegible]
[illegible] 治子宮久冷赤白帶下
牡蠣煅 黃狗頭骨煅 紫稍花 韶腦
母丁香 蛇床子 破故紙 桂心等分
右爲細末煉蜜圓如雞頭大臨事用壹粒
[illegible]圓 治婦人血臟久冷赤白帶下補虛進食暖血海
北艾 [illegible] 大附子貳箇 [illegible] 黃狗頭骨 [illegible]

右爲末煉米粥爲圓如梧桐子大每服五拾圓空心溫酒
下或飯飲亦可忌口日參服忌生冷毒物
伏龍肝散 治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁多困乏力
棕櫚 [illegible] 伏龍肝 [illegible]
屋梁上塵 [illegible]
右參味等分碾和令停入龍腦麝香各少許每服貳錢
溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半月可安 [illegible]
[illegible]
[illegible] 治婦人血海不調因虛冷成積經絡無定赤白帶
下崩中不止面色痿黃肌瘦多困 [illegible]
白茯苓 青木香 杜仲 菖蒲
乾地黃 柏子仁 秦艽 青皮
菟絲子 訶子皮 當歸 艾葉
赤石脂 五加皮 牛膝 烏賊骨等分
右爲末每日空心以糯米粥壹盞藥壹匙粥調溫抄藥
壹錢相和喫下後喫餘粥或有胎忌用鯉魚糯米粥下
治冷白帶下
桑寄生 芍藥 栢葉各半兩 桑耳
禹餘糧貳兩 吳茱萸 乾地黃各壹兩 烏賊骨伍分
右爲細末空心用飯飲調下貳錢匕
治白崩中不絕
牡蠣 禹餘糧 鱉甲各陸分 黃皮
阿膠 [illegible] 續斷 白芷各叁兩

當歸　赤石脂[illegible]　白石脂　龍骨[illegible]
右為末煉蜜圓如梧桐子大每服肆拾圓空心溫酒下
治帶下
茅花[illegible]　棕櫚炭[illegible]　嫩蓮葉[illegible]　甘草節[illegible]
右為細末空心酒調方寸匕
治赤白帶下骨立者[illegible]
地榆[illegible]用水叁升煮至壹升半去滓再煎如稠餳
空心服叁合日貳服
聖惠方治漏下五色亦治嘔血
地榆[illegible]
[illegible]用醋壹升煮拾餘沸去滓食前稍熱服
治婦人漏下不斷方
亂髮[illegible]空心溫酒調下壹錢
又壹方
鹿角燒灰細研食前溫酒調下貳錢
又壹方
桃仁燒灰細研食前溫酒調下貳錢
千金溫經湯治女人曾經小產或帶下三十六病腹脹[illegible]
口乾日晡發熱小腹急痛手足煩熱大腑不調時時泄利
經脉不調久不懷孕
吳茱萸[illegible]　白芍藥　當歸　芎藭[illegible]
麥門冬[illegible]　半夏[illegible]　人參　阿膠[illegible]
牡丹皮去心　甘草　桂心[illegible]

右為粗末每服叁錢水壹盞薑伍片煎至柒分去滓空心
食前溫服忌生冷羊肉[illegible]千金方同
[illegible]治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不斷腰腹
重痛凡是五色帶疾並宜治之
禹餘糧[illegible]　赤石脂[illegible]
龍骨[illegible]　白芍藥　川芎　附子
熟地黃[illegible]　當歸[illegible]　乾薑[illegible]　肉桂各半兩
右為細末每服貳錢入麝香少許米飲調下空心食前
壹日貳服
又仲治婦人崩中漏下青黃赤白使人無子方
禹餘糧[illegible]　赤石脂[illegible]　牡蠣[illegible]　桂心
烏賊骨[illegible]　伏龍肝[illegible]
右等分為末溫酒調下方寸匕日[illegible]服空心[illegible]
又壹方
鹿茸[illegible]　當歸[illegible]　蒲黃[illegible]
右叁味為末溫酒調下方寸匕日叁服
又壹方[illegible]為末貳匕若燒露蜂房為末一指撮溫酒調服
又壹方常灸豬肝食之
千金療婦人白崩中方
乾地黃　芎藭　阿膠
赤石脂　小薊根[illegible]　伏龍肝[illegible]　桂心
右柒味切以酒陸升水肆升煮取叁升去滓入膠令烊
分為叁服日叁服[illegible]
沉香牡丹圓治婦人[illegible]久虛經候不利赤白帶下血氣

衝心多發刺痛四肢困傾

沉香　　壯丹皮　　赤芍藥　　當歸

桂心　　川芎　　黄耆　　人參

茯苓　　山藥　　白芷　　橘紅

吳茱萸　　白巴戟　　木香　　牛膝

枳殼　　肉豆蔻　　製厚朴　　生乾薑

白龍骨

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服貳拾圓空心溫酒下

若心腹痛煎白芷酒下

腎着治[illegible]下[illegible]

[illegible]為末每服叁錢以酒調下

千金[illegible]方脈數者可用

[illegible]生地黄

[illegible]取伍升分為三服

白[illegible]治[illegible]

崩漏[illegible]下五色[illegible]

虛羸吸吸少氣[illegible]

下血過多兩脇[illegible]

白汗

禹餘糧　　白石脂　　芍藥　　白芷

川椒　　阿膠　　艾葉　　川芎

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服[illegible]拾圓米飲下或[illegible]

酒醋湯亦得常服溫補胞[illegible]和養血氣光澤顏色[illegible]

風冷退除百病自成孕育性平不熱

[illegible]圓治婦人赤白帶下[illegible]

[illegible]圓治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶漸漸

瘦悴飲食少味累年無子

熟地黄　　山茱萸　　蕪荑仁　　乾薑

白芍藥　　代赭石　　白殭蠶　　厚朴

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心溫酒下伍拾圓

日叁服[illegible]

婦人白濁白淫方論第十六

論曰夫婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養水火不

升降或由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰

陰為溲便之道胞冷腎損故有白濁白淫宜服局方金鎖

[illegible]

正元丹或因心虛而得者宜服平補鎮心丹降心丹威喜

元若因思慮過當致使陰陽不分清濁相干而成白濁者

然思則傷脾故也[illegible]四七湯吞[illegible]圓子[illegible]分利

[illegible]宜[illegible]沉湯每貼加茯苓壹錢遠志[illegible]智貳拾枚

去殼[illegible]煎服

治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔[illegible]

片子薑黄　　大附子　　赤芍藥　　桂

紅藍子　　三稜　　牡丹皮　　芫花

木香　　郁李仁　　没藥

右為細末每服壹錢酒煎服如腹痛用當歸没藥為末

以水[illegible]分酒[illegible]分同煎至[illegible]分熱服

婦人天癸過期經脈不調方論[illegible]　　九

許學士云婦人天癸過期而經脈不調或三四月不行或壹月再至腰腹疼痛素問云七損七益謂女子七七數盡而經脈不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善宜服【當歸散】

當歸　川芎　白芍藥　黃芩

白朮各半兩　山茱萸肉壹兩半

右為細末空心食前溫酒調下貳錢日叁服如冷者去黃芩加桂心壹兩

【紫石英圓】調氣固血治本臟因虛生寒月經行多或來不及期腹痛怯風臟腑不和

鹿茸　五味子　蓯蓉　杜仲

赤石脂　紫石英　茱萸　附子　乾薑

黑龍骨　肉豆蔻　白茯苓　熟乾地黃各壹兩

右為細末酒煮麵糊為圓如梧桐子大空心食前熱米飲吞下伍柒拾圓壹月後血氣已安[illegible]可以常服中年已後婦人最宜服此藥

婦人血分水分腫滿方論見第二十

【椒仁圓】

夫婦人腫滿若先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通名曰血分水化為血血不通則復化為水矣宜椒仁圓若先因小便不利後身面浮腫致經水不通名曰水分宜服

治血分椒仁圓

椒仁　甘遂　續隨子去皮　附子

郁李仁　黑牽牛　五靈脂研　當歸

吳茱萸　延胡索各半兩　芫花[illegible]壹分

信砒　膽礬各壹錢　斑猫[illegible]

蚖青[illegible]

右為細末麵糊為圓如豌豆大每服壹圓橘皮湯下

治經脈不利即為水水流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類醫作水治之非也宜此方

人參　當歸　大黃[illegible]

桂心　瞿麥穗　赤芍藥　白茯苓

葶藶[illegible]

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下拾伍圓至貳拾圓

治水分【葶藶圓】[illegible]

葶藶[illegible]　續隨子[illegible]　乾薑[illegible]

右為末棗肉圓如梧桐子大每服柒圓煎扁竹湯下如大便利者減續隨子葶藶各壹分加白朮半兩

又有腸覃臟服[illegible]氣血氣血蠱水蠱石瘕血瘕[illegible]

並見後拾遺門第二十四卷

新編婦人大全良方卷之八

子136 310

新編婦人大全良方卷之二

○衆疾門

經脉不調衆疾生焉故以次之

拯一方總論第一

夫天地造端於夫婦乾坤配合於陰陽雖清濁動靜之不同而成象效法之有類原茲婦人之病與男子不同者亦有數焉古方以婦人病比男子十倍難治不亦言之深乎但三十六病產蓐一門男子無之其餘外傷風暑寒濕內積喜怒憂思飲食房勞虛實寒熱悉與丈夫一同也依源治療可得而知之

產寶方論第二

古書治婦人別著方論者以其胎妊生產崩傷之異況婦人之病比之男子十倍難療蓋女子嗜慾多於丈夫感病倍於男子加之慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所以為病根深治之難差況懷胎妊而挾病也不特避其毒藥仍須審其虛實冷熱而調治之無使妄投湯劑以致夭枉

博濟方論第三

夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷血氣則風冷乘虛而干之或作之於經絡或衝入於腹中內受風邪脾胃虛弱故不能消於飲食也食既不充榮衛凝澁肌膚黃燥面不光澤若大腸氣虛則變為下利若流入關元致絕子嗣隨其所傷而變成疾焉經曰凡婦人三十六種病皆由子臟冷熱勞損而挾帶下起於胞內也是故衝任之脉為十二經之會海婦人之病皆見手少陰太陽之經而候之

寇宗奭論第四

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪足之家居奧室之中處帷幔之內復以帛幪手臂既不能行望色之神又不能殫切脉之巧四者有二闕焉黃帝有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以為診法若患人脉病不相應既不得見其形醫人止據脉供藥其可得乎如此言之焉能盡其術也此醫家之通患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁多為醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯之色尚不肯信況其不得見者乎嗚呼可謂難也已

通用方序論第五

夫通用方者蓋產前產後皆可用也或一方而治數十證不可入於專門者是名賢所歎世之常用有效之方雖曰通用亦不可刻舟求劍按圖索驥而膠柱者也

[illegible]四物湯 治婦人經病或先或後或多或少疼痛不一腰足腹中痛或崩中漏下或半產惡露多或停留不出妊娠腹痛下血胎不安產後塊不散或亡血過多或惡露下不服之如神○張氏道云此方治婦人自然只是四物湯加茱萸煎服若陰臟少使茱萸[illegible]陰臟多使茱萸[illegible]與周端仁郎中頃赴省試[illegible]一路案出場云某本醫家凡婦人

百病只是四物湯加藥交錯不效若達以此爲服 [illegible]
當歸 白芍藥 川芎 [illegible]
生乾地黄 [illegible]
右等分爲粗末每服肆錢水壹盞半煎至[illegible]分
清若帶熱服食前 若平常血氣不調及常服只用本
方日貳叁服 治經血凝滯腹内血氣作疾加議成官
桂等分用之 [illegible] 如因産後欲
推陳致新補血海治諸疾加小薑煎 若胎動不安下
血每服加艾葉伍柒片更加葱白阿膠末減四味之半
當歸用小半如疾勢甚者以四味各半兩細判以水四
盞熟艾壹塊如雞子大阿膠五七片煎至貳盞半去滓
分作四服一日令盡 [illegible] 日貳叁服至二臘
[illegible] 以前産後每日可常服 如氣虚弱血每不
調服一月不妨 如産後被驚氣滯種種積滯敗血一
月内惡物微少敗血作病或脹或疼胸膈脹悶或發寒
熱四肢疼痛加延胡索没藥香白芷與四物等分爲細
末淡醋湯或童子小便酒調下 如血風於産後乘虚
發作或産後傷風頭痛發熱百骨節痛加荊芥穗天麻
香附子石膏藿香各壹分四物料共壹兩中加之每服
叁錢水壹盞煎至柒分服 如虚熱心煩與血相搏口舌
乾渴欲飲水者加栝樓根壹兩麥門冬叁分 如腹
刺痛惡物不下加當歸芍藥壹分 如血崩不止加熟
地黄蒲黄各壹兩 嘔逆加白术人參各半兩 如寒
熱往來加炮乾薑牡丹皮各壹兩 因熱生風加川

芎壹分柴胡半兩 腹脹加厚朴枳實各壹分 身熱
脉數頭昏項强加柴胡黄芩各半兩 如臟腑滑泄加
桂心附子炮各壹分 若虚煩不眠加竹葉人參各
壹分 煩燥引飲頭痛大渴加知母石膏各半兩 若水
停心下微吐逆加木猪苓防己各叁分同煎 若平常
些小虚眩肢體倦怠月信不調只用[illegible]如常煎
服 [illegible] 壹方治婦人血虚心腹㽲
痛不可忍者去地黄加乾薑名四神湯 治老人風秘
加青皮等分煎服 壹方治小便澁大便秘加大黄桃
仁去皮尖炒黄減半煎 壹方治血痢不止加阿膠艾
[illegible] 壹方治婦人腹痛作聲經脉
不快加熟地黄一倍 [illegible] 加荊芥酒
[illegible]
前常服 壹方添柴胡名五神湯柴胡大能補虚退虚
熱 壹方以四物湯共肆兩爲細末煉蜜爲圓如梧桐
子大空心米飲下叁肆拾圓以療年高婦人白帶又良
驗也 [illegible] 用之 壹方四物湯共肆兩加甘草半兩細
末煉蜜爲圓每兩作捌圓酒醋共半盞温湯同化調停
下名當歸煎去敗血生好血如人行五里再進壹圓無
時候 [illegible] 此藥不知起於何代或云始自魏華佗按
巢氏一天化之術精微方論[illegible]傳佛化術鍼灸不過數
處千金方云自一代以來[illegible]未有如此詳備者
其間有漢五臣名公諸方今産寶乃末梁時節度巡官
昝殷所撰其中有四物散國朝太平興國中修入聖惠
方者數方自後醫者易散爲湯雖無傳特之功但善用

者若馭良馬以意驅策之則隨意無所不至乃可珍也

自 皇朝以來名醫於此四物中尚損益味隨意虛

實寒熱無不得其效者然亦非止婦人之疾可用而已

懷娠產前後加減法

川芎洗 當歸 桂心 白芍藥

右四味各等為細末取淨壹兩各隨病證加減用 臨產腹痛

產前初覺胎動川芎芍藥各七錢米飲下 產後

甚川芎芍藥當歸各半錢桂末壹錢[illegible] 產後

惡露不快川芎當歸各五七錢童子小便調下 仍時時打

醋炭令香不絕則血脈自收安樂無病切不可妄投藥

恐逆血過多則心虛氣多二日內只服當歸川芎末各

壹錢童便調下日三服三日後只服四順理中圓空心

童子小便吞下 七日內催產當歸川芎末各壹錢童

子小便或米飲調下 七日外方可服補藥猶得太早

則留住惡血 [illegible] 產後

頭昏目暈川芎芍藥當歸末各七錢童子小便調下未

滿月已滿月四味各七錢水壹盞煎至[illegible]分溫服 腹

痛當歸末壹錢桂心末半錢童子小便調下 心智煩悶

當歸芍藥各半錢童子小便調下 惡露過多桂心芎

藥當歸各五壹錢童子小便調下 大便冷用理中圓水

壹錢煎[illegible]分溫服

保命[illegible]治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾[illegible]未進

別物即先服此藥能除諸疾逐敗血生新血

川芎貳兩 川當歸參兩

右為細末每服貳錢水壹盞[illegible]分溫服 壹

方為粗末每服肆錢水[illegible]分煎至[illegible]熱服

將產前先安排此藥[illegible]之產了[illegible]之參

日內日貳服參日外壹服 壹方名芎歸湯只是此

貳味等分以咀水煎[illegible]治失血傷胎去血產後去血崩

中去血金瘡去血拔牙去血[illegible]及 切去血過多心

煩眩暈悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉能治之

若產後[illegible] 一名桂香散治產後腹

疼不可忍[illegible]小便合煎服之立

效 一名[illegible]治妊娠子死或未死胎動不安每服

用酒水合煎[illegible]服胎若已死服之便下若未死其

胎即安此[illegible] 一名[illegible]臨月服之

則[illegible]治產後諸疾 一名[illegible]湯治[illegible]

之[illegible]不能支持四肢自汗

[illegible]

分溫服 一名[illegible]治婦人室女心腹疼痛經脈不

調[illegible]服若姙婦胎氣不安產後諸疾如酒煎服

一名[illegible]治婦人血氣上喘下腫[illegible]分為細末

每服貳錢空心煎艾湯調下 又治產後[illegible]血衝心

及腹脹氣絕者神驗 [illegible]子死腹中先用黑豆

壹大合炒熟水壹盞[illegible]童子小便壹盞[illegible]肆錢煎至

壹盞以上分為貳服未效再作 產後惡血注心迷悶

喘急腹痛依前用黑豆[illegible]生薑自然汁半合煎服 又

此藥兼治[illegible]每服[illegible]錢半入[illegible]花[illegible]水壹盞

前至陸分無時候服三日服下血隨入添　如產後頭
痛加川芎煎　如吐血亦宜服
論用參黃散主治　出明醫方書
四物湯婦人多用者以其不問產前產後經水多少皆可
通用惟用參黃散者味其主治頗相類何者以其能破宿血
補新血安胎落死胎止崩中帶下調經脉大類當歸地
黃芍藥川芎也
丹參散　治婦人經脉不調或前或後或多或少產前胎不
安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼
丹參去蘆不以多少
右為細末每服貳錢溫酒調下經脉不調食前服冷熱
勞無時候服
[illegible]圓　治婦人久虛
無子產前產後一切病患兼療男子下虛無力此藥能安
胎催生姙娠臨月服伍拾圓產時攷痛婦人無子是子宮
冷如服貳拾圓男女自至又治積年血風腳手痵痹半身
不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心痛
子死腹中遶臍痛氣滿煩悶失蓋汗不出月水不通四肢
浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不語口噤產後痢疾
消渴眼前見鬼迷運敗血上衝寒熱頭痛面色痿黃淋瀝
諸疾血下無度血痢不止飲食無味產後傷寒虛煩勞悶
產後血運產後血痢九婦人衆疾不以年月日深並皆治之
白芍藥　蒼朮　石脂　川芎　不見火
牡丹皮　當歸　白茯苓　人參
白薇　白芷　桂心
白朮　沒藥　甘草　延胡索
右十五味等分為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓
溫酒化下初產了並用熱醋湯下空心食前○此方係
王承宣壓祖傳宋家九婦人懷身便服此藥甚神妙常
服尤好係在京師於能家傳到
人參圓　專治婦人諸疾產前產後風虛痼冷手足瘴痹豆
淋酒化下血風頭痛產後中風荊芥酒化下產前產後痰
涎咳嗽桑白皮湯下經脉不調或前或後或多或少血氣
攻刺臍腹疼痛溫酒化下經脉不通產後血暈蘇木人參
煎湯化下血崩不止赤白帶下側柏燒灰調酒下姙娠將
產失宜或因驚動胎氣悶漏胎下血艾葉煎湯化下臨
產艱難乳香酒化下子死腹中胎衣不下用朴硝煎湯
童子小便和酒化下產後勞傷敗血氣痕實熱過
身體痛咳嗽盜汗地黃烏梅煎湯化下產後敗血浮腫薑
汁少許和酒半盞化下產前服之則安胎臨產亦易產產
後則逐去惡血不生諸疾用童便和酒化下常服滋血駐
顏大暖血海升降陰陽滋養榮衛或子宮久冷多病少子
能久服之見效立致忌生冷油膩魚腥豬母白豬一切
當歸　白芍藥　川芎　石斛
香附子　蒼朮　降真香　熟地黃
秦艽　貝母　羌活　桂心
粉草　乾薑　北細辛　牡丹皮
大豆卷　茴香　枳殼　延胡索

白芷各壹兩　人參　木香　石膏煅

沉香　黃芩各半兩　川椒炒一分　交加兩

右為細末煉蜜為圓每兩作柒圓依前服飼常服溫酒化下

交加散　治產前後百病治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚為瘕產後中風尤妙

生地黃壹斤研取汁　生薑拾貳兩研取汁

右將地黃汁炒生薑渣生薑汁炒地黃渣各稍乾焙為細末每服叁錢溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後尤不可缺

交加散　治榮衛不和月經湛濁大能滋養血絡逐散惡血腹撮痛腰脹重兼血經諸疾並皆治之

生薑　生地黃　白芍藥

延胡索　當歸　桂心

紅花　沒藥　蒲黃

右為細末每服貳錢溫酒調下如月經不依常未愈酒調下若腰疼用糖煎酒調下

玉露通真圓　治婦人諸疾

半夏　人參各半兩　厚朴

澤蘭　甘草　白芍藥

石膏　蚕蛻　白朮

當歸　羌活　熟地黃　白茯苓各

防風　乾薑　柏子仁　蒼朮

白薇　木香　川牛膝

附子　白薑

川芎　藁本各壹兩　川椒　苦梗各叁兩

白芷貳兩半

右為細末煉蜜為圓每玖錢重分作拾圓切記煉蜜無令太過及生　男子婦人諸虛不足狀如勞瘵黃耆煎酒下　血氣痛炒姜酒下　產前安胎川芎湯下　產後諸疾用酒或鹽湯下　產前產後淋用米飲送下　男子婦人牙疼用半圓擦疼處以鹽湯點下　產前產後血悶用童子小便送下　經脈不調用紅花煎酒送下　產後風毒生瘡荊芥茶下　冷痰翻胃鹽心乾薑湯下　婦人子宮久冷崩漏赤白帶下用童子小便米醋好酒一處煖熱下

川芎　白芍藥　當歸

人參　陳皮各半兩　白朮　地黃各壹兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服伍拾圓溫水下

二聖散　產前服之則安胎產後惡血不盡胎衣不下方

川芎　羌活

右為細末每服貳大錢水壹盞酒少許煎柒分溫服

二聖大寶琥珀散

生地黃　生薑　當歸

川芎　牡丹皮　芍藥　茯苓

蒲黃　香白芷　羌活各半兩　桂心不見火

熟地黃炒

右拾味各等分同前貳味為細末於瓷合內收之

婦人冷氣痛并血海不調腸氣炒薑酒下貳錢　產後
胞衣不下暖酒調下貳錢　產婦臨月日進叁服則滑
胎易產溫酒調貳錢　產後血犯心眼見鬼神用童便
半盞酒半盞同煎調貳錢　婦人久服則顏色紅白無
血來相攻一生無子者久服則有孕　此藥治療婦人
百病空心日午臨卧食前日貳服產後百病並暖酒調下

木香湯　治婦人胎前產後血氣諸疾

木香　三錢　莪朮　白朮
枳殼　白茯苓　當歸　延胡索
人參　熟地黃　牡丹皮　粉草

右爲末米糊圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓嘗
服溫酒吞下湯使于后　胎前渾身并腳手痛炒薑酒
下　胎前瘧疾并安胎紫草煎酒下　胎前心悶逆吐
食糯米飲下　胎前飲食不得渾身浮腫淋酒下
胎前渾身發熱甘草湯下　胎前咳嗽煨薑鹽湯下
胎前頭痛煨薑茶下　胎前產後瀉紫蘇薑酒下　催
生胎衣不下當歸白參寸煨酒下　產後赤白痢乾薑
甘草湯下　產後下血不止燒秤錘淬酒錢調酒下
產後渾身虛腫陳皮焙乾浸酒下　頭疼薄
荷茶下　常服飲下　赤白帶下燒棕櫚灰錢調
酒下　久年血氣成塊心痛溫酒下炒薑酒下及良
薑浸酒下　婦人室女經脈不通煎紅花蘇木酒
下　經脈不調或前或後或多或少煎當歸酒下　大
小便秘結燈心煎湯下　乳汁不行豬蹄羹下

產後…煎…下

沉香琥珀圓　治…氣血經脈不調心忪倦乏腰膝疼
痛赤白帶下五心煩熱面無顏色血海久冷胎孕不成憎
寒壯熱婦人諸疾並能治之

沉香　琥珀　附子　川芎
肉桂　五味子　石角　辰砂
阿膠　續斷　茯苓
人參　當歸　牛膝　木香
沙黃

右爲末…圓如梧桐子大每服肆拾圓空心溫酒吞下日
三服

血…散　…血補婦人…治血海久冷…

當歸　川芎　人參
麥門冬　牡丹皮　芎藭　阿膠　琥珀
酸棗仁　粉草　桂心

右爲粗末每服…水壹盞薑…片煎柒分去滓溫
服一日叁服

…圓　治婦人…方

吳茱萸　良薑　白芍　當歸
芍藥　延胡索　陳皮
青皮　劉寄奴　生地黃　莪朮
川芎　柏葉灰　破故紙

右爲細末醋煮麵糊圓如梧桐子大每服肆伍拾圓　月
水不通紅花蘇木酒　白帶牡蠣粉酒下　子宮久

冷白茯苓煎湯下　赤帶蓮葉湯下　血崩豆淋酒調
綿灰下　胎不安蜜和酒下　腸風陳米飲調百草霜
下　心疼菖蒲煎酒下　滑胎下血烏梅溫酒下　耳
聾臘茶煎湯下　胎死不動斑猫煎酒下　[illegible]
痛當歸酒下　胞衣不下芸薹研水下　頭風薄荷茶
下　血風服黑豆炒薑湯下　生瘡生地黃湯下　身
體疼痛黃耆末調酒下　四肢浮腫麝香湯下　咳嗽
喘滿桑白皮湯下　腰痛桂心末調酒下　產前產後
白痢乾薑湯下　赤者甘草湯　雜首一宜湯當服溫酒豬
湯任下　並空心食前服

新編婦人大全良方卷之二

新編婦人大全良方卷之三

此一卷論中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口眼喎斜風眩頭痛血風心神驚悸癲狂骨節疼痛風血風走注痿痿癮疹風痰腳氣腰痛諸疾已上諸證雖各有方論亦要先明其人體性肥瘦之處實辨證之冷熱相人之強弱入臟入腑在絡在經方可以合方調治未要孟浪用藥今之治法先宜順氣然後治風萬不失一　蓋有中風中寒中暑中痰中氣皆能令人涎潮昏塞所謂朱紫相凌玉石不分醫者不可不詳而究之如中風若作中氣治之十愈八九氣中若作中風治之十無一生所以疑惑之間不問中風中氣首以蘇合香圓藿香煎五積散如中痰則有參蘇飲如中寒則有理中湯如中暑則有白虎湯　如的然見得是中風如三生飲加木香附子排風續命湯引人小竹瀝大八風湯至寶丹用牛黃清心圓　若其冷熱虛實而投之未有不安者也然此疾積之以非一日所能致令人服藥三五服便責無效其責醫者亦速矣正宜大劑久服方有其效孟子曰七年之病求三年之艾也

婦人中風方論第一

夫中風者虛風中於人也風是四時八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名為虛風賊害萬物人體虛者則中之當時雖不即發停在肌膚後或重傷於風前後重沓因體虛則發入臟腑俞俞皆在背中風多從俞入隨所中之俞而乃發病婦人血氣虛損故令中風也其候口眼開闔以

別重輕涎沫有無以明證治如眼開口閉手足不開涎不
作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿者死
（至寶丹）（蘇合香圓）（五積散）[illegible]黃清心圓[illegible]
大八風湯[illegible]

排風湯 治男子婦人風虛冷濕邪氣入藏狂言妄語精神
錯亂及風入五藏等證詳見和劑方
白鮮皮　白朮　白芍藥　桂心
川芎　當歸　防風　杏仁[illegible]
甘草[illegible]　白茯苓　麻黃[illegible]　獨活[illegible]
右㕮咀每服[illegible]水一盞半生薑[illegible]片煎至[illegible]分去滓
溫服無時[illegible]
[illegible]

[illegible]

三生飲 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲
痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脈沉伏或指下
浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈[illegible]
生南星[illegible]　生烏頭[illegible]　生附子[illegible]　木香[illegible]
右㕮咀每服半兩水貳大盞生薑拾片煎至陸分去滓
溫服或口噤不省人事者用北細辛皂角各少許為細
末或只用半夏為細末用少許以蘆管吹入鼻中俟噴
嚔其人少蘇然後進藥如氣盛人只用南星伍錢重木
香壹錢加生薑拾片煎作兩服飲之名星香散
[illegible]

[illegible] 治痰飲停積胸中中脘閉塞眩暈嘈煩
忪悸噦逆及痰氣中人停留關節手足嚲曳口眼喎斜半
身不遂食已即嘔頭疼發熱狀如傷寒
人參　紫蘇葉　半夏　茯苓
乾葛　前胡[illegible]　甘草　木香
陳皮　枳殼[illegible]　桔梗[illegible]
右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑柒片棗壹枚煎至柒分去
滓空心溫服服痛加[illegible]

[illegible] 治左癱右瘓[illegible]
進食寬中[illegible]
羌活　[illegible]　防風[illegible]　白朮
陳皮　黑附子[illegible]　南木香　檳榔

牛膝　大川烏(炮)　草豆蔻(煨去皮)　杏仁(去皮尖麩炒)
人參　白茯苓　川芎　當歸
甘草　桂心(各半兩)
右㕮咀每服肆錢重水壹大琖半生薑伍片煎至捌分
去滓熱服大便不通加大黃小腹脹加苦葶藶滑石腸
上壅滿咳嗽氣促加知母川升麻天門冬知母[illegible]
[illegible]

附子湯 治五臟中寒口噤四肢強直失音不語昔有
武士守邊大雪出帳外觀瞻忽然暈倒時林億作隨行醫
官灌以此藥兩劑遂醒
大附子(炮)　人參(去蘆)　乾薑(炮)　甘草(炙)
白朮(各等分)
右細剉每服肆錢重水壹琖半煎柒分去滓不以時候
服口噤者斡開灌之[illegible]
[illegible]

續命湯 治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂口
眼喎斜手足戰掉語言蹇澁肢體麻痺神情昏亂頭目眩
重痰涎并多筋脈拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側及
治諸風服之皆驗若治脚氣緩弱久服得差久病風人每
遇天色陰晦節候變更宜預服之以防瘖瘂

麻黃(去節)　防己　人參(去蘆)　黃芩
桂心　甘草　白芍藥　川芎
杏仁(各壹兩)　附子(炮去皮臍半兩)　防風(壹兩半)
右㕮咀每服伍錢水壹琖半生薑柒片棗兩箇煎至柒分
去滓不以時候服取汗隨人虛實與所中輕重有人脚
弱服此六七劑得差　精神恍惚加茯神遠志　骨節
煩痛有熱者去附子倍芍藥心煩多驚者加犀角半兩
骨間冷痛者倍用桂附　嘔逆腹脹者倍人參加半夏
壹兩　躁悶大便澁者去附子倍芍藥入竹瀝壹合煎
服　臟寒下利者去防己黃芩倍附子壹兩加白朮壹
兩[illegible]無芎藭去杏仁止十味　延年無
防風[illegible]使用產後失血并老人小兒用麻黃桂心
甘草各貳兩　一法治武猝哭或欠語無所不及用麻
黃芩兩人參桂枝白朮各貳兩無附子防風生薑有當
歸壹兩自汗者去麻黃杏仁加白朮　脚弱加牛膝石
斛各壹兩　身疼痛加秦艽壹兩　腰疼加桃仁杜仲
各半兩　失音加杏仁壹兩[illegible]
[illegible]

小風引湯
防風　獨活　細辛　川芎
北五味子　白茯苓　人參　白芍藥
白朮　甘草(等分)
右㕮咀每服肆錢水壹琖生薑參片杏仁伍箇去皮尖搥
碎同煎至柒分去滓溫服　如加麻黃蓯蓉附子當歸

羚羊角陸味等分 即大風引湯

千金竹瀝湯 又治熱即生風

竹瀝貳升 生葛汁壹升 生薑汁叁合

右叁味相和溫暖分叁服朝晡夜各壹服

深師竹瀝湯 治中風涎潮譫語昏塞四肢緩縱

秦艽 防風 獨活 附子各壹分

右㕮咀以水肆錢煎至貳錢入生地黃汁淡竹瀝各半錢再煎四五沸去滓分作四服無時熱服病勢去以他藥扶持未愈再作近世貴人用之多有神效

取竹瀝法

新竹截尺許長去節作兩邊用兩磚對立相去八寸置竹仰在磚上多著熾火燒之磚外兩頭以碗盛瀝瀝盡以綿濾澄清夏秋須沉冷水中以防瀝酸凡大熱有風人亦可單服冷暖隨人勿過度荊瀝亦然

婦人中風角弓反張口噤方論第二

夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽之經也人之陰陽經絡周環於身風乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀宜用小續命湯 方見前

活人書論曰婦人產後血虛多汗出喜中風身體強直口噤背反張作痓治之屬太陽經先因傷風又感寒濕而致然也古人謂之痓病外證發熱惡寒與傷寒相似但其脈沉遲弦細而項背反張強硬如發癇之狀此為異耳 新產血虛 [illegible] 當發其汗無汗以分剛柔二痓 剛痓無汗柔痓有汗 發熱無汗名陽痓屬剛痓陰痓屬柔痓無汗葛根湯主之有汗桂枝加葛根湯主之凡剛柔二痓小續命湯並可與之有汗者去麻黃加葛根若 [illegible] 其人 [illegible] 不 [illegible] 附子湯 [illegible] 散 [illegible] 防風湯 八物白朮湯 桂枝 [illegible] 可 [illegible] 用之 [illegible]

葛根湯 治剛痓無汗惡風

葛根 [illegible] 麻黃 [illegible] 桂枝

芍藥 [illegible] 甘草 [illegible] 大棗 [illegible]

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎至八分去滓溫服取汗為度

桂枝加葛根湯 治柔痓有汗不惡寒

桂枝 [illegible] 芍藥 [illegible]

甘草 [illegible] 乾葛 [illegible]

右㕮咀每服伍錢水壹盞煎至八分去滓溫服取汗為度

[illegible]

附朮散 治傷寒手足逆冷筋脈拘急汗出不止項強直搖頭口噤

附子 白朮 [illegible] 川芎 [illegible] 桂 [illegible]

獨活 [illegible]

右為細末每服叁錢水壹盞 [illegible] 煎至七分 [illegible] 溫服

桂心白朮湯 治傷寒陰痓手足厥冷筋脈拘急汗出不止

白朮 桂心 附子 防風

川芎 甘草 [illegible]

右㕮咀每服伍錢水貳盞薑四片棗壹枚煎至壹盞 分溫服

柴胡防風湯 治傷寒陰痓閉目合面手足厥逆筋脈拘急汗出不止

柴胡 五味子 白朮 茯苓

甘草 乾薑 附子 防風 各等分

桂心

右為粗末每服三錢薑三片水一盞煎七分去滓溫服

八物白朮散 治傷寒陰痓一二日不差手足厥冷筋脈拘急無汗恐陰氣內傷

白朮 麻黃 茯苓 五味子

羌活 附子 桂心 良薑

右為粗末每服三錢水一盞薑五片煎七分去滓溫服

白僵蠶散 治婦人中風角弓反張口噤不能言皮膚頑痺筋脈抽掣

白僵蠶 烏蛇肉 天麻 羌活

南星 川烏 防風 蟬蛻

白附子 羚羊角 朱砂 桑螵蛸

麝香

右為細末每服一錢溫酒調下無時候

烏蛇圓 治婦人中風口噤緊急手足頑麻心膈痰涎壅滯

烏蛇肉 天麻 白附子 南星

獨活 羚羊角 僵蠶 全蠍

半夏麯 麻黃 當歸 晚蠶沙

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服七圓溫酒吞下亦

治角弓反張

婦人中風口噤方論第三

夫婦人中風口噤者是體虛受風風入頷頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頷頰足陽明之筋上夾於口而風挾冷乘虛入其筋則筋攣故引牙關急而口噤也

天南星散 治婦人中風口噤四肢拘急

天南星 白附子 黑附子 烏蛇肉

全蠍

右為細末每服半錢以生薑汁溫酒調下無時拗開灌

[illegible] 治婦人中風口噤四肢強直

黑附子 天麻 桂心 石膏

麻黃 川烏 南星

麝香

右為細末入研藥令停每服一字無時豆淋酒調灌

烏蛇散 治婦人中風口噤

烏蛇肉 全蠍 天麻 南星

僵蠶 膩粉

右為細末入膩粉令停每服一字以生薑酒調灌下

婦人中風不語方論第四

巢氏云脾脈絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脈係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也喉嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故謂之中風失音不語經云醫所當[illegible]使人發揚

【神仙解語丹】治心脾經受風言語謇澀舌強不轉涎唾溢
盛及疼痛注邪搏陰神內鬱塞心脈閉滯暴不能言
白附子炮　石菖蒲去毛　遠志去心甘草水煮
天麻　全蝎去毒炒　羌活　白殭蚕炒
南星牛膽釀如無只炮　木香半兩
右為細末煮麵糊為圓如梧桐子大每服入朱砂為衣每
服貳拾圓至叁拾圓生薄荷湯吞下無時候
治中風內虛腳弱語言謇澀【[illegible]】
石斛去根　熟地黃　杜仲去皮炒　丹參各壹兩
防風　川芎　麥門冬去心　桂心
川獨活各壹兩
右㕮咀每服伍錢水壹盞半棗大枚煎至壹盞分去滓溫服
治中風入肝脾經手四肢不遂舌強語謇【[illegible]】
威靈仙　附子炮　苦梗　蔓荊子
防風　枳殼麩炒　川芎　當歸各等分
右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑三片煎至八分
溫服日四服忌茶

婦人風痺手足不隨方論第五

夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而為痺風多者為風痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起於手足而循行於身體風寒之氣客於肌膚始為痺復傷陽經隨其虛處而停滯與血氣相搏血氣行則遲緩使機關弛縱故風痺而復手足不隨也

【三痺湯】治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆療
川續斷　杜仲去皮切姜汁炒　防風　桂心
華陰細辛　人參　白茯苓　當歸
白芍藥　甘草各壹兩　秦艽　生地黃
川芎　川獨活各半兩　黃芪　川牛膝各壹兩
右㕮咀為末每服伍錢水貳盞薑叁片棗壹枚煎至壹盞
去滓熱服無時候但腹稍空服有人病左臂不隨後
已痊平而手指不便無力試諸藥不驗服此藥纔半料
【三五七散】[illegible]

婦人中風自汗方論第六

尋古今中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用麻黃令人不得虛虛乃以風邪不得汗則不能泄也然此治中風無汗者為宜若治自汗者更用麻黃則津液轉使脫泄反為大害中風自汗仲景雖處以桂枝湯至於不住發搐口眼瞤動遍身汗出者豈勝對治當此之時獨活湯續命煮散復榮衛却風邪不可闕也

【獨活湯】治風虛昏憒不自覺知手足瘛瘲坐臥不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之
川獨活　羌活　人參　防風
當歸　北細辛　茯神去木　半夏
桂心　白薇　遠志去心　菖蒲去毛
川芎各半兩　甘草炙三分
右㕮咀每服伍錢水壹盞半薑伍片煎七分去滓無時服

【續命煮散】治風氣留滯心中昏憒四肢無力口眼瞤動或時搐搦亡失津液渴欲引飲此能扶榮衛去虛風中風自

汗及産後中風自汗尤宜服之

防風　獨活　當歸　人參

細辛　葛根　芍藥　川芎

甘草　熟地黄　半夏　遠志去心

荊芥穗各等分　桂心各減半

右㕮咀每服伍錢水壹盞半生薑參大片煎至柒分去滓温服不拘時汗多不止者加牡蠣粉壹分半

婦人臂痛方論第七

論曰夫婦人臂痛筋脉攣急不得屈伸遇寒則劇由肝虚為風寒邪氣流於血脉客於經絡搏於筋筋不榮則乾急而痛其脉緊細宜服柏子仁圓若經絡為寒臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由中脘伏痰脾氣滯而不行上與氣

[illegible]

相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而氣不下上攻於臂故痛其脉沉細宜茯苓圓控涎丹

柏子仁圓 王氏指迷方

柏子仁　乾地黄各貳兩　茯苓　枳實去白麩炒

覆盆子炒　北五味　附子炮　石斛去根

鹿茸酥炙　酸棗仁炒　桂心　沉香

黄耆各壹兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下參拾圓

舒經湯 治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

片子薑黄肆兩　甘草　羌活各壹兩　白朮

海桐皮　當歸　赤芍藥各貳兩

右為粗末每服參錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服如腰以下疾空心服腰以上疾食後服

茯苓圓

茯苓壹兩　半夏貳兩　枳殼麩炒半兩　風化朴消貳錢半

右四味為末生薑自然汁煮糊為圓如梧桐子大生薑湯下貳拾圓食後服

控涎丹 凡人忽患胸背手足頸項腰胯隱痛不可忍連筋骨牽引釣痛坐卧不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走疰便用風藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰涎伏在心膈上下變為此疾或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流睡涎手腳重腿冷痺氣脉不通誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但以此藥不過數服其疾如失

[illegible]

甘遂去心　大戟去皮　真白芥子各等分

右為細末糊圓如梧桐子大臨卧淡薑湯吞下伍柒圓如痰猛加至拾圓

白芥子散 治臂痛外連肌肉牽引背胛時發時止此由營衛之氣循行失度留滯經絡與正氣相搏其痛發則有似癱瘓

真白芥子　木鼈子各壹兩麩炒　沒藥別研

桂心　木香各半兩

右為細末入研藥令停每服壹錢溫酒調下

流氣飲子

紫蘇葉　青皮　桔梗　大黄炮

當歸　芍藥　烏藥　茯苓
川芎　黄耆　枳殼麩炒　防風各半兩
甘草　橘皮各壹兩　木香　連皮大腹
右㕮咀每服伍錢水貳盞薑叁片棗壹枚煎壹盞去滓

婦人賊風偏枯方論第八

論曰賊風偏枯者是體偏虛受風風客於半身也人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半體名爲偏風也其風邪入深真氣去邪氣留發爲偏枯此由血氣衰損爲風所客令血氣不相周榮於肌故令偏枯也

論曰夫偏枯者其狀半身不隨肌肉枯瘦骨間疼痛神智如常名曰偏枯推原疾之由皆由陰陽偏虧臟腑怯弱經絡空虛血氣不足當風衝坐風邪乘虛而入疾從斯作

經云汗出偏沮使人偏枯詳其義理如樹木或有一邊津液不蔭注而先枯槁然後被風所害人之身或有一邊血氣不能榮養而先枯槁然後被風所苦其理顯然古人有云舟行於水人處於風水能泛舟而亦能覆舟風能養體而亦能害體[illegible]漏水入體漏風傷古人有云醫風先醫血血行風自滅是也治之先宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風湯續斷湯

大八風湯　治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

當歸　杏仁去皮尖麩炒　甘草　桂心
乾薑炮　五味子　升麻各　川烏炮去皮尖
黄芩　芍藥　獨活　防風
川芎　麻黄去節　秦艽　石斛酒浸

人參　茯神　石膏　黄耆
紫菀各壹兩　大豆叁兩炒去皮
右爲粗末每服伍錢水貳盞酒壹合煎至壹盞去滓溫服恍惚者不用酒煎

獨活寄生湯　治半身不隨肌肉乾燥漸漸細瘦或時痠痛病名偏枯

茵芋葉　川烏炮去皮尖　石楠葉　防風
川椒去目閉口者炒出汗　女萎　附子炮　北細辛
獨活　卷柏　肉桂　天雄炮去皮
秦艽　防己各壹兩　躑躅花炒　當歸
生乾地黄各貳兩　芍藥壹兩
右㕮咀酒貳斗漬之冬七日夏三日春秋各五日初服一合漸增之以知爲度令酒氣相續

當歸湯　治偏枯少血

當歸　陳皮　芍藥　北細辛各壹兩
生乾地黄貳兩
右爲粗末每服伍錢水貳盞煎至八分去滓溫服藥寒多利者入熟附子壹兩和煎藥

偏風口喎方論第九　凡五方

論曰偏風口喎者是體虛受風風入於夾口之筋也足陽明之筋上夾於口其筋偏虛風因虛而乘之使其筋偏急不調故令口喎僻也

防風湯　治卒然口喎斜言語牽急四肢如故別無所苦

防風壹兩　羌活半兩　甘草壹分

右為粗末每服伍錢水貳錢煎至壹錢去滓入麝香研壹字溫服

治口眼喎斜

用草麻子七粒去皮殼細研作餅安在手心 右喎安左手心左喎安右手心 却用銅盂盛熱湯坐於藥上纔正即洗去不用

廣濟療風著口面喎斜語聲不轉方

生地黃汁 壹升 竹瀝 壹升 獨活 切叁兩

右相和煎取壹升頓服未正更進一劑

【續命湯】療中風口噤喉痹諸疾卒死不知人補虛起死神方

人參　防已　麻黃 去根節　芍藥

川芎　甘草　黃芩　白朮 各半兩

桂心　附子 炮　防風 各壹兩　生薑 五兩

右切以水壹斗貳升煮取叁升分為叁服不差復作忌海藻菘菜桃李生菜葱雀肉猪肉

又千金方

炒大豆叁升令焦以酒叁升淋取汁頓服　又方用大皂莢伍兩去皮子為末以三年大醋調如左喎塗右右喎塗左乾更塗

婦人血風心神驚悸方論第十

夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為諸藏之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛干之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變恍惚而憂懼也

【茯神散】治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神 去木　人參　龍齒 別研　獨活

酸棗仁 炒　防風　遠志 去心　桂心

細辛　白朮 各叁分　甘草　乾薑 各半兩 炮

右為粗末每服肆錢水壹盞半煎至捌分去滓溫服

【龍齒圓】治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠臥不安

龍齒 別研　茯神 各壹兩　朱砂 研　人參

當歸　天麻 各叁分　犀角屑　檳榔

防風　生乾地黃 各半兩　遠志 去心

赤箭 各叁分　麝香 壹錢 研

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服貳拾圓煎棗湯溫下

【琥珀散】治婦人血風

琥珀 研　沒藥 研　木香　當歸

芍藥　白芷　羌活　乾地黃

延胡索　川芎 各半兩　土瓜根　牡丹皮 去心

白朮　桂心 各壹兩

右為末每服壹錢水壹盞煎至柒分入酒叁分再煎少時熱服重者數服効

失血過多心神不安方第十一

【寧志膏】治婦人因失血過多心神不安言語失常不得睡

辰砂 研　酸棗仁 炒　人參　白茯神 去木

琥珀 各壹分 研　乳香 壹錢 研

右為末和勻每服壹錢濃煎燈心棗湯空心調下

婦人風邪顛狂方論第十二

夫婦人顛狂病者，由血氣虛，受風邪所為也。人禀陰陽之氣而生，而風邪入并於陰則為顛，入并於陽則為狂。陰之與陽，有虛有實，隨其虛時，為邪所并則發也。顛者卒發，意不樂，直視仆地，吐涎沫，口喎目急，手足撩戾，無所覺知，良久乃蘇。狂者少臥不飢，自高賢也，自辨智也，自貴倨也，妄笑好歌樂，妄行不休，故曰顛狂也。

[illegible] 治婦人風邪顛狂，或啼泣不止，或歌笑無度，或心神恐懼，或言語失常。

防風　茯神　獨活　人參　遠志（去心）　龍齒　菖蒲　石膏　牡蠣（各一兩，燒）　秦艽（[illegible]）　禹餘糧　桂心（各半兩）　甘草　蛇蛻（一尺，炙）

右為粗末，每服三錢，水一盞半，煎至七分，去滓溫服。

又方

羚羊角屑　獨活　遠志（去心）　菖蒲　防風　茯神　石膏　麥門冬（去心）　龍齒（別研）　白鮮皮　人參　生乾地黃

右為粗末，每服三錢，水一盞半，煎至七分，溫服，無時。

素問云：陽厥狂怒，飲以鐵落。[illegible]

婦人飛尸血厥方論第十三

夫飛尸者，遊走皮膚，穿藏府，每發刺痛，變作無常也。遁尸者，附骨入肉，攻鑿血脈，每發不可得近，見尸喪，聞哀哭便發。風尸者，淫濯四肢，不知痛之所在，每發昏沉，得風雪便作。沉尸者，纏骨結藏，衝心脅，每發絞切，遇寒冷便發。注尸者，舉身沉重，精神錯雜，常覺昏廢，每節氣改變，輒成大惡，皆宜用此方。

[illegible] 服如雞子大，日三服。

[illegible] 治中風之要藥，[illegible] 尸疰風顛狂，[illegible] 不若但是一切惡毒無所不治，但近世少得曾青磁石為難合，是闕故不錄。

蘇合香丸 亦治此疾，方見和劑，更不贅錄。

雄朱散 治因喪驚憂悲哀，感尸氣而成，變動不已，似冷似熱，風氣觸則發。

雄黃（研）　朱砂（研）　桔梗　羌活　當歸　升麻　川烏（炮）　龍齒（別研）　犀角屑　白朮　芍藥　鬼箭羽　白殭蠶（炒）　木香　虎頭骨（醋炙）　紫蘇子（炒）　川芎　南星（炮）　山梔子　陳皮　莽草　枳殼（去穰，麩炒）　黃芩　麻黃（去節）　蜈蚣（[illegible]）　全蝎

右為細末，每服二錢，溫酒調下，一日三服。

人平居無疾苦，忽如死人，身不動搖，默默不知人，目閉不

能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移時方寤此由汗過多血少氣并於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜服白薇湯倉公散

白薇湯方

白薇　當歸各壹兩　人參半兩　甘草壹分

右㕮咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞温服

倉公散 治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血便死不知人及卧魘齧脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂末　藜蘆末　雄黃研　礬石煆各等分

右為末研停用少許吹入鼻中得嚏氣通便活未嚏再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂莢者為正

白朮散 治中風身體強痺不仁

白朮炒　芍藥　萆薢

當歸各壹兩　虎骨酥炙　烏蛇肉各半兩

右為細末每服貳錢匕温酒調下瘧實多利者加附子半兩骨中煩熱者加生地黃壹兩

新編婦人大全良方卷之三

新編婦人大全良方卷之四

婦人血風身體骨節疼痛方論第一　九五方

夫婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風冷所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛也

芎藭散 治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎壹兩　赤茯苓　赤芍藥　酸棗仁炒

桂心　當歸　木香　川牛膝各叁分

羌活　枳殼麩炒　甘草各半兩

右為麁末每服叁錢水壹大盞薑叁片煎至柒分去滓熱服無時候

羚羊角散 治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑　酸棗仁炒　生乾地黃　檳榔各壹兩

五加皮　防風　赤芍藥　當歸

骨碎補炒　海桐皮　川芎各叁分　甘草半兩

右為末每服貳錢温酒調下

趁痛元 治男子婦人手足痛風不可忍者

白附子　白僵蠶炒　全蝎炒　麝香壹字

右為末煉蜜元如梧子大每服十元温酒下一日三服

當歸沒藥元 治婦人血風血氣腹脇刺痛筋攣骨痺手足麻木皮膚瘙痒

當歸　五靈脂各壹兩　沒藥半兩

右為末醋糊元如梧桐子大每服叁拾元生薑湯空心下

大效虎骨散 治血風走注疼痛丈夫筋骨疼痛及打撲傷損

疼痛甚者

虎骨（酥炙）　敗龜（酥炙）　當歸　桂心
地龍（去土）　牛膝　漏蘆　威靈仙
玄胡索　自然銅（醋淬）

右各等分為末，每服貳錢，熱酒調下，每日一服。

婦人血風白虎歷節走疰方論第二　凡七方

夫婦人體虛受風邪之氣，隨血而行，或淫易皮膚，去來擊痛，遊走無有常處，故名為走疰也。加減小續命湯主之。

趂痛散 治婦人血風走疰，疼痛無有常處。

漏蘆　當歸　牛膝（各等分）　桂心
地龍（去土）　防風　羌活　白芷
沒藥（研）　甜瓜子（兩）　虎脛骨（酥炙）　敗龜（酥炙各半兩）

右為細末，每服弍錢，熱酒調下，無時候。

四生元 治血風骨節疼痛，擡舉臂不起，行履不得，及渾身麻痺。

白殭蠶（炒去絲）　地龍（去土）　白附子（生）　五靈脂
草烏（去皮尖）（各等分）

右為末，以米糊元如梧桐子大，每服弍拾元，茶酒任下。或作末，酒調半錢亦可。

麝香元 治白虎歷節，諸風疼痛，遊走不定，狀如蟲嚙，晝靜夜劇，及一切手足不測疼痛。

大八角川烏頭（炮去皮尖）　生全蝎（拾壹箇）　生黑豆（拾壹粒）
生地龍（半兩）

右為細末，入麝香壹字，同研停，糯米糊為元，如綠豆大。每服柒元，甚者拾元，夜臥令膈空，溫酒吞下，微出冷汗，一身便瘥。[illegible]

附子八物湯 治歷節疼痛，身體羸瘦，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐。

桂心　知母　防風（各肆兩）　芍藥
甘草　麻黃（[illegible]）　附子（[illegible]）

右㕮咀，每服肆錢，水壹盞半，生薑伍片，煎柒分，去滓，空心服。一法有白朮、川芎、杏仁、半夏。

附子八物湯 治風歷節，四肢疼痛如鎚鍛，不可忍。

附子　乾薑　芍藥　茯苓
人參　甘草　桂心（各參兩）　白朮（肆兩）

右㕮咀，每服肆大錢，水弍盞，煎柒分，去滓，食前服。一方去桂，用乾地黃（弍兩）。

獨活寄生湯 最治歷節風，道人用之甚效。[illegible]

小烏犀元 治白虎歷節痛不可忍。[illegible]

[illegible]

婦人血風癮瘮瘙痒方論第三　凡八方

局方治婦人時發遍身瘙痒，或赤腫癮瘮，五心煩熱，血風攻疰，與人參荊芥散、消風散、四物湯加荊芥煎，或人參當歸散、或逍遙散、簡服，沒藥元。如不通者，食後服皂角元[illegible]

……服如服皂角圓不退者此疑滯積（……）先服青木香圓三兩服以開氣道却服前藥即效

夫婦人體虛為風邪氣客於皮膚復遇風寒相折則起風瘙瘾疹若赤疹者由涼濕折於肌肉之熱熱結成赤疹也得天熱則劇取冷則差白疹者由風氣折於肌中肌中熱熱與風相搏所以為白疹也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則滅著衣暖亦差也脉當浮而洪浮即為風洪即為氣風氣相搏則為瘾疹身體為癢凡人汗出不可露卧及浴素問云汗出見濕乃生痤痱使人身振寒熱生風疹也雷公炮炙序云遍體疹風冷調生側

何首烏散 治婦人血風皮膚瘙癢心神煩悶及血風遊走不定並宜服之

何首烏　防風　白蒺藜　枳殼　天麻　殭蠶　胡麻　茺蔚子　蔓荊子（各等分）

右為細末每服貳錢煎茵陳湯調下無時候

附子酒 治痛風婦人血風身上瘙癢（出聖惠方）

生附子（[illegible]）　皂角刺（[illegible]）　黑豆（[illegible]）

右叁味細剉分為二處用好酒貳瓶入上件藥慢火煨候乾至半瓶却合作一處密縛泥頭經貳宿每服宜温服無時候未效再服

治婦人風瘙瘾疹不止（聖惠方）

蒼耳花葉子（各等分）

右為細末用豆淋酒調下貳錢

治瘾疹

白蜜不以多少好酒調下已試有效

治皮膚有風熱遍身生瘾疹方（初虞世）

牛蒡子（[illegible]）　浮萍（[illegible]）

右為細末每服貳錢薄荷湯調下日貳服

又治風氣客於皮膚搔之不已方

蟬蛻（洗）　大葉薄荷（等分）

右等分為細末每服温酒調下方寸匕（[illegible]）

又方

露蜂房（[illegible]）　蛇蛻（[illegible]各等分）

右為細末温酒調下壹錢日二三服

婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四（凡七方）

夫婦人風眩是體虛受風風入於腦也諸臟腑之精皆上注於目其血氣與脉并上屬於腦循脉引於目系目系急故令眩也其眩不止風邪甚者變成癲疾也

養正丹 治虛風頭旋吐涎不已昔此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已

黑鉛　水銀　硫黄（研）　朱砂（各壹兩研）

右用建盞壹隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳枝子打停取下歇少時入貳味打停候冷取下研為粉以糯米軟飯元如綠豆大每服叁拾圓棗湯吞下空心食前日貳服

鉤藤散 治肝厥頭暈清頭目（出[illegible]方）

鉤藤　陳皮　半夏　麥門冬（去心）

茯苓　茯神　人參去蘆　甘菊花
防風各半兩　甘草貳分　石膏壹兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑三片煎至捌分去滓
熱服 [illegible]
斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事
喝起草取其嫩心不以多少陰乾爲末以常酒服
一大錢匕無時候其功大効服之多連腦子覺通頂
門

荊芥散治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語蹇澁痰逆不
下飲食
蔓荊子　防風　羌活　川芎
羚羊角屑　枳殼　前胡　石膏
赤茯苓　麻黃去根節　荊芥穗各半兩　北細辛
甘菊花　白芷　藁本　旋覆花
甘草各半兩
右爲粗末每服肆錢薑三片水壹盞煎柒分去滓溫服
無時候

四神散治婦人血風眩暈頭痛　九籥衛生方
菊花　當歸　旋覆花　荊芥穗各等分
右爲細末每服壹錢水壹盞葱白三寸茶末壹錢煎至
柒分通口服良久去枕仰卧少時

治風眩頭暈川芎散　靈苑方
小川芎　白茯神　甘菊花
人參各半兩　[illegible]
右爲細末無時候溫酒調貳錢日三服
治女人頭旋即大動如轉[illegible]心眩非血風也 [illegible]方
膽子礬 [illegible] 細研用胡餅劑子壹箇拌得成餅子上安
平一指厚以箸子劄成如骰子大塊不須界斷於瓦上
焙乾每服一骰子大爲末煎熟薄荷湯調下

婦人血風頭痛方論第五 [illegible] 附　九九方
許叔微云婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車
船上蓋因血虛肝有風邪襲之爾予嘗處此方以授人比
他藥效而速
川芎壹兩　當歸叁分　羌活　旋覆花
華陰細辛　蔓荊子　防風　石膏
藁本　荊芥穗　半夏麴　乾地黃
甘草各半兩
右㕮咀每服三錢水壹盞半薑五片煎至柒分去滓溫服

七生元治男子婦人八般頭風及一切頭痛發歇不定
攻傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治療 [illegible]
川烏　草烏　南星 [illegible]　半夏 [illegible]
川芎　石膏　白芷 [illegible]
右爲細末研韭菜自然汁圓如梧子大每服柒圓加至
拾圓嚼生葱茶送下 [illegible]
[illegible]

芎辛湯治狀如前但發熱者不可服

生附子 去皮 生烏頭 去皮尖 南星 乾薑 炮
北細辛 川芎 各壹兩 甘草 叁分
右㕮咀每服肆錢水貳錢盞薑柒片茶芽少許煎至陸分
去滓食前温服中脘素有寒者不用茶芽
芎辛導痰湯 川芎細辛如半夏數白合服之見効甚速
若頭痛筋攣骨重少氣噫噦腹滿時驚不嗜臥咳嗽煩冤
其脉舉之則弦按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆而
上行謂之腎厥頭痛宜玉真圓與硫黃圓
玉真圓方
石膏 煅研 半夏 湯洗 硫黃 貳兩 硝石 壹分研
右研令停生薑自然汁打糊圓如梧桐子大生薑湯下
叁拾圓
硫黃圓 治氣攻頭痛不可忍或頭風年深久患無所不治服此
除根
硝石 壹兩 硫黃 貳兩
右研令極細滴水圓如指頭大空心蠟茶清嚼下
方云中暑者以水水服之下咽即洒然治傷冷以艾湯
若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留於骨髓
而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜白附
子散灸曲鬢穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯
左痛灸左右痛灸右
白附子散方
麻黃 不去節 烏頭 炮去皮 南星 各半兩 白附子 炮壹兩
全蠍 伍枚 辰砂 研 麝香 研壹錢 白薑 炮壹分

右為細末酒調壹字服訖去枕臥少時
裕陵傳王荊公偏頭疼方云是禁中秘方用生蘿蔔汁
一蜆殼仰臥注鼻中左痛注左右痛注右或兩鼻皆注
亦可數十年患皆一注而愈東坡云荊公與僕言已愈數
人
治頭風痛不可忍者
硝石 人中白 腦子 等分
右研令極細用竹管吹入鼻中
項頸強痛 凡論壹首 凡五方
此一卷論頸項強痛為得斯疾者之以易而實難然
方冊中所載亦少纔有一二之議論亦略以僕多之然許有
近代必有是方何古今此疾治略又無的然之論
詳之必是諸疾所以紹興所日
方以備
遺訣能而宗之不亦宜乎成淳元年上元日
人有心堂
夫頸項之脈乃足太陽膀胱之經又并入督一名是足少
陰腎之經
太陽經
捆以頸項強
凡古人以
中風亦有
後贊錄 又有
散仍與

腦俱痛項背筋脉拘急可與蝎附散…許太學治
項筋強痛不可轉側者以木瓜煎

追風散 治年深日近偏正頭痛又治肝藏久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱百節痠疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼治婦人血風攻注頭目昏痛皆治之

川烏（炮去皮） 防風（去蘆） 石膏（煆） 川芎
甘草（炙） 荊芥（穗） 白殭蚕（炒去絲嘴） 地龍（去土）
天南星（炮） 羌活 天麻 草烏頭（炮去皮）
白附子（炮） 全蝎（去尾針） 白芷
没藥（研） 乳香（研） 雄黃（各研）

右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨臥服常服清頭目利咽膈治風化痰

透頂散 方

草烏頭 [illegible]
丹砂 [illegible] 麝香 [illegible]

右為細末研令停滴調塗痛處

烏附散 治一切風邪頭痛夾腦風及[illegible]口吐清水暗風旋暈眼見黑花[illegible]瞤動頭項拘急[illegible]太陽[illegible]出暴感風邪[illegible]作差作發服藥無效者並皆治之

附子（炮去皮臍） 川烏 麻黃（去節） 殭蚕（炒）
南星 防風 雄黃 朱砂

全蝎 白芷 [illegible]

右為細末每服半錢熱茶調下食後服孕婦不可服京城之[illegible]用此[illegible]治眼目[illegible]不明者以多淚其物不明有效

香白芷丸 方

香白芷 [illegible]

彈子大每服一丸多用荊芥點臘茶細嚼下食後常服只乾嚼下亦可都無所忌此藥大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血風頭痛服之令人目明凡沐浴後服一二粒尤佳甚暖下暖神思不清傷寒頭目昏暈並宜服之

[illegible] 方

宣木瓜 没藥 乳香

右[illegible]味內木瓜中用[illegible]合了[illegible]飯上蒸三四次爛研成膏子每服一匙生地黃汁半盞無灰酒二盞和之用八分盞熱暖化膏子服

[illegible]

婦人腰痛方論第七 二方

夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若[illegible]外感六淫內傷七情皆致腰痛[illegible]亦有五種之說[illegible]續命湯加桃仁杜仲煎服[illegible]散加桃仁如虛損及五種腰痛者青蛾元神應元[illegible]

皆可用也。如氣滯腰痛，宜以神保元；[illegible]後必奇功也。

如神湯 治男子婦人腰痛。陳總領方

延胡索 當歸 桂心各等分[illegible]

右為末，溫酒調下二錢，甚者不過數服。[illegible]

獨活寄生湯 夫腰痛者，皆由腎氣虛弱，臥冷濕地，當風所得，不時速治，喜流入腳膝，為偏枯冷痹，緩弱疼重，或腰痛攣腳重痹，宜急服之。

獨活三兩 桑寄生 續斷 杜仲

北細辛 川牛膝 秦艽 茯苓

白芍藥 桂心 川芎 防風

人參 熟地黃 當歸各二兩

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，煎至七分，去滓，溫服，空心。氣虛下利，除地黃。并治新產腹痛不得轉動，及腰腳攣痛，痹弱不得屈伸。此湯最能除風消血。肘後有附子一枚，無寄生、人參、當歸。近人將治歷節風、腳氣流注，甚效。

婦人腰腳疼痛方論第八 凡一方

夫腎主於腰腳，女人腎臟繫於胞絡。若勞傷腎氣，虛弱而風冷客於胞絡，邪氣與真氣交爭，故令腰腳疼痛也。

酸棗仁散 治婦人血氣風虛，腰腳疼痛，頭目昏悶，飲食少。

酸棗仁炒 川牛膝 當歸各三分 羌活

川芎 桂心 防風 木香

海桐皮 杜仲 附子炮 萆薢

川續斷 粉草各半兩

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，薑五片，煎至七分，去滓，溫服。

[illegible]散 治婦人血風氣攻腰腳疼痛，腹脇拘急，肢節不利。

骨碎補 萆薢 川牛膝 桃仁

海桐皮 當歸 桂心 檳榔各一兩

赤芍藥 附子 川芎各三分 枳殼半兩

右為粗末，每服三錢，水一盞，薑三片，棗一個，煎至七分，去滓，食前熱服。

婦人腳氣方論第九 凡十一方

凡頭痛身熱，肢節痛，大便秘，或嘔逆，而腳屈弱者，腳氣也。輕者可與香蘇散加木瓜、檳榔、生薑煎服，然後隨證治之。要知有腳氣之人，先從腳起，或先緩弱疼痹，或行起忽倒，或兩脛腫滿，或腳膝枯細，或心中忪悸，或小腹不仁，或舉體轉筋，或見食嘔逆，惡聞食氣，或胸滿氣急，或遍體酸疼，皆腳氣候也。黃帝所謂緩風濕痹是也。[illegible]千金[illegible]中三陽所患[illegible]命湯[illegible]附子[illegible]之大[illegible]

聖惠方婦人腳氣論

夫婦人腳氣與丈夫不同者，以丈夫則腎臟虛損，風濕所乘；女子以胞絡氣虛，為風毒所搏。是以胞絡屬於腎，腎主於腰腳，又肝腎二臟經絡[illegible]

風邪先客於脚，從下而上，動於氣，故名脚氣也。凡此皆由體
虛，或當風取涼，或久坐卑濕，或産後勞損，或喜怒傷肝，以心
氣滯致令月候不通，因其虛傷風毒，搏於肌骨，則令人皮膚
不仁，筋骨抽痛，五緩不遂，六急拘攣，或即冷疼，或即腫滿，
或兩脚痺弱，或舉體轉筋，目眩心煩，見食即嘔，精神昏憒，
肢節煩疼，小便赤黃，大便秘澀，此皆其證也。其婦人脚氣
治之與丈夫不同者，以其氣血不調，懷胎難產，崩傷之異，
是以損瀉各殊，婦師尼與妻妾殊別，因其義也。

【[illegible]散】治脚氣浮腫，心神煩悶，小便不通

川牛膝　羚羊角　檳榔　大黃炒
芒硝各壹兩　防己　桂心　牡丹皮
赤芍藥　甘草各柒錢半分　桃仁[illegible]

右爲粗末，每服三大錢，水壹盞，煎至七分，去滓，温服，利
下惡物爲度，亦要斟酌其強弱用之

【大腹皮散】治婦人風毒脚氣，肢節煩疼，心神壅悶

大腹皮　紫蘇　木通　桑白皮
羌活　荊芥　赤芍藥　青皮
木瓜　獨活各壹兩　枳殼二兩

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，薑五片，葱白七寸，煎至七分，
去滓，空心温服

【[illegible]散】治婦人脚氣發動，心腹脹滿，飲食不下，嘔逆不止

半夏　陳皮　人參
大腹皮　桂心各三分　檳榔壹兩　赤茯苓
紫蘇各兩半

右㕮咀，每服肆錢，水壹盞半，薑參片，煎柒分，去滓温服

【[illegible]散】治婦人脚氣衝心，悶亂，四肢煩疼，有熱者

羚羊角　木香各半兩　紫蘇　赤茯苓
檳榔各壹兩　赤芍藥　紅花各貳分　紅雪壹兩半

右㕮咀，每服肆錢，水壹盞，煎至柒分，去滓温服

【木香散】治婦人脚氣發衝心悶亂

木香半兩　郁李仁　赤芍藥　大腹皮
紫雪壹兩半　桑白皮　桂心　檳榔
茯苓各叁分

右㕮咀，每服叁錢，水壹盞，薑叁片，煎至柒分，去滓温服

治婦人脚氣衝心，悶亂不識人，宜服此藥

紫蘇　松節各壹兩　吴茱萸半兩　檳榔
乾木瓜[illegible]　陳皮叁分

右㕮咀，每服肆錢，水壹盞，煎至壹盞半，入童子小便貳合，
再煎叁沸温服

【[illegible]散】治婦人風毒脚氣，腹内壅塞，痰思不思飲食，脚重
虛腫

紫蘇莖葉　木通　桑白皮　茴香根[illegible]
枳殼各壹兩　羌活　獨活　荊芥穗
木瓜　青皮　甘草各半兩　大腹子[illegible]

右㕮咀，每服叁錢，水壹盞，薑叁片，葱白壹莖，煎至柒分，
去滓温服

【[illegible]散】治婦人脚氣盛發，兩脚浮腫，小便赤澀，腹脇脹
滿，氣急，坐卧不得

桑白皮　郁李仁（各壹兩）　赤茯苓（貳兩）　木香
防己　大腹皮（各[illegible]）　紫蘇子　木通
檳榔　青皮（各叁分）
右㕮咀，每服叁錢，水壹盞，生姜叁片，煎至柒分，去滓溫服

薏苡仁散 治婦人脚氣緩弱，及頭面腫滿，心下急，大便澀
薏苡仁　防風　豬苓　川芎
防己　檳榔　郁李仁　大麻仁（[illegible]）
桑白皮（[illegible]）　枳殼（各叁分）　甘草（[illegible]）　羚羊角屑（[illegible]）
右為粗末，每服叁錢，水壹盞，煎至柒分，去滓，投溫服

酒白散 治男子婦人血虛發熱，夜多盜汗，不進飲食，四肢疼痛，骨立，拘攣，脚痛不能行
黃耆　厚朴　益智仁　藿香
白朮　白扁豆　陳皮　半夏
白茯苓　人參　白豆蔻仁　天台烏藥
甘草（各半兩）　京南芍藥　丁香　沉香
右為細末，每服叁錢，水壹盞，生姜叁片，棗一枚，煎至柒分溫服
自後消息，退只有脚攣痛不能行，以苓朮元，但之，效此藥大治乾濕脚氣，筋脉拘攣，疼痛不能行，及兼補下部

苓朮元方
乳香　沒藥（[illegible]）　川牛膝　青[illegible]
艾葉（[illegible]）　川烏（[illegible]）　全蝎（[illegible]）
右除研藥為細末，入研藥令停，以木瓜壹個，大者，切蓋頭，留作盞子樣，入上件藥於木瓜內，將蓋簽定，安木瓜於黑豆中，水煮令爛，取出去皮，連藥研成膏，却入生蒼朮末拌令得所，圓如梧桐子大，每服伍拾圓，空心用木瓜湯下，或溫鹽酒亦得，一日二服，忌血物[illegible]
[illegible]
大便秘者可與七宣圓[illegible]七聖[illegible]二和散[illegible]

新編婦人大全良方卷之四

勞瘵敘論第一　凡二十一方

夫骨蒸殗殜復連尸疰勞疰蟲疰毒疰熱疰冷疰食疰鬼疰等皆曰傳尸以疰者注也病自上注下與前人相似故曰疰其變有二十二種或三十六種或九十九種大略令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聳或腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或散沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復下利羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死死後乃疰易傍人乃至滅門者是也更有蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注等謂之五尸及大小附着等證不的知其所苦無處不惡乃挾諸鬼邪而害人以三因攷之內非七情所傷外非四氣所襲雖若麗乎不內外因然其證多端傳變遷移難以推測故自古及今愈此病者十不得一所謂狸骨獺肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗見效唯膏肓俞崔氏穴名四花若闕早灸之可幾乎晚亦不濟也　病者憎寒發熱自汗面白目乾口苦精神不守恐畏不能獨臥其傳在肝　病者憎寒發熱面黑鼻燥忽忽喜忘大便苦難或復泄瀉口瘡其傳在心　病者憎寒發熱而青唇黃舌本強不能言飲食無味四肢羸瘦吐涎沫其傳在脾　病者憎寒發熱面赤鼻白乾燥毛折咯涎喘急時吐白涎或有血線其傳在肺　病者憎寒發熱面黃耳輪焦枯脛骨痠疼小便白濁遺瀝膈痛其傳在腎

二十四種蒸病論

所謂勞蒸者二十四種隨證皆可名之毛折髮焦肌膚甲錯其蒸在皮　外人覺熱自反惡寒身振瞤肉其蒸在內　髮焦鼻衄或復尿血其蒸在血　身熱煩躁痛如針刺其蒸在脈　爪甲焦枯眼昏兩脇急痛其蒸在筋　板齒黑燥大腸疼其蒸在骨　背膂疼痛胻骨痠痛其蒸在髓　頭眩熱悶口燥白濁眼多眵淚其蒸在腦　男子失精女子白淫其蒸在玉房　乍寒乍熱中脘與膻中煩悶其蒸在三焦　小便赤黃凝濁如膏其蒸在膀胱　傳道不均或秘或泄腹中雷鳴其蒸在小腸　大腹隱痛右鼻乾疼其蒸在大腸　口鼻乾燥腹脹睡臥不安白汗出其蒸在胃　口苦耳聾脇下痛其蒸在膽　裏急後重肛門澀秘其蒸在回腸　小腹疞痛筋脈縱緩陰器自強其蒸在宗筋　眼昏淚下時復眼暈躁怒不常其蒸在肝　舌焦黑氣短煩悶洒洒淅淅其蒸在心　唇乾口瘡胸腹脹悶畏寒不食其蒸在脾　咳嗽喘滿咯痰吐血聲嘶音遠其蒸在肺　耳輪焦枯腳氣酸疼起居不得其蒸在腎　情想不寧無故泄精白物綿綿而下其蒸在右腎　心主包絡心膈噎塞攻擊疼痛俛仰煩冤其蒸在膏肓　諸證雖曰不同其根多有蟲嚙其心肺治之不可不絕其根也

取蟲法　取傳尸勞蟲服此藥須先擇良日焚香禱祝令病人設揖面向福德方服即有神効不可使病人知其藥味及子細

青桑皮　楊柳枝　梅枝　桃枝東引

石榴皮各　葱白七莖　青蒿一握以童子小便

真安息香去石壹分研　阿魏壹分
右捌味除阿魏外用童子小便壹升半煎取藥耗及一
半去滓將藥汁化阿魏再煎十數沸去滓候溫作貳次
調下件藥末
朱砂半錢　小檳榔半兩　麝香半分
右叁味研令極細分為貳服用前湯使調下五更初壹
服三點再壹服依時間取下蟲遂絕根本若見蟲色白
者此病必差若黑色則已傳入腎經不可救也服藥後
以淡粥補之並不動元氣効驗無比切須祕之此傳
勞蟲有壹輕易傳之則傷醫者此說殆醫者從借其方
不可以授人耳要須珍重之則無淺從天機乃起死還
生功同造化鬼神護助自有殊効大凡傳尸勞者必須
先服此一藥後拾伍方隨證治不可以槩用藥調治三
五箇月再服此取蟲藥則求除根本如取下蟲色已黑
經服後藥亦無補也然則能使不傳它人
治心虛勞積氣作聲牽引兩脇痛心悶不收音聲不清虛熱
上壅作衂鼻衂方
桑白皮叁分　枳殼　木通　子芩
生乾地黃　白芍藥　甘草各半兩
右為粗末每服叁文重水戔半煎至柒分去滓溫服食後
治伏痰血在心肺時作衂心背微悶痛方
白芍藥　牡丹皮各壹兩　生犀角半兩　生地黃叁分
右㕮咀每服半兩水壹大戔煎至七分去滓溫服
調榮衛消痰血　益肺止咳嗽消痰血方
川當歸　牡丹皮　白芍藥　子芩
木通　麥門冬　甘草　華陰細辛各半兩
生乾地黃壹兩
右㕮咀每服叁錢水壹戔薑叁片煎至七分去滓溫服
治虛熱昏冒倦怠下虛上壅咳嗽血衂方
雞蘇葉半兩　黃耆半兩　甘草　川芎各壹分
防風壹兩　苦梗半兩　荊芥穗壹兩　甘菊花壹分
真腦子半錢　生乾地黃半兩
右為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓用麥門冬去心
煎湯嚼下又治肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不得喘
嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澁加車前子壹分
每服壹圓煎桑枝湯嚼下日可六七服桑枝剉炒香每
用水三戔煎至壹戔去滓下藥
治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此病因失血榮衛損也宜
防風湯方
黃耆壹兩　白芍藥　防風各叁分　甘草半兩
當歸　生乾地黃各叁分
右㕮咀每服叁錢水壹戔薑叁片棗壹箇煎至七分去
滓溫服食前服
治勞嗽滋全散
甘草　黃芩　桑白皮　防風各壹兩
杏仁貳兩湯浸去皮尖麩炒　人參去蘆　茯神各半兩　麥門冬去心壹兩
以前五味用米泔浸壹宿曬乾次入人參茯神麥門冬
叁味同為細末每服貳錢水壹戔蠟壹豆大煎至捌分

食後温服

治勞嗽有四滿湯極妙方見[illegible]

治心氣不足解勞倦益血枸杞飲子

苦梗　甘草　黄耆　人參[illegible]

麥門冬[illegible]　青皮[illegible]

右為末每服弐錢水壹盞煎至七分温服

治胸痺[illegible]枳殼[illegible]　厚朴　薤白[illegible]　瓜樓[illegible]

桂枝[illegible]

右㕮咀水七升煎取四升去滓温服

涼心肺解勞除熱使榮衛順血不絕子芩散

黄耆[illegible]　白芍藥　子芩　人參

[illegible]

白茯苓　麥門冬　苦梗　生乾地黄[illegible]

右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三盞生薑三片

煎至水一盞半入藥末三錢重煎至七分去滓温服

治積氣堅硬作氣噎胸背引背痛方

白芍藥[illegible]　鱉甲[illegible]　枳殼[illegible]　北柴胡[illegible]

甘草　赤茯苓[illegible]

右㕮咀每服三錢水壹大盞薑三片棗壹箇煎至七分

去滓温服

治伏連傳注腹中有堅硬積氣攣心胸作狸痛引胸背痛

胸脇滿悶方

鬼臼　天門冬[illegible]　巴豆[illegible]　甘草

不蛀皂角[illegible]　桑子　雄黄[illegible]

右為細末煉蜜為圓如小豆大每服壹圓漸加至叁貳

圓空心湯水吞下臨卧壹服常宜斟酌勿令泄瀉忌鯉

魚山猪驢等

出聲音〃

訶子[illegible]　木通[illegible]　甘草[illegible]

右㕮咀用水叁升煎至升半入生地黄汁壹合再煎數

沸放温分六服食後日作半料

治咽喉瘡方

百藥煎[illegible]　鵬砂　甘草　生白礬[illegible]

右四味為細末每服一錢食後調細細呷嚥

治肺間邪氣胸中積血作痛失音含化圓方

蛤蚧[illegible]　訶子[illegible]　阿膠[illegible]　麥門冬[illegible]

[illegible]

北細辛　甘草　生乾地黄[illegible]

右為細末煉蜜為圓如雞頭子大食後含化壹圓

已上諸方[illegible]錄示云傳之於五羊大師方侍

郎[illegible]

治瘵疾得効方河車圓治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸等疾

河車壹枚[illegible]

[illegible]

白茯苓[illegible]　人參[illegible]　乾山藥[illegible]

右為細末麪糊為圓如梧桐子大以少許麝香末為衣每

服三五十圓米飲温酒鹽湯送下空心[illegible]五味

子湯下

又方治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧酥炙 知母 貝母去心

人參去芦 甘草 杏仁去皮尖 枇杷葉去毛

鹿角膠炒

右各壹兩依方事治淨秤爲末每服二錢水一盞入桑白皮煎至八分温服日三夜貳

治勞嗽補肺湯

桑白皮 熟地黃各貳兩 人參去芦 紫苑

黃耆 川五味子各壹兩

右爲細末每服貳錢水一盞煎至七分入蜜少許食後温服

又方蘇合香丸加秦艽煎服尤妙

[illegible]

治傳尸出汗取虫辟邪天靈蓋散

鼈甲醋炙 青蒿一握 淡豉三七粒 葱白兩莖

安息香 桃柳桑枝各七寸 桃仁 天靈蓋

右十味隔夜以水一升浸至五更煎至半升再以童便半升同煎取四合又用檳榔一箇爲末麝香一錢匕停所煎藥去滓調下至日高二丈時放温頓服以衣覆出汗審看十指汗出如細絲五色臭穢汗出後仍瀉下虫狀惡物盡其者旬日再服亦効

補肺丸 治骨蒸勞咳頰赤氣粗口乾渴引飲或多盜汗大腸滋秘小便赤黃飲食全少

青蒿 鼈甲醋炙 北柴胡 木香

生乾地黃各 青皮去白 宣黃連貳兩

右爲末以豬肚一箇洗淨入藥在內繫定蒸令極軟研如泥爲丸如綠豆大湯下拾伍丸空心日三服忌濕麪諸物

婦人骨蒸勞方論第二 九十五方

夫骨蒸勞者由熱毒氣附骨故謂之骨蒸也亦曰傳尸亦謂殗殜亦謂伏連亦名無辜丈夫以癖爲根女人以血氣爲本無問少長多染此病內既傷於臟腑外則損於肌膚日久不瘥遂致羸瘦內服冷藥過度則傷於脾脾氣既衰而傳五臟脾初受病或脹或妨遂加瀉痢肌肉瘦瘁痿黃四肢無力飲食少味脾既受已次傳於腎腎既受病時時盜汗腰膝冷疼夢鬼交侵小便赤黃腎既受已次傳於心心既受病往往忪悸或喜或嗔兩頰常赤唇色如朱乍熱乍寒神氣不守心既受已次傳於肺肺既受病胸滿短氣咳嗽多唾皮膚甲錯狀如麩片肺既受已次傳於肝肝既受病兩目昏暗脇下妨痛不欲見人常懷忿怒五臟既病漸漸羸瘦即難療也

天靈蓋散 治婦人骨蒸勞四肢無力每至晚間即熱兩頰紅色食飲不下心神煩躁

天靈蓋酥炙 安息香 地骨皮 當歸

山梔子仁 人參去芦 貝母去心 黃連

桃仁(去皮尖炒) 檳榔(各) 鱉甲(醋炙) 北柴胡
生乾地黃 赤茯苓 麥門冬(去心) 阿魏
右為粗末以童子小便一大盞桃柳枝各七寸[illegible]五片
葱白五寸同藥同煎至七分去滓溫服
[illegible]治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食
獺肝(一具) 鱉甲(醋炙) 北柴胡(各一兩) 朱砂
桃仁(去皮尖[illegible]) 川升麻 天靈蓋(酥炙) 犀角屑
梔子仁 地骨皮 知母(各一兩) 黃耆(三分)
甘草(半兩) 麝香(一分研)
右為細末煉蜜丸如梧桐子大溫水下三十丸無時候
[illegible]治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦疼痛口乾心躁不得
眠臥
黃耆 麥門冬(去心) 茯神 北柴胡
甘草 生乾地黃 酸棗仁
郁李仁 杏仁(去皮尖麩炒) 枸杞子
人參(去蘆) 黃芩 百合 枳殼(麩炒)
赤芍藥 知母(各半兩) 鱉甲(二兩醋炙)
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大青粥飲下三十丸無
時候
[illegible]治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連(已上出聖惠方)
麝香(三分) 犀角屑 木香 白朮(各一兩)
鬼箭羽 虎頭骨(酥炙) 天靈蓋(酥炙) 辰砂
桃仁(去皮尖麩炒) 雄黃(各半兩研)
右為細末煉蜜為丸如梧桐大溫水下二十丸[illegible]

辟瘟疫亦可帶之
[illegible]治勞(見曾治婦人方)
雄鼠糞 杏仁(去皮尖) 北柴胡 貝母
知母(各[illegible]兩)
右除[illegible]諸藥細剉以好酒[illegible]升入鍋內將活鱉在中
以藥和[illegible]固定上用板子[illegible]令鱉在藥內喫酒藥
候來日却以慢火煮候酒盡為度却取鱉令患人喫盡
次將鱉甲用醋炙黃入在前項諸藥內焙為細末用
酒煮麵糊丸如梧桐子大用米飲吞下三十丸無時候
日伍服
[illegible]治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心胸煩壅
赤茯苓 當歸 乾漆 鱉甲(醋炙)
川芎 大黃 北柴胡 白朮
生乾地黃 小麥
右為細末每服二錢水一盞小麥五十粒煎至六分食
後臨臥時溫服有虛汗加麻黃根一兩蘇東坡云此黃
州[illegible]判官方[illegible]骨[illegible]肌熱盜汗[illegible]散
甚多此方名[illegible]之如今世之珍其效可知
[illegible]治諸虛勞疾羸瘦乏力腰背引痛心煩喘嗽唾膿
[illegible]頭[illegible]眩[illegible]多汗[illegible]耳鳴
及寒骨熱一切五勞七傷骨蒸等疾能治[illegible]
地骨皮 甘草 北柴胡 前胡
烏梅 麻黃(不去節) 秦艽 青蒿
桔梗 知母 天仙藤 北人參(各[illegible]兩)

人參　生乾地黃　秦艽　鱉甲
黃耆各半兩
右㕮咀每服叁錢水壹盞酒一分猪脊骨一莖炙焦分
為四服桃柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖槌碎煎至七
分去滓溫服加烏梅半箇尤妙[illegible]

華佗方大黃治傳尸明月丸方
雄黃　木香各半兩　天靈蓋壹兩酥炙　輕粉壹分
鱉甲醋炙壹兩　兔糞貳兩
右為末用法酒壹大升大黃半兩為末熬膏入前藥為
元如彈子大朱砂為衣傳尸勞肌瘦面黃嘔吐咳嗽不
定先燒安息香令烟出吸之不嗽非傳尸也不可用此
藥若煙入口咳不能禁止乃傳尸也宜用此藥五更初
[illegible]
服勿令人知以童便共酒壹盞化壹元服如人行十里
久必吐出虫狀如燈心細長及寸或如爛爪李又如蝦
蟇狀各不同未下次日再服以應為度

蘇沈良方治諸勞明月丸
兔糞[illegible]　硇砂[illegible]
右細研生蜜元如梧桐子大以甘草半兩碎之水浸壹
宿取汁五更初下七元勿令病人知勞蟲下後視看若
有虫急打殺以桑火油煎使焦棄急水中叁日不下更
服須在月望前日服忌見喪[illegible]孕婦人猫犬之類後
服治勞補氣藥取差[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

解勞生肌進食活血養心[illegible]華佗方
生地黃汁　杏仁汁　生薑汁　藕汁各伍升
薄荷汁　鵝梨汁各壹升　法酒貳升　沙糖[illegible]
右慢火熬成膏入後藥
北柴胡去苗　木香　人參　茯苓
山藥　柏子仁[illegible]　遠志去心　枳實麩炒
白朮各壹兩　秦艽　苦梗[illegible]　麝香[illegible]
熟地黃[illegible]
右為末以前膏和丸如梧桐子大食後甘草湯下貳
拾元

治骨蒸實熱名醫錄云睦州楊寺丞有女事鄭迪功女有
骨蒸內熱之病時發外寒寒過內熱附骨蒸盛之時四肢
[illegible]
微瘦足趺腫者其病在五臟六腑之中衆醫不瘥因遇
州呂醫者言請為治之只單用石膏散服之體微涼如故

石膏散方
真石膏[illegible]
右新汲水和服方寸匕取身無熱為度[illegible]

青蒿散治男子婦人肢體倦疼虛勞發熱[illegible]
青蒿八九月間[illegible]時採去枝梗以童子小便
浸叁日晒乾為末每服貳錢烏梅壹箇煎至七分[illegible]

[illegible]鱉甲散治骨蒸勞退熱解肌進食[illegible]方
九肋鱉甲[illegible]　北柴胡[illegible]　甘草　杏仁
桔梗　當歸　人參　地骨皮
赤芍藥[illegible]　胡黃連　宣連[illegible]　官桂

木香各半兩　鼈甲醋炙，壹兩　酥　蜜各叁兩

右拾四味同為細末，用青蒿一斤，童子小便伍升，好酒一升，熬青蒿汁約貳升已來，去青蒿不用，入酥蜜再熬成膏，冷後入藥末，搜和為元，如梧桐子大。每服拾伍元，溫酒下，米飲亦得。日進叁服。如秋後入冬時，更入桃柳枝治惡氣，此藥甚妙。

五心煩熱附

五心煩熱，頗亦宜焉。方逍遙散（方見[illegible]第一論）

【[illegible]散】治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忪頰赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，月水不調，臍腹脹痛，寒熱如瘧。又療室女血弱陰虛，榮衛不和，痰嗽潮熱，肌體羸瘦，漸成骨蒸。

白茯苓　白朮　當歸去蘆，[illegible]

白芍藥　北柴胡去蘆，各壹兩　甘草炙，半兩

右㕮咀，每服叁錢，水壹盞，煨生薑一塊切片，薄荷三葉，同煎至七分，去滓熱服，無時候。

治婦人手足煩熱，夜臥多汗，肌肉黃瘁，經候不調，四肢煩倦，心胸滿悶，狀如勞氣。【[illegible]散】

枳殼麩炒，去穰　半夏湯洗　赤芍藥各等分　柴胡

黃芩各等分

右為粗末，每服貳錢，水一盞，生薑一塊拍破，棗一枚，煎至八分，去滓溫服。候五心煩熱及身體壯熱潮熱退，方續服。

夫婦人血風勞者，由氣血虛損，經候不調，外傷風邪，或內挾宿冷，致使陰陽不和，經絡否澀，腹中堅痛，四肢酸疼，月水或斷或來，面色萎黃羸瘦。又有因產後未滿百日，不謹將護，臟腑虛損，百脈枯竭，遂致勞損之疾也。

【人參荊芥散】治婦人血風勞，遍身疼痛，頭昏目澀，心忪煩倦，寒熱盜汗，頰赤口乾，痰嗽胸滿，精神不爽，或月水不調，臍腹㽲痛，痃癖塊硬，疼痛發歇，或時嘔逆，飲食不進，或因產將理失節，淹延瘦瘁，乍起乍臥，甚即着床。

荊芥穗　人參　桂心　生乾地黃

北柴胡　鱉甲醋炙　酸棗仁炒　枳殼麩炒

羚羊角屑，別為末　白朮各七錢半　川芎

當歸　防風　甘草炙，各半兩

右為粗末，每服叁錢，水一盞半，生薑叁片，煎至八分，去滓熱服，無時候。日二服，常服除一切風虛勞冷宿疾。孕婦休服。

【[illegible]】治婦人血風勞氣，四肢[illegible]羸瘦，疼痛，經脈不利，飲食無味，漸加虛困。

鱉甲　桂心　川芎

防風　川牛膝　當歸　秦艽

人參　桃仁　琥珀各壹兩　檳榔壹分

黃耆　赤芍藥　虻蟲微炒　水蛭微炒

鬼箭羽　白朮　羌活各叁分　熟乾地黃壹兩

右為細末，煉蜜元如梧桐子大，食前溫酒吞下叁拾元。

【[illegible]元】治血風虛勞，上熱下冷，[illegible]筋節拘攣，心中煩燥困之

無力不美飲食無心口燥月水不調肌肉黃瘁腹痛腰脚或
或有氣塊攻衝或時作寒熱頭疼痰涎手足麻痺大宜常
服此調補方

琥珀　當歸　木香　川芎
防風　檳榔各壹分　三稜炮　乾薑炮
桂心各五分　吳白朮　柴胡　人參各肆分
青皮　吳茱萸湯洗焙　全蝎炒　附子炮
草豆蔻　赤芍藥　枳殼　白芷各叁分
桃仁去皮尖　牡蠣醋炙　鱉甲醋炙各分　天麻各叁分

右為細末煉蜜元如梧桐子大每日空心酒下貳拾元
午前近晚更進一服如覺暖近晚不須服如腹內塊積
攻築於鱉甲桃仁檳榔三稜各加一倍為妙忌生冷葱
莧菜毒魚等物

鱉甲散 治婦人血氣虛勞四肢少力肌肉黃瘁多困減食遍身疼
疼真邪相搏心腹撮痛宜

木香　乾薑各叁分　鱉甲一兩醋炙　牡丹皮
赤芍藥　橘紅　桂心　人參
茯苓　熟地黃　秦艽　柴胡
白朮炒　當歸　附子各半兩炮去皮　甘草半兩

右為粗末每服貳錢水壹盞生薑三片棗二枚煎至七
分去滓稍熱服如煩渴心躁入烏梅一兩同杵為末

地黃煎 治婦人血風勞心忪發熱不退出經驗方

生乾地黃　熟乾地黃

右貳味等分為細末用生薑自然汁入水相和打糊為
元如梧桐子大每服叁拾元用地黃湯下或只茶酒鹽
湯下亦可食後日三服如覺臟腑虛冷早間兼服八味黃
一服[illegible]

荊芥散 治血風勞氣痃癖產後虛羸骨節[illegible]服食少服諸藥除去

荊芥　貫衆各三分　當歸　人參各壹兩
桂心　牡丹皮　羌活　防風
苦梗　大腹子　甘草　蒲黃
白茯苓　枳殼　厚朴　半夏
杏仁　鼈甲各九分　附子炮　乾地黃
鱉甲　白芍藥　北柴胡　黃耆醋炙
乾薑　木香各半分　沉香各壹分

右為細末每服貳錢生薑三片棗一枚水一盞煎至七分
溫服

[illegible]散 治婦人血海虛冷手足煩疼氣亦口乾背甲勞
倦寒熱往來咳嗽痰涎飲食進退血經不調多驚盜汗胸
膈不快但是風勞氣冷並皆治之

荊芥穗　北柴胡　秦艽　白芷
黃耆蜜炙兩　當歸　羌活　川芎
麥門冬　白茯苓　人參　白芍藥
沉香　海桐皮　枳殼　熟地黃
甘草　酸棗仁　木香　檳榔各壹兩
鱉甲醋炙　白豆蔻　桂心　苦梗各貳兩

右為細末每服貳錢烏梅壹箇生薑三片煎至七分熱
時溫服如極虛去檳榔每日兩服空心食前服尤佳忌生冷

動風動物腥膩肥膩之類治

[illegible]治婦人血氣不足不耐寒暑易冒疾傷月水不調久而心虛狀若心勞四肢易倦筋骨少力盜汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間作頭昏飲食無味胸膈不利或產前產後受病並可服之

北柴胡　白茯苓　甘草　熟地黃

人參　當歸各壹兩　鱉甲　胡黃連

沉香　知母各半兩　桑寄生　乾葛各三分

右為細末每服貳錢水壹盞烏梅壹箇棗貳枚麥門冬數粒煎至八分無時候

[illegible]治血虛肌熱又治小兒脾虛蒸熱羸瘦不能飲食

白朮　白茯苓　白芍藥各壹兩　甘草半兩

右為細末當棗煎貳錢服

[illegible]治血虛寒熱四肢羸倦無力瘦瘁不進飲食日漸[illegible]

川烏　海桐皮　地骨皮　五加皮

桂心　牡丹皮　陳橘皮　白芍藥

川芎　當歸　烏藥　白芷

莪朮各壹分

右為末每服貳錢水貳盞入生麻油三點煎至七分溫服無時候

[illegible]治血風勞氣攻疰四肢腰背疼痛嗝逆醋心不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻痺血海冷敗服此神效

五加皮　川烏炮　芍藥　海桐皮

牡丹皮　桂心　乾薑　川芎各壹兩

右為細末每服貳錢水壹盞油浸錢壹文同煎至六分溫服常服以油浸貳錢煎藥時不可攪喫藥時不可吹

局方亦有[illegible]方見和劑[illegible]亦妙集見和劑

治血風勞方

牡丹皮　地骨皮　防風　甘草

黑豆　白芷　白芍藥各壹兩　荊芥穗各壹兩

川芎壹分

右為細末每服貳錢水壹盞烏梅壹箇生薑三片棗一箇蔥白一寸煎至八分溫服無時候

[illegible]治熱病後虛勞或四肢倦怠腳手疼痛飲食無味肌膚黃瘦或熱或寒治干頭暈虛煩此藥久服駐顏其妙不可具述

鱉甲[illegible]　當歸　木香

人參　羌活　川芎　沉香

肉豆蔻　酸棗仁　附子　檳榔

大腹子　北柴胡　厚朴　川牛膝

白茯苓　秦艽　桂心

右㕮咀每服伍錢水壹盞生薑三片烏梅壹箇同煎至八分去滓溫服日三服忌生冷毒食雞肉鮓醬之類

[illegible]治血風攻疰肢體疼痛或骨蒸痒或麻痺作寒作熱飲食減味並宜治之

馬鞭草　荊芥穗　北柴胡　烏梅肉

枳殼　白朮　羌活　白芍藥

[illegible] 天台烏藥 麻黃各半兩 木香半兩
當歸 川烏炮 甘草各壹兩
右爲細末每服貳錢水壹盞生薑三片棗一枚葱白貳
寸煎至柒分日午臨卧温服常服無忌有孕莫服

婦人風虛勞冷方論第四 九一方

夫婦人風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能爲害若勞傷氣血便致虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡或入於腹内其經絡得於冷則氣血凝滯不能自温於肌膚也腹内得於風冷則脾胃氣弱不能消於飲食也隨其所傷變成疾病若大腸虛者則變下利若風冷入於子臟則令臟冷致令無子若搏於血則澁壅亦令經水不利斷絶不通也

麝香散 治婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛肢節拘急體瘦無力經候不調飲食減少
牡丹皮 赤芍藥 柏子仁 續斷各半
麝香壹分 澤蘭葉貳兩 當歸 延胡索
桂心 附子炮 川牛膝 川芎
桃仁 乾漆炒 琥珀 沒藥
木香各叁分
右拾柒味爲細末每服貳錢温酒調下

紫石英圓 治婦人風虛勞冷經候不調四肢羸弱不能[illegible]
紫石英 熟乾地黃 白石英細研 續斷
白芍藥 桂心 木香 當歸
白术 乾薑 白薇各半兩 川牛膝
川芎 北五味子 人參各叁分 椒紅炒
附子 黃耆各壹兩
右爲末煉蜜爲元如梧桐子大每服叁拾元温酒吞下
空心服

婦人冷勞方論第五 九七方

夫婦人冷勞者由血氣不足表裏俱虛臟腑久挾宿冷致令飲食不消腹内積聚臍下冷痛月候不調骨節疼痛手足無力肌膚羸瘦面色痿黃故曰冷勞也

桃仁散 治婦人冷勞氣滯經脉不通腹脇妨悶四肢羸瘦不思飲食
木香 訶子 白薑 桃仁
人參各壹兩 陳皮 琥珀 桂心各壹兩
赤芍藥 延胡索 赤茯苓 川牛膝
當歸 白术各叁分
右㕮咀每服四錢水壹盞生薑叁片煎至七分去滓空心
温服

木香元 治婦人冷勞經脉不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味漸加羸瘦
木香 琥珀 吳茱萸泡 當歸
牡丹皮 赤芍藥 三稜 附子炮
延胡索 川芎各叁分 乾薑 人參
桂心各壹兩 北柴胡 白术 鱉甲醋炙去
厚朴 熟地黃 陳橘皮各壹兩
右爲末煉蜜元如梧桐子大每服叁拾元空心温酒下

[illegible]治婦人冷勞虛損肌體消瘦顏色痿黃四肢無力月候不調少思飲食

乾熟地黃　鱉甲　陳皮各壹兩　北五味子

當歸　川芎　桂心各半兩　川牛膝

人參　白芍藥　白朮　附子

白茯苓　黃耆各壹兩　甘草壹分

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下叁拾元

鱉甲圓元治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢羸瘦不思飲食

鱉甲醋炙　桃仁去皮尖　木香　五靈脂各壹兩

當歸各壹兩　硇砂細研[illegible]

右為細末用硇砂膏為元如梧桐子大空心溫酒下貳拾元

[illegible]治婦人冷勞脾胃虛乏大腸轉泄水穀不化四肢羸瘦口內生瘡不思飲食漸加無力宜服此藥

北柴胡　縮砂仁　蓽澄茄　蓽撥各壹分

白朮　白芷　胡椒　白薑

陳皮　山茵陳　人參　蕪荑仁

木香　紫菀　白芍藥　北細辛

桂心各半兩

右為細末以豬肝一具去筋膜切如柳葉片以新汲水洗過入蔥白三寸細切入藥末半兩於銚內以新水二大盞入鹽醋少許以瓷碗合煮令水盡空心以意食之煎湯飲下食後良久飲暖酒一盞為妙晚食前再服亦佳

[illegible]治婦人冷勞面色痿黃不多思食或時腹痛四肢少力積漸羸瘦

白芍藥　川芎　桔梗　厚朴

桂心各壹分　陳皮各壹兩半　白薑　當歸

荊芥穗　蒼朮　川椒　蕪荑仁

藁本　柴胡　紫菀各半兩

右為細末每服半兩以豬肝一具用蔥白各少許細和如尋常煮熟空心任意食之然後飲溫酒二盞亦佳

治婦人血臟風虛冷氣肌肉黃瘦飲食進退經候不調心腹多脹漸變如勞補血海調氣[illegible]

鱉甲[illegible]　沉香　柴胡　人參

川芎　羌活　當歸　附子炮去皮

木香　安息香　桔梗　茯苓

藿香葉　陳橘皮　牡丹皮　三稜

厚朴薑汁炙　桂心　桃仁去皮尖　牛膝去苗各半兩

檳榔　和皮大腹子各壹分

右為細末每服貳錢水壹盞生薑烏梅各少許煎至八分溫服餘一半更加乾漆炒壹分　阿魏半分　赤芍藥各壹分同為末煉蜜元如梧桐子大空心煎烏梅地黃湯下貳叁拾元與散子相間服

婦人熱勞方論第一

夫婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血氣血不調臟腑壅滯熱毒積蓄在內不得宣通之所致也其候心神煩躁頰赤頭疼眼澀唇乾口舌生瘡神思昏沉多卧少起飲食無味舉體痠疼或時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

人參散 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲飲食

人參　黃芩　當歸各一兩　北柴胡去苗

黃耆　地骨皮　赤茯苓　麥門冬

生地黃　赤芍藥各一兩　甘草半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎至六分去滓溫服無時

柴胡散 治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛或時寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏　知母　苦梗　人參

赤茯苓　秦艽　赤芍藥　麥門冬

烏梅肉各半兩　鼈甲醋炙　北柴胡　黃耆各一兩

大腹皮各三分　甘草各半分

右為粗末每服四大錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓溫服無時候

[illegible]丸 治婦人熱勞羸瘦

北柴胡　赤茯苓　人參　黃耆各一兩半

黃連各一兩　地骨皮　木香各半兩　桃仁

鼈甲各二兩

右為細末用好嫩豬肚一枚淨洗將藥末入豬肚內以線縫合蒸令爛熟於砂盆內研如膏員如梧桐子大食前粥飲下三十丸至四十丸食前再服

□□丸 治血經有熱月脈凝滯五心煩倦

麥門冬　秦艽各半兩　生地黃　當歸

地骨皮　鬱金　蘇木各三分

右為細末每服二錢水一盞紅花少許同煎至七分溫服若經脈調不用紅花忌油膩熱物七日可服一年

婦人客熱方論第二

夫婦人有氣血陰陽腑臟虛實則生寒熱虛則受邪邪熱加人陰陽客熱因衛果也今客熱者因體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上焦胸膈之間虛熱口燥心煩手足壯熱者是也

麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

麥門冬　北柴胡　赤茯苓　羚羊角屑

赤芍藥　桑白皮　黃耆各一兩　生乾地黃

甘草半兩

右㕮咀每服四錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服無時

□□散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

羚羊角屑　赤芍藥　地骨皮　紅花

甘草各半兩　北柴胡各一兩　黃耆　麥門冬

人參　枳殼　赤茯苓各三分

右㕮咀每服四錢水一盞生薑三片煎至六分去滓無時

□□散 治婦人客熱，心胸壅悶，肢節煩疼，不思飲食

生乾地黃　黃芪各壹兩　羚羊角屑　甘草

瓜蔞子仁　黃芩各半兩　人參　茯神各三分

右為細末，每服貳錢，水壹中盞，入竹葉伍片，煎至柒分，溫服，無時候。

論婦人寒熱方論第三　凡四方

經云：陽不足則先寒後熱，陰不足則先熱後寒。又婦人勞傷氣血所致，今陰陽交爭，營衛不調，故令寒熱如瘧也。

□□□散 治婦人血風氣，體虛發歇寒熱

北柴胡　地骨皮各壹兩　桑白皮　枳殼

前胡　黃芪各三分　白茯苓　五加皮

人參　甘草　桂心　白芍藥各半兩

右㕮咀，每服叁錢，水壹盞，生薑叁片，煎至柒分，去滓溫服，無時候。

□□散 治婦人血氣不調，或時寒熱，體痛，不思飲食

生乾地黃　北柴胡各壹兩　羌活　木香

桂心　防風各半兩　酸棗仁　羚羊角屑

白芍藥　白朮　黃芪　川牛膝

白茯苓　當歸　枳殼各三分

右㕮咀，每服叁錢，水壹盞，生薑叁片，煎至柒分，去滓溫服，空心。

□□□散 治婦人寒熱，體瘦，肢節疼痛，口乾心煩，不欲飲食

北柴胡　黃芩　赤茯苓　白朮各壹兩

人參　地骨皮　枳殼　生乾地黃

茯神　桑白皮　赤芍藥各三分　鱉甲

麥門冬去心　甘草半兩

右㕮咀，每服肆錢，水壹盞半，生薑叁片，煎至柒分，去滓溫服，無時候。

□□□散 療時氣風溫，寒熱往來，頭痛熱壯，宜服之

陳皮　麻黃　香附子　甘草各壹兩

荊芥穗　厚朴各壹兩　草果仁　川白芷

桂心各半兩

右㕮咀，每服貳錢，水壹大盞，生薑叁片，棗兩枚，煎至柒分，去滓溫服，無時候。

寡婦寒熱如瘧方論第四　凡一方

論曰：寡婦之病，自古未有言者，惟宋褚澄略而論及。言寡婦、尼僧，異乎妻妾之療。蓋獨陰無陽，欲男子而不可得，是以鬱鬱成病也。易曰：天地絪縕，萬物化醇；男女媾精，萬物化生。孤陰獨陽，可乎？夫既處閨門，慾心萌而不遂，致陰陽交爭，乍寒乍熱，有類瘧疾，久則為勞。又有經閉白淫、痰逆頭風、膈氣痞悶、面䵟瘦瘠等證，皆寡婦之病。診其脈獨肝脈弦，出寸口而上魚際，則其病皆鬱而得。經云：男子精盛則思室，女人血盛則懷胎。觀其精血，思過半矣。

生地黃丸　許學士云：有一師尼患惡風體倦，乍寒乍熱，面赤心煩，或時自汗。是時疫氣大行，醫見寒熱，作傷寒治之，大小柴胡湯雜進，數日病劇。予診視之，曰：三部無寒邪

脉但微陰肝脉弦長而上魚際宜服抑陰等藥于與此方
治之愈

北柴胡　秦艽　黄芩各半兩　生地黄貳兩
赤芍藥壹兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大烏梅煎湯下叄拾元
無時候日叄服 [illegible]

婦人惡寒方論第九　九一方

論曰夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於
陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脉必浮
數發於陰者宜溫裏脉必沉細又有汗後利後惡寒及背
惡寒已上疾證方治並載前問不復繁引僕嘗治一婦人
但惡寒別無他證六脉平靜遂用敗毒散而安此藥能去
表中風邪故也經云惡寒家慎不可過當覆衣被及近火
氣寒熱相薄脉道沉伏愈令病人寒不可遏但去被撤火
兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒
氣入腹血室結聚針藥所以不能治矣

婦人血風煩悶方論第六　九四方

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之搏
於血使氣不宣而否澀則生於熱或肢節煩疼口乾少卧
皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也

治婦人血風虛冷月候不調或即脚手心煩熱或即頭面
浮腫頑麻**川烏頭元**

川烏頭 [illegible]

右為細末更入乳鉢內研令停後將蒸餅水浸
後却瀝去水漸漸入臼中和杵待元得即元如梧桐
子大空心溫酒或鹽湯貳拾元忌動風物丈夫風疾亦治

治婦人氣血不和心胸煩悶不思飲食四肢少力頭目昏
眩身體疼痛**赤芍藥散**

牡丹皮　白茯苓　赤芍藥　白芷
甘草各壹兩　柴胡各貳兩半

右為細末每服貳錢水壹盞半薑三片棗一枚同煎至
柒分溫服食後臨卧

治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁不思飲食

酸棗仁　赤芍藥　當歸　羚羊角屑
赤茯苓　紅花　生地黄各三分
防風　羌活　川牛膝　麥門冬
桂心　川芎　地骨皮　甘草各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑叄片薄荷少許煎至柒分溫服

治婦人血風潮熱

當歸一兩　芍藥　延胡索　不灰木
熟地黄兩　大黄各三分　桂心各半兩　甘草壹分

右為細末每服貳錢水壹盞臘脂壹小角子煎至陸分
去滓如膈時以冷服細呷清者

婦人血風攻脾不能食方論第七　九四方

夫脾為中州，意智之藏也，其形心肺腎肝皆受脾之精氣以榮養焉。脾與胃為表裏，脾化穀，納食胃為水穀之海，故經言四時皆以胃氣為本也。婦人血氣不調，臟腑勞損，風邪冷氣搏者在內，攻於脾胃，脾胃既虛，為邪所乘，則不能消伏五穀，故令不能食也。

草豆蔻散 治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納飲食

人參壹兩　草豆蔻仁(煨)　白茯苓　半夏(各三分)

良薑　白朮　縮砂仁　枇杷葉(去毛)

桂心　木香　青皮　甘草(各半兩)

右為粗末，每服叁錢，水壹大盞，薑叁片，煎至柒分，去滓溫服，無時候。

[illegible]元 治婦人血風攻脾胃腹脇氣痛不思飲食 [illegible]

白朮　附子(炮)　枳殼(麩炒)　訶子

桂心　人參　木香　食茱萸(泡)

陳皮(各壹兩)　苦梗　乾薑(各半兩)

右為細末，以酒煮神麯末成糊，作糊為元如梧桐子大，每服貳拾元，空心薑湯吞下。

蓽撥元 治婦人血風攻脾胃臟腑虛冷，全不思食，臍腹多痛，體瘦無力

蓽撥　沉香　附子(炮)　莪朮

訶子　當歸　白朮(各壹兩)　良薑

白豆蔻仁　丁香(各半兩)　麝香(壹分別研)

右為細末，酒煮麪糊為元如梧桐子大，空心溫酒下卅元。

進食散 李潛方 治脾胃虛冷不思飲食，久病人脾胃虛，全不入食者，只兩服能食(出[illegible]方)[illegible]此方既有川烏治血風攻脾不食，宜服良驗

青皮　陳皮　粉草　良薑

桂心(各壹分)　川烏(炮去皮尖)　草豆蔻仁(各)　訶子(煨)

右為細末，每服貳錢，水壹盞，薑貳片，煎至柒分溫服。

婦人夢與鬼交方論第八　凡三方

夫人稟五行秀氣而生，承五臟神氣而養，若陰陽調和則臟腑強盛，風邪鬼魅不能傷之。若攝理失節而血氣虛衰，則風邪乘其虛，鬼干其正。然婦人與鬼交通者，由臟腑虛，神不守，故鬼氣得為病也。其狀不欲見人，如有對忤，時獨言笑，或時悲泣是也。脈息遲伏，或如鳥啄，皆由邪物為病也。又脈來綿綿，不知度數，而顏色不變，此亦是其候也。

[illegible]

茯神散 治婦人風虛與鬼交通，妄有所見聞，言語雜亂

茯神(壹兩半)　茯苓　人參　石菖蒲(各壹兩)

赤小豆(半兩)

右㕮咀，每服叁錢，水壹盞，煎至陸分，去滓，食前溫服。

桃仁元 治婦人與鬼魅交通

辰砂　檳榔　當歸　桃仁(去皮尖)

水銀(棗肉研令星盡)　麝香　阿魏　沉香(各[illegible])

右為細末，煉蜜元如梧桐子大，空心桃仁湯吞下拾元。

又方　**辟邪丹**

虎頭骨　朱砂　雄黃　雌黃

鬼臼　皂莢　蕪荑仁　鬼箭

藜蘆(各壹兩)

右件生為末煉蜜為丸如彈子大常佩壹丸男左女右繫臂上及用壹丸當病人戶前燒之一切邪鬼不敢近

太乙神精丹蘇合香元皆可用也

婦人傷寒傷風方論第九　凡八方

論曰古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相刑傷寒氣口緊盛即宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可下當發其汗以救血室榮衛得和津液自通然後汗出而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣者言不可下也○小柴胡湯主之若行湯遲則熱入胃令津燥中焦上焦不榮成血結胸狀須當針期門也方行相剋以生制扶[illegible]以出不居之日水火交於木未相生則發[illegible]血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積則剛燥不生剛燥不生則不能犯胃氣則言發譫語[illegible]心腹滿小便利當服小柴胡湯證也[illegible]同男子先調氣婦人先調血此大略之詞耳要知脈緊無汗名傷寒脈緩有汗為傷風熱病脈洪大中暑者脈細弱其證一也假如中暍用白虎胃實用承氣豈必調血而後行湯耶仲景傷寒論所以不分婦人者良以此學者皆可隨病於男子藥證中以意選用也○若妊婦傷寒藥性須涼慎不可行桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋為妊婦而去也大抵產前則先安胎產後先補益次服傷寒藥若病稍退則止藥不可盡劑此為大法○黃帝問婦人重身毒之奈何岐伯曰有故無殞亦無殞也大積大聚其可犯也衰其太半而止過者死○男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景所撰而王叔和為之序以法考之間有可取疑非古方特假聖人之名以信其說於天下今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可採者列為一卷雖不足以盡婦人傷寒之詳亦可以百問中參用也

婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不得往來宜桂枝紅花湯

桂枝　芍藥　甘草各一兩　紅花貳兩

右㕮咀每服五錢水一盞半姜四片棗二個煎至七分去滓溫服良久再服汗出而解

[illegible]

婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食宜[illegible]主之

黃芩　白芍藥　白术　生乾地黃

右各等分㕮咀每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服寒則加生姜

婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下宜服[illegible]湯

柴胡一兩　白术貳兩　人參　甘草

赤芍藥　當歸各一兩　五味子　木通各半兩

右㕮咀每服半兩水一盞半生姜四片棗二枚煎至七分去滓稍熱服

婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁譫語目赤毒氣閉塞不得通宜[illegible]

川大黃　鼠尾黃芩　鷄爪黃連等分

右爲粗末每服肆錢水壹盞煎至捌分去滓溫服取微利如目赤睛疼宜加茯苓嫩竹葉瀉肝之餘氣

婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺熱宜乾地黃湯

乾地黃壹兩　大黃　黃連　黃芩

柴胡　白芍藥　甘草壹兩半

右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服取溏利汗出解

男子病新差婦人與之交合得病名曰陽易其證裏急腰胯乃腹內痛身重宜燒裩散

用男子裩襠燒灰爲末以水調方寸匕服即愈

婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胸手足拘急搐搦如中風狀宜青竹茹湯

栝樓根貳兩　淡青竹茹半升

右以水貳升半煮取壹升貳合去滓分作叁服

婦人病未平復因有所動小腹急痛腰胯疼四肢不任舉動無力發熱者宜當歸白朮湯

桂枝　白朮　當歸　甘草

芍藥　人參　黃耆各壹分　生附子壹枚炮

[illegible]　生薑半兩

右㕮咀水叁升煮取壹升半去滓通口服壹盞食頃再服溫覆微汗差

婦人熱入血室方論第十　凡五方

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦宜小柴胡湯

婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀宜服小柴胡湯

柴胡[illegible]　黃芩　人參　生乾地黃

甘草各壹兩　半夏[illegible]

右㕮咀每服伍錢水盞半薑叁片棗貳枚煎至捌分去滓溫服

易方四物湯不用熟地黃只用生乾地黃加北柴胡等分煎服亦療此證

婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜服乾薑柴胡湯

柴胡壹兩　桂枝壹兩半　栝樓根貳兩　牡蠣

乾薑　甘草各壹兩

右㕮咀每服伍錢水盞半煎柒分去滓溫服初服微煩再服汗出而愈

婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近宜海蛤散婦人血結胸法當刺期門仲景無藥方此方疑非仲景然其言有理姑存焉

海蛤　滑石　甘草各壹兩　芒硝半兩

右爲細末每服貳錢雞子清調下小腸通利則胸膈血散膻中血聚則小腸壅小腸既壅則膻中血不流行宜此方小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈

婦人傷風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼和胸脇下滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室也當刺期

門穴隨其實而取之期門穴在乳直下筋骨近腹處是也
凡婦人病法當刺期門不用行子午法恐纏臟腑引氣上
但下針令病人吸五吸停針良久徐徐出針此是平瀉法
也凡針期門必瀉勿補可肥人二寸瘦人寸半深也

婦人咳嗽方論第十一

夫婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也肺為
四臟之華蓋內統諸臟之氣外合於皮毛若為寒熱風濕
所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳也大抵治
咳不可一槩治當以脉息辨之其脉浮而弦者起於風濡
而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澁者起於寒風者
散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不安
者也

咳嗽用溫藥方論第十二　[illegible]

經曰微寒為嗽寒甚為腸澼古人立方治嗽未有不本於
溫藥如乾薑桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發
散以此推之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因欬為

肺痿又實則為肺癰虛則為肺痿此人其始或血不足或
酒色滋味太過或因服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受
邪脉數發熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦
用溫藥如建中之屬今人但見發熱咳嗽率用柴胡鱉甲
門冬葶藶等藥旋踵受斃而不知非可為深戒劇使不可
進以溫藥亦須妙以湯丸委曲調治無為偏奪致傷人命

治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾[illegible]

黃耆四兩　甘草貳兩

右為細末湯點貳錢服日三　一方甘草一兩黃耆
六兩名黃耆六一湯只㕮咀水煎服

治婦人咳嗽不止漸成勞氣宜服[illegible]

蛤蚧一對酥炙　紫菀　欵冬花　鱉甲炙
貝母去心　皂莢子仁[illegible]　杏仁去皮尖

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服貳拾元溫薑湯吞
下

含化丸　昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞服
此安寇宗奭方

枇杷葉去毛　桑白皮　欵冬花　木通
紫菀　杏仁去皮尖各等分　大黃減半

右為細末煉蜜元如櫻桃大食後夜卧含化一元

貝母湯　治諸嗽久不差　出本事方

貝母生薑汁浸半日　北五味子　黃芩　乾薑熟
陳皮各一兩　半夏　桑白皮　桂心
北柴胡各[illegible]　木香　甘草各一分

右為粗末每服伍錢水二盞煎一盞半杏仁柒箇去皮尖碎之
生薑貳片煎至柒分去滓熟服黄師文云戊申冬有姑
蔣若貝妻積年嗽製此方授之一投而瘥以此治諸嗽
悉皆愈

定喘湯 治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急喉中
涎聲胸滿氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽
聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

半夏麴炒　明阿膠炒　甘草各壹兩半　罌粟殼半兩
北五味子　桑白皮　麻黄去節　人參各壹分

右㕮咀每服叁大錢薑叁片烏梅半箇煎至七分去滓
漸漸溫服食後臨卧服

滄州李信人宅方 治狀同前　又名清金湯

罌粟殼蜜炙貳兩　人參　粉草各半兩　陳皮
茯苓去皮　白朮　明阿膠炒
北五味子　桑白皮　薏苡仁　紫蘇莖葉各

右㕮咀為末每服叁大錢水一盞半薑叁片棗兩枚烏梅
半箇煎至一盞臨卧溫服僕每用則無效遂加百合貝
母去心半夏麴款冬花各壹兩服之良驗

[illegible]不換散 治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳
嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠
年日近一切喘咳嗽諸藥不效者並治之

罌粟殼去瓤蜜炙兩　杏仁去皮尖麩炒　甘草各炙　枳殼四錢

右㕮咀每服叁錢水一盞半薑叁片烏梅半箇煎至八
分食後臨卧漸漸熱服

又治一婦人時行感熱咳嗽遂用小柴胡湯去人參薑棗
只加北五味子煎服愈

古今錄驗橘皮湯 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲
上氣不得下頭痛方

陳皮　紫菀　麻黄去根　杏仁去皮尖
當歸　桂心　甘草　黄芩各壹兩壹分

右㕮咀每服伍錢水一盞半煎至一盞去滓熱服

勞嗽方論第十三　九二方

經曰人感於寒則受病微則為咳甚則為泄為痛凡咳嗽
五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣合於皮毛邪之
初傷先客皮毛故咳為肺病五臟則各以治時受邪六腑
則又為五臟所移古人言肺病難愈而喜卒死者肺為嬌
藏怕寒而惡熱故邪氣易傷而難治以其嬌故也過針灸
不及故也十種欬嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒
咳支飲咳膽咳厥陰咳華佗所謂五嗽若冷嗽氣嗽燥嗽
飲嗽邪嗽孫真人亦有方治五毒注嗽若歷代方論著之
甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經見意其華佗所謂邪嗽
真人所謂注嗽者是也此病蓋酒色過度勞極傷肺損動
經絡其重者咯唾膿血輕者時發時差又有因虛感邪惡
之氣且傳注得之或先嘔血而後嗽或先咳嗽漸就沉羸
此則非特內損肺經又挾邪惡傳疰之氣所以特甚病之
毒害無過此也古人治注嗽通氣丸方用蜈蚣四節又云

夢與鬼交通及飲食者令服蜈蚣丸此方四滿丸治五嗽亦用蜈蚣過世名公能推原其旨審湯用蛤蚧天靈蓋桃柳枝賁香用砂雄黄麝香之類以通神明之藥療之其出古人之意矣又肺中有蟲如蚕令人喉痒而發嗽湯散選過藏炙不及以藥含化蟲死即嗽止 見急救方

深師療五嗽一上氣嗽二飲嗽三燥嗽四冷嗽五邪嗽

四滿丸

乾薑　桂心　踯躅花　芎藭

紫菀　芫花根皮各　蜈蚣一條去頭足炙　細辛

甘草炙　鬼督郵　人參　半夏湯洗各

右拾貳味為細末煉蜜丸如大豆許每服伍丸米飲下日三夜一不知加至拾捌丸服此藥無不差忌如常 生葱生菜海藻菘菜

古今錄驗四滿丸療五嗽 一氣嗽二痰嗽三燥嗽四邪嗽五冷嗽悉療之方

蜈蚣貳枚炙　芫花根五　踯躅花　乾薑

芎藭　桂心各分　人參　細辛各分

右為末煉蜜丸如梧桐子大米飲下壹拾丸日三服加至拾伍丸忌生葱生菜

喘滿方論第十四　九六方

夫喘之為病黄帝問岐伯岐伯對曰夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者則著而為病此原疾之由雖曰皆本於肺與氣然感外邪則有太陽證脉浮無汗而喘者宜麻黄湯陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜承氣湯若表邪未解誤服下利藥不止脉促喘而汗出者宜葛根黄芩湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黄杏子甘草石膏湯若表邪未解心下有水發熱而喘或嘔者小青龍湯去麻黄加杏仁主之若陰證喘促者四肢逆冷脉息沉細或寸大尺小或六脉促疾或心下脹滿結硬或冷汗自出或大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜返陰丹主之……以大藥而言之諸藏相乘而喘者以杏子散如感寒伏熱而喘者以華蓋散九寶湯若暴寒向火覆衣被過當傷熱肺實而喘促者其……多有熱證宜洗心散冷水調服若因氣字不調痰涎喘促者宜四七湯……若涎多而喘者宜千緡湯橘皮半夏湯若不得卧臥即喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則浮而喘使氣不得通流其脉沉大宜神秘湯腎之積名曰息賁在右脅下大如杯令人洒淅寒熱喘咳發癰疽宜息賁丸若上氣喘者神授湯若上盛下弱而喘促者宜蘇子降氣湯養正丹黑錫丹若尊年之人素來稟賦太厚不任熱藥者不可輕投丹劑及諸熱藥但以秘傳降氣湯分心氣飲論之極穩不出於此矣若素有脚氣而喘者當作脚氣治之又有骨蒸勞瘵喘自有專門不敢濫及

神秘湯治水氣乘肺而喘兼療支飲而喘

陳橘皮　紫蘇葉　人參　桑白皮

生薑等分

右㕮咀每服半兩水煎去滓溫服

杏子散 治諸藏積冷秉喘急

杏仁去皮尖麩炒入湯別研細 麻黃根為細末等分

右和煎橘皮湯調下二錢無時候

千緡湯

齊州半夏洗七枚炮裂四片破之 皂角一寸去皮炙

甘草炙一寸 生薑如指大

右同以水一盞煮去半頓服沈興宗待制常病痰喘不能卧人扶而坐數日客有見之曰我曾如此得良藥一服差我以千緡酬之謂之千緡湯可試為之興宗得湯一服而差

葶藶丸 療息賁

甜葶藶研細 陳皮 苦梗各等分

右後二味為末入葶藶令得所煮肥棗肉研為膏和丸如梧子大每服伍柒丸飲下 許學士云予常患停飲水積肺經食已必嚏漸喘覺脇下急服此良驗

杏參散 治上氣喘急不得卧

橘紅 苦梗 紫蘇 人參

北五味子等分

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至陸分去滓食後服

九寶湯 治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小兒室女產前產後皆可服惟虛勞自汗不可服

薄荷葉 紫蘇 大腹皮洗 麻黃去根節

桑白皮 桂心 杏仁去皮尖 陳橘皮

甘草炙各貳兩

右㕮咀每服半兩水一盞半烏梅一箇煎至六分去滓溫服食後 有兩浙張大夫病喘二十年每至秋冬輒劇不可坐卧百方不癒後得臨平僧法本方服之遂差法本亦病三十年服此藥半年乃絕根本永不復發凡服此藥須久乃差

官局桔梗湯 橘皮乾薑湯 洗心散 華蓋散方見和劑

雄朴湯 沒食蘇羅安人年近六十遇秋冬之交上氣喘促不能坐卧六脉沈實服諸藥無效問疾之原少年自川中往所服餌用砂又恐是丹毒為害遂服洗心散以華蓋散數服而愈覆記之

婦人風痰方論第十五

九八方

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胸膈所成也人皆有痰少者不能為妨多者成患但胸膈有痰飲漬於五臟則令眼暈亦令頭眩頭痛也

評曰夫痰之為害多因外感五邪內傷七氣因五邪而得者得冷為冷痰得熱為熱痰得暑為暑痰因七氣所傷者多因婦人情性執著不能容忍而有甘特以因風冷而成疾所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液凝汗滯濁變而成痰乘間而為害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎飲沫四種相類宜子細詳辨調治因證而生痰者宜從

三生飲、星香飲、青州白丸子、化痰玄[illegible]；因寒冷而得
者宜服降氣湯、黑錫丹、養正丹[illegible]；因熱而得者宜服
金沸草散、柴胡半夏湯；因暑而得者消暑丸[illegible]；因氣
字不調得[illegible]服蘇合香丸[illegible]二陳湯。痰在
上者以瓜蒂散吐之，在下者以控涎丹利之。雖曰可吐
可下，亦要斟酌之。勇怯藥脉之虛實方可投之，切記不
宜痛擊輕下，所以初虞世有金虎碧霞之戒者此也。

三生飲 星香飲 參蘇飲 [illegible]

控涎丹 [illegible] 養正丹 [illegible]

旋覆花湯 治婦人風痰嘔逆不下，飲食頭目昏悶

旋覆花 [illegible] 枇杷葉 [illegible] 川芎 北細辛

藿香 桂心 枳殼 [illegible] 前胡

人參 羌活 半夏 各[illegible] 甘草

羚羊角 赤茯苓 [illegible]

右為粗末，每服叁錢，水壹盞，薑[illegible]片，煎至柒分，去滓，溫
服

治婦人風痰心膈壅滯**天南星元**

天南星 白附子 [illegible] 皂莢仁 [illegible] 半夏 [illegible]

晉礬 [illegible]

右為細末，以酒煮麵糊為元，如梧桐子大，每服拾元，生薑
薄荷湯吞下

又方

半夏 天南星 [illegible] 白礬 [illegible] 生薑 [illegible]

右以水伍升，煮[illegible]水盡去[illegible]只用半夏[illegible]
焙乾為末，[illegible]如梧桐子大，生薑薄荷湯
下七元

柴胡半夏湯 治痰熱頭目不利，胸膈煩悶，手足煩熱，榮衛不
調，肢節拘倦，身體疼痛，嗜臥少力，飲食無味，兼治五嗽痰
癖

柴胡 [illegible] 半夏 [illegible] 人參 [illegible] 甘草

黃芩 麥門冬 [illegible] 白朮 [illegible]

右㕮咀，每服伍錢，水盞半，薑伍片，棗壹枚，煎至捌分，去
滓服

金沸草散 治傷寒中脘有痰，令人壯熱頭痛，筋緊急，時發
寒熱，皆類傷風

荊芥 [illegible] 半夏 甘草 北細辛 [illegible]

赤茯苓 [illegible] 前胡 旋覆花 [illegible]

右為細末，每服貳錢，水壹盞，生薑伍片，棗壹枚，煎至陸
分，熱服。不知，再服。[illegible]

瓜蒂散 療病如桂枝證，頭不痛，項不強，寸脈微浮，胸中痞
鞕，氣上衝咽喉不得息者，此為胸有寒也，當吐之，宜服此

瓜蒂 [illegible] 赤小豆 [illegible]

右為細末，取壹錢匕，以香豉壹合，湯漬之，須臾煮作
稀糜，去滓取汁，和散溫頓服。不吐，少少加，得快吐乃止。
諸亡血虛家不可與之。[illegible]

大半夏湯 治痰飲及脾胃不和

半夏 白茯苓 生薑 [illegible]

右㕮咀，作壹服，每[illegible]以水貳盞，煎至壹盞

去滓臨臥溫呷如有熱嗽加炒甘草壹分如脾胃不和
去甘草加陳橘皮壹分同煎 此即二陳湯加減得理

四七湯 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或
如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣所為也或中
脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節
嘔逆惡心並宜服之 婦人性情執著不能寬解多被七
氣所傷遂致氣填胸臆或如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲
絕產婦尤多此證宜服此劑間以香附子藥久服取効切
不可謂產蓐結氣且謂新產氣血俱虛不肯多服用之効
驗不可具述

紫蘇葉貳兩 厚朴叁兩 茯苓肆兩 半夏伍兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑柒片棗壹箇煎至陸分
去滓熱服無時候若因思慮過度小便白濁用此藥吞
青州白元子極妙

婦人心胸嘈雜方論第十六 九二方

夫心胸嘈雜婦人多有此證原疾之由多是痰也皆血液
淚汗變成或云是血嘈今人多用猪䐈血炒而食之則愈
詳其此理是以血導血歸源耳 治如以臘柳下逐之義不
若用許學士旋覆花湯治心腹中脹痰水冷氣心下汪洋
嘈雜腸鳴多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此
胃氣虛冷所致其脈沉遲弦細是其證也

旋覆花湯方

旋覆花 北細辛 橘紅 桂心
人參 甘草 苦梗 白芍藥
半夏各半兩 赤茯苓叁分

右㕮咀每服肆錢水一盞半生薑柒片煎至柒分去滓溫服

局方治惡阻半夏茯苓湯赤茯苓湯方見惡阻論中

新編婦人大全良方卷之七

婦人嘔吐方論第一　凡六方

夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理所爲也胃爲水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃胃氣逆則令嘔吐也　愚詳曰夫嘔吐之疾非特脾胃虛冷而嘔吐也亦有胃熱而嘔者亦有胃中冷胃口熱而吐者亦有痰盛而嘔者亦有血弱而嘔者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥　如胃冷而嘔吐宜用局方人參丁香散理中元及許仁則半夏元人參七味元　如胃熱而嘔吐者宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯枇杷散　如胃中冷胃口熱而嘔吐者宜用局方藿香正氣散七棗散子煎沈冷服即止　如痰盛嘔吐者宜局方半夏茯苓湯二陳湯　如惡阻者服茯苓元　自有專門　如血不歸源而嘔吐者宜用千金大補湯加陳皮半夏藿香當歸煎服　或有腳氣而嘔者自有專門不敢濫及

益智子散　治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不下食四肢無力

益智壹兩　附子炮　縮砂仁　丁香
厚朴　黃耆　白朮　白茯苓
陳皮　川芎　良薑　藿香葉
當歸各叁分　人參　桂心各半兩

右㕮咀每服叁錢薑叁片棗壹枚煎至柒分去滓無時溫服

治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水穀不消**丁香散**

丁香　白朮　縮砂仁
草果仁各叁分　人參壹兩　當歸
白豆蔻　藿香葉　甘草各半兩
橘皮叁分　神麴　訶子各半兩

右爲細末每服貳平錢煎蘇葉湯調下

竹茹湯　治胃熱嘔吐

乾葛叁兩　半夏湯洗七次以薑汁半升浸令乾半可取二分用
甘草叁分

右㕮咀每服伍錢水貳盞薑叁片竹茹壹彈大棗壹枚煎至壹盞去滓溫服

許學士云胃熱者手足心熱　政和中一宗人病傷寒得汗身凉數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃脘孫兆竹茹湯正相當爾亟治藥與之即時愈

良方**枇杷散**　亦相類方

良薑　白參　枇杷葉去毛令黃
甘草等分

右爲細末白湯調貳錢

許仁則**半夏元**　療積冷在胃嘔逆不下食方

半夏宜升貞洗去滑焙用
小麥麵壹升

右擣半夏爲散以水搜麵丸如彈子大以水煮令麵熟則是藥成初吞四五元日二服稍加至十四五元旋煮

旋服服此霍病減欲更重合服亦佳忌羊肉餳救急同
又依前【人參丸】雖實漸損然病根不除欲多合前元又慮
藥毒不可久服欲不服又恐病深宜合【人參白朮元】服
人參　白朮各四兩　厚朴　細辛各貳兩
生薑别研　橘皮各四兩　桂心貳兩
右為細末煉蜜元如梧桐子大飲下十元漸加至二十
元與半夏元間服亦可忌桃李雀肉生葱生菜呉昇同
婦人霍亂方論第一　凡六方
論曰嘔吐而利者名霍亂也原疾之由皆因腸胃虛冷飲
食過度觸冒風冷使陰陽不和清濁相干致令揮霍變亂
也或先心痛而吐者或先腹痛而利者或吐利俱作者或
頭痛身體壯熱而脉浮洪者或陽氣暴絶而手足逆冷而
[illegible]
脉息微絶者治之當分陰陽察其虛實辨其冷熱審其脉
息熱者涼之冷者溫之以平為期千金問云凡霍亂吐利熱
多而渴者五苓散寒多不飲水者理中元吐利已汗出而
厥四肢拘急不解脉微欲絶者通脉四逆加猪膽汁湯○
夏月中暑霍亂大煩渴四肢逆冷冷汗出脚轉筋者香薷散
濃煎沉冷服即效 [illegible]
【加减理中元】主霍亂臨時方亦可治男子　出千金翼
人參　白朮　乾薑　甘草各壹兩
右為細末煉蜜為貳拾兩作伍元取湯和壹元服之日
拾服吐多利少者取枳實炙肆枚炙去穰四破水叁升煮
取壹升和壹元服之　吐少利多者加乾薑一累　吐
利乾嘔者取半夏半兩洗去滑水貳升煮取壹升和

壹元服　若體疼痛不可堪者水叁升煮棗叁枚取壹
升和壹元服　若吐利大極轉筋者以韭汁洗腹腎從
胸至足踝勿逆即止　若體冷微汗腹中寒取附子壹
枚炮去皮四破以水貳升煎取壹升和壹元服　吐利
悉止脉不出體猶冷者可服諸湯補之
千金翼【四順湯】治霍亂吐利腹痛手足逆冷脉微欲絶
附子生去皮臍　乾薑各叁兩　人參　甘草各壹兩
右㕮咀水煎服
【四逆加豬膽汁湯】治吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解
脉微欲絶者
甘草貳兩　乾薑叁兩　附子壹枚生　猪膽汁半合
右叁味㕮咀每服伍錢水叁盞煎至壹盞去滓內猪膽
汁分作兩次溫服其脉即來
[illegible]
【[illegible]】治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥鱠生冷過度
或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於
三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干
腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間使至吐利心腹疼痛
霍亂氣逆有先心痛而吐者或先腹痛而利者有吐利俱
發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹
刺痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢
逆冷脉微欲絶者或煩悶昏塞欲死者於霍亂吐利此
藥悉能主之
香薷葉肆兩　白扁豆　厚朴各貳兩
右㕮咀每服半兩水壹盞[illegible]至六分

去滓井中浸令氷冷頓服與時候連併二三服立見神
效蘇沈良方中名香薷散 百問同有黄連無扁豆

訶子散 治老幼霍亂吐利壹服取効又治九種心痛及心
脾冷痛不可忍其功如神

訶子　甘草　厚朴　乾薑
草菓仁　陳皮　良薑　茯苓
神麯　麥芽 各等分

右為細末每服貳錢候發刺痛不可忍用水壹琖煎柒
分入鹽服急則[illegible]點

[illegible]湯 治霍亂吐利甚妙

胡椒　綠豆 [illegible]

右為細末木瓜煎湯調下貳錢

三因方 [illegible]

婦人翻胃吐食方論第三　凡二方

[illegible]散 治婦人翻胃吐食千金翼云不特治婦人男子亦
可服壹斤以上為妙

白礬土 [illegible]
乾薑壹分 炮

右為細末研停每服壹錢飯飲調下甚者貳錢

白[illegible]散 治婦人翻胃吐食

右用白[illegible]壹兩切作片於瓦上炒令黄為細末用猪血
貳拾文切片以滚湯泡七次將血蘸藥喫七片如剩藥
末留後次用

婦人血膈方論第四　凡一方

牡丹煎 治婦人血膈

牡丹皮　苦參　貝母 去心　玄胡索
白芍藥

右等分為細末煉蜜丸如梧桐子大每服拾伍貳拾元
米飲吞下無時候

婦人鼻衄方論第五　凡七方

夫婦人鼻衄者由傷動血氣所致也凡血氣調和則循環
表裏經絡澁則不散若勞傷損動而生熱氣逆流溢入於
鼻者則成鼻衄也又有産後見衄者不可治 [illegible]

[illegible]散 治婦人鼻衄血流不止

刺薊　桑耳　亂髮灰　艾葉 [illegible]
生地黄 貳兩　蒲黄 兩半

右為細末每服貳錢無時粥飲調下

伏龍肝散 治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆治之

伏龍肝　生地黄　竹茹 壹升　芍藥
當歸　黄芩　川芎　桂心
甘草 各貳兩

右㕮咀水壹斗三升煮竹茹減三升內藥煮取三升分
為三服千金無桂

百問有茅花湯 以白茅花濃煎飲之立止
一方擣吐白茅根取汁壹大合飲之止　又方取生葱心塞
鼻中即定若因刺著并刀斧所傷血不止並用之方定

又方取釜底墨細研入鼻中　又方取亂髮灰細研以竹管吹入鼻中立止　又方取龍骨末吹入鼻中立止

婦人吐血方論第六　凡十三方

夫婦人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於經絡內榮於臟腑若傷損氣血經絡則虛血行失於常理氣逆者吐血又怒則氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內傷氣逆上者皆吐血也

治婦人吐血心煩昏悶　雞蘇散

雞蘇葉　各壹兩　阿膠　刺薊　生地黃　各壹兩

黃耆　羚羊角屑　茜根　甘草　各半兩

麥門冬　黃芩　當歸　伏龍肝　各叁分

右為粗末每服肆錢水壹盞薑叁片竹茹半雞子大煎至六分去滓溫服

治婦人虛損氣逆吐血不止　雞蘇散　[illegible]

雞蘇葉　黃芩　各壹兩　赤芍藥　各半兩

伏龍肝　阿膠　各貳兩　當歸

右為粗末每服肆錢水壹盞煎至六分去滓溫服

治婦人熱毒上攻吐血不止

生藕汁　刺薊汁　生地黃汁　各叁兩

生薑汁　半合　白蜜　壹合

右和煎叁兩沸無時以壹小盞調炒麵塵壹錢服

千金翼治吐血百方不差療十十差神驗不傳方詳此藥性治熱毒吐血有効

地黃汁半升　生大黃末壹方寸匕

右煎地黃汁叁兩沸調大黃末　分為叁服

又方　伏龍肝

右研令極細每服貳錢新汲水調下頻服取効

又方　白茅根　壹握切

右以水壹大盞煎取柒分去滓溫服

又方治吐血　桂心末

右水調方寸匕日夜可貳拾服

又方　生地黃　切叁斤　阿膠　貳兩炒　蒲黃　叁合

右水伍升煮取叁升分叁服　[illegible]

治虛勞吐血衄血下白汗出方　[illegible]

甘草　白芍藥　黃耆　各　兩　熟地黃　壹兩

右為末每服肆錢水酒各壹盞煎至柒分去滓取陸分清汁溫服食前　[illegible]

四生丸　治吐血凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉　生艾葉　生柏葉　生地黃

右等分爛研圓如雞子大每服壹圓水叁盞煎至壹盞去滓溫服無時候　[illegible]

療熱甚嘔血者以犀角地黃湯（方見小三黃元）以白茅根煎濃湯吞之妙

犀角地黃湯 治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑

芍藥（七錢半）　生地黃（半斤）　牡丹皮（一兩）

犀角（一兩，如無以升麻代之）

右㕮咀每服伍錢水煎服有熱如狂者加黃芩貳兩

青餅子 治咯血

青黛　杏仁（各壹兩，以牡蠣粉炒黃色，去牡蠣不用）

右壹處同研成膏熔黃蠟和作叁拾餅子每服壹餅子用乾柿半箇夾定以濕紙裹煨令香同嚼粥飲下無時

若陰乘於陽心肺經寒而嘔血者宜服**甘草乾薑湯**

甘草　乾薑

右㕮咀水姜煎服　或理中湯亦妙（方見第□卷）

婦人痃癖諸氣方論第七（凡四方）

夫婦人痃癖者本因邪氣積聚而生也痃者在腹內近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀名曰痃氣也癖者為僻側在兩肋之間有時而痛故曰癖也夫痃之與癖皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則發作疼痛故曰痃癖者也

麝香元 治婦人痃癖冷氣兼疰氣心腹痛不可忍

麝香（半兩，別研）　阿魏（一分，麵裹煨令麵熟）　五靈脂

桃仁　三稜（各三分）　芫花（醋炒）　檳榔（各一兩）

莪朮　桂心　沒藥　木香

當歸（各半兩）

右為細末入麝香令停用糯米軟飯為元如梧桐子大每服十元無時淡醋湯下

治婦人痃癖及血氣等神效方

右以豶猪肝壹具可及拾兩者用巴豆伍拾枚去大皮劄在肝內用釅醋叁椀慢火熬令肝爛熟入砂盆內研令極爛入京三稜末和就得所為元如梧桐子大每服五元食前熱酒下

（小注：[illegible]）

[illegible]元 治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛大治婦人產前產後腰腿痛胎不安或血刺痛者兼能治血藏宿冷百節倦疼肌體怯弱勞傷帶癖久服盡除但婦人一切疾病最宜服此

川芎　當歸　枳殼　厚朴

桂心　乾薑　芍藥　舶上茴香

青皮　葶藶子　木香　熟地黃

麥芽　三稜　莪朮　茯苓

神麴　人參（各等分）

右為細末每服貳錢水壹盞連根葱白貳寸拍破鹽半錢煎至柒分溫服內大黃㕮咀子宜斟酌虛實加減如大便

不利入大黃同煎知不入訖如大便自利入呵子煎[illegible]

[illegible]

[illegible]安人每遇經脉行時則臍與小腹下痛亦灸服藥無效

僕以桂枝桃仁湯愈月後再發一服而愈

桂枝桃仁湯[illegible]

治經候來時[illegible]腹痛[illegible]局方七氣湯吞下來復丹

婦人[illegible]癥瘕方論第八　凡四方

夫婦人疝瘕之病者由飲食不節寒溫不調氣血勞傷臟腑虛弱受於風冷冷入腹內與血相結所生疝者痛也瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃動也婦人之病有異於丈夫者或因產後血虛受寒或因經水往來取冷過度非獨因飲食失節多挾於血氣所成也診婦人疝瘕其脉弦急者生虛弱小者死又尺脉澀如浮牢為血實氣虛也其發腹痛逆氣上行此為婦人胞中絕傷有惡血久則結成瘕也

乾漆散

治婦人疝瘕久不消令人黃瘦尫羸兩脅妨悶心腹疼痛

乾漆（炒令煙盡）　木香　芫花（醋炒）　赤芍藥

桂心　當歸　川芎　琥珀（各半兩）

大黃（[illegible]炒）　牛膝（各三分）　桃仁（壹兩）　麝香（壹分）

右為細末無時溫酒調下壹錢

治婦人疝瘕及積瘀血在臟時攻腹脅疼痛[illegible]

川芎（[illegible]）　硇砂（[illegible]）　當歸　雄黃

桂心（各半兩）　大黃（炒）　三棱（各貳兩）

右為細末用米醋壹升熬大黃末為膏次入餘藥末和元如梧桐子大每服溫酒吞拾元漸加至貳拾元以利下惡物為度

治婦人疝瘕及血氣疼痛**巴豆元**

巴豆（[illegible]）　硇砂　大黃（壹兩[illegible]）

五靈脂　桃仁（[illegible]）　木香（半兩）

右為末煉蜜元如綠豆大[illegible]湯空心下五元熱酒亦可

良方黑神元

神麴　茴香（[illegible]）　木香　椒（炒香出汗）

丁香（各半兩）　檳榔（肆枚）　漆（[illegible]）

[illegible]

右除椒漆餘物皆半生半炒為細末用前生熟漆和元如彈子大茴香末拾貳兩鋪陰地蔭乾候外乾并茴香收器中極乾去茴香每服壹元[illegible]

崩產後諸血漏[illegible]壹元分四服死胎壹元皆綿灰酒下難產炒葵子肆粒[illegible]酒煎下壹元諸疾不過三服痃氣拾服[illegible]伍服血瘕三元當差

[illegible]

婦人八瘕方論第九　凡一方

夫婦人八瘕者皆因胞胎生產月水往來血脈精氣不調之所生也腎為陰主開閉左為胞門右為子户主定月水生子之道胞門主於子精精神氣所出入合於中黃門玉

門四邊上去關元下精海下三寸名曰關元主藏魂魄婦人之胞三焦之府常所從止然婦人經脈俞絡合調則月水以時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通邪氣便得往入合於其藏若生血未盡而合陰陽即令婦人血脈攣急小腹重痛支滿胸脇腰背相引四肢痠痛飲食不調結牢惡血月事不時或前或後因生積如懷胎狀邪氣甚盛令人恍惚多夢寒熱四肢不舉陰中生氣腫內生風甚者害於小便小腹堅痛淋瀝面色黃黑則不復生子其八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血瘕脂瘕狐瘕蛇瘕鼈瘕是也千金外臺言之詳矣

桃仁煎 治婦人血瘕血積經候不通 出本事方

桃仁 大黃各一兩 虻虫半兩炒黑 川朴消一兩

右四味為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大黃桃仁虻虫等不住手攪欲下手丸下朴消更不住手攪良久出之丸如梧桐子大前一日不用晚食五更初用溫酒吞下五丸日午取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆衣狀未下再作如鮮血來即止續以調氣血藥補之此方出千金 [illegible]

婦人腹中瘀血方論第十 凡二方

夫婦人腹中瘀血者由月經否澀不通或產後餘穢未盡因而乘風取涼為風冷所乘血得冷則成瘀血也血瘀在內則時時體熱面黃瘀久不消則變成積聚癥瘕也

桃仁散

虻虫 水蛭 烏賊骨 鯉魚鱗燒灰

芫花醋炒 枳殼 當歸 牛膝

赤芍藥 朔砂 桂心各一兩 桃仁二分

右為細末食前溫酒調下一錢

桃仁元 治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或來心腹滿急

桃仁 大黃炒各一兩 虻虫炒去翅足 水蛭各四十枚炒焦

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五丸熱酒吞下未知加至八丸

婦人癥痞方論第十一 凡三方

夫婦人癥痞者由冷熱不調飲食不節積在腹內或腸胃之間與臟氣結搏其牢強推之不移者名曰癥言其病形徵可驗也氣壅塞為痞痞言其氣痞澀不宣暢也皆得冷則發動刺痛癥痞之病其形冷結若冷氣入於子藏則使無子若冷氣入於胞絡搏於血血得冷則澀亦令月水不通

川山甲散 治婦人癥痞及惡血氣攻心腹疼痛面無顏色四肢瘦弱

川山甲炙黃 鱉甲醋炙 赤芍藥 大黃炒

乾漆炒令煙出 桂心 川芎 芫花醋炒

當歸各半兩 麝香一分

右為細末入麝香令停每服一錢無時熱酒調下

蓬莪茂元 治婦人癥痞腹脇妨痛令人體瘦不思飲食

莪茂三分 當歸炒 桂心 赤芍藥

檳榔　枳殼　木香　昆布
琥珀各半兩　桃仁　鱉甲　大黃各壹兩
右為末煉蜜圓如梧桐子大食前粥飲下貳拾元
治婦人癥瘕結塊不散心腹疼痛丁香圓
雄雀糞　硇砂　當歸
芫花　巴豆
右為末同研令停醋煮麵糊圓如小豆大當歸酒下三元
婦人食癥方論第十二　凡二方
夫婦人食癥者由臟腑虛弱月候來時食生冷之物脾胃
既虛不能消化與臟氣相搏結聚成塊日漸生長盤牢不
移故謂之食癥也
治婦人食癥久不消令人瘦弱食少圓
硇砂　青礞石　京三稜
乾漆　硫黃　巴豆
右為末用醋圓如小豆大每服伍元生薑橘皮湯下
治婦人食癥塊久不消攻刺心腹疼痛
青礞石　巴豆　朱砂　粉霜
木香　硇砂
右研令停以糯米飯和圓如綠豆大每服貳元空心
溫酒下取下惡物為度
婦人積年血癥塊方論第十三　凡七方
夫婦人積年血癥塊者由寒溫失節臟腑氣虛風冷在內
飲食不消與血氣相結漸生頗塊盤牢不移動者是也皆
因血氣勞傷月水往來經絡否澀惡血不除結聚所生也

久而不差則心腹兩脇苦痛害於飲食肌膚羸瘦
治婦人積年血癥塊或攻心腹疼痛四肢不和面少血色
飲食全少圓
乾漆　大黃　琥珀　硇砂
硝石　莪朮　紅花　延胡索
桂心　巴豆
右為細末用醋和圓如梧桐子大每服伍元於日未
出時煎蘇木湯吞下量其人輕重加減服之
治婦人積年血癥塊不消狀若鬼胎之候宜服圓
琥珀　桂心　牛膝　芫花
檳榔　桃仁　生地黃　延胡索
當歸　鱉甲　三稜　乾漆
硇砂　大黃　虻虫　水蛭
右為末醋煮麵糊和搗三二百杵圓如梧
桐子大每服拾元空心溫酒下
治婦人積年癥塊不消圓
硇砂　乾漆　雄黃　水銀
雄雀糞　巴豆
右研停用棗肉圓如綠豆大空心當歸酒下壹元臨臥
再服取下惡物為度
理五積氣痛及婦人血積惡血假發歇攻刺疼
痛嘔逆噎塞心中迷悶不醒人事及血鼓腹脹滿經脈
不行者
芫花

[illegible]

當歸 桂心 木香 沒藥

肉豆蔻 蓬莪朮各二兩 檳榔乙分

班猫三十個 [illegible]

附子 [illegible]

右一十二味除斑猫沒藥餘為細末後斑猫沒藥一処合研令停入前腎子內和搗千杵丸如赤豆大初服壹元用醋炒蘿蔔子令焦黑以酒浸同煎一二沸放温吞下漸加至五貝七貝即止如名產乎血氣攻心脾以酒醋共一錢殘煎沸吞下婦人血瘕積結塊攻心疼痛悶絶久醫不効者入此餘糧一兩火煅醋焠十次研細和藥為貝每服伍貝用蘇木節二兩細剉酒三升煎至七合去滓分為三服吞藥併進三服當下出則效須大小腸遂下其病立差人弱者每服只二貝如是丈夫元臟小腸氣脾積氣癥塊等疾即入丹砂一兩細研和停以生姜鹽湯吞下二三貝

【[illegible]元】治婦人積年癥塊及惡血氣久不除者

五靈脂 乾漆 川烏 麝香

硫黃 硇砂 巴豆

右為末研停醋麥麪糊貝如綠豆大每服五貝空心溫酒下

【三稜煎】治婦人血癥血瘕食積痰滯

三稜 莪茂各二兩 青橘皮去白半斤

麥芽一兩炒各乙

右用好醋六升煮乾焙為末醋糊貝如梧桐子大每服三四十貝淡醋湯下痰積多薑湯下

【[illegible]】治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癖塊腹中卒暴疼痛面有䵟黯黧黑羸瘦者九方

經娠花 硇砂

桂心 木香 乾歸 縮砂仁二兩

紅花 斑猫 川狗脊 生地黄汁

[illegible] 小便 青皮 大朱砂

右玖味為末同汁熬[illegible]和貝如雞頭大朱砂為衣每服一貝溫酒[illegible]服

婦人血氣心痛方論第十四 凡五方

夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者成疹者心為諸臟之主而主於神其正經不可傷傷之而痛者名為真心痛朝發夕死夕發旦死別絡為風冷所乘而痛者故痛發乍輕乍甚而成疹者也

【[illegible]散】治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥 莪茂 桂心 當歸

桃仁 青皮 木香

右等分為末每服二錢熱酒調下

【阿魏元】治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣

當歸 桂心 青皮 附子

阿魏 白朮 川芎各一兩

吳茱萸 木香 乾姜各三分 檳榔

肉豆蔻 延胡索 莪茂各一兩 朱砂

右為末，先以醋煮升煎阿魏成膏，和藥末搗三百杵，丸如梧桐子大。每服貳拾丸，食前熱酒下。

[illegible] 治男子婦人九種心痛，一切冷氣。

良薑 桂心 赤芍藥 各等分

右為細末，每服貳錢，水一盞，入鹽、木瓜三片，同煎七分，溫服。鹽湯點亦得。血氣刺腹痛，用熱醋湯調下。忌生冷。

又一方 [illegible]

[illegible] 入 [illegible] 血氣作心腹 [illegible] 方同，只無 [illegible]

桂心 用醋煎 [illegible] 醋湯 [illegible]

[illegible]

陳氏二神丸 治婦人血氣不和，作痛不止，及下血無時，月水不調。

真蒲黃炒 蓽撥 鹽炒

右等分為細末，煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，空心溫酒吞下。如不能飲，米飲下。兩服即止。

[illegible]散 治婦人血風血氣等疾。武興戎司機宜侯檀云：見一道人用此方療病不一，而見效，以為獸炭是 [illegible]

五靈脂 [illegible] 錢 桂心 [illegible]

右為末，每服貳大錢，酒半盞，水半盞，煎至八分，疾作熱服。

失笑散 [illegible] 亦妙。

經驗方 治婦人卒血氣心痛，只用生五靈脂為細末，每服一錢，酒一盞煎，沖熱服。

夫婦人血氣心腹疼痛方論第十九 [illegible]

婦人血氣心腹疼痛者，由臟腑虛弱，風邪乘於其間，與真氣相擊而痛。其痛隨氣上下，或上衝於心，或下攻於腹，故云血氣攻心腹疼痛也。

治婦人血氣攻心腹疼痛。[illegible]

延胡索 當歸 川芎 桂心 各等分
木香 枳殼 赤芍藥 桃仁 各半兩
熟地黃 [illegible]

右㕮咀，每服參錢，水一盞，薑三片，煎至七分，去滓熱服。

治婦人血氣攻心腹煩燥，悶亂疼痛不止。[illegible]

琥珀 沒藥 當歸 赤芍藥
牡丹皮 延胡索 蒲黃 蓬莪茂
桂心 [illegible]

右為末，每服壹錢，溫酒調下。[illegible]

[illegible] 治一切血氣臍腹撮痛，及產後惡露不行，兒枕塊痛。

血竭 沒藥 桂心 當歸
蒲黃 紅花 木香 延胡索
乾漆 赤芍藥 各等分

右為細末，每服二錢，熱酒調下，食前服。

治血瘕衝心，叫喚，其痛不可忍，若如喫不得，可灌下。

右用真 [illegible] 三錢，熱酒調服立止。

[illegible]金散 治婦人血氣心痛，月經不行，預先嘔吐疼痛及月信不通。

片子薑黃(壹兩) 牡丹皮 莪茂 紅花
當歸 赤芍藥 川芎 桂心
延胡索(各兩半)
右爲末每服貳錢水壹盞酒少一分煎七分溫服日叁次
[illegible] 治血氣心腹疼痛立驗
當歸 厚朴 芍藥 枳殼(麩炒)
人參(各半兩) 甘草 茯苓(各一分) 肉豆蔻(貳分)
右爲末水貳升煎取捌合空心分叁服
[illegible] 治婦人血氣心腹疼痛立驗 [illegible]方
檳榔(貳枚) 當歸 [illegible]
右同研令勻每服壹錢溫酒調下
[illegible] 治婦人血刺痛不可忍者 [illegible]方
[illegible]
三稜 [illegible] 巴豆 [illegible]
右叁味以[illegible]醋壹碗熬醋成膏為度先將[illegible]固濟一罐
子陰乾後將藥并醋膏一處置罐子中外用泥封以平
瓦子一片蓋之用炭火五七斤煅常看守纔煙出
即取出看通黑則止不得燒過了便入乳缽內細研為
末有患者炒生薑酒調一錢服
治婦人血氣[illegible] [illegible]方
大生烏頭([illegible]) 牡丹皮 桂心(各[illegible]兩)
右為細末每服壹錢酒半盞童子小便半盞煎至柒分
溫服如婦人血瘕血氣胎血積聚上衝心膈須臾欲絕
者用酒壹盞生薑壹片煎[illegible]柒分去滓通口服
[illegible] 治婦人心腹[illegible]痛氣急氣悶

月信不調等疾 [illegible]方
烏藥 莪茂(各貳兩) 當歸(壹兩)
右並生為細末溫酒調貳錢服服後以食壓之忌生冷
油膩等物如是産後諸疾炒生薑酒調下
治血氣不調臍下痛
桑耳 [illegible] 桂心 土瓜根
川芎(各半兩) 甘草(貳分) 牛膝 赤茯苓(各半兩)
大黃 白芍藥(各一兩) 乾地黃([illegible]分)
右為末煉蜜元如梧桐子大醋湯吞下貳拾元
[illegible] 治婦人血氣刺痛
荔枝核(燒存性半兩) 香附子(壹兩[illegible])
右為細末鹽湯米飲調下貳錢不拘時候服
[illegible]
[illegible] 治婦人血氣疼痛不可忍者 [illegible]方
紅花 沒藥 當歸 延胡索(炒)
右等分為末每服貳錢童子小便酒各半盞同煎至六
分熱服只用秤錘淬酒調亦可常服只用溫酒
[illegible] 治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛不思飲食
[illegible]方
牡丹皮 桂心 當歸 延胡索([illegible])
莪茂 牛膝 赤芍藥([illegible]) 荊三稜([illegible]兩)
右為粗末每服叁錢水壹盞酒半盞煎[illegible]分溫服
[illegible] 治婦人血氣産前産後百疾[illegible]
當歸 芍藥 乾薑 莪茂
桂心 地黃 蒲黃([illegible]) 黑豆([illegible])

右為細末，空心熱酒調下貳錢。

【失笑散】（方見二十卷第七論）【[illegible]白散】（方見第十卷第十論）【琥珀散】（方見第十卷）

治婦人心腹刺痛，以蔥湯化下；氣湯加延胡索少許，同煎服。若胸膈不快，惡心，更用服烏沉湯，兼治月水不調，或前或後。

【菖蒲元】治婦人脾血積氣及心脾疼，男子大[illegible]亦治

菖蒲（節密者）　吳茱萸（去枝）　香附子（炒去毛，各等分）

右叁味並剉細，以釅醋伍升煮乾，焙乾為細末，以好神麴打糊為元，如梧桐子大，空心食前以淡薑湯吞下四五十元，日三服，橘皮湯亦好。

治婦人血氣走作疼痛不可忍者，及月水不調，面色痿黃，嘔食減少，及產後諸疾，並皆治之。【延胡索散】

延胡索　三稜（生）　當歸（酒浸）　莪朮（醋浸）

右為末，每服貳錢，空心溫酒調下。如血氣發甚者，及月水不調，並皆童子小便、酒、紅花同煎調下。

治婦人久積血氣，時發刺痛，肌瘦乏力，月候不調。【當歸元】

當歸（酒浸）　檳榔　赤芍藥　牡丹皮　延胡索（各等分）

右除當歸末，用米醋熬成膏，入眾藥末和，負如梧桐子大，空心溫酒下貳拾元，午食前再服。

治婦人積年血氣攻刺，心腹疼痛不可忍者，及多方醫療未差，宜服【神仙北亭元】　靈苑方

北亭（去砂石）　沒藥　木香　當歸（各壹分）

芫花　莪朮（各半兩）　巴豆（去皮膜心，研如泥）

右先研北亭、沒藥、巴豆如粉，用好米醋貳升同煎為膏，膏熟後將餘藥末入膏內搜合成塊，用新瓦合盛之，臨時加減元數，用酒醋各半錢煎數沸，通口服，不得嚼破，仍須與盡酒醋。男子元氣亦依前方服。食如急喉閉，苦男女以壹元綿中噙之立愈。方中云臨時加減，負數皆不云大小數目，試之古人亦嘗加減。既有北亭、芫花、巴豆，合宜負如綠豆大，每服只伍元。

治產前產後血氣不和，及一切疾。【當歸散】

當歸（去蘆）　川芎（各壹兩）　赤芍藥（貳兩）　莪朮（壹兩半）

右為末，每服貳錢，空心溫酒調下。如腰腹痛，加陳皮去白半兩，乾薑半兩，為末，同和停。如不喫酒，以水壹錢煎至柒分溫服。

婦人小腹疼痛方論第十六　凡四方

夫婦人小腹疼痛者，此由胞絡之間夙有風冷，搏於血氣，停結小腹，因風冷發動，與血相擊，故痛也。

治婦人久冷氣滯，血刺小腹疼痛。【[illegible]散】

威靈仙　當歸　沒藥　木香　桂心（各半兩）

右為細末，無時熱酒調下壹錢，服忌茶。

治婦人久積血氣，㽲刺，小腹疼痛，四肢無力，不能飲食，宜【當歸散】

當歸（炒）　赤芍藥　劉寄奴　沒藥　枳殼　延胡索（等分）

右為細末，熱酒調下壹錢，無時候。

芸薹元 治婦人血刺小腹疼痛不可忍 聖惠方

芸薹子 微炒 桂心 各壹兩 良薑 半兩

右為細末醋糊元如梧桐子大每服伍員無時淡醋湯下常服補血虛破氣塊甚有効

石灰散 治婦人血氣痛不可忍者陳五娘子方 出婦人方

右取猪肚脅血半錢於湯上煖用秋子攪停後用石灰於火上燒令黃為末羅過入灰壹錢同血攪停放溫服

婦人兩脇脹痛方論第十七 凡六方

夫婦人兩脇脹痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷之氣客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏壅塞不宣邪正交爭衝擊故令兩脇脹痛也

治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛 **草豆蔻散**方

草豆蔻 訶子肉 各壹兩 桂心 苦梗

厚朴 各叁分 甘草 壹分 川芎 當歸

乾薑 檳榔 各半兩

右為粗末每服肆錢水壹盞煎柒分去滓熱服食前

治婦人臟腑虛冷宿冷氣攻兩脇脹痛坐卧不安 **訶子散**

菴閭子 延胡索 桃仁 桂心

琥珀 當歸 各壹兩 赤芍藥 木香

沒藥 各半兩

右為末每服貳錢溫酒調下無時候

[illegible]紫金元 治婦人榮衛不和心腹刺痛胸膈脹滿不進飲食 出陳無擇方

紫金皮 蒼朮 石菖蒲 各壹兩 香附子 貳兩

人參 半兩 木香 叁錢

右為末米糊和員如梧桐子大每服叁拾員食後溫湯下

[illegible]元 治久積氣痞塞利滯氣寬胸膈止刺痛

木香 青皮 去白 大黃 炮 檳榔 各壹兩

黑牽牛 生 [illegible]

右為末煉蜜元如梧桐子大溫水下叁拾元 [illegible]

[illegible]

論脇肋疼痛服 **木通散** [illegible]

心下脇肋少腹疼痛皆寒有積與寒而然煨湯[illegible]亦可主治甚者以溫藥下之心下與小腹痛諸書並有効方而脇肋下痛鮮[illegible]治法此 [illegible]

木通散 治脇肋苦痛偏効併心下脇肋并小腹牽引痛者皆主之

木通 去皮節 青皮 去白 川楝子 [illegible]

巴豆 [illegible] 蘿蔔子 炒 舶上茴香 [illegible] 莪茂

巴豆不用

木香　滑石各半兩

右為細末，煎葱白酒調三錢，食前服。甚者不過再服。

三脘散 治中焦虛痞，兩脇氣痛，面目手足浮腫，大便秘澀。兼治脚氣。

大腹皮　紫蘇　沉香　乾木瓜

獨活　白术　川芎　木香

甘草　陳皮　檳榔各等分

右㕮咀，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓，空心熱服，日[illegible]

中脘[illegible]

婦人心腹脹滿方論第十八　凡三方

夫婦人心腹脹滿者，由臟腑久冷，氣血虛損，而邪冷之氣客之[illegible]乘於心脾故也。足太陰脾之經也，脾虛則[illegible]。足少陰腎之經也，其脈起於小指之下，斜趨足心，入跟中，上股內後廉，[illegible]貫脊，屬腎絡膀胱；其直者，從腎上貫肝膈，入肺中；其支者，從肺出絡於[illegible]六藏虛，邪氣客於二經，與正氣相搏，積在內，氣并於脾，脾虛則脹，故令心腹煩滿而脹也。診其脈遲而滑者，脹滿[illegible]

白术散 治婦人脾胃氣虛，心腹脹滿，不欲飲食，四肢少力。

白术　草果仁　訶子肉　赤茯苓

檳榔　桂心各半兩　陳皮　厚朴

人參各壹兩　甘草壹分

右為粗末，每服肆錢，薑三片，棗一枚，煎至柒分，去滓，食前熱服。

檳榔散 治婦人脾胃虛冷，心腹脹滿，不欲飲食。

檳榔　前胡　川芎　青皮各[illegible]

赤芍藥　桂心　大黃　苦梗

木香　枳殼各半兩　甘草[illegible]

右為㕮咀，每服肆錢，薑三片，煎至七分，去滓，溫服，無時。

[illegible]

治婦人脾胃虛冷，心腹脹滿，不欲飲食。**木香散**

木香　桂心　白术　乾薑炮

陳皮去白　草果仁　訶梨勒　人參各壹兩

[illegible]　甘草[illegible]

右為細末，每服三錢，如茶點熱服。

婦人大全良方卷之七

新編婦人大全良方卷之八

婦人淋瀝小便不通方論第一　凡十一方

夫婦人淋者由腎虛而膀胱熱也膀胱與腎爲表裏俱主於水行於脬者爲小便也臟腑不調爲邪所乘腎虛則小便數膀胱熱則小便澁其狀小便疼痛澁數淋瀝不宣故謂之淋也[illegible]

治婦人五淋木通散

木通　榆白皮　瞿麥穗　大麻仁

滑石各壹兩　貝齒　葵子　白茅根各貳兩

甘草半兩

右爲粗末每服伍錢水煎空心温服

治婦人小便卒淋澀石韋散[illegible]

石韋　黃芩　木通　榆白皮

葵子　瞿麥穗　甘草

右等分爲粗末每服半兩水盞半薑參片煎柒分去滓熱服

治婦人氣淋勞淋桃膠散

桃膠　榆白皮各[illegible]　車前子　冬瓜子

鱉魚齒　葵子　瞿麥　木通各半兩

枳殼壹分

右㕮咀每服肆錢重水壹盞煎至柒分去滓温服

治淋金沙散

海金沙草陰乾爲末煎生甘草湯調貳錢甚若不過參肆服

又方

貝琥珀研細不以多少研[illegible]香白酒調下[illegible]

治婦人血淋雞蘇散

雞蘇葉　木通各貳兩　生乾地黃　滑石各參兩

刺薊根壹兩

右爲粗末每服半兩水壹盞半竹葉參七片煎至柒分去滓食前温服

治婦人血淋及尿血澁痛

生乾地黃[illegible]　蒲黃各[illegible]

右爲細末每服貳錢車前子葉煎湯調下日參服以利爲度

亦有血瘀似淋小便不通臍腹脹痛[illegible]

方見血瘕[illegible]

後行消散及方治臍轉不得小便亦可治血淋尿血亦好

火府丹　治心經熱小便澁及治五淋[illegible]　本事方

生地黃貳兩　木通　黃芩各壹兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大木通煎湯下參拾丸

此藥治淋瀝臍下滿痛[illegible]

治婦人諸般淋

苦杖根俗呼爲杜牛膝多取淨洗碎之以壹合用水伍盞煎[illegible]去滓用麝香少許調下[illegible]

[illegible]

婦人脬轉不得小便方論第二　凡十方

夫婦人脬轉之病者由脬為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於脬屈辟不得充張外水應入不得入內溲應出不得出內外壅滿脹不通故為脬轉其狀少腹急痛不得小便甚者至死不可治也

[illegible]治婦人脬轉不得小便

滑石散 治婦人因夫脬轉小便數日不通　千金翼

滑石[illegible]　寒水石[illegible]　葵子[illegible]

右為末以水壹斗煮取伍升時時服壹升即利

又方

亂髮燒灰　葵子　車前子

右等分為細末每服貳錢茶湯調下

蒲黃散 治婦人脬轉小便不通亦可治男子

[illegible]　滑石研各等分

右研停葱湯調貳錢服

[illegible]治脬轉小便不通出指迷方前同

白礬[illegible]　車前子

右等分為細末每服五錢水貳盞煎至壹盞去滓服

治婦人忽小便不得[illegible]脬轉經四五日困篤欲死方

滑石貳兩　亂髮灰[illegible]

右研停取桃白皮壹斤熟搗以水叁盞絞取汁無時溫半盞調貳錢服

又方　以滑石末葱湯調下貳錢服

千金翼治婦人不得小便

杏仁[illegible]

右壹味麩炒黃為細末水調服立通

又方

紫草為末井華水調服叁指撮立通又云紫苑皆可用

若卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲死此由暴氣乘并膀胱或從憂驚氣無所伸鬱閉而不流氣衝脬系不正

診其脉[illegible]

橘皮[illegible]　葵子[illegible]

右㕮咀水伍升煮取貳升分叁服出指迷方

婦人小便數方論第三　凡二方

夫婦人小便數者由腎與膀胱俱虛[illegible]於水腎氣通於陰此二經俱虛而有熱乘之則小便澀虛則小便數也

治婦人久虛冷小便日夜三五十行[illegible]

鹿茸[illegible]　烏賊骨　桑寄生　龍骨[illegible]

白芍藥　當歸　附子[illegible]　桑螵蛸[illegible]

右為細末食前溫酒調下貳錢

治婦人虛冷小便數[illegible]

桑螵蛸[illegible]　[illegible]

黃芪[illegible]　牡蠣粉　甘草[illegible]

右為細末食前[illegible]調貳錢服

遺尿失禁方論第四　凡七方

經云膀胱不利為癃不約為遺尿者乃心腎之氣傳送失

度之所為也故有小便澁而遺者有失禁而出不自知者
又婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時又有脬寒臟
冷而遺尿不禁治之各有方
治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁[illegible]
鹿茸　椒紅　桂心　附子
牡蠣　補骨脂　石斛　茯苓
雞膍胵　肉蓯蓉酒浸焙乾　桑螵蛸各等分
右為細末酒煑麪糊丸梧桐子大空心温酒下叁拾丸
又方　以鹿角骨炒令黃為細末空心入温酒調貳錢
又方　雞膍胵炙為末空心酒調貳錢
治婦人遺尿不知出時出千金翼
白薇　白芍藥等分
右為末酒服方寸匕日叁服空心
[illegible]
又方　桑螵蛸酒炒為細末每服貳錢生薑湯調下
又方
白礬　牡蠣等分
右為細末飲服方寸匕亦治丈夫遺尿
療婦人小便不禁　以雞膍胵燒灰為末酒服方寸匕
婦人小便出血方論第五　凡九方
夫婦人小便出血者由心主於血血之行身通遍經絡循
環臟腑血性得寒則凝澁得熱則流散失其常經溢滲入
於脬內故小便出血也
治婦人勞傷於熱致小便血[illegible]
[illegible]

[illegible]
治婦人勞損虛羸尿血[illegible]
[illegible]汁　當歸　熟地黃　葵子
蒲黃　續斷等分
右為細末酒調貳錢日叁服
[illegible]治小便尿血或先尿而後血或先血而後尿亦遠
近之謂也又治飲食忽小便或走馬房勞皆致脬轉臍下
急痛不通兼治肺疽心衄內崩吐血一兩口或舌上血出
如針孔或舌衄吹內立已
[illegible]
右實味則貳錢以米飲貳合湯少許調服并華水調亦
[illegible]
[illegible]即炒黑[illegible]其上則通
治婦人勞血不止[illegible]
生乾地黃　柏葉　黃芩各半兩　阿膠[illegible]
右為粗末每服叁錢水壹盞薑叁片煎柒分去滓溫服
又方
羚羊角屑　龍骨　當歸　蒲黃各壹兩
生地黃貳兩
右為細末粥飲調下貳錢食前服
治婦人小便出血或時尿血[illegible]
當歸　羚羊角屑　赤芍藥各半兩　生地黃壹兩
刺薊葉叁分
右為粗末每服叁錢水煎去滓服

又方　以生地黃擣取汁，每服壹小盞，日叁服

又方　以蒲黃末，酒調貳錢服之，水調亦可

又方　鹿角膠叁兩，炙令黃，以水壹大盞煎至半盞，去滓，分為叁服，食前服

婦人大便不通方論第六　凡八方

夫婦人大便不通者，由五臟不調，冷熱之氣結於腸胃，則津液燥竭，大腸壅澀，故大便不通也。仲景云：婦人經水過多，則亡津液，亦大便難也。

局方四物湯，加青皮煎服

大三脘散 [illegible]

七宣圓　麻仁圓 [illegible]

治婦人大便不通 [illegible]

木香 [illegible]　郁李仁 [illegible]　青皮 [illegible]　木通

[illegible]　桂心 [illegible]　黑牽牛 [illegible]

右為細末，每服貳錢，如煎茶 [illegible] 溫，空心服

[illegible]

治婦人大便不通 [illegible]

大黃　芒硝　檳榔　桃花

郁李仁 [illegible]　木香 [illegible]

右為細末，空心粥飲調下貳錢

治婦人大便不通，心腹虛脹 [illegible]

黑牽牛 [illegible]　青皮 [illegible]　木香 [illegible]

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，空心溫水下貳拾圓

治婦人腸胃風結，大便常祕 [illegible]

大麻仁 [illegible]　[illegible]　人參 [illegible]　檳榔

木香　枳殼 [illegible]

右為細末，與麻仁研停，煉蜜圓如梧桐子大，空心溫水下貳拾圓

論曰：婦人虛人風人大便祕，不可用駃藥

初虞世云：今歷觀古人用通藥，率用降氣等藥，蓋肺氣不下降，則大腸不能傳送，以杏仁、枳殼、訶子等藥是也。又老人、虛人、風人津液少，大便祕，經云：澀者滑之。故用胡麻、杏仁、麻子仁、阿膠之類是也。今人學不師古，[illegible]，每至大便祕燥，即以駃藥蕩滌之，既走津液氣血，大便隨手愈更祕澀，兼生它病。予昔在曹山日，有一譚少[illegible]，鎮府寄居王世安小府，全京師人，始病風，[illegible]，為此生以駃藥累累利之，後為肺[illegible]，大便不通而死。古人服藥尤所謹重，不若今人之輕生，故聚此以戒後人

治風人腸間或祕或利方論第七　凡四方

經云：春傷於風，夏必飧泄。蓋木氣剋土，土不能滲泄，則木氣勝，故世風氣行，津液燥，故祕，即不可專以祕藥為風也。余家中宗親張公度，母氏年七十日下利數十行，百方治之不愈，又苦腫脚拘攣，公度以[illegible]治拘攣而利愈。[illegible]母安康郡太君苦祕結，以公度藥[illegible]而大便利，故知祕與利皆出於風。公度濟人，名聞一世，[illegible]承父醫學，而克其家，清約不妄取，真有德君子，今見於此

治風人腳氣人大便或祕或利，虛人尤宜方

皂莢子 [illegible]

右煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓煎淡漿酸棗仁湯
下空腹服兩時久未利再進一服漸加至伍圓不妨以
通為度

罌粟膏方

罌粟不以多少炒至赤黑色日內以木棒研碎去粗揀擇淨
每罌粟叁兩以酸棗仁[illegible]兩炒令香同研為細末馬尾
羅篩每服叁錢水一盞煎至六分去滓溫服下[illegible]

大五柔圓 治臟氣不調大便難通榮衛利九竅進飲食方

大黃 [illegible] 枳殼 [illegible] 白芍藥 葶藶 [illegible]
牛脂 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible]
桃仁 [illegible] 杏仁 [illegible]

右除有油藥外並為末煉蜜圓入牛脂桃杏仁研杵數
千下圓如梧桐子大米飲下叁拾圓日叁服後稍稍加[illegible]服
未知稍增以知為度

安康郡太守苦風秘[illegible]只可三七圓

杏仁 [illegible] 麻仁 [illegible] 枳殼 [illegible] 訶子 [illegible]

右貳物各當兩爲細末同貳斤杵煉蜜和圓如梧桐子
大溫水下貳叁拾圓未知稍增[illegible]

[illegible]

蜜兌法

好蜜四五兩銀石器中微火熬不住手以匙攪候可圓
見風硬即以蛤粉塗手捏作人指狀長三寸許坐剩上
內之以手掩定候大便通如放手未快再作[illegible]

婦人泄瀉方論第八　凡八方

三因論曰夫婦人泄瀉者經中所謂洞泄飧泄溏泄濡泄
胃泄脾泄大腸泄大瘕泄小腸泄水穀注下其實一也原
疾之由皆因腸胃虛冷而致[illegible]氣虛之經云寒甚則泄春傷
於風夏必飧泄[illegible]此得於外也喜怒憂思恐致使臟氣
隔絕精神奪散以致溏泄此屬內也如飲食生冷食傷脾
胃而泄者屬不內外也寒者溫之熱者涼之滑者澀之濕
者燥之治利之法無以過也

溫脾圓 治脾胃虛冷泄瀉注下無度脾虛氣閉不進飲食

大[illegible] 北茴香 白朮 陳皮 [illegible]
訶子 赤石脂各[illegible]兩

右為細末麵糊圓如梧桐子大空心米飲下伍拾圓如
常服暖脾胃

陰陽圓 治臟腑虛寒為風濕冷所搏冷滑注下不禁老人虛
人危篤累效

附子 肉豆蔻 白茯苓 桂心
木香 乾薑 丁香

右為細末米糊圓如梧桐子大空心米飲下伍拾圓

豆蔻分氣飲 治臟腑虛寒泄瀉無度瘦極及婦人產後
洞泄危篤者

藿香葉 草豆蔻 青橘皮 甘草

丁香（兩） 烏梅（肉） 肉豆蔻（麵裹煨）
右㕮咀每服肆錢水貳盞糯米壹撮煎至分去滓溫服
五香散 治飲食傷脾泄瀉不止腹刺痛及婦人產前產後
腹痛血氣等疾用溫酒下產後敗血衝心用敗蒲煎湯下
安胎以糯米飲調下婦脾泄瀉痢煎陳米飲調下食前
烏藥 白芷（炒） 枳殼 白朮（炒）
良薑（炒） 甘草 莪朮（各等分）
右等分為細末每服貳錢溫酒調下
豆蔻圓 治臟寒泄瀉不止服諸藥無効[illegible]
肉豆蔻麵裹煨不以多少碾細入陳米白麵攪令得所員
如綠豆大空心煮粟米飲吞下百員全家累以此藥救
人有効
治夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止[illegible]
五苓散 平胃散（各等分）
右合和姜棗煎空心服妙 陳日華方
人參豆蔻散 治久瀉不止服諸藥無効者宜試之有効
人參 肉豆蔻 乾薑 厚朴
甘草 陳橘皮（各一兩） 川芎 桂心
訶子 北茴香（各半兩）
右為細末每服叁錢水壹盞姜叁片棗壹枚煎至陸
分服 不拘時 道人
木香散 治臟腑冷極及久冷傷憊口瘡下泄米穀不化飲
食無味肌肉瘦悴心多嗔恚婦人產後虛冷下泄及一切
水瀉冷痢

木香 破故紙（炒） 良薑 縮砂仁
厚朴（製） 赤芍藥 橘紅 桂心
白朮（各半兩） 胡椒 吳茱萸（各一分）
肉豆蔻 檳榔
右為散每服叁錢用不經水猪肝肆兩許去筋膜批為
薄片重重摻藥置一鼎中入漿水壹碗醋壹茶腳許蓋
覆煮肝熟入鹽壹錢葱白叁莖細切生薑彈子許拍破
同煮水欲盡空心為壹服冷食之初服微瀉不妨亦是
逐下冷氣少時自止經年冷痢滑瀉只是壹服渴即飲
粥湯忌生冷油膩物如不能食冷物即添少漿暖服○
嘉興謝醫得此方恐其[illegible]只用漿水煮猪肝員如梧桐
子大[illegible]每服伍拾員其効亦若暴瀉痢只是壹服唯熱
[illegible]

論熱痢下利方論第九 凡三方
論曰若下利清水其色赤黃或米穀不化但欲飲冷時時
嘔逆小便不利得熱則極心胸煩躁脈虛大而數此由乘
虛熱入於胃湊滲下焦津液不分併於大腸謂之協熱下
利先用五苓散利小便次以玉粉丹四味阿膠員
玉粉丹

蛤粉　硫黃等分

右同研細，白麵糊和丸如梧桐子大，飲下伍拾丸。

黃連　赤茯苓　芍藥各壹兩　阿膠炒壹兩

右除將膠三味為末，却以好醋熬阿膠成稀膏，丸如梧桐子大，飲下伍拾丸。

滯下方論第十　凡十三方

夫赤白痢疾，昔古人名之滯下是也。究疾之原，皆因外感五邪之氣，內傷生硬冷熱之食，其證不一，有赤有白有赤白相雜，有冷有熱，有虛有實，大抵以時皆以胃氣為本。未有不因外感寒暑燥濕風之氣而傷於脾胃，脾胃既虛而又內傷飲食，飲食不能克化，致令積滯而成滯下。古人云無積不成痢，若此也。經云：春傷於風，夏生飧泄。蓋風喜傷肝，然春時肝木正旺而不受邪，反移氣克於脾土，然脾既受克，又不能忌慎口腹，恣食生冷粘硬之物，致令脾胃不能克化，因此積滯。又夏秋之間，再感暑濕風冷之氣，發動而成痢也。其證必先腹臍疞痛，洞泄水瀉，裏急後重，或有或無，或赤或白，或赤白相雜，日夜無度。如有此證，不問冷熱虛實，但當先服神朮散，可以發散風冷寒濕之氣，次服五苓散，分利水穀，兼用加巴感應丸溫脾胃，去積滯。或六神丸未有不安者也。或曰雖古人有言無積不成痢，亦不專以去積為先，豈有一歲之內，獨於夏秋之間人皆有積而春冬無之？蓋風邪入胃，木來勝土，不為暴下則為痢疾，其神朮散要藥也。又有一方一郡之內，上下傳染，疾狀相似，或只有一家長幼皆然，或上下鄰里相傳染，或有病同而證異，亦有證異而治同，或用溫藥而安，或用涼藥而愈，有如此等，是毒疫痢也。治疫毒痢者，雖當察五運六氣之相勝，亦不可拘泥，此說且如運氣相勝，豈獨偏於一方一郡而獨於一家？一家之中，如有此證，當先察其虛實冷熱，首以敗毒散多加人參甘草陳米薑棗煎服，及三黃熟艾湯、黃連阿膠丸、五苓散、駐車丸，可選而用之。如下痢赤多，或純下鮮血，裏急後重，大便不通，身體壯熱，手足心熱，大煩躁渴，腹臍脹痛，小便赤澀，六脉洪大，或緊而數，或沉而實，此熱痢也，宜白頭翁湯及三黃熟艾湯、五苓散，可選而用之。若風痢下血太過，宜用胃風湯加木香、黑豆煎服。若夏秋之間，下痢或赤或白，或赤白相雜，臍腹疞痛，裏急後重，增寒發熱，心煩，胸膈燥渴引飲，嘔逆惡心，小便不利，五心煩熱，六脉虛弱，此等脉證，正因伏暑而得此疾，宜服香薷散加黃連、甘草、當歸，酒水濃煎，沉令水冷頓服，仍兼服酒蒸黃連丸，或小柴胡湯加人參煎服，必愈。[illegible]如然證一退而痢尚未止，則以四物湯加膠艾煎服，以調陰陽，未有不安者也。如水穀不分，小便不利，宜用五苓散、淡竹葉煎湯調服，如煩渴甚者，亦宜服之。若不明伏暑之證，但以脉虛而妄投硫附等桂丹石之藥，而殺之源，可不慎哉。若下痢純白，狀如魚腦，臍腹冷痛，日夜無度，手足逆冷，或有嘔逆，全不入食，飲食欲溫而惡冷，六脉微細，此由臟腑虛冷之極，宜木香散加服四味理中湯及鍾乳健脾丸，甚者四肢逆冷，六脉沉絕，宜

一味峻補兼灸氣海丹田二穴更以助胃之藥此守而不攻之意也宜四順附子湯三建丹白丹加味參附湯附湯皆可選用如年尊虛弱之人或素來禀受怯弱亦宜以此法詳酌調理然亦宜開胃進食使食可得入則脾胃運化精粹便成糟粕既成脂膩血澀滯不患其不除矣如久痢不差腸滑不禁溏泄不止謂無攻方可施之證腸止痢之劑則必先以龍骨肉豆蔻訶子鍾乳胡粉之藥近人多用罌粟殼地榆之屬然此物性太緊澀能損胃氣如少壯之人壯健者服之則參苓功效若是衰老嬰幼受濕之證及產孕之人或虛損怯弱脈微者則不免其大害若以固秘澀爲先則風寒暑濕之邪非惟遂而不去而胃管閉而不通禁口不食已見厥逆糟粕不入腸中所患無由可除矣若有七證宜以參苓白术散四君子湯及以石蓮山藥之劑治之必兼治利欲投補藥必須有溫通之意在焉如四君子湯理中湯十全湯加木香白豆蔻肉桂官桂厚朴之屬可以散風邪可以分水道可以開胃管可以治纏綿可以通秘澀此攻守之意兩全也大抵治痢之法虛者補之實者瀉之滑者澀之閉者通之有積者推之風則散之暑則滌之濕則燥之熱則清之冷則溫之冷熱者調之以平爲期不可以過此爲大法樂憲老人序

白頭翁湯 治熱痢下血連月不差

白頭翁貳兩　黃連　黃蘗皮　秦皮各參兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓無時溫服

神术散 治春傷於風夏生飧泄大治傷風頭痛項背拘急鼻流清涕

蒼术貳兩　藁本　川芎各壹兩　羌活肆兩

甘草炙壹兩　細辛去葉壹兩

右爲粗末每服參錢水壹盞薑參片煎至柒分要出汗加葱白煎稍熱服無時候

治赤白痢 **六神丸**

神麯炒　麥芽炒　茯苓

木香　黃連　枳殼

右爲末用神麯末作糊爲丸如梧桐子大每服伍拾丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢乾薑甘草湯下

[illegible]

三黃熟艾湯 治傷寒四五日大下熱痢時作諸藥多不止宜服此湯除熱止痢亦治人作實子熱不食下痢亦治時行毒痢良驗

黃芩　黃連　黃蘗各參分　熟艾半雞子大

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓溫服無時

四順附子湯

生附子去皮臍　白薑炮　甘草　人參各壹兩

右㕮咀每服肆錢重水貳盞煎至柒分去滓空心服吐瀉腹痛加桂半兩小便不利者加茯苓半兩大凡痢疾雖解其手足逆冷冷汗自出六脈沉伏不宜輕用附子多因伏暑而得此疾亦有冷汗自出四肢逆冷六脈虛弱但背寒面垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴引飲此伏

之證若手足和暖則為陽只須服五苓散用粟米飲調下
次服感應圓貳拾粒即愈若還手足厥冷則為陰當服暖
藥如已寒圓附子之類如此治痢無不効此方親曾用有
効有人夏月患痢一日六七十行用五苓散兩服止

酒蒸黃連圓 [illegible]　薑附湯

小柴胡湯　參苓白朮散　香薷散

敗毒散　理中圓　四君子湯

黃連阿膠圓　[illegible]建理圓　駐車圓

感應圓 [illegible]

胃風湯　四物湯　玉華白丹

十全大補湯　斗門散　五苓散

真人養臟湯　水煮木香圓　大巳寒圓

已上諸方並出官局不復重錄

如斗門散　養臟湯　水煮木香圓　參香散　豆蔻餅
其中皆使罌粟殼然此藥大能壞脾胃古方不用如
脾胃壯健之人服者多有良驗姑存于后

罌粟湯 治男子婦人小兒陰陽不和冷熱相搏積而成痢
或赤或白或赤白相雜日夜無度裏急後重臍腹疞痛甚
不可忍又治水瀉不止腸鳴腹痛或熱毒中傷或寒食久
積並宜治之

罌粟殼 [illegible]　陳皮去白　粉草炙各　厚朴半兩
青皮　白薑各等分

右為末每服貳錢赤痢甘草湯調白痢陳米飲調赤白
相雜紫蘇湯調如冷瀉陳米飲調熱瀉新井水調空心
服此藥正脾去積和氣理中忌生冷肥膩油麪醃藏

[illegible] 治赤白痢臍腹刺痛久而不愈大治冷痢

罌粟殼 [illegible]　白芍藥　黃耆 [illegible]　陳皮
青皮　木香　訶子　肉豆蔻
人參各 [illegible]　羌活　當歸各 [illegible]

右為末[illegible]如彈子大每服貳圓水壹小琖煎至柒
分溫服 [illegible]

[illegible]

葛根　黃芩　芍藥　桔梗
藁本　赤茯苓　白朮　甘草 [illegible]

右㕮咀每服叁錢水壹琖煎至柒分去滓溫服移時再
服 [illegible]

痢後嘔噦方論第十一　凡七方

凡患下痢之稍久方欲愈之時多有咳逆及嘔逆之證然
咳逆者古人所謂噦是也噦者胃寒所生此證最危其它
病亦惡咳逆如見此證宜用橘皮乾薑湯半夏生薑湯丁
香柿蒂湯若陽證咳逆者小柴胡湯橘皮竹茹湯。僕嘗
治一痢疾咳逆不止六脈沉弱諸醫用藥灼艾皆無效僕
投退陰散兩服愈。又嘗治許主簿痢疾愈後咳逆不止

服諸藥無效遂灸期門穴不叅壯而愈[illegible]

嘔逆之證雖經云無陰則嘔然多有胃熱而嘔亦有胃寒而生亦有暑毒而生如胃熱而嘔宜服小柴胡湯孫兆竹茹湯葛根湯官局桔梗湯竹葉石膏湯加生薑主之嘔而發渴者豬苓湯○僕嘗治一痢後嘔不止六脉虛弱此胃寒而嘔又以暑毒凝於胃脘投局方香薷飲愈

橘皮乾薑湯 治噦

橘皮 通草 乾薑 桂心

甘草各貳兩 人參壹兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓溫服

半夏生薑湯 治噦欲死

半夏[illegible] 生薑[illegible]

右以水貳[illegible]煎至[illegible]分去滓分為貳服

丁香柿蒂湯 治噦逆

丁香拾粒 柿蒂拾伍箇

右㕮咀用水壹盞半煎至捌分去滓熱服

橘皮竹茹湯 治噦逆

橘皮貳兩 竹茹壹升 甘草[illegible] 人參半兩

半夏[illegible]

右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑陸片棗壹枚煎至柒分

去滓溫服

乾薑橘皮湯 治乾嘔噦若手足厥冷者

橘皮肆兩 生薑半斤

右㕮咀每服半兩水壹盞煎至柒分去滓溫服

退陰散 治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰重連進叅服小小傷冷每服壹字入正元散內同煎入鹽少許陰毒傷寒咳逆煎壹服細細熱呷便止

乾薑 川烏

右等分為粗末炒令黃色候冷搗為末每服壹錢水壹盞鹽壹捻煎[illegible]溫服

猪苓湯 治嘔而渴心煩不得眠

猪苓 赤茯苓 澤瀉 阿膠炒

滑石各壹兩

右㕮咀每服叅錢水壹盞[illegible]煎[illegible]去滓下膠消盡服

孫兆竹茹湯[illegible] 葛根湯[illegible] 小柴胡湯

官局桔梗湯 竹葉石膏湯 香薷飲[illegible]

[illegible]

婦人大便下血方論第十二 凡八方

夫婦人藏腑損傷風[illegible]邪氣在內令人下血風在內而小便血[illegible]或如豆汁腹[illegible]痛若每後下血[illegible]來遠蓋[illegible]有血[illegible]來近[illegible]近若[illegible]病在[illegible]下也[illegible]無血[illegible]時[illegible]脉[illegible]按之[illegible]

治婦人腸風大便後時時下血宜服[illegible]

[illegible] 枳殼[illegible]

右㕮咀每服叅錢水壹盞煎至柒分去滓空心服

治腸風下血

赤芍藥 當歸[illegible]

右為末溫酒調下貳錢

又方

扣殼[illegible]
服貳拾粒空心米飲下[illegible]肉為丸如梧桐子大
治痢久不安下血成片
頭髮[illegible]洗淨炒研 每服貳錢新汲水調下[illegible]
毒以溫淨服空心
木香散 治腸風瀉痢 [illegible]四方出[illegible]婦人方
[illegible] 荊芥穗 川烏(炮去皮臍)
右為末糊丸如梧桐子大每服貳拾丸[illegible]
粟米飲湯吞下忌[illegible]血[illegible]同合[illegible]服有効
又方
荊芥穗 黃芩 熟地黃 當歸
[illegible]
桑白皮 地榆 樗白皮 皂角刺
乾薑 黑豆 牛蒡子 甘草
右等分為細末每服貳錢粥飲調下空心服
治腸風下血
蒼朮(不拘多少)[illegible]
右壹味為細末麵糊為丸如梧桐子大每服伍拾丸米飲空心下
經云結陰者便血壹升再結者貳升參結參升宜用地榆湯
地榆湯
地榆(肆兩) 甘草(半兩炙) 縮砂仁(四十九枚)
右為粗末每服參錢水壹盞煎至七分去滓空心溫服
勝風黑散 治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之內或食生

冷或啖炙煿或飲酒過度積熱腸間致使腸胃[illegible]損[illegible]
成大便鮮血[illegible]臟毒[illegible]後重或肛門脫出或久患酒
痢大便頻併並皆治之
敗龜 木饅頭 烏梅(去核) 粉草(炙各等分)
右為細末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服。僕
嘗治一婦人便血不止用黃芪附貴加五靈脂効(見第[illegible]卷)
婦人痔瘻方論第十一 凡五方
夫婦人痔瘻者皆由酒色氣風食及勞傷經絡其血滲而
成之[illegible]有長年久患而成[illegible]其痔有五種肛邊生瘡如乳出
於外[illegible]為牡痔也肛邊生瘡而出者為牝
痔也肛邊生瘡痒而復痛者為脈痔也肛邊腫核痛[illegible]寒
熱而出血者為腸痔也因便轉而清血隨出者名為血痔也
治之各有方
[illegible]治婦人五痔疾
猬皮 露蜂房 蛇蛻 蝟皮
豬後懸蹄甲 [illegible] 麝香
右各研為細末和藥令停每服一錢空心用生乾地黃
煎湯調下若肛門有瘡腫痛傅之即愈[illegible]見
[illegible]方[illegible]服之皆驗
僕嘗治一婦人久病心焦多怒遂成痔疾狀如蓮子熱
腫而痛遂用熊膽入梅花腦子並研更用豬膽汁調開
塗痔上愈 方出張氏
又方 療痔熱腫痛 郭子章[illegible]方
蜗蝓大者一二條[illegible] 研令爛入研

了龍腦一字坯子半錢研停傳之愈先以石蓮為末
水熏洗尤妙（伍拾[illegible]）
婦人脫肛候方論第十四　凡五方
夫肛門者大腸候也大腸虛冷其氣下衝肛門反出亦有
因產用力努躽氣衝其肛亦令反出也
治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得　出聖惠方
蝸牛（[illegible]）豬脂和傅之立縮（[illegible]）
（[illegible]）
姚和衆治男子女人小兒大腸虛冷肛門脫出
以鐵精粉傅之良（[illegible]）
集驗方療脫肛歷年不愈
以生鐵叁斤水一斗煑取五升去鐵以汁洗日再
姚和衆治丈夫小兒因痢脫肛
鱉頭一枚燒灰研取粉摻之（[illegible]）
孫真人療脫肛
腸頭若挺出一片蝦蟇皮瓶中燒煙熏功效甚微
婦人陰腫方論第十五　凡六方
夫婦人陰腫者是虛損受風邪所為胞絡虛而有風邪客
之風氣乘於陰與血氣相搏令氣否澀腠理壅閉不得泄
越故令腫也
古今錄驗治婦人月水澁滯陰間腫痛
菖蒲　當歸各一兩　秦艽三分　吳茱萸半兩
右為粗末每服三錢水一盞葱白五寸煎至六分去滓
空心溫服

經心錄治婦人陰中腫痛不可忍
艾葉伍兩　防風叁兩　大戟貳兩
右剉細以水壹斗煑取伍升熱洗日叁切宜避風冷
古今錄驗治婦人陰腫或瘡爛者麻黃湯洗方
麻黃　黃連　蛇床子各貳兩　北艾葉壹兩
烏梅拾枚
右剉細以水壹斗煑取伍升去滓熱洗避風冷
古今錄驗（[illegible]）陰腫或瘡白礬散
（[illegible]）　甘草半分　大黃一分
右為細末每以棗大綿裹內陰中日兩換
肘後方療陰中腫痛
枳殼半斤（[illegible]）炒令熱以故帛裹熨冷即換之
（[illegible]）
子母秘錄治陰腫
鐵精粉傅上
婦人陰癢方論第十六　凡十方
夫婦人陰癢者是蟲蝕所為三蟲在於腸胃之間因臟虛
三蟲動作蝕於陰內其蟲作熱微則為癢重者乃痛也
治婦人陰癢大黃散
大黃　黃芩　黃耆各一兩　赤芍藥
玄參　丹參　山茱萸　蛇床子各半兩
右為細末食前溫酒調貳錢服
廣濟方療婦人陰癢不止
蚺蛇膽　雄黃　硫黃　朱砂
硝石　芜荑各半兩　藜蘆（[illegible]）

右爲細末研令以臘月猪脂和如膏用故布作縚子如
指長壹寸半以藥塗上內陰中日壹易之易時宜用猪
椒根叁伍兩水煑稍熱洗乾拭內之效
又方 小蘇不拘多少水煑作湯熱洗日叁用之
崔氏療陰痒不可忍方
杏仁燒作灰承熱綿裹內陰中日貳易之
又方 蒜煑湯洗之 一方用枸杞根
又方
狼牙貳兩 蛇床子叁兩
右以水伍升煑取滿熱洗
又方 取雞肝承熱內陰中如有蟲當盡下
古今錄驗療婦人陰痒如有蟲狀
右取牛肝切截長叁寸內陰中其蟲盡入肝內出之效猪
肝亦得
千金翼治婦人陰痒脫方 石硫黃
礬石爲末空心酒服方寸匕日叁服
婦人陰冷方論第十七 見六方
婦人胞絡挾於子臟虛損風冷客之冷乘於陰故令冷也
療婦人癥瘕陰冷五加皮浸酒方
五加皮 乾薑 丹參 蛇床子
熟地黃 杜仲炙各貳兩 鍾乳粉肆兩 天門冬壹兩
地骨皮貳兩
右細剉以生絹袋盛用酒拾伍升漬貳宿每服溫壹盞中
空心晚食前各壹服

治婦人陰冷痒方
遠志貳分 乾薑生 蓮花貳分 蛇床子
五味子各肆分
右爲細末先以兔屎塗陰門中然後綿裹壹錢內陰中
熱即爲効
補心方治玉門寬冷方
硫黃末煎湯洗
近効坐導藥治陰冷子門痒悶方
吳茱萸 葶藶子貳分 蛇床子叁分 沒石子壹箇
右爲末以綿裹如棗大內子宮中
又方 五味子肆兩爲細末每用以口中玉泉和如兔屎
大內陰門中熱即効
通眞論療婦人子門冷坐藥法
蛇床子肆分 吳茱萸叁分 麝香半錢
右爲細末煉蜜圓如酸棗大以綿裹內陰中下惡物爲效
婦人陰挺出下脫方論第十八 見八方
夫婦人胞絡傷損子臟虛冷氣下衝則令陰挺出謂之下脫
亦有因產而用力偃氣而陰下脫者診其少陰脈浮動浮
爲虛動爲悸故令下脫也
千金翼療婦人陰挺下脫當歸散
當歸 黃芩各貳兩 牡蠣半兩 蝟皮壹兩
赤芍藥壹兩
右爲細末每服貳錢食前煖酒調下米飲亦可
又方

當歸各壹兩 敗醬貳兩 獨活 白芷
地榆 白礬各兩半
右細剉水壹㪷煮取貳升去滓稍熱洗
廣濟方治狀同前
皂角去皮子 半夏熟令 大黃
北細辛各壹兩 蛇牀子壹兩
右爲細末薄綿裹盛如指長內陰中日貳易之
又方
蛇牀子伍兩 烏梅拾肆枚
右剉以水伍升煮取叁升去滓熱洗日伍次
又方
川烏 白及各等分
右爲細末綿裹壹錢內陰中令入叁寸腹內熱即止來
辰時用壹方有生礬壹兩
千金翼療婦人陰脫兼療脫肛
羊脂煎訖適冷暖塗上以鐵精粉敷脂上多少令調以火炙布令溫以熨上漸漸推內之更細末磁石酒調服
方寸匕日叁服
婦人陰中生瘡方第十九 敘論一十三 凡五方
集驗療婦人陰中痛生瘡
羊脂壹斤 當歸 杏仁 白芷
芎藭各壹兩
右伍味細切羊脂和置甑中蒸之藥成取如大豆壹枚綿裹內陰中日壹度

肘後療女人陰中生瘡方
杏仁燒末 雄黃 礬石各貳分 麝香半分
右肆味研細和傅陰中
又方
硫黃 右研細付之
古今錄驗療婦人陰中生瘡雄黃散洗方
雄黃 當歸 黃芩 芎藭
大黃 礬石各貳分 黃連壹分
右柒味切以水伍升煮取肆升洗瘡日叁度
又方雄黃散
雄黃 芎藭 辰砂 藜蘆
北細辛 當歸 川椒各等分
右爲末帛裹以內陰中又傅外瘡上忌如常法
女人傷丈夫頭痛方第二十 凡二方
集驗療女人傷丈夫四肢沉重噓吸頭痛方
生地黃捌兩 芍藥伍兩 香豉壹升 葱白壹升
生薑肆兩 甘草貳兩
右陸味切以水柒升煑取貳升半分叁服不得重作忌
房事千金同
千金翼療婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔悶桑白皮湯
桑白皮半兩 乾薑壹兩 桂心伍寸 大棗廿枚
右肆味切以酒壹㪷煮叁肆沸去滓分溫服衣適厚薄
毋令汗出千金同
女人交接輒血出痛方第二十一 凡二方
千金療女人交接輒血出方

桂心 伏龍肝各貳分

右爲末酒服方寸匕差止

又方

黃連陸分 牛膝 甘草各肆分

右叁味細切以水肆升煑取貳升洗之日叁肆度差止

女人交接他物傷方第二十二 凡三方

集驗療女人交接陽道違理及他物所傷犯血出流漓不止方

取釜底墨斷葫蘆塗藥內之

又療女童交接陽道違理血出不止方

燒髮并青布末爲粉塗之

又方

割鷄冠血塗之

小戶嫁痛方第二十三 凡四方

千金療小戶嫁痛連日方

甘草叁分 白芍藥貳分 生薑壹分 桂心壹分

右肆味細切以酒貳升煑取叁沸去滓溫服神良

又療小戶嫁痛單行方

牛膝伍兩

右壹味切以酒叁升煑取貳升分叁服

又療婦人嫁痛單行大黃湯方

大黃叁兩

右壹味切以酒壹升煑壹沸頓服

又療婦人小戶嫁痛烏賊魚骨散方

烏賊魚骨貳枚

右壹味燒研爲細末酒服方寸匕日叁服

新編婦人大全良方卷之八

新編婦人大全良方卷之九

○求嗣門 疾病既無須求嗣故以次之

陳無擇求子論第一

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不孝有三無後爲大者言嗣續之至重也凡欲求子當先察夫婦有無勞傷痼害之屬依方調治使內外和平則婦人樂有子矣

褚尙書澄求男論第二

建平孝王妃姬等皆麗無子擇良家未笄女入御又無子問曰求男有道乎澄對曰合男女必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽完實然後交合則交而孕孕而育育而爲子堅壯強壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣早泄未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而子脆不壽此王之所以無子也然婦人有所產皆女者有所產皆男者大王誠能訪求多男婦人謀置宮府有男之道也王曰善未再朞生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也

婦人無子論第三

大婦人無子者其事有三也一者墳墓不嗣二者夫婦年命相剋三者夫病婦疾皆令無子若是墳墓不嗣年命相剋此二者非藥能益若夫病婦疾須將藥餌故得有効也然婦人挾疾無子皆由勞傷血氣生病或月經閉澀或崩漏帶下致陰陽之氣不和經血之行乖候故無子也診其

右手關後尺脈浮浮則為陽陽脈絕無子也尺脈微濇中年得此為絕產也少陰脈如浮緊則絕產惡寒脈尺寸俱微弱者則絕產也○又有因將攝失宜飲食不節乘風取冷或勞傷過度致令風冷之氣乘其經血結於子臟得冷亦令無子也

千金翼求子方論第四 凡十四方

千金論曰夫婦人之別有方者以其血氣不調胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四歲已上陰氣浮溢百想經心內傷五臟外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論生熟二臟虛實交錯惡肉內漏氣脈損竭或飲食無度損傷非一或胎瘡未愈而合陰陽或行步風來便利於懸厠之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也惟懷胎妊孕而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所以為病根深療之難瘥故養生之家特須教子女學此三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務若不通明於此則何以免其橫夭者哉故傅母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不虞也

○又曰人之情性皆願賢己而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業不能專一推求至理莫不虛生浪没齡無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日昏爾若愚是則徒願賢己而疾不及人之謬也斯實不達賢己之趣而妄徇虛聲以終無用今述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

○又論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中者則求子必得若其本命五行相剋及與刑殺衝破并在子休廢死墓中者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣

禁忌法

凡欲要兒子生吉良日交會之日常避丙丁及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘖啞聾聵頑愚癲狂攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中井竈圊厠之側塚墓屍柩之傍皆悉不可夫交會如法則有福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男子受胎時日法

凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日為男仍遇月宿在貴宿日又以夜半後生氣時瀉精者有子皆男必壽而賢明高爵也以經絕後二日四日六日瀉精者皆女

過六日皆不成子又遇旺相日尤吉

一推王相日法

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸、

推貞宿日法

正月[illegible] 二月[illegible] 三月[illegible] 四月[illegible] 五月[illegible] 六月[illegible] 七月[illegible] 八月[illegible] 九月[illegible] 十月[illegible] 十一月[illegible] 十二月[illegible]

若春合甲寅乙卯 夏合丙午丁巳 秋合庚申辛酉 冬合壬子癸亥與上件月宿日合者佳

論曰夫人求子者服藥須知次第不可不知其次第者謂男服七子散女服蕩胞湯及坐導藥并服紫石門冬丸則無不効矣不知此者得力鮮焉

七子散 主丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方

牡荊子 五味子 菟絲子 車前子

菥蓂子 山藥 石斛 熟地黃

杜仲 鹿茸 遠志各八銖 附子

蛇床子 川芎各六銖 山茱萸 天雄各六銖

桂心十銖 白茯苓 川牛膝 人參

黃耆各六銖 巴戟天十二銖 蓯蓉十銖 鍾乳粉各八分

右為細末酒服方寸匕日二服不知加至二匕以知為度忌生冷醋滑豬魚蒜油膩不能飲者蜜元服亦佳

一方加覆盆子二兩 行房法一依素女經女人月信斷一日為男二日為女三日為男四日為女以外無子每日午時夜半後行事生子吉餘時生子凶

慶雲散 主丈夫陽氣不足不能施化施化無成

覆盆子 五味子 菟絲子 白朮 石斛 麥門冬 天雄 紫石英 桑寄生

右為細末食後酒服方寸匕日三服素不能飲者米飲調下 冷者去桑寄生加細辛 陽事少而無子者去石斛加檳榔[illegible]

蕩胞湯 治婦人立身已來全不產育及斷緒久不產三十年者

朴消 牡丹皮 當歸 大黃蒸一食久

桃仁 細辛 厚朴 苦梗

赤芍藥 人參 茯苓 桂心

甘草 川牛膝 陳皮 附子炮

虻蟲 水蛭各炒

右㕮咀每服四錢酒水合盞半煎至一盞去滓溫服空心日三服夜一服少汗積血及冷赤膿如小豆汁即下若力弱大困不堪者只一二服止然恐物不盡不得藥力能服盡佳好一日

坐導藥 治婦人全不產及斷緒服前蕩胞湯惡物不盡用此方

皂角去皮子 吳茱萸 當歸 大黃 各二兩
晉礬 戎鹽 川椒 各一兩 五味子
細辛 乾薑 各半兩 [illegible]

右為細末，以絹袋盛大如指，長三寸，盛藥令滿，繫袋口，內婦人陰中，坐卧任意，勿行走，小便時去之，了，復更安一日一度易新者，必下清黃冷汁，汁盡止。若未見病出，亦可至十日安之。本為子宮有冷惡物，故令無子。但天陰冷則發疼痛，須候病出盡乃已，不可中輟。每日早晚用苦菜煎湯熏洗外，坐藥必要。出千金翼。千金方無苦菜，有甘草三分，餘方同。若坐藥後一日，乃服紫石英元，方見[illegible]

紫石英元 [illegible]

紫石英 研 天門冬 去心 紫葳 牡蒙 各二兩
粉草 炙 各兩 桂心 川芎 卷柏
烏頭 炮 熟地黃 辛夷仁 禹餘糧 煅醋淬七次
當歸 石斛 各兩 烏賊骨 川牛膝
薯蕷 各分 桑寄生 人參 牡丹皮
乾薑 厚朴 續斷 食茱萸
細辛 洗 柏子仁 各一兩

右為細末，煉蜜元如梧桐子大，每服三十元，溫酒吞下，漸加至五十元，治如前法。經心錄同。

延年方 療婦人子臟偏僻冷結無子坐導藥

蛇床子 芫花 各二分

右貳味為末，取棗大，紗袋盛，如小指長，以內陰中，工作須去，任意卧，有臍風冷

蕩胞湯 療無子令子宮[illegible]

[illegible] 皂莢 去皮子 川椒 [illegible]

右為末，煉蜜為元，如酸棗大，綿裹，內產宮中，留少綿線出，覺小腹不淨，下多，即抽綿線出卻，用藥一日一度換之，無問晝夜，皆內無所忌。

秦桂元 治婦人無子。知衆州范羅言乞以此方試令婦人服之，至四十六日如無子，請斬臣一家，以令天下，何疑焉。方雖其言似然，實有異驗。

秦艽 桂心 杜仲 防風
厚朴 各二兩 附子 生 白茯苓 各三兩 [illegible]
乾薑 沙參 牛膝 半夏 湯洗七次
人參 各三兩 細辛 [illegible]

右拾肆味，並生碾為細末，煉蜜為元，如赤小豆大，每服三拾元，空心食前，醋湯、米飲任下，未効，更加元數。已覺有孕，便不可服。昌吏守十七無子，服此藥十一日便有孕。終藥實石門縣令妻年三十四，斷產已十六年，服此藥便有孕。又終藥與太子中守文參妻年四十無子，服此遂有孕。其効如神，不可具述。此仙方也。

[illegible]元 治婦人血海虛冷，致陰陽不升降，久不成妊娠者

鹿茸 當歸 肉蓯蓉 禹餘糧
菟絲子 覆盆子 熟地黃 紫石英
桑螵蛸 各等 五味子 真琥珀 白芍藥

川芎　桑寄生　卷栢　艾葉
川椒　白茯苓　人參　牡蠣
酸棗仁各一兩　鍾乳粉各二兩
右為細末酒煮麪糊丸如梧桐子大食前溫酒吞下伍
拾丸日參服吃後以粥飯壓之候試其驗[illegible]
療久無子白薇元 出備急
白薇　牡蒙　藁本各四兩　蒲黃
當歸　熟地黃各五分　川芎　人參
栢子仁　石斛　桂心　附子炮
五味子　防風　甘草　川牛膝
吳茱萸　桑寄生各六分　秦椒三分　禹餘糧二分
右為末煉蜜元如梧桐子大空心酒下參拾元日貳服
[illegible]
忌生葱生菜熱麪蕎麥蒜猪肉炙煿冷菜蕪荑菘菜海藻
粘食臭物等
又療久無子斷緒小腹冷疼氣不調地黃湯
熟地黃乾　川牛膝　當歸各二兩　卷栢
川芎　防風各六分　牽牛子末　桂心各三分
右㕮咀以水陸升煮取貳升參合去滓入分參服服別和
壹分牽牛子末服如人行四五里更進壹服以快利止
忌同前
千金療月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有
子又金城太守白薇元
白薇　細辛各六分　人參　杜衡
厚朴　牡蒙　半夏　殭蚕

秦艽　當歸　紫菀各三分　川牛膝
沙參　乾薑各六分　川椒　附子
防風各二分
右為末煉蜜圓如梧桐子大先食服參圓不知稍加至
肆伍圓此藥不長將服覺有身則止用大驗忌餳猪
肉冷水生葱菜[illegible]
千金又白薇圓主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療
白薇　車前子各二分　當歸　川芎
蛇床子各一兩　太一餘糧各二分　紫石英　菴閭子
石膏　藁本　卷栢各五分　澤蘭葉
覆盆子　桃仁　麥門冬　白芷
人參各三分　桂心　蒲黃各二兩　乾薑
[illegible]
蜀椒　細辛　乾地黃各二分　白茯苓
赤石脂　遠志　白龍骨各二分　橘皮貳分
右為末煉蜜圓如梧桐子大酒服拾伍圓日再增至肆
伍拾圓以知為度忌驢馬猪雞魚蒜及前所忌覺有身
即止藥宜秘之勿妄傳也
經心錄吳茱萸圓療婦人陰寒十年無子者
吳茱萸　川椒各一斤
右為末煉蜜圓如彈子大綿裹內陰中日再易無所下
但開子臟令陰溫即有子也
紫石英圓
紫石英　阿膠　當歸　川芎
赤芍藥　川續斷各二兩　鹿茸　白术

桂心各半兩　栢子仁　熟地黃各一兩

右為末，煉蜜為圓如梧桐子大，空心溫酒下三拾圓。兼治虛中有熱，頭目旋暈，足如履空，嘔吐不食，月水不調，或多或少，皆虛損也。久服能生髮，令人有子。更治虛勞，常若憂思，皆心血不足，血室虛冷所致也。

溫隱居求嗣保生篇方論第五　凡一方

昔東京有一焦公，因三世無嗣，嗣後為商，旅遊諸名山尋訪至人，問其因果，遂至京都，見一老僧，清而遠，目視精光，請教求嗣之語，言其未故，哀痛而坐。僧曰：有何所諭？焦曰：貧家三世無嗣，嗣奈何？僧曰：無嗣者有三：一祖宗無德，自身無行；二夫妻年命恐犯禁忌；三精神不守，妻妾血寒。焦公曰：自身無行，夫妻年命，皆可受持。若妻妾血寒，有何法[illegible]術？再拜告曰。僧曰：一言僧以不難，先修德後修身，三年之後可到五臺山，當授異方。說畢忽不見。焦公自遇老僧之後，時時行方便，種種作陰功，遇人臨難，皆勸觀音之救苦，見物命放生者，助上帝之好生，行恩布德。如此三年，竟往五臺山尋訪老僧，數日不見，方問歸，忽見行童手持一書，言老師傳語大夫：功成行滿，可往合藥，志誠服之，當貴子孫。遂[illegible]生焦公。曰：但得嗣子足矣，何望貴子？[illegible]生焦員外後，貴外養子不肖，問：有何損德如是？忽遇一道人云：汝有異方，何不往五臺山見老僧？[illegible]至五臺山，不見老僧，只見行童[illegible]問，但依父行，愚者自賢，爾後必生賢德子孫。焦氏曰：豈過子孫賢？行童曰：昔竇氏五子皆不全形，後行恩布德延皆如故，積德所應，皆登科第。焦氏拜謝而歸，奉行雕板印施方書。不及二十年，富貴子孫數人，長子黃金出入金門。後人收得行狀及方，受持行用，求藥者獲其子孫，皆有德行。余躬受此方，不敢緘默，併錄篇論，以告諸賢，庶不致湮沒耳。方具于后。

[illegible]　治婦人稟受氣弱，胎臟虛損，子宮冷憊，血寒痼冷，難成子息，功効如神。

高良薑　桂心　熊膽　烏藥[illegible]
益智　杜仲　石菖蒲　吳茱萸[illegible]
茯神　川牛膝　秦艽　細辛
苦桔梗　半夏　防風　白芍藥[illegible]
乾薑[illegible]　附子[illegible]
川椒[illegible]　牡蠣[illegible]
[illegible]

右為細末，取附子內朱砂別研為細末，糯米糊為元，如梧桐子大，每服三拾元至五拾元，空心淡醋湯、溫酒、鹽湯皆可下，食日三服。

此藥及療男子精寒不固，滑泄夢泄，及治婦人血虛帶下，肌瘦寒熱，但是男女諸虛百損，客熱盜汗，氣短乏力，面無顏色，飲食少味，並皆治之。更有奇效難以具述。受持君子宜須行陰功，及方便，卻服此藥，無不感應。

胎教門

求嗣已明，須知胎教，故以次之

姙娠總論第一

凡婦人姙娠十月，其說見於古書，有不同者多矣。按巢氏病源論：婦人姙娠一月名始胚，足厥陰脈養之；二月名始膏，足少陽脈養之；三月名始胎，當此之時，血不流行，形象始化，未有定儀，見物而變。欲子端正莊嚴，常令母見貴，不可見狀貌醜惡人也。欲生男，宜操弓矢，乘牡馬；欲生女，宜著珥璫，施環珮；欲子美好，玩白璧，觀孔雀；欲子賢能，宜讀詩書，務和靜。手心主脈養之。四月始受水精以成血脈，手少陽脈養之。五月始受火精以成其氣，足太陰脈養之。六月始受金精以成其筋，足陽明脈養之。七月始受木精以成其骨，手太陰脈養之。八月始受土精以成膚革，手陽明脈養之。九月始受石精以成毛髮，足少陰脈養之。十月五臟六腑、關節、人神皆備，此其大略也。又五臟論有稱耆婆者論：一月如珠露，二月如桃花，三月男女分，四月形象具，五月筋骨成，六月毛髮生，七月遊其魂，兒能動左手，八月遊其魄，兒能動右手，九月三轉身，十月受氣足。更有稱張仲景者亦然。又顱顖經云：一月為胎胞，精血凝也；二月為胎形，成胚也；三月陽神為三魂；四月陰靈為七魄；五月五行分五臟也；六月六律定六腑也；七月精開竅，通光明也；八月元神具，降真靈也；九月宮室羅布，以定生人也；十月受氣足，萬象成也。今推究數說之理，如五臟論者，類皆淺鄙不經，往往妄託其名，至於三藏所書，且說涉怪誕，漫不可考。今按顱顖經三卷，云中古巫方所撰，隋人巢氏方亦嘗序之。今巢氏論婦人姙娠，乃不見言之。聖濟經原化篇亦獨取顱顖經，而不言巢氏論者，何哉？蓋聖濟經云：小兒方論起自巫方，黃帝不言者，不能察幼小，蓋固有巫方能知小兒之壽夭耳。及觀巢氏論小兒候亦云：中古有巫方，立小兒顱顖經以占壽夭，世所相傳者有少小方焉。巢氏論小兒則取於顱顖經，則是未盡其理，故不言之。若聖濟經者，但取其文句，不若巢氏之論，其間有胎教之法甚可取。所以巢氏論其姙娠至三月始胎之時，欲令見貴人[illegible]，若操弓矢、施環珮、觀孔雀、讀詩書之類，豈非胎教之理乎？若試推巢氏所論姙娠脈養之理，若足厥陰肝脈也，足少陽膽脈也，為一臟腑之經，餘皆如此。且四時之令必始於春木，故十二經之養始於肝也，所以一月二月。手心主心包絡脈也，手少陽三焦脈也，屬火而夏旺，所以養胎在三月四月也。屬手少陰心、手太陽小腸者，以君主之官無為而尊也。足太陰脾脈也，足陽明胃脈也，屬土而旺長夏，所以養胎而在五月六月。手太陰肺脈也，手陽明大腸脈也，屬金而旺秋，所以養胎在七月八月。足少陰腎脈也，屬水而旺冬，所以養胎在九月。又況母之腎臟係於胎，是母之真氣，子之所賴也。至十月，兒於母腹之中受足諸臟氣脈所養，然後待時而生。此論奧微而有至理，餘者所論皆不能及也。觀此則知巢氏之論曲盡，有明之者，亦未有過於巢氏之論矣。余因述其說

娠子論第二

夫至精纔化一氣方凝始受胞胎漸成形質子在腹中隨母聽聞自妊娠之後則須行坐端嚴性情和悅常處靜室多聽美言令人講讀詩書陳禮說樂耳不聞非言目不觀惡事如此則生男女福壽敦厚忠孝賢明不然則男女既生則多鄙賤不壽而愚此所謂因外象而內感也昔太任娠文王目不視惡色耳不聽惡聲口不談惡言世傳胎教之道是謂此也前論亦略敘之矣然則婦人有終身無子者何也按巢氏病源云婦人無子者蓋有三焉一者墳墓不嗣二者夫婦年命相剋三者夫疾婦病皆令無子若夫疾婦病可以服藥而後能有子餘皆不可致也今觀其說亦未盡善有人以婦人無子問西京常器之者乃曰女人自少多病服煖藥無節使天癸耗動且早故終身無子又有問襄陽宋大亨者亦然然則婦人妊娠有兩胎者何也按古今方書並無論及此者惟巢氏論云陽施陰化精氣有餘故生二胎且謂成一胎之理其精有幾耶今見婦人有兩胎者其精神氣宇曾無小異至於數有兩胎或間成兩胎者有俱男俱女者有一男一女者道藏經云有求子法云婦人月信初止後一日三日五日值男女旺相日陽日陽時交合有子多男若男女受胎時則令子一有怯弱則少子以此推之理可概見焉又婦人妊娠男女之別何也按難經云陽盛發陰當孕成男六脈諸經皆舉其陽陰盛發陽當孕成女六脈諸經皆舉其陰巢氏病源云三陽所會則生男三陰所會則生女葛洪肘後方云男從父氣女從母氣聖濟經云天之德地之氣陰陽之至和相為流薄於一體因氣而左動則屬陽陽資之則成男因氣而右動則屬陰陰資而成女易稱乾道成男坤道成女此男女之別也凡妊娠有疾投以湯藥有傷胎破血者之忌何也內經云婦人重身毒之奈何岐伯答曰有故無殞衰其大半而已也蓋妊婦有疾不可不投藥也必在醫者審度疾勢輕重量度藥性高下處以中庸不必多品視其疾勢已衰藥宜便止則病去母安子亦無損復何懼於攻治哉

受形篇第三

男女之合二精交暢陰血先至陽精後衝血開裹精精入為骨而男形成矣陽精先入陰血後參精開裹血血入居本而女形成矣陽氣聚面故男子面重溺死者必伏陰氣聚背故女子背重溺死者必仰走獸溺死伏仰皆然陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之兆父少母老產女必羸母壯父衰生男必弱古之良工首察乎此受氣偏瘁與之補之補羸女則養血壯脾補弱男則壯脾節色羸女宜及時而嫁弱男宜待壯而婚此疾外所務之本不可不察也

論胎教第四

論曰胎教產圖之書不可謂之迂而不加信然亦不可狎泥之方今俚俗之家與不正之屬將息避忌略不如儀或藥毒不備或產於風露既無產厄子母均安固有之如不利嗣續或蔑偶太甚抑勉必成然雖鄰家有所興修亦且犯其胎氣令兒破形殞命如刀犯者形必傷泥犯者竅必

[illegible]唯能順時數謹人事勿動而傷則生育之道得矣[illegible]

生長收養資出萬物有儀[illegible]備而天地之氣未始或窮[illegible]者蓋陰陽相養以相濟也[illegible]之味有曾不知此乃汝拂自然之理謬惑求息之術方[illegible]且推生死於五行蔽禍福於卜筮若以偏勝負以人助天揵或有子孕而不育育而不壽者衆矣昔人論年老有子者男不過盡八八女不過盡七七則知氣血在人固自有量夫豈能逃陰陽之至數哉[illegible]

凝形殊稟章第八

天地者形之大也陰陽者氣之大也惟形與氣相資而立未始偏廢[illegible]男女構精萬物化生天地陰陽之形氣寓焉[illegible]語七八之數七少陽也八少陰也相感而流通故女子二七天癸至男子二八天癸至則以陰陽交合而兆始故也[illegible]語九十之數九老陽也十老陰也相包而賦形故陰窮於十男能圍之陽窮於九女能方之則以陰陽相生而成終故也[illegible]

[illegible]元氣孕毓皆始於子自子推之男左旋積歲三十而至巳女右旋積歲二十而至巳巳為正陽陰實從之自巳懷妊男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申申為三陰寅為三陽而生育之時著矣其稟賦也誠有剛柔脉有強弱氣有多寡血有盛衰皆一定而不易也[illegible]以至分野異域則所產有多寡之宜吉事有祥則所夢各殊其類故荊揚薄壤多女雍冀厚壤多男熊羆為男子之祥虺蛇為女子之祥其理之可推也[illegible]

[illegible]胎化之法有所謂轉女為男者亦皆理之自然如食牡雞取陽精之全於天產者帶雄黃取陽精之全於地產者[illegible]矢[illegible]取剛物之見於人事者氣類潛通造化密移必於三月兆形之先蓋方儀則未具陽可以勝陰變女為男理固然也[illegible]

氣質生成章第七

具天地之性集萬物之靈陰陽平均氣質具備咸其自爾然而奇耦異數有衍有耗剛柔異用或強或羸血榮氣衛不能逃於消息盈虛之理則稟賦之初詎可一概論是以

附贅垂疣駢拇枝指侏儒跛躄形體所賦有如此者[illegible]

癰腫聾盲瘖啞瘦瘠疲瘵氣形之病有如此者然則胚胎[illegible]

造化之始精移氣變之後保衛輔翼固有道矣[illegible]

[illegible]天有五氣各有所湊地有五味各有所入

所湊有節適所有度量凡所畏忌悉知戒慎於物無害者[illegible]

理固然也[illegible]興以時出則以節[illegible]

[illegible]

間而入因時爲養理宜然也以至調燮寒暑[illegible]

[illegible]可以高明可以周密使[illegible]風邪不得投

[illegible]

[illegible]作勞不妄而氣血從之皆所以保[illegible]

役若邪不得干焉[illegible]

[illegible]而爲不然方授受之時一失

調養則內不足以爲中之守外不足以爲身之強氣形弗

充而疾疢因之[illegible]

[illegible]若食兜[illegible]缺食大無[illegible]之屬皆以食

物之戒之謂也[illegible]

[illegible]

足而綢繆[illegible]

[illegible]

[illegible]心氣未之而神不足之屬皆以氣血不調之過也

能食飲知所戒推而達之五時無所傷誠能於氣血知所

新編婦人大全良方卷之十一

脉例第一

王子亨云若姙娠其脉三部俱滑大而疾（在左則男在右則女）經云陰搏陽別謂之有子搏者近也陰脉逼近於下陽脉別出於上陰中見陽乃知陽施陰化法當有子又少陰脉動甚者姙子也手少陰屬心足少陰屬腎心主血腎主精精血交會投識于其間則有娠又三部脉浮沉正等無病者有姙也餘病如脉經說左手尺部浮洪者為男胎也右手尺部浮洪者為女胎也兩手尺部俱洪者為兩男俱沉實者為兩女又云中指一跳一止者一月胎二跳二止者二月胎也

診婦人有姙歌第二

肝為血兮肺為氣血為榮兮氣為衛陰陽配偶不參差（[illegible]）兩臟通和皆類例（[illegible]）血衰氣旺定無孕（[illegible]）血旺氣衰應有體（[illegible]）寸微關滑尺帶數流利往來并雀啄小兒之脉已見形（[illegible]）數月懷耽猶未覺（[illegible]）左疾為男右為女流利相通速來去（[illegible]）兩手關脉大相應已形亦在前通語（[illegible]）左手帶縱兩個兒（[illegible]）右手帶橫一雙女（[illegible]）左手脉逆生三男（[illegible]）右手脉順還三女（[illegible]）寸關尺部皆相應一男一女分形證（[illegible]）有時子死母身存或即母亡存子命（[illegible]）往來三部通流利滑數相參皆替替陽實陰虛脉得明遍滿胸膛皆逆氣（[illegible]）左手太陽浮大男（[illegible]）右手太陰沉細女（[illegible]）諸陽為男諸陰女指下分明長記取（[illegible]）三部沉正等無絕（[illegible]）尺內不止真胎婦（[illegible]）夫乘妻兮縱氣霧（[illegible]）妻乘夫兮橫氣助（[illegible]）子乘母兮逆氣參（[illegible]）母乘子兮順氣護（[illegible]）小兒日足胎成聚身熱脉亂無所苦（[illegible]）汗出不食吐逆時精神結備其中住（[illegible]）滑疾不散胎三月（[illegible]）但疾不散五月母（[illegible]）弦緊牢強滑者安（[illegible]）沉細而微歸泉路（[illegible]）

驗胎法第三　凡一方

婦人經脉不行已經三月者欲驗有胎

川芎爲細末空心濃煎艾湯調下方寸匕當腹內微動則有胎也

胎殺避忌產前將護法第四

一受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣甚至母殞驗若反掌斷不可忽

月遊胎殺第五

立春在房床　驚蟄在戶 [illegible]　清明在門 [illegible]

立夏在竈　芒種在母身　小暑在竈

立秋在碓 [illegible]　白露在廚廁

寒露在門　立冬在戶及廚　大雪在爐及竈

小寒在房及母身

十干日遊胎殺第六

甲己日占門　乙庚日占碓磨　丙辛日占井竈

丁壬日占廚廨　戊癸日占米倉

十二支日遊胎殺第七

子丑日占中堂　寅卯辰酉日占竈　巳午日占門

未申日占籬下　戌亥日占房

六甲旬遊胎殺第八

甲子旬遊窗碓　甲戌旬遊正廳　甲申旬遊中庭

甲午旬遊房內　甲辰旬遊房中　甲寅旬遊

太史局日遊胎殺第九

每遇癸巳甲午乙未丙申丁酉五日在房內北　庚子辛丑壬寅三日在房內南　癸卯一日在房內西　甲辰乙巳丙午丁未四日在房內東　六戊六己日在房內中　餘日在外無占

凡遊在房內不宜於方位上安牀帳及掃舍皆凶

又有小兒殺及本年三殺及產母身黃定命皆不可犯凡妊娠之後將此貼於當眼常照應之切不可穿鑿修掘移釘擊壁重物接壓之類犯之重則胎死腹中母亦不利輕則子受其殃成人之後必定破形拳攣跛縮喑瘂犯之極驗

食忌論第十

一受孕之後不可食之物切宜忌食非惟有感動胎氣之戒然於物理亦有厭忌者設或不能戒忌非特延月難產亦能令兒破形母損可不戒哉

食雞肉糯米令子生寸白蟲　食羊肝令子生多厄

食鯉魚膾及雞子令兒成疳多瘡　食犬肉令子無聲音

食兔肉令子缺唇 [illegible]　食鱉令子項短及損胎

鴨子與桑椹同食令子倒生心寒

雀肉合豆醬食之令子面生䵟䵳黑子

食豆醬合藿食之墮胎　食冰漿絕產

食雀肉令子不恥多淫　食山羊肉令子多病

食子薑令子多指生瘡　食螃蟹令子橫生

食蝦蟆鱔魚令兒瘖瘂　食驢馬肉延月難產

如此之類無不驗者則知聖人胎教之法豈非慮有自其然乎

孕婦將息法第十一

蚖斑水蛭地膽蟲　烏頭附子配天雄
躑躅野葛螻蛄類　烏喙側子及虻虫
牛黃水銀并巴豆　大戟蛇蛻及蜈蚣
牛膝藜蘆并薏苡　金石錫粉及雌雄
牙消芒消牡丹桂　蜥蜴飛生及䗪虫
代赭蚱蟬胡粉麝　芫花薇銜草三稜
槐子牽牛并皂角　桃仁蠐螬和茅根
欓根硇砂與乾漆　亭長波流菵草中
瞿麥䕡茹蟹爪甲　蝟皮赤箭赤頭紅
馬刀石蠶衣魚等　半夏南星通草同
乾薑蒜雞及鴨子　驢肉兎肉不須供
切忌婦人產前用　此歌宜記在心胸

妊娠疾病門

胎教已明須知妊娠疾病故以次之

凡妊娠諸病但忌毒藥餘當對證依法治之

妊娠隨月數服藥及將息法第一　凡貳拾方

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥毋食腥辛是謂才正

妊娠一月足厥陰脈養不可針灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之內血行否澀不為力事寢必安靜毋令恐畏

又妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯方

烏雌雞壹隻治如食法　吳茱萸壹升　茯苓　阿膠各貳兩　生薑　甘草各壹兩　人參　白朮　麥門冬去心　芍藥

右拾味細切以水壹斗貳升煮雞取汁陸升去雞下藥煮取三升納酒三升并膠烊盡取三升去滓溫服壹升日三服

又若曾傷壹月胎者當預服補胎方

細辛壹兩　防風貳兩　烏梅壹升　吳茱萸伍合　乾地黃　白朮各參兩　大麥伍合　生薑四兩

右㕮咀以水柒升煮取貳升半去滓分溫三服若寒多者倍細辛茱萸若熱多渴者去細辛茱萸加栝樓根貳兩若有所思去大麥加栢子仁參合壹方有人參壹兩忌生菜蕪荑桃李雀肉等物

妊娠貳月名始膏，毋食辛臊，居必靜處，男子勿勞，百節皆
痛，是謂胎始結。
又妊娠貳月，足少陽脈養，不可鍼灸其經。足少陽內屬於
膽，主精。貳月之時，兒精成於胞裏，當謹護勿驚動。
又妊娠貳月，始陰陽踞經，有寒多壞不成，有熱即萎悴，中
風寒有所動搖，心滿，臍下懸急，腰背強痛，卒有所下，乍寒
乍熱，艾葉湯主之方
丹參各二兩　當歸　人參　麻黃
艾葉　阿膠各二兩　甘草炙各一兩　大棗
生薑六兩
右九味切，以酒叁升水壹斗內藥，煮減半，去滓，內膠
更煎取叁升，分溫叁服。忌海藻、菘菜。
又若曾傷二月胎者，當預服黃連湯方
黃連　人參各一兩　吳茱萸五合　生地黃五兩
生薑三兩
右伍味切，以酢漿七升，煮取叁升，分四服，日三夜一，十日一修合。若
頗覺不安，加烏梅一升，加烏梅者不用漿，直
用水耳。忌豬肉、冷水、蕪荑。一方用當歸半兩。
妊娠三月名始胎，當此之時，未有定儀，見物而化，欲生男
者操弓矢，欲生女者弄珠璣，欲子美好，數視璧玉，欲子賢
良，端坐清虛，是謂外象而外感者也。
又妊娠三月，手心主脈養，不可鍼灸其經。手心主內屬於
心，無悲哀，無思慮驚動。
又妊娠三月為定形，有寒大便青，有熱小便難，不赤即黃。
卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆，動於經脈，腹滿，繞臍苦痛，或腰背
痛，卒有所下，雄雞湯方
雄雞一隻　甘草炙　茯苓　人參
阿膠各貳兩　黃芩　白朮各壹兩　芍藥四兩
麥門冬五合　大棗十二枚　生薑壹兩
右㕮咀，以水壹斗伍升煮雞減半，出雞，內藥，煮取一半，入清
酒叁升并膠，再煎取叁升，分叁服，一日盡之，當溫臥。忌
海藻、菘菜、醋物、桃李、雀肉等。一方用當歸、川芎各二兩。
又若曾傷三月胎者，當預服茯神湯方
茯神　丹參　龍骨各壹兩　阿膠
當歸　甘草炙　人參各貳兩　赤小豆二十一粒
大棗二十一枚
右㕮咀，以酢漿壹斗，煮取叁升，分四服，七日後服一劑。腰
痛者加桑寄生。深師方有薤白、麻子。忌同前。
妊娠四月，始受水精以成血脈，其食宜稻秔，其羹宜魚鴈，是謂
成血氣以通耳目而行經絡。
又妊娠四月，手少陽脈養，不可鍼灸其經。手少陽內輸三
焦，四月之時，兒六腑順成，當靜形體，和心志，節飲食。
又妊娠四月為離經，有寒心下溫溫欲嘔，胸膈滿不欲食，
有熱小便難，數數如淋狀，臍下苦急，卒中風寒，頸項強痛，寒
熱，或驚動身軀，腰背腹痛，往來有時，胎上迫胸，心煩不得安，
卒有所下，菊花湯方
菊花如雞子大一枚　麥門冬一升　麻黃　阿膠各三兩
生薑伍兩　甘草炙　當歸　半夏各二兩

人參壹兩半　大棗拾貳枚擘
右細切，以水捌升煑減半，內清酒叁升并阿膠，煎取
叁升八分叁服，溫則當汗，以粉粉之，護風寒四五日。忌羊
肉、海藻、菘菜、鰻等。
又若曾傷四月胎者，當預服調中湯方
芍藥肆兩　甘草炙壹兩　芎藭　續斷各壹兩
柴胡　白朮各叁兩　烏梅壹升　生李根白皮叁兩
當歸壹兩半　生薑肆兩　厚朴炙　枳實炙各貳兩
右細切，以水壹㪷煑取叁升，分四服，日叁夜壹，八日後
服壹劑。一方有半夏貳兩。忌海藻、菘菜、桃李、雀肉。
妊娠五月，始受火精以成其氣，臥必晏起，沐浴浣衣，居處必厚，
其衣裳，朝吸天光，以避寒殃，其食稻麥，其羹牛羊，和茱萸，
調以五味，是謂養氣，以定五藏。
又妊娠五月，足太陰脈養，不可鍼灸其經。足太陰內輸於
脾，五月之時，兒四肢成，無大飢，無甚飽，無食乾燥，無自炙
熱，無大勞倦。
又妊娠五月，毛髮初生，有熱苦頭眩，心亂嘔吐；有寒苦腹滿
痛，小便數，卒有恐怖，四肢疼痛，寒熱，胎動無常處，腹痛
悶頓欲仆，卒有所下，阿膠湯方《小品方》旋覆花湯
阿膠肆兩　人參壹兩　麥門冬壹升去心　生薑陸兩
吳茱萸柒合　旋覆花　當歸　芍藥
甘草炙　黃芩各貳兩
右細切，以水玖升煑藥減半，內清酒叁升并膠，微火煎
取叁升半，分為四服，日叁夜壹，先食再服便愈，不差更
服。忌海藻、菘菜。
又若曾傷五月胎者，當預服安中湯方
甘草炙　芍藥各叁兩　當歸　人參
乾地黃　芎藭各貳兩　五味子五合　生薑陸兩
麥門冬壹升去心　大麻仁五合　大棗三十五枚擘　黃芩壹兩
右細切，水柒升，清酒五升，煑取叁升半，分四服，日叁夜
壹，七日再服壹劑。忌如前。
小品療妊娠五月舉動驚愕，胎動不安，下在小腹，痛引腰
胳，小便疼，下血，安胎當歸湯方
當歸　阿膠　芎藭　人參各壹兩
大棗拾貳枚　艾壹虎口
右細切，以酒水各叁升合煑，取叁升，去滓，內膠令烊，分
叁服，腹中當安，小便緩也。古今錄驗、救急同。一方有甘
草，無參棗。
妊娠六月，始受金精以成筋，身欲微勞，無得靜處，出遊於
野，數觀走犬及馬，食宜鷙鳥猛獸之肉，是謂變腠理紉筋，以
養其力，以堅背膂。
又妊娠六月，足陽明脈養，不可鍼灸其經。足陽明內屬於
胃，主其口目，六月之時，兒口目皆成，調五味，食甘美，無大飽。
又妊娠六月，卒有所動不安，寒熱往來，腹內脹滿，身體腫，
驚怖，忽有所下，腹痛如欲產，手足煩疼，麥門冬湯方
麥門冬壹升去心　甘草炙　人參各貳兩　乾地黃叁兩
黃芩貳兩　阿膠肆兩　生薑陸兩　大棗十五枚擘
右八味切，以水柒升，煑減半，內清酒貳升并膠，煎取叁

分叁服每服如人行三四里中間進糜粥忌海藻菘菜

【柴胡湯】

又若曾傷六月胎者當預服柴胡湯方

柴胡肆兩 芍藥一方作紫葳 白朮 甘草炙各貳兩

麥門冬去心貳兩 蓯蓉壹兩 芎藭貳兩 乾地黃伍兩

生薑陸兩 大棗拾貳枚

右十味切以水壹斗煮取叁升分四服日叁夜壹中間進糜粥勿食生冷及堅強之物七日更服一劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等一方有黃芩貳兩

【旋覆花湯】療妊娠六七月胎不安常服旋覆花湯方

旋覆花壹兩 厚朴 白朮 枳殼

黃芩 茯苓各叁兩 半夏炒 芍藥

生薑各貳兩

右九味切以水壹斗煮取貳升半先食分五服日叁夜貳忌羊肉餳桃李雀肉千金同

妊娠七月始受木精以成骨髓勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣自此後居處必燥飲食避寒常食稉稻以密腠理是謂養骨而堅齒

又妊娠七月手太陰脈養不可鍼灸其經手太陰內屬於肺肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

又妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脈若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背強葱白湯方

葱白長三四寸十四莖 半夏壹升洗 麥門冬壹升去心

生薑捌兩 甘草炙 當歸 黃芩各叁兩

阿膠肆兩 人參壹兩半 黃芪壹兩 旋覆花壹合

右十一味切以水八升煮減半內清酒叁升并膠煎取肆升溫服壹升日叁夜壹溫臥當汗出若不出者加麻黃貳兩煮服如前法若秋後勿強責汗忌羊肉餳海藻菘菜等

【杏仁湯】若曾傷七月胎者當預服

杏仁去皮尖雙仁 甘草炙 鍾乳研 乾薑各貳兩

麥門冬去心 吳茱萸 五味子 粳米各伍合

紫菀壹兩

右九味切以水捌升煮取叁升半分四服日三夜一中間進食七日服一劑忌海藻菘菜

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色

又妊娠八月手陽明脈養不可鍼灸其經手陽明內屬於大腸大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大起

【芍藥湯】又妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷痛而目視䀮䀮

芍藥肆分 人參 當歸 甘草炙各叁兩

白朮壹兩 厚朴貳兩 薤白切壹升 生薑切肆兩

右八味切以水伍升酒肆升合煮取叁升分叁服日再夜壹忌海藻菘菜桃李雀肉等

□□湯治妊娠八月傷胎者當預服

甘草（炙） 柴胡 白朮各二兩 厚朴

芍藥各三兩 麥門冬（去心） 小豆 大棗

右八味切以水九升煮取三升分三服日三夜一服一

劑忌海藻菘菜桃李雀肉等

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴

食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力

又妊娠九月足少陰脈養不可鍼灸其經足少陰內屬於

腎腎主續縷九月之時兒脈續縷皆成無處濕冷與著炙衣

半夏湯 又妊娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝腹背痛

不可轉側短氣

半夏（洗） 麥門冬（去心） 乾薑各一兩 當歸

吳茱萸 阿膠（炙） 大棗（擘）

右柒味切以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火

上溫分肆服痢即止忌生血物餳

豬腎湯 若曾傷九月胎者當預服

豬腎（一具） 茯苓 桑寄生 乾薑

乾地黃 芎藭各三兩 白朮四兩 麥門冬（去心）

附子（炮） 大豆（三合）

右十味切以水壹斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升

半分四服日三夜壹拾日更一劑忌豬肉冷水蕪荑桃

李雀肉酢物等

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關

節人神皆備但俟時而生集驗從之千金同

妊娠惡阻方論第二　凡十二方

夫妊娠阻病者按昝殷產寶方謂之子病巢氏病源謂之

惡阻若婦人血受胎□或有風氣或有痰飲既妊娠便有

是病其狀顏色如故脈息和順但覺肢體沉重頭目昏眩

擇食惡聞食氣好食鹹酸甚者或作寒熱心中憒悶嘔吐

痰水胸腑煩滿恍惚不能支持不拘初娠但疾苦有輕重

耳輕者不服藥亦不妨重者須以藥療之千金方有半夏

茯苓湯茯苓圓二方專治阻病然此二藥比來少有服者

以半夏有動胎之性蓋胎初結慮其易散此不可不謹也

張仲景傷寒論云婦人傷風續得寒熱發作有時此為熱

入血室有用黃龍湯者小柴胡湯去半夏也此蓋為妊婦

而設隨王子亨則有白朮散局方則有人參丁香散用之

又驗然二方皆大同而小異續撰則有人參橘皮湯齊士

明則有醒脾飲子試之亦效皆不用半夏動胎等藥服者

知之

白朮散 治惡阻吐清水甚者十餘日粥漿不入者

白朮（壹兩） 人參（半兩） 丁香（貳錢半） 甘草（壹錢）

右為細末每服貳錢水壹盞生薑伍片煎至七分溫服

人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水

人參（去蘆） 陳橘紅 白朮 麥門冬（去心各壹兩）

甘草（炙叁錢） 厚朴（製） 白茯苓（去皮各）

右為粗末每服肆錢水壹盞半竹茹一塊如彈子大

生薑三片煎至七分去滓澄清溫服空心食前（集驗有）

茯苓 麥門冬 甘草

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心腹刺痛
人參半兩 丁香 藿香葉各壹分
右爲散每服叁錢水壹盞煎至七分去滓溫服無時
又方
人參 丁香 柿蔕各壹兩 甘草
良薑各半兩
右爲細末每服貳錢熱湯點下無時
醒脾飲子 治妊娠阻病嘔逆不食甚者中滿口中無味或
作寒熱 出七寶方
草豆蔻以濕紙裹灰火中煨令紙乾取出去皮 厚朴製各
乾生薑各三分 甘草一分
右爲細末每服貳大錢水壹大盞棗貳枚生薑三片煎
至七分去滓呷服病輕者只一二服便能食
或微治寒熱瘧痢不食從人去橘皮以生薑代乾薑
治老人氣虛大便秘少津液引飲有奇效產科
士明依舊用乾薑大橘皮亦名醒脾飲子治妊娠阻病
神驗 宜和初在京師校勘
保生湯 治婦人經候不行身無病而似病脈滑大而六部
俱勻乃是孕婦之脈也精神如故惡聞食臭或但嗜一物
或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此
藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎服 溫隱居方
人參一分 甘草一分 白术 香附子
烏梅 橘紅各半兩
右㕮咀每服叁大錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓

溫服無時或作末子調服
古今錄驗療惡食
人參四兩 厚朴 生薑 枳殼
甘草各貳兩
右切以水陸升煮取貳升分叁服
治妊娠阻病心中憒悶見食嘔吐惡聞食氣肢節煩疼身
體沉重多思嗜臥面黃肌瘦
人參 陳皮各壹兩 白茯苓 麥門冬
甘草 生薑各兩 大棗
右㕮咀以水五升煎取貳升溫分叁服忌鹹菜鮭等。
凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈。壹方無麥
子有半夏竹茹如陳皮分兩
二香散 治妊娠胎氣不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水
起坐費重宜服之
香附子壹兩 藿香葉 甘草各貳錢
右爲細末每服貳錢入鹽少許百沸湯點下
近效方療妊娠惡食心中煩憒熱悶嘔吐
青竹茹 麥門冬 前胡 橘皮壹兩
蘆根一握
右細切以水壹大升煮取半升去滓分兩服食前服
壹方無麥門冬用小麥叁合。○若體熱四肢煩熱者加地
骨皮
李茂翁先生云若左脈弱而嘔服諸藥不止者當服理血
歸原藥則愈經云無陰則嘔是也

治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無效者
此藥理血歸原則愈

人參　甘草　川芎　當歸

京芍藥　丁香各半兩　白茯苓　白朮

陳皮去白　桔梗炒　枳殼去瓤麩炒　半夏湯洗

右㕮咀每服叁錢重水一盞薑伍片棗壹枚煎

茯苓圓治懷胎二月四月至九箇月日惡阻病者心中憒悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食氣欲噉鹹酸多睡少起嘔逆不食或吐動不安兼肝腎動腹痛或時下血及妊娠一切痰病並宜治之

甘草　茯苓　當歸　熟地黃

川芎　白朮　黃耆　白芍藥

半夏湯洗　阿膠炒成珠　地榆各等分

右㕮咀每服叁錢水一盞半生薑肆片煎至柒分去滓溫服無時候　一方無半夏地榆有人參桑寄生　又一方無白朮黃耆半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓

妊娠痰逆不思食方論第二　凡八方

夫水飲停積結聚爲痰人皆有之少者不能爲害多則成病妨害飲食乃至嘔逆妊娠之病若嘔逆甚者傷胎也原疾之由皆胃氣不調或因冷熱之氣搏於胃故成斯病也亦惡阻之漸端

半夏茯苓湯治妊娠惡阻心中憒悶虛煩吐逆頭目昏眩四肢怠墮百節煩疼痰逆嘔吐嫌聞食氣好噉鹹酸惡寒汗出羸極黃瘦多卧少起不進飲食從此有痰必生阻病千金以此半夏茯苓湯以對之此思邈數方之妙也若孕婦羸弱胎孕不牢則動以成墮全在醫者消息強弱以投之又何慮焉

半夏湯洗[illegible]生薑各五兩　茯苓　熟地黃各三兩

橘紅　北細辛　人參　芍藥

紫蘇　川芎各二兩　桔梗　甘草各半兩

右㕮咀每服肆大錢水一盞半薑七片煎至七分去滓空心溫服兼服茯苓圓

局方無紫蘇細辛有旋覆花葛兩有客熱煩渴口瘡去橘皮細辛加前胡知母各叁兩腹冷下痢者去地黃加炒桂心叁兩胃中虛熱大便秘小便赤澀加大黃叁兩去地黃加黃芩壹兩此半夏能動胎若炒過則無妨

張氏方半夏茯苓湯

半夏湯洗七次　陳皮去白　白茯苓　縮砂仁各一兩

甘草炙各半兩

右㕮咀每服肆錢水貳盞生薑拾片棗壹箇烏梅半箇煎至柒分食前溫服

茯苓圓治妊娠阻病心中煩悶頭目暈重憎聞食氣吐逆吐痰煩悶顛倒四肢重弱不自勝持服之即效要先服半夏茯苓湯兩劑後服此藥

赤茯苓　人參　桂心　乾薑

半夏湯洗七次　橘紅各壹兩　白朮　葛根

甘草　枳殼各貳兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大米飲吞下伍拾圓日
叁服○一方有麥門冬忌海藻菘菜羊肉餳糖桃李雀
肉酢等○肘後只五味云妊娠忌桂土金同

療妊娠心胸支滿痰逆不思飲食

赤茯苓　前胡　白朮　紫蘇莖葉各
半夏　麥門冬　人參　大腹皮各半

右為粗末每服叁錢水壹盞薑伍片煎至柒分去滓溫
服壹方無大腹皮人參有大腹子檳榔

療妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生蘆根拾分　橘紅肆分　生薑陸分　檳榔貳分

右切以水貳盞煮取柒分空心熱服

療妊娠心膈氣滯嘔吐不下飲食心神虛煩四肢少力

枇杷葉　半夏　麥門冬　人參
甘草拾兩　訶子肉　藿香各壹兩　赤茯苓
枳殼　陳皮各叁分

右㕮咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹箇煎至柒分去
滓溫服[illegible]

集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹　橘皮各叁兩　生薑　茯苓各肆兩
半夏伍兩

右細切以水陸升煮取貳升半去滓分叁服不差頻服
忌羊肉餳酢等物

古今錄驗療妊娠不欲食或吐春月所宜服柴胡湯

甘草　柴胡各貳兩　麻黃壹兩　食茱萸半兩

大棗拾貳枚

右細切以水陸升煮取叁升分溫服壹升日叁服忌食
噎醋除熱下氣所宜多與上同但秋夏去茱萸加枸杞
壹升六月加小麥壹升石膏叁兩秋去石膏加甘草壹
兩九月去麻黃加乾薑壹兩十月加川芎叁分忌海藻
菘菜

○胎動不安方論第四　凡貳拾方

凡婦人妊娠胎動不以日月多少而常墮胎者有雖有胎
而月信頻不多常來○○胎不損者産寶方云婦人妊娠常
胎動不安者由衝任經虛胞門子戶受胎不實故也并有
飲酒房室過度有所損動不安者巢氏云婦人衝任貳經
因寒而有胎故不以日月多寡因誤有擊觸而胎動者
有喜怒不常氣宇不舒傷於心肝觸動血脈衝任經虛乃
致胞門不固或因登高上廁風攻陰戶入於子宮如此皆
令胎動不安也曾有以娠婦月信不絕而胎不損問産科
熊宗古者答曰婦人血盛氣衰其人必肥既娠之後月信
常來而胎不動若據晚進觀之便以為漏胎若作漏胎治
之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮今推宗古之
言誠有旨也巢氏云妊娠人經閉不利別無所苦者是謂有
子以其經血蓄之以養胎擁之為乳汁也有子之後蓄以
養胎矣豈可復能散動邪所以然者有娠而月信每至是
亦未必因血盛也若謂婦人榮經有風則經血喜動以其
風勝則可也既榮經為風所勝則所來者非養胎之血以
此辨之若作漏胎治之必服保養補胎之藥且胎不損強

以藥致之乃所謂實實虛虛也其胎終隨之矣古醫書亦如
產經有風之理專以養胎治風經而可也或不服藥胎亦
無恙然而有胎本不固而因房室不節先漏而後墮者須
作漏胎治之此又不可不審也亦有婦人年方壯盛雖嘗
宜言其藥可服致補暖而子戶虛冷所攝[illegible]
[illegible]
子不以遲晚則必墮中年之後氣衰多有崩中帶下
之疾或月信愆期漸覺黃瘦腰背不伸五勞七
傷之疾從此而生不獨胞門子戶風寒而生也故千金翼
方有朴消蕩胞湯正爲此疾今之醫者未見有用亦未見
有知之者又論妊娠胎動其由有貳壹因母疾而胎動但
療母疾其胎自安若胎不堅固自動其母疾惟當安胎其
[illegible]
母自愈壹因勞役氣力或觸冒冷熱或飲食不適或居處
失宜輕者轉動不安重者便致傷墮當以母形色察之母
面赤舌青者兒死母活脣口青兩邊沫出者子母俱死面
青舌赤口中沫出者母死子活也

集驗方療妊娠貳叁月上至捌玖月胎動不安腰痛已有
所見方

艾葉 阿膠 當歸 川芎各叁兩
甘草貳兩

右細切以水捌升煑取叁升去滓內膠令烊分叁服日
叁千金文仲備急同

刪繁療婦人懷妊胎動不安葱豉安胎方

香豉壹升 葱白壹升 阿膠貳兩炙

先以水叁升煑葱豉取壹升去滓入膠再煎令烊服壹
日壹夜可服叁肆劑經心錄同

經心錄療治妊娠捌玖月胎動不安心腹㽲痛面目青冷汗
出氣欲絕此由勞動用力傷胎宮宜急治之

鉤藤 當歸 茯神 人參各壹兩
苦梗壹兩半 桑寄生半兩

右爲粗末每服五大錢水貳盞煎至壹盞去滓溫服無
時候忌豬肉菘菜若煩熱加石膏貳兩半臨產月加桂
心壹兩

妊娠胎動不安護胎法

鯉魚貳斤 粳米壹升 葱壹握 豉壹合

右作臛食之每月壹度
[illegible]

治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶[illegible]

當歸 桑寄生各貳分 川芎叁分 豉壹合
阿膠貳分 葱白拾肆莖

右以水貳升煑取捌合下膠烊溫分貳服壹方無豉
用銀器煎集驗無寄生豉有續斷叁分銀多少先煮後
入藥

[illegible]治胎動不安腹痛下黃汁

糯米壹合 黃耆 川芎各壹兩

右細剉水壹大盞煎至壹盞叁分溫服

產寶方治胎動

熟艾 阿膠各貳兩 葱白壹升

右以水肆升煑取壹升半分爲叁服

安胎鐵罩散 白藥子壹兩 白芷半兩
右為細末每服貳錢煎紫蘇湯調下或胎熱心煩悶入
砂糖少許煎
葱白酒 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方
苧根貳兩剉 銀伍兩 清酒壹盞
右以水壹大盞煎至壹大盞去滓分溫貳服
治胎動方 出產生必用方
阿膠 川芎 當歸 青竹茹貳兩
右以水拾升煮銀壹斤煮至伍升去銀入上件藥叁味
煮至貳升半去滓入膠再煎膠烊分溫叁服空心自早
至暮盡未効再作

治妊娠冷熱腹內不調致胎不安方 出產寶方
艾葉貳兩 當歸 乾薑各叁兩 川芎肆兩
右以水肆升煮取貳升分溫肆服不過兩劑
寄生湯 治胎氣常不安治伍箇月已後胎不安
桑寄生壹兩 秦艽 阿膠各半兩 糯米半合
右以新汲水叁升先下寄生秦艽貳味煮至貳升去滓
次入阿膠糯米再煮約有壹升止分作叁服空心食前
日午服之忌酒醋叁伍日姙婦胎氣至伍月以後常不
安者服之必効須見孩婦好飲酒食鹹酸伍辛胎必動
可不知之
治胎動不安
好銀煮取水 右著葱白作羹食之佳

又方
川芎貳兩 葱白壹升
右以水柒升煮取貳升半分溫叁服
順氣飲子 產前服之安胎
紫蘇葉 木香 人參 草豆蔻
茯苓各壹兩 甘草半兩 大腹子壹兩如氣弱者不用腹
右㕮咀每服叁錢水壹盞苧根叁寸糯米少許煎至柒
分去滓溫服
療姙娠後不轉動方
阿膠炙壹兩 桑寄生半兩
右為末以酒壹升煮伍沸下生雞卵壹枚投酒中分溫
貳服空心食前當服小品方無寄生有艾葉只用水煎

文仲安胎寄生湯 療血流下方
桑寄生 白朮各伍分 茯苓肆分 甘草拾分
右切以水伍升煮取貳升半分叁服若人壯者可加芍
藥捌分足水貳升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑
肆分即安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等崔氏小品經
心同
治胎動不安秦艽湯 出王氏指迷方
秦艽 阿膠炒 艾葉
右等分為粗末每服伍錢水貳盞糯米百粒煎至壹盞
去滓溫服
小品療姙娠重下痛引腰背安胎止痛湯方
當歸 阿膠炙 乾地黃 黃連

芎藭各壹兩　雞子壹枚　秫米壹升

右柒味以水柒升，煑雞子令相得，煑秫米令如蟹目沸，去滓，內諸藥，煑取叁升，分肆服。忌與黃經心錄同。

又療妊娠動胎損動，毋去血腹痛方

膠叁兩炙　艾葉壹把

右貳味以水伍升，煑取貳升半，分叁服。經心錄同。

妊娠漏胎下血方論第五

夫妊娠漏胎者，謂妊娠數月而經水時下也。此由衝任脈虛不能約制手太陽少陰之經血故也。衝任之脈為經絡之海，起於胞內。手太陽，小腸脈也；手少陰，心脈也。是二經為表裏，上為乳汁，下為月水。有娠之人經水所以斷者，壅之養胎，蓄之以為乳汁也。衝任氣虛則胞內泄不能制其經血，故月水時下，亦名胞漏。血盡則人斃矣。又有因勞役喜怒哀樂不節，飲食生冷，觸冒風寒，遂致胎動。若母有宿疾，子藏為風冷所乘，氣血失度，使胎不安，故令下血也。

妊娠卒然下血方論第六　凡十二方

夫妊娠卒然有損動，或冷熱不調和，致傷於胎，故卒痛而下血。若不止之，則墮胎也。

療妊娠叁肆箇月腹痛時時下血

續斷捌分　艾葉　當歸　乾地黃各陸兩

竹茹　阿膠　雞蘇各肆兩

右以水壹升煎取陸合，去滓，空心再服，隔日更服。

療妊娠陸柒箇月忽胎動下血腹痛不可忍

川芎捌分　桑寄生肆分　當歸拾貳分

右以水壹升煎取捌合，下清酒半升，再煎取捌合，分叁服。假如人行伍陸里再服。

廣濟主安胎胎病漏血腹痛

當歸　川芎　阿膠炙　人參各壹兩

大棗拾貳枚

右切，以水叁升，酒肆升，煑取貳升半，分叁服，伍日壹劑，頻服叁肆劑。無所忌。

又療妊娠胎動腰痛及下血安胎

當歸　川芎　苧根各叁兩　鹿角膠

艾葉各貳兩　蔥白壹升

右細切，以水壹斗，煑取伍升，空心熱服。正方用銀煑水煎藥。又見腰痛門。

療妊娠忽下血，胎上衝心，手足逆冷，用生艾汁貳錢入阿膠、白蜜各貳錢，煎至壹錢半，稍熱服。如無生艾，濃煎艾汁。

治妊娠忽然下血腹痛不可忍

鹿角銼細　當歸

只作壹服，以水叁琖煎至壹琖半，空心食前分服，不過貳服即安。

又方

阿膠壹兩炙　艾葉炙半兩

右為細末，空心糯米飲調下貳錢。

漏胎下血不止，胞乾即死，宜急治之。

生地黃汁壹升　酒伍合

右同煎叁伍沸，分溫叁服，以止為度。

崔氏療妊娠下血不止血盡子死
生乾地黃為末酒服方寸匕日叁夜壹即愈不過三服愈
又療妊娠漏胞方 又見補遺方
生乾地黃肆兩 乾薑貳兩半
右為末酒服方寸匕日再集驗文仲經心同
療妊娠無故卒然下血不絕方
阿膠叁兩 用清酒壹升半煎取壹升頓服
又方治妊娠卒然下血兼治胎衣不下方
右以鐵錘燒令通赤內酒中如此者叁大候溫飲壹盞

妊娠驚胎及僵仆方論第七 凡七方

夫妊娠驚胎者是懷妊月將滿其胎神識已具或將產之時從高墮下傷損胞絡致血下胎動遂上搶心胷悶絕不[illegible]以其母面赤舌青口無沫出者兒死母活唇口俱青沫出者子母俱死面青舌青沫出母死子活若下血不止胞燥胎令子死矣

佛手散 壹名芎藭湯 治婦人妊娠伍柒月因事築磕著胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下本出文仲徐王効神驗胎動方云治血上衝心腹滿悶者如湯沃雪救急經心同 出外臺 又治產前產後體熱敗血腹痛
當歸叁兩 川芎肆兩 [illegible]等分
右為粗末每服叁錢水壹大盞煎令泣泣欲乾投酒壹大盞止煎壹沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服不過叁貳服便生壹方云此藥治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多昏暈欲倒者以水煎服 或先以漏血腹內疼痛加芍藥官桂減半隨手效[illegible]

治妊娠因墮倒損胎不轉動腹內疼痛腰重及子死腹中不出須臾三服立下
川芎壹兩為細末以熱酒調服方寸匕日叁肆服
治妊娠因失所動困絕千金方亦治子煩
右取竹瀝飲壹升立愈
治妊娠從高墮下腹痛下血煩悶
生地黃 益母草各壹兩 當歸 黃耆各半兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞薑肆片煎至陸分去滓無時候
集驗療妊娠貳叁月上至柒捌月頓仆失跙胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣下血不止方
乾地黃 當歸 艾葉 阿膠
川芎各叁兩
右以水柒升煮取貳升半分作叁服腹痛甚加杜仲五加皮各叁兩 一方無地黃有甘草壹方無地黃艾用生地黃自然汁壹匙地黃汁半合馬通半合煎成去滓入此再煎叁沸溫服壹方有人參白茯苓各水煎

竹茹酒 治妊娠誤有失墜損築胎損疼痛
青竹茹貳合 好酒壹升 煮取伍沸分作叁服即安
療妊娠或因僵仆胎動不安腳腹疞痛 [illegible]
出產科 方見前
療妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍兼治崩血甚者
[illegible]治子旨 又名子[illegible]

縮砂[illegible]和皮炒令黑色壹方用仁[illegible]
末熱酒調下貳錢不飲酒者以米飲調下[illegible]覺腹中
熱則胎已安矣此方極效溫隱居云神效不可盡述[illegible]
用有效

姙娠胎上逼心方論第八 凡七方

夫姙娠將養得所則血氣調和故兒在胎則安當產亦易若節適失宜則血氣乖理兒在胎則動至產育亦難而子上逼於心者由產難用氣力胎動氣逆胎上衝逼於心[illegible]胎上逼於心則悶絕胎下乃甦甚者至死也

[illegible]治姙娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸[illegible]治臨產驚恐氣結連日不下 名七寶散 無芎

當歸叁分 甘草壹分 大腹皮 人參
川芎 陳橘皮 白芍藥 紫蘇[illegible]

右㕮咀每服半兩水壹盞半薑肆片葱白柒寸煎[illegible]分去滓空心溫服

[illegible]

簡易治姙娠胎動漏心悶絕煩燥口乾橫生倒產上衝

下氣迷悶脣口青黑手足厥冷產科名保安散壹方無葱有川芎厚朴產寶方有川芎

當歸 人參各陸銖 阿膠壹兩炒 甘草壹兩
連根葱白壹握

右細剉水貳升煎肆味至升半去滓下葱再煎叁合溫服壹劑分為貳叁服

治胎上逼心熱痛下血

麴半斤搗碎和熟水絞取汁叁中盞無時分溫伍服。壹方治胎動腰痛連腰用麥麴新汲水調下壹方用神麴大同小異

治胎上逼心煩悶方又治姙娠陸柒月已後胎動困篤

葱白貳柒莖濃煮汁飲之即安若胎已死服之即出未死即安未效再服

治胎不順胎上逼心方。以烏犬血少少飲之當下

治姙娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白朮伍兩 黃芩貳兩 芍藥肆兩

右水陸升煮取貳升半分為叁服緣胎有水致痛兼易產

文仲葛氏療姙娠卒胎上迫心痛方。取弩弦急帶之立愈

姙娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛方第九 凡壹方

療姙娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

糯米伍升 黃耆陸兩

右以水柒升煎取貳升分為肆服

姙娠誤服毒藥傷動胎氣方第十 凡叁方

奪命圓 專治婦人小產下血至多子死腹中其人憎寒手指唇口爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則悶絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下此方的係異人傳授至妙

牡丹皮　白茯苓　桂心　桃仁（去皮尖）　赤芍藥

右等分為細末以蜜圓如彈子大每服壹圓細嚼淡醋湯送下速進兩圓至胎腐爛腹中危甚者立可取出

治婦人服草藥墮胎腹痛方（男六一陳無擇）

白扁豆生去皮為細末米飲調服方寸匕若口噤[illegible]及濃煎服亦可亦解男子女人誤中砒毒亦[illegible]人[illegible]（出本草）

用下姜炒黃為末米飲調下（[illegible]）

阿膠散 治妊娠不問月數深淺或因頓仆或因毒藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣方（出[illegible]）

熟地黃（貳兩）　白芍藥　艾葉　當歸　甘草　阿膠　黃耆（各壹兩）　一方有川芎

右㕮咀每服半兩水壹大盞薑叁片棗壹枚煎至柒分去滓溫服無時

妊娠心痛方論第十一

凡十方

夫妊娠心痛者多是風邪痰飲交於心之經絡邪氣搏於正氣交結而痛也若傷心正經而痛者為真心痛心為帝主之官統領諸藏不可受邪邪若傷之朝發夕死夕發旦死若傷心支別絡而痛者則乍安乍甚休作有時也妊娠之人或有病痛不已者氣乘胞絡傷損子藏也則令胎動凡胎轉移則多不安不安而動於血者則血下也

治妊娠卒心痛氣欲絕方（出產寶）

川芎　當歸　茯苓　厚朴（製各壹分）

右水陸升煎取貳升分為貳服忌如前

雷公炮炙論云心痛欲死急覓延胡

白朮湯 治妊娠卒心痛欲死不可忍者（出古今錄驗）

白朮（叁兩）　赤芍藥（貳兩）　黃芩（壹兩半）

右切以水陸升煮取貳升半分叁服半日令盡微下水令易生忌桃李雀肉

千金療妊娠心痛

青竹茹（壹升）　羊脂（捌兩）　白蜜（叁兩）

右叁味合煎每服棗核大叁枚食前頓服日叁服（[illegible]）

又方

青竹皮壹升酒貳升煮取壹升半去滓分溫頓服

又方

破雞子壹枚調酒服之

又方

大麻子叁升研水捌升煮取伍升分為伍服

又方

橘皮（叁兩）　豆豉（叁兩）

右為細末煉蜜圓如梧桐子大溫水下貳拾圓無時候（四方出外臺秘要）

妊娠心腹痛方論第十二

凡十一方

夫姙娠心腹痛者或由宿有冷疾或新觸風寒皆由臟虚而致發動也邪正相擊而并於藏隨氣上下衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也姙娠而痛者邪正貳氣交攻於內若不時差者其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮也又云姙娠心腹疼痛多是風寒濕冷痰飲與藏氣相擊故令腹痛攻傷不已則致胎動也

當歸芍藥散 治姙娠腹中㽲痛心下急痛及療產後血暈內虛氣乏崩中久痢常服通暢血脉不生癰瘍消痰養胃明目益津

白芍藥半斤 當歸 茯苓 白朮各貳兩

澤瀉 川芎各肆兩壹本川芎只用貳兩

右爲細末每服貳錢食前溫酒調服 元和紀用經云本六氣經緯元能祛風補勞養真陽退邪熱緩中安和神志潤澤容色散邪寒瘟瘴時氣安期先生賜李少君久餌之藥後仲景增減爲婦人懷姙腹痛方本方用芍藥肆兩澤瀉茯苓川芎各壹兩當歸白朮各貳兩亦可以蜜元服出三因方

治姙娠心腹痛不可忍方

鹽壹斤燒令赤右以兩指取壹撮酒調服

療姙娠先患冷氣忽中心腹痛如刀刺

川芎 人參 茯苓 吳茱萸

苦梗 當歸各叁兩 厚朴 芍藥各貳兩

右㕮咀以水玖升煎取叁升分叁服氣下即安

療姙娠患腹痛并胎動不安

葱白切壹升 人參 厚朴 阿膠

川芎各貳兩 當歸叁兩

右㕮咀以水柒升煎取叁升分作叁服一方有甘草無厚朴川芎

香朮散 治姙娠伍箇月已後常胸腹間氣刺滿痛或腸鳴以至嘔逆減食此由忿怒憂慮過度飲食失節之所致。蔡元度寵人有子夫人怒欲逐之遂病醫官王師復處此方參服而愈後用果驗

廣中莪茂壹兩 丁香半兩 粉草壹分

右爲細末空心鹽湯點服壹大錢覺胸中如物按下之狀

草豆蔻散 治姙娠心腹常痛或食減少四肢不和全不入食

草豆蔻仁肆兩 陳橘皮 乾地黃

白朮各壹兩 川芎叁分 當歸 桂心

乾薑 木香各半兩

右爲細末每服肆錢水壹盞棗貳枚煎至陸分熱服

阿膠散 治姙娠胎動腹中疼痛不思飲食

白茯苓 白朮 川芎 阿膠炒各叁分

當歸炒 陳皮各壹兩 甘草壹分

右㕮咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹箇煎至柒分去滓溫服

治姙娠肆伍月忽心腹絞痛

大紅棗拾肆枚燒存性爲末以童子小便調下

治姙娠胎動欲落腹痛不可忍

上等銀壹斤茅根

右以水玖升煮銀取貳升入清酒壹升同煎[illegible]取貳
升分爲叁服立安
古今錄驗療妊娠腹內冷痛忽胎動
薤白壹升　當歸切肆兩
右以水伍升煮取貳升作叁服亦將小便服將去壹次
頃出
千金療妊娠腹中痛
生地黃叁斤擣取汁酒壹升合煎減半頓服愈
妊娠中惡方論第十三　凡叁方
夫妊娠人忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡言邪惡
之氣中胎傷於人也所以然者血氣自養而爲精神之主
若氣血不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠之
[illegible]
病亦致損胎也
聖惠方治妊娠中惡心腹疞痛
當歸　丁香　川芎各叁兩　青橘皮貳兩
吳茱萸半兩湯洗焙乾微炒
右爲細末無時溫酒調壹錢
又方
生乾地黃壹兩　枳殼　木香各叁分
右爲細末每服壹錢酒調下
又方
苦梗壹兩細剉略炒　薑半片煎服
妊娠腰腹及背痛方論第十四　凡十方
論曰腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之則腰痛
冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛不止多
動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則胎墮也
療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛
當歸叁兩　阿膠　甘草各貳兩　葱白壹升
右細剉以水柒升煮取叁升去滓分溫伍服
紫酒治妊娠腰痛如折
大黑豆貳合炒令香熟以酒壹大琖煮取柒分去豆空
心頓服
通氣散治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙
破故紙不以多少瓦上炒令香熟爲末嚼核桃肉半箇
空心溫酒調下貳錢
[illegible]
療妊娠腰背痛反復不得
鹿角[illegible]鹿角爲末服亦可
療妊娠腰痛不可忍或連胯痛先服此散
杜仲炙　五加皮　阿膠炙　防風
金毛狗脊　川芎　北細辛　白芍藥
萆薢各叁兩　杏人[illegible]
右㕮咀以水玖升煮取貳升去滓下膠作叁服
療妊娠叁貳月腰痛不可忍者[illegible]
續斷　杜仲各[illegible]　獨活各叁兩
狗脊　五加皮　萆薢　芍藥
薯蕷　訶子肉各[illegible]兩
右爲末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下肆拾圓日叁服
療觸動胎以致腰痛背痛

杜仲　五加皮　當歸　芍藥　人參
川芎　萆薢各叁兩
右細剉，以水柒升，煮取貳升半，分溫叁服。
療妊娠叁、貳月及柒、捌月胎動不安，或腰肚痛及血下。
川芎　當歸各肆兩　艾葉　阿膠各貳兩
甘草壹兩
右細剉，以水伍升，煮取貳升，去滓，分溫叁服。
大地黃圓治產前後腰腹疼，壹切血疼痛疾方，治血氣虛，
四肢不舉，骨髓熱疼。
熟地黃貳兩　烏梅肉　當歸各壹兩
右爲細末，煉蜜圓如彈子大，每服壹圓，白湯嚼下，空心。
廣濟療妊娠胎動，腰痛及下血，安胎方。方見前第叁論中
小品苧根湯療損動胎，腰腹痛，去血，胎動向下方。
生乾地黃　苧根各貳兩　當歸　芍藥
阿膠　甘草各壹兩
右細切，以水陸升，煮取貳升，去滓，内膠，煎烊，分溫叁服。
忌海藻、蕪荑。
救急療胎動去血，腰腹痛。方見前第四篇中
妊娠小腹痛方論第十五　凡壹方
論曰：妊娠小腹痛者，由胞絡宿有風冷，而妊娠血不通，冷血相搏，故痛甚，亦令胎動也。
療妊娠被驚惱，胎向下不安，小腹痛連腰，下血。
當歸　川芎各壹分　阿膠炙　人參各壹分
艾葉肆分　大棗貳拾個　茯苓各拾分

新編婦人大全良方卷之十三

妊娠數墮胎方論第一　凡五方

夫陽施陰化，故得有胎。榮衛調和，則經養周足，故胎得安，則能成長。若血氣虛損，若子臟為風寒所苦，則血氣不足，故不能養胎，所以數墮胎也。其妊娠腰疼者，喜墮胎也。

千金療妊娠一二箇月數墮胎法：灸膝下一寸，七壯。

又方

赤小豆為末，酒調方寸匕，日二服。亦治妊娠數月月水尚來。

刪繁方療妊娠損胎數落而不結實，或冷或熱，宜服之。源

甘草　黃耆　人參　川芎

白朮　地黃　吳茱萸各等分

右為末，空心溫酒調二錢，忌菘菜、桃李、雀肉、醋物。總錄

廣濟療婦人懷妊數傷胎方

鯉魚二斤　粳米一升

右二味如法作臛，少著鹽，勿著葱豉醋，食之，甚安胎。一月中須一三度作，效，安穩無忌。集驗、文仲、備急、崔氏、延年方同

經心錄紫石英圓　主風冷在子宮，有子常落，或始為妊便患心痛，乃成心疾，月水都未曾來，服之肥悅，令人有子方

紫石英　天門冬　五味子　烏頭

卷柏　烏賊魚骨　雲母　禹餘糧

當歸　川椒　桑寄生　石楠葉

澤瀉　杜仲　遠志　蓯蓉

桂心　甘草　石斛　人參

辛夷　柏子仁

右為末，煉蜜為圓如梧桐子大，溫酒下二十圓至三四十圓。

千金方同

療妊娠數墮胎，皆因氣血虛損，子臟風冷，致胎不堅固，頻有所傷，宜服卷柏圓

卷柏　鍾乳粉　鹿角膠　紫石英

陽起石　桑螵蛸　禹餘糧　熟地黃

桂心　川牛膝　桑寄生　北五味

蛇床子　牡丹皮　杜仲　川芎

當歸

右為末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓，空心溫酒下。

妊娠胎不長養方論第二　凡五方

夫妊娠之人，有宿挾疾而後有娠，或有娠時節適乖理，致生疾病，並令腑臟衰損，氣力虛羸，令胎不長，故須服藥去其疾病，益其氣血，以扶養胎也。

集驗治婦人懷胎不長方

鯉魚長一尺者，去腸肚鱗，以水漬沒，內鹽及棗，煮令熟，取汁稍稍飲之。當胎所腹上當汗出，如牛鼻狀。雖有所見，胎雖不安者，十餘日輒一作此，令胎長大，甚平安。

古今錄驗療妊娠養胎白朮散

白朮　川芎各四分　川椒三分　牡蠣二分

右肆味為細末，酒調服一錢匕，日三夜一。但苦痛加芍藥；心下毒痛倍加川芎；吐唾不能飲食，加細辛一兩，半夏

大者黃水於服之後更以粳米服之若嘔亦以粳米
服之後不解者小麥汁服之已後其人若渴者大麥粥
服之病雖愈盡服之勿置 [illegible]

療姙娠胎不長宜服安胎和氣思食利四肢黃耆散

黃耆 白朮 陳皮 麥門冬
白茯苓 前胡 人參各三分 川芎
甘草各半兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞生姜叁片棗壹枚煎至柒分去
滓溫服

療姙娠胎不長宜服養胎人參圓

人參 白茯苓 當歸 柴胡
刺薊 厚朴 桑寄生各一兩 枳殼麩炒
甘草半兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓食前溫
水吞下

白朮圓 調補衝任扶養胎氣治姙娠宿有風冷胎萎不長
或失於將理傷動胎氣多致損墮 [illegible]

白朮 川芎 阿膠炒
當歸去苗炙 牡蠣煅取粉 川椒去目炒出汗 [illegible]

右為末煉蜜為圓如梧桐子大空心米飲吞叁肆拾圓酒
醋湯亦可

姙娠胎動安不得卻須下方論第三　凡七方

因母得病欲去子方附

夫姙娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損氣血枯竭既不能養胎
致胎動而不堅固終不能安者則可下之免害姙婦也
或胎動安不得尚在腹母欲死須以牛膝湯下之

牛膝去苗兩 水銀貳兩 朱砂細研半兩

右以水五大盞煮牛膝可得壹半去滓即以蜜和朱砂
及水銀研如膏每服以牛膝汁壹小盞調下半匙頻服

治姙娠母因疾病胎不能安可下之桂心散

桂心 瓜蔞 牛膝 瞿麥各壹兩
當歸壹兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓空心服

又方

瞿麥 桂心各壹兩 牛膝貳兩 蟹爪貳合

右為細末空心溫酒調下壹錢服

又方

牛膝壹握 右細擣以無灰酒壹大盞煎取七分溫貳服

又方

取七月七日法麴肆兩水貳大盞煎取壹盞叁分綿濾
去滓分溫叁服立下

小品療姙娠得病須去胎方

麥蘖壹升為末和煮貳升服之即下神效

文仲療姙娠得病欲去胎方

取雞子壹枚以叁指撮鹽置雞子中服之立出與阮河
南療產難同千金經心錄同

姙娠墮胎後血下不止方論第四　凡九方

夫墮胎後復損於經脈經脈既虛故下血不止也下血多

者便致煩悶乃至死矣

治妊娠損動下血不止腹痛宜服此方

阿膠炙壹兩　艾葉半兩

右以水壹大殘煎至陸分去滓溫服空心

治妊娠損動下血不止

甘草炙壹兩　阿膠炒貳兩　雞子壹枚

右細剉以水貳大殘煮甘草壹殘參分去滓下雞子及阿膠候膠消攪令停無時分溫參服

廣濟療因墮娠下惡血不止龍骨散

龍骨　當歸　地黃各八分　艾葉四分

地榆　阿膠　芍藥　乾薑各六分

蒲黃五分　牛角鰓炙焦十分

右爲細末食前粥飲調下貳錢

治妊娠墮胎下血不盡苦煩滿欲絶時發寒熱狂悶方

鹿角屑壹兩熬

右以水壹大殘煎豉壹合取汁陸分分爲參服調鹿角屑貳錢服日參服須臾血下古今錄驗同

千金療落胎下血不止方

右以生地黃汁壹小殘調代赭末壹錢日參服

治妊娠下血疼痛不止方亦治小便不禁

右以雞卵燒灰細研以溫酒調下貳錢如人行五里再服以效爲度

千金療妊娠胎墮下血不止方

丹參壹味剉貳兩

右細切以酒伍升煮取參升分爲參服

救急療損娠方

右取朱砂末壹錢匕生雞子參顆取白和朱砂頓服胎若死即出如未死即安

妊娠日月未足欲產方第五　凡四方

集驗知母圓治日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩

知母壹味爲細末煉蜜爲圓如雞頭大溫酒嚼下日參服

千金搭氏小品同　一方圓如梧桐子大粥飲下二十圓

槐子圓治妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子　蒲黃等分

右爲末蜜圓如梧子大溫酒下貳拾圓以痛止爲度

又方

取蒲黃如棗核大篩過以井花水調服

又方

梁上塵　竈突煤

右貳味爲細末空心酒服方寸匕

斷產方論第六　凡七方

論曰欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰生然亦有臨產艱難或生育不已或不正之屬爲尼爲娼不欲受孕而欲斷之者故錄驗方以備所用然其方頗衆然多有用水銀蝱虫水蛭之類孕不復懷難免受病此方平和而有異驗列具于后

小品方療婦人斷產驗方　千金翼外臺秘要同

故蠶紙方圓一尺燒爲末酒飲調服終身不復懷孕也

療妊娠欲去之并斷產方

枳殼　桂心各貳兩　豉壹升
右叁味切以水肆升煮取壹升半分服之
又方　附子貳枚爲末以淳苦酒和塗右足去之大良
千金斷産方
油煎水銀壹日方息空心服如棗大壹圓永斷不損人
廣濟落胎方
栝樓根肆兩　桂心伍兩　牛膝叁兩　瞿麥貳兩
右切以水柒升煎取貳升叁合去滓溫分叁服服後如人
行五里又進壹服無忌
小品療羸人欲去胎方
粉草　乾薑　人參　川芎
生薑　肉桂　蟹爪　黃芩
右捌味等分細切以水柒升煮取貳升分叁服
一　療婦生息
千金欲去胎
大麥麴伍升清酒壹斗煮叁沸去滓分伍服隔宿勿食旦
再服其子如糜令母肥盛無疾苦　千金不傳

妊娠咳嗽方論第七　凡八方

夫肺感於寒寒傷於肺則成咳嗽也所以然者肺主氣而外合皮毛毛竅不密則寒邪乘虛而入故肺受之也五臟六腑俱受氣於肺以其時感於寒而爲嗽也秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其嗽不已則傳於腑妊娠病久不已者則傷胎也

療妊娠心肺痰壅肺氣不順咳嗽頭疼　款冬花散
款冬花　麻黃　貝母炒　前胡
桑白皮　紫菀各半兩　旋覆花　白术
甘草各壹分　石膏壹兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑叁片煎至七分去滓溫服
食後

治妊娠肺壅咳嗽喘急不食　天門冬飲
天門冬去心　桑白皮　苦梗　紫蘇各半兩
赤茯苓壹兩　麻黃去節　貝母　人參
甘草炙半兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞薑叁片煎至柒分去滓不拘
時候服

治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急　馬兜鈴散
馬兜鈴　苦梗　人參　甘草
貝母各半兩　陳皮去白　大腹皮　紫蘇
桑白皮各壹兩　五味子柒分
右㕮咀每服肆錢水壹盞薑叁片煎至柒分去滓無時
溫服

參蘇散　治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食
麻黃　陳皮　前胡各壹兩　半夏
人參　白术　枳殼　貝母
甘草各半兩
右㕮咀每服肆錢葱白五寸薑半分棗二箇水壹盞半煎
至六分去滓溫服

百合散　治妊娠咳嗽心胸不利煩悶不食

川百合　紫菀　麥門冬　苦梗
桑白皮各一兩　甘草半兩
右㕮咀每服四錢水一盞竹茹一塊煎至七分去滓入
蜜半匙更煎二兩沸不拘時溫服
紫菀湯 治妊娠咳嗽不止胎不安 出產寶
甘草　杏仁各二錢半　紫菀一兩　桑白皮一分
苦梗參分　天門冬一兩
右㕮咀每服三錢水一盞竹茹一塊煎至七分去滓入
蜜半匙再煎二沸溫服
治妊娠咳嗽方
以款冬花蜜炙赤投酒中候冷飲之良
療妊娠傷寒痰多咳嗽 [illegible]
知母　杏仁　天門冬　桑白皮各等分
右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓服
妊娠嘔吐不止宜服前方[illegible]重而有動
妊娠吐血衄血方論第八　凡二方
論曰夫妊娠吐血者皆由臟腑所傷[illegible]
臟氣逆吐血吐血而心悶[illegible]不欲止心悶甚者亦妊娠
病此多墮胎也可與方[illegible]有動
治吐血不止
馬勃用生布擦為末濃米飲調下[illegible]
[illegible]
方見[illegible]以白茅[illegible]汁服[illegible]吐血方中
妊娠子煩方論第九　凡十方

論曰妊娠若煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六月
受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子
煩也產寶云夫妊娠而子煩者是肺臟虛而熱乘於心則
令心煩也停痰積飲在心胸之間或衝於心亦令煩也若
熱而煩者但熱而已若有痰飲而煩者嘔吐涎沫惡聞食
氣煩躁不安也大抵妊娠之人既停痰積飲又寒熱相搏
氣鬱不舒或煩躁或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂之子
煩也
竹葉湯 治子煩
防風　黃芩　麥門冬各三兩　白茯苓四兩
右㕮咀每服四錢水一盞竹葉數片煎至七分去滓溫
服忌酢物
外臺秘要有竹瀝無竹葉名[illegible]
[illegible]一方無[illegible]
又方 時時飲竹瀝隨多少
療妊娠煩悶或胎不安[illegible]
淡青竹刮茹一兩
右以水一大升煮取四合徐徐服盡為度
麥門冬散 治妊娠心煩憒悶虛躁吐逆惡聞食氣頭眩四
肢沉重百節疼痛多臥少起
麥門冬　子芩　赤茯苓各一兩　柴胡
赤芍藥　陳皮　人參　苦梗
桑寄生　甘草　旋覆花各半兩　生地黃一兩
右為粗末每服四錢水一盞生薑半分煎至六分去滓無
時溫服

又方

麥門冬　苧根各壹兩　黃芩　茯神各壹兩

甘草各壹分　犀角屑半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞生地黃壹分竹葉貳柒片煎至陸分去滓溫服

柴胡散 治妊娠心煩頭目昏重心胸煩悶不思飲食或嘔吐

柴胡壹兩半　赤茯苓　麥門冬各壹兩　枇杷葉去毛

人參　橘紅　甘草各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞薑參片煎至柒分去滓溫服

人參散 治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁壅熱口舌乾渴

人參　麥門冬　赤茯苓　地骨皮

家乾葛　黃芩　犀角屑各半兩　甘草壹分

右㕮咀每服參錢水壹盞煎至陸分去滓溫服

治妊娠子煩口乾不得臥

黃連去鬚

右為細末每服壹錢粥飲調下須臾[illegible]亦妙

治妊娠心煩熱不止

葱白壹握　豉貳合

右以水貳大盞煎取壹盞半去滓溫分參服

知母圓 治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得臥者巢氏謂之子煩也

知母壹兩洗焙

右為細末以棗肉為圓如彈子大每服壹圓細嚼煎人參湯送下〇次見醫者不識此證作虛煩治之損動胎氣宜矣有識者小見有驗也產科鄭宗文得於陳藏器本草拾遺中也用之良驗

妊娠渴躁口乾方論第十

夫足太陰脾之經也其氣通於口手少陰心之經也其氣通於舌若妊娠之人臟腑氣虛榮衛不理陰陽隔絕熱氣乘於心脾津液枯少故令心煩而口乾也　愚考此說與子煩大同小異其方亦可就子煩中通用　知母圓亦妙

[illegible]散 治妊娠煩熱心神煩躁口乾渴逆

川升麻　黃芩　人參　麥門冬

訶子仁　柴胡　茯神　瓜蔞根

犀角屑各半兩　知母　甘草各壹分

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至陸分去滓溫服

知母散 治妊娠煩躁悶亂口乾及胎臟熱

知母　麥門冬　甘草各半兩　黃耆

子芩　赤茯苓各參分

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓入竹瀝壹合更煎貳沸溫服

葛根散 治婦人妊娠數月以來[illegible]口乾渴因服熱少食

葛根貳兩　黃芩　人參　茯苓

黃耆　麥門冬　甘草各半兩

右每服肆錢水壹盞竹茹壹團如錢大煎至七分去滓溫服無時

麥門冬散 治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參 黄芩 家葛根 秦艽

麥門冬各壹兩 知母各 甘草半兩 赤茯苓壹兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞薑叄片淡竹葉貳拾片煎至

陸分去滓溫服

新編婦人大全良方卷之十三

妊娠中風方論第一

論曰夫四時八方之氣爲風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名爲虚邪賊害萬物人體虚則中之若風邪客於皮膚入於經絡即頑痹不仁若入於筋脉挾寒則攣急喎僻挾溫則弛縱若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虚風邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而爲諸病也妊娠中風若不早治則令墮胎也

防風散 治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢強急

防風 桑寄生 葛根各壹兩 菊花

防己 北細辛 秦艽 當歸

桂心 茯神 甘草 羚羊角各半兩

右爲粗末每服肆錢水壹盞薑叄片煎至陸分去滓入竹瀝半合溫服

白朮酒 治妊娠中風口噤語言不得

白朮壹兩半 獨活壹兩 黑豆壹合炒

右細剉以酒叄升煎取壹升半去滓溫分肆服口噤者拗口灌之得汗即愈

治妊娠中風口眼不正手足頑痹

防風 羌活 防己各壹兩 麻黄半兩去節

黄松木節壹兩 桂心 荊芥穗

羚羊角屑 桑寄生 甘草 薏苡仁各半兩

者當先作瀝汁次擗湯也且竹遠不可卽辦者當先辦湯此二療會得其一種其竹瀝偏療諸痓絕起死也非但偏療姙娠産婦絕死者有効小兒或痸痓金瘡發痓療之亦驗。作竹瀝法見第三卷第十一論

葛根湯 療姙娠臨月因發風痓忽悶憒不識人吐逆眩倒小醒復發名爲子癇

葛根 貝母去心 牡丹皮去心 木防己
防風 當歸 川芎 白茯苓
桂心 澤瀉 甘草炙各二兩 獨活
石膏碎 人參各三兩

右細切以水玖升煮取叄升分貳服貝母令人易産若未臨月者升麻代之忌海藻菘菜酢物

姙娠腹內有鬼胎方論第二 九三方

夫人臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之若榮衛虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也

療姙娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛雄黃丸

雄黃細研 鬼臼去毛 莽草 丹砂細研
巴豆去皮心 獺肝炙黃 蜥蜴炙 蜈蚣去足炙

右爲細末蜜丸如梧桐子大空心溫酒下貳丸日兩服後當利如不利加至叄丸初下清水次下虫如馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如蝦卵雞子或如白膏或如豆汁其病即除

右㕮咀每服叄錢水壹盞半生薑叄片煎至陸分去滓溫服

治姙娠因感外風如中風狀不省人事

右以米醋炒令極熱來熨以治臍下良久即省

陳總領云余女夫趙汝嵩居天台親見一投舍人妻其嫂氏

姙娠風痓方論第二 九一方

論曰夫姙娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相搏發則口噤背強名之曰痓又云痙其候冒悶不識人須臾自醒良久復作謂之風痓亦名子癇亦名子冒甚則反張

治姙娠中風角弓反張口噤語澀

麻黃去節 羌活去蘆 秦艽
桂心 升麻 防風 甘草
秦艽各半兩 川芎 當歸 杏仁去皮尖

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至陸分去滓入竹瀝一合溫服

治姙娠中風腰背強直時復反張

防風 葛根 川芎 生乾地黃
杏仁 麻黃去節 桂心 獨活
甘草 防己

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓溫服

小品療姙娠忽悶眼不識人須臾醒醒復發亦有不醒者名爲痙病亦名子癇亦名子冒葛根湯若有竹近可速辦

療婦人鬼胎及血氣不可忍方

斑猫去頭翅足炒　延胡索炒各等分

右爲細末研如麪以溫酒調下半錢以胎下爲度

治婦人虛羸有鬼胎癥塊經候不通

芫花根三兩

右剉炒令黃色爲細末每服壹錢桃仁煎湯調下當下惡物

妊娠傷寒方論第四　凡一十方

論曰夫四時之氣人體虛爲寒所傷即成病爲傷寒輕者淅淅惡寒翕翕發熱微咳鼻塞數日乃止重者頭疼體痛先寒後熱久而不愈則傷胎凡妊婦傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可與常婦人一概治之也

治妊婦產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下宜**加減四物湯**

當歸　川芎　白芍藥

熟乾地黃各等分用生者各壹兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎至捌分取陸分清汁熱服日肆服以知爲度○妊孕下血即入艾葉阿膠末壹錢同煎疾勢甚大散藥不及以肆味各半兩細剉以水肆盞煎至貳盞半去滓分肆服食前熱服空日之中令盡以知爲度平常產乳服至三臘止如虛弱血臟不調至壹月止○因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲水者加括蔞根壹兩麥門冬參分○腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥各參分○血崩加地黃蒲黃各壹兩○因熱生風加川芎壹分柴胡半兩　身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩　大便秘結加大黃半兩桃仁壹分炒　如大便溏泄加桂心熟附子各壹分　發寒熱加乾薑牡丹皮芍藥各壹分　嘔者加白术人參各半兩　腹脹加厚朴枳實各壹分　虛煩不得眠加竹葉人參各壹分　煩躁大渴加知母石膏各半兩　水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各壹分　虛寒狀類傷寒加人參柴胡防風各參分

妊婦傷寒若發時氣先服此以安胎宜**阿膠散**却以治病藥相間服

阿膠炒　白术　桑寄生　人參

白茯苓

右等分爲細末每服糯米飲調服方寸匕日三服

妊婦傷寒憎寒發熱當發其汗**葱白湯**

葱白十莖　生薑貳兩

右細切以水貳盞煎取壹盞連服取汗愈

妊婦傷寒頭痛壯熱肢節煩疼宜**前胡湯**出黃瀞方

石膏拾貳分　前胡陸分　甜竹茹參分外臺同

黃芩　大青各伍分　知母　梔子仁各肆分

右㕮咀每服伍錢水壹盞半生葱白參寸煎至捌分去滓溫服集驗文仲備急救急同

妊婦傷寒或中時行洒淅作寒振慄而悸或加噦者**黃芩湯**

赤芍藥　橘紅　黃芩　黃連

甘草　蒼朮等分

右㕮咀每服伍錢水壹盞煎至柒分去滓溫服汗出瘥

若胎不安兼服阿膠散 方見前

妊婦寒熱頭疼嘿嘿不欲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷
風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱
不解宜服黃龍湯

柴胡壹兩　黃芩　人參　甘草各壹分半

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎至壹盞中盞去滓溫服

妊婦傷寒頭痛壯熱寒身熱躁悶四肢疼痛項背拘急口乾
渴宜服前胡石膏湯

前胡肆兩　甘草貳兩　石膏八兩

右㕮咀每服貳錢水壹盞薑伍片煎至柒分去滓溫服

出大全良方

若氣虛體冷加人參肆兩

妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹上氣渴不止飲食
不多腰疼體重宜服枳實散

枳實壹兩　陳皮叁分　麥門冬半兩

右為細末每服叁錢水壹盞中盞生薑半分蔥白柒寸煎
至陸分去滓溫服

妊婦傷寒頭目旋疼壯熱心躁宜旋覆花湯

旋覆花　赤芍藥　甘草各半兩　前胡
石膏各壹兩　白朮　人參　麻黃去根節
黃芩各叁分

右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑半分煎至陸分去滓溫服

麥門冬湯 妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安

人參　石膏各壹兩　前胡　黃芩各叁分
葛根　麥門冬各半兩

右㕮咀每服伍錢水壹盞半生薑肆片淡竹茹
壹分煎至捌分去滓溫服

妊婦發斑變為黑色尿血宜梔子大青湯 外臺秘要方

升麻　梔子仁各貳兩　大青　杏仁
黃芩各壹兩半

右㕮咀每服伍錢水壹盞半蔥白叁寸煎至壹盞去滓
溫服

治妊娠傷寒五箇月已前嘗用此方芎歸湯 出傷寒指要

黃芩　當歸　芍藥各貳錢　川芎肆錢
白朮貳錢

[illegible]

右為細末溫酒調服方寸匕日貳服產後百疾悉皆主
之常服則易產與疾苦 王子亨為產後百病之藥

當歸散 治婦人傷寒腹中疞痛

當歸　茯苓　白朮各貳兩　白芍藥半斤
澤瀉　川芎各肆兩

右為細末酒服方寸匕日叁

白朮湯 治妊婦傷寒煩熱頭疼胎氣不安或時吐逆不下食

白朮　橘紅　麥門冬　人參
前胡　赤茯苓　川芎各壹兩　甘草
半夏各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞中盞薑肆片淡竹茹壹分煎至
陸分去滓無時溫服

柴胡散 治妊娠熱病骨節煩疼頭疼壯熱若不治熱不止則損胎

柴胡　葛根　知母　梔子仁

甘草各半兩　石膏壹兩　大青　黃芩

升麻各叁分

右㕮咀每服肆錢水壹盞葱白叁寸煎至陸分去滓無時熱服

麻黃散 治妊娠伍陸箇月傷寒頭疼壯熱四肢煩疼

麻黃　桂心　柴胡　赤芍藥各壹

甘草各半兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞薑叁片煎至陸分去滓無時溫服

升麻散 治妊娠傷寒頭痛身體壯熱

川升麻　蒼木炒　麥門冬　麻黃各壹兩

黃芩　大青各半兩　石膏貳兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞薑半分淡竹葉貳柒片煎至陸分去滓無時溫服

治孕婦傷寒

柴胡　前胡　川芎　當歸

人參　芍藥　甘草　生地黃等分

右為細末每服貳錢薑叁片棗壹箇煎至柒分去滓溫服要出汗加葱

良方白朮散 治妊婦傷寒

白朮　黃芩各等分新瓦上炒令香

右為散每服三錢水一中盞薑四片棗一枚煎至七分溫服但覺頭痛發熱便可吃二三服即瘥唯四肢厥冷陰證者未可服此方本常州一士人賣此藥醫者論斤售去行醫用之如神無人得此方予自得此治疾無有不効者仍安胎益母子

治妊婦傷寒頭疼腹痛

升麻　黃芩各六分　葱白　葛　大青

石膏　甘草各三分　苦竹葉乙握切

右用水一升半先煮苦竹葉乾減一半入諸藥再煮至六合去滓溫服

妊娠時氣方論第五十一　凡三方

論曰天四時之間忽有非節之氣如春應暖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反暖非其節而有其氣而一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似若多發於春也言其時當行此氣故云此時氣也妊娠遇之重者致傷胎也

秦艽散 治妊婦時氣五六日不得汗口乾多吃冷水狂語嘔逆

秦艽　柴胡各乙兩　石膏二兩　赤茯苓

前胡　甘草　犀角屑　葛根

川升麻　黃芩各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑半分淡竹茹一分煎至六分去滓無時溫服

葛根飲子 治妊婦時氣煩熱口乾頭痛

家乾葛　麻黃去節各乙兩　石膏乙兩　豉乙合

白米半合　梔子仁三七枚　葱白一莖連根

右細切以水二大盞煎至一盞三分去滓無時分溫三服

服汗出為效

葵子散 治妊娠時氣六七日熱甚大小便不利煩悶

川芒消一兩細研　葵子二兩擣

右如前煎服以利為效

[illegible]

升麻葛根湯亦可用[illegible]

妊婦熱病方論第六　凡五方

論曰夫冬時嚴寒觸冒傷之藏於肌骨至夏至乃發壯熱又為暑病即熱病也此與氣溫積發即為病若妊娠遇之多致損胎也

經云凡病與中暑相似但熱病者脈盛中暑者脈虛

治妊娠熱病壯熱頭痛嘔吐不止不食心胸煩悶

人參一兩去蘆　竹茹　家葛根　蘆根一兩

麥門冬去心一兩半　知母三分

右㕮咀每服四錢水一盞連根葱白三寸煎至七分去滓溫服

梔子仁散 治妊娠熱病斑出黑色小便如血氣急欲絕胎欲落

梔子仁　升麻　石膏　乾地黃各二兩

黃芩　大青各一兩

右㕮咀每服半兩葱白七寸豉四十九粒水一盞煎至五分去滓無時溫服救急有[illegible]仁無地黃有石膏

[illegible] 治妊娠熱病除六七日熱入腹中大小便秘澀煩熱

川大黃微炒　石膏各一兩　知母　前胡

赤茯苓各一分　梔子仁　甘草　黃芩各半兩

右㕮咀每服半兩水壹大盞生地黃壹分煎至陸分去滓無時溫服

又方

以伏龍肝細研無時水調下壹錢[illegible]

又方

以葱白[illegible]無時服壹小盞

妊娠傷寒熱病防損胎方論第七　凡七方

論曰非節之氣傷於妊婦熱毒之氣侵損胞胎遂有墮胎漏血俱害子母之命也

[illegible]

治妊娠傷寒骨節疼痛壯熱不急則胎落

[illegible]　前胡　家葛根　石膏各十分

青黛四分　升麻八分　梔子仁各貳分

右㕮咀以水柒升煮取貳升半去滓分溫三服

治妊娠時氣頭痛腰背強壯熱

升麻　青黛　前胡　梔子仁

黃芩各二兩　石膏八分　家葛根三兩

右㕮咀以水伍升煎取貳升半去滓分為叁服

治妊婦除六七月傷寒熱入腹大小便秘結不通煩熱

前胡各分　大黃　石膏　梔子仁拾枚

知母　黃芩　茯苓　生薑各八分

右水捌升煎取貳升半，去滓，下大黄更煎叁佰沸，分作叁
服

治姙娠傷寒，苦熱不止，身上斑出，忽赤忽黑，小便如血，氣
欲絕，胎欲落

梔子仁　升麻各肆兩　青黛貳兩　石膏捌兩
葱白切壹升　黄芩叁兩　生地黄壹升

右㕮咀，以水玖升煎取叁升，去滓，分叁服，忌熱物

治姙娠時氣，身大熱，令子不落，護胎方

伏龍肝研令細

右水調塗臍下，乾則易，差即止，泔清亦可

又方

井中泥塗心下，乾則易。二方出本事[illegible]

[illegible]

又方

消石　川朴消　蛤粉　藍根各等分
大黄減半

右為末，水調付臍上，安胎解熱，極妙

姙娠熱病胎死腹中方論第八 凡壹十九四方

論曰：熱病胎死腹中者何？荅曰：因母患熱病至六七日以
後，臟腑極熱，熏煑其胎，是以致死。緣兒死身冷，不能自出，
但服黑神散，暖其胎，須臾胎即自出。何以知其胎之已死？
但看產母舌青者，是其候也。

黑神散 一名烏金散 一名肉桂散

桂心　芍藥　甘草炙
乾薑炮　生乾地黄　黑豆　附子炮去皮臍半兩

右為細末，每服貳錢，空心温酒調下。一方無附子[illegible]

陳無擇評曰：夫姙娠謂之重身，二命係焉，將理失宜，皆能
損胎。不特病重所致，或因頓仆驚悸，出入觸冒，及素有
癥瘕積聚，壞胎最多。其候：若青，即知子死；兼脣論曰面青
舌赤，母死子生；脣青吐沫，子母俱斃；又有雙懷貳胎，或一
死一活。其候尤難知，自非臨歧觀察，未易辨之。不可不備
學也。然以黑神散温胎，未若補助產母，使其氣正，免致虛
乏困頓，胎自下矣。催生湯，催胎黑神散

催生湯 治胎死腹中，或產時氣乏，安娩產道乾澁

蒼术　甘草炙　苦梗壹兩　陳皮壹錢　白芷
桂心　甘草　川芎　川烏
當歸　乾薑　厚朴　芍藥
茯苓　半夏湯洗　附子炮去皮臍　南星
枳殼　木香各壹錢　杏仁去皮尖　阿膠炒

右為細末，每服壹大錢，温酒調下。覺熱悶，加白蜜、新汲
水調服。只是五積散無麻黄，有川烏、附子、南星、阿膠、木
香、杏仁，除味

鹿角散 治姙娠熱病胎死腹中，下之

鹿角屑壹兩

右以水壹盞，葱白伍莖，豉半合，煎至陸分，去滓，温服，未

又方 取死胎

烏雞壹隻，去毛

右細剉，以水叁升，煮取貳升，去雞，通手用衣帛蘸，摩臍
下，胎自出

妊娠瘧疾方論第九 凡四方

論曰夫妊娠病瘧者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪乘之動則陽氣發陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱歇若邪動氣至交爭則發故瘧休作有時其發實時節漸晏者此由風邪客於風府循膂而下衛氣至一日一夜常大會於風府故發日晏其發日早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內注於伏衝之脈其行九日出缺盆之內其氣既上故發更早其間日發者由風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故間日搐積乃發也妊娠而發則寒熱之氣相迫傷於胎或多損動也

治妊娠婦瘧疾不差出集驗方千金救急古今錄驗同 [illegible]

常山 石膏各壹兩 甘草 黃芩各半兩

烏梅 [illegible]

右細切以酒水各壹大盞相和浸一宿平旦煎至壹盞去滓分貳服

千金療妊娠患瘧方

恒山 竹葉各叁兩 石膏捌兩碎 糯米百粒

右切以水陸升煮取貳升半去滓分叁服第一服未發一前一食久服之第二服取臨欲發時服餘壹服涂頭額及胸前五心藥滓置頭邊當發壹日勿進水及飲食發過後乃進粥飲忌生葱菜集驗文仲備急同

治妊娠婦患瘧寒熱頭痛心煩

黃芩 麥門冬去心各壹兩 石膏貳兩

甘草半兩 烏梅拾陸個

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至陸分去滓溫服

治男子婦人一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩三發或連日或間日發或三四日一發不問鬼瘧食瘧不伏水土山嵐瘴氣似瘧者並皆治之

常山 厚朴薑製 青皮 陳皮去白

甘草 檳榔 草果去殼

右等分㕮咀每服半兩於未發隔夜用水壹碗酒壹盞煎至壹大盞濾出露一宿却將滓再用酒水更依前煎壹次去滓別以瓷器盛貯亦露一宿來日當發之早溫溫面東空心服 [illegible] 服發時大有神効 [illegible] 氏○撲

[illegible]

嘗治一婦人妊娠七個月病瘧疾先寒後熱六脈浮緊眾醫用柴胡桂枝無効僕以此疾非常山不愈眾醫不肯因循數日病甚無計遂勉而治之遂用七寶散壹服愈 黃帝問曰婦人重身毒之奈何岐伯曰有故無殞帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死不以毒藥之性味明治療之方惟以中病與疾遏之於半而止之勿過而餘則何疑於攻治哉

妊娠霍亂方論第十 九四方

[illegible]

論曰夫陰陽清濁相干謂之氣亂於腸胃則為霍亂也但飲食過度觸冒風冷使陰陽不和致清濁相干腸胃虛者受之故霍亂也熱多者先吐或心腹痛則吐利並發有頭

[illegible]滯吐瀉發熱而吐瀉者亦爲霍亂所以然者挾風而有實故也風折於氣皮膚經絡故血氣不得宣通故令壯熱風邪乘其經脉氣上衝頭則頭痛風氣入於腸胃則泄痢胃逆則嘔逆故爲吐痢也吐痢甚者則多煩燥臟腑虛故也又手逆冷陽氣暴竭謂之四逆也姙娠之病吐痢甚者則傷胎也

人參散 治姙娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 去蘆　厚朴 薑製　橘紅 各壹兩　當歸 炒

乾薑 炮　甘草 炙 各半兩

右爲散每服肆錢水壹盞棗三枚煎至柒分無時溫服

白朮散 治姙娠霍亂腹痛吐逆不止

白朮 炒　益智仁　枳殼 麩炒　橘紅 各叁分

草豆蔻 煨 [illegible]

右爲散每服叁錢水壹盞薑半分煎至陸分去滓溫服無時

木瓜煎 治姙娠霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕

吳茱萸 湯泡七次　生薑 切 各壹分　木瓜 切 壹兩半

一方有茴香 [illegible]

[illegible]

右細剉水貳盞煎至壹盞貳分去滓分叁服無時熱服

方 **[illegible]散** 治姙娠霍亂吐瀉心煩悶亂作渴

右用糯米壹合泡令淨細研以水壹大盞研濾取汁入蜜壹合生薑汁半合相和温即頓服立止 [illegible]

五苓散 [illegible] 理中丸 [illegible] 胡椒湯 [illegible] 香薷散

[illegible]

[illegible]

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐痢霍亂之後服熱藥太多致煩躁者宜沉令冰冷頓服

草果仁 四兩　烏梅 肉 三兩　甘草 二兩半

右㕮咀每服半兩水一盞煎至八分去滓以熱水溫冷[illegible]

新編婦人大全良方卷之十四

妊娠泄瀉方論第一　凡三方

論曰：凡妊娠泄瀉，冷熱不同。水瀉青白，或黃白，或水穀不化，腹痛腸鳴，其脈弱而緊，此內傷冷也，謂之洞泄寒中。若泄注如水，深黃色，又有完穀，小便赤，腹脇脹滿，煩躁引飲，時時嘔逆，或下利清水，或小便不利，得熱則極，脈虛大而數，由內虛熱入於胃，湊滲下焦，津液不分，并於大腸，謂之協熱利。先以五苓散利小便，次以黃連阿膠元或三黃熟艾湯。凡泄瀉色黃而有沫，腸鳴腹脹，下痢微痛，其脈沉緊而小數，謂之冷熱不調，宜戊己元和之。凡暴下或青或白，水穀或化或不化，腹脇或脹或不脹，或痛或不痛，但腸生熟氣，全不思食，其脈內虛外實，右關脈沉緊者，謂之飧泄，先去沉積，宜感應元，後調和之。凡治瀉先須理中焦，如理中湯元是也；次即分利水穀，如五苓散是也。治中不效，然後斷下，即用禹餘糧、赤石脂是也。（方見前第八卷第八論通用）

厚朴丸　治妊娠洞泄寒中

乾薑　厚朴（去粗皮）

右等分，先杵令爛，水拌同炒令乾，再為末，水煮麪糊為丸如梧桐子大。每服五十丸，食前米飲下。

草果散　治妊娠臟氣本虛，宿挾風冷，脾胃久弱，臟腑虛滑，臍腹㽲痛，日夜無度。

厚朴（二兩，去皮，薑汁制）　肉豆蔻（一個，麪裹煨）　草豆蔻（一個，煨）

右㕮咀，每服三錢，水一盞，薑三片，煎至七分，去滓熱服。

三黃熟艾湯（方見第八卷第十論）

理中元　理中湯　五苓散　黃連阿膠元

戊己元　感應元　已上並見和劑局方

妊娠下痢赤白及黃水方論第二　凡十五方

論曰：夫妊娠之人，胞血既閉，臟氣不理，脾胃易傷，或恣食腥肥生冷，脾胃停滯，不能剋化，冷熱相搏，致令心腹攪刺疼痛，臟血亦自病下，古書所謂滯下是也。亦疾之由，皆因冷熱不調，大腸虛冷，熱氣客於腸間，熱氣乘之則赤，冷氣乘之則白，冷熱相交則赤白相雜而遲滯，水止名為滯痢也。其狀白膿如涕而有血雜，亦有血少者，如白膿涕而有赤脈如魚腦，此名魚腦痢。又有血痢者，熱乘血入於大腸為血痢也。血之隨氣，外行經絡，內通臟腑，常無停積，若觸冒分動，生熱熱乘血散，滲入大腸，腸虛相化，故成血痢也。

療妊娠患痢，膿血狀如魚腦髓，小腹絞痛難忍

阿膠（炙）　地榆　酸石榴皮（兩）　薤白（切）

黃柏（[illegible]）

右用水七升，煎取二升，溫分三服，忌生冷肥膩。

療妊娠白膿痢，腹中冷

乾薑（四兩）　赤石脂（六兩）　粳米（一升，炒黃）

右用水七升，煎取二升，溫分三服，忌如前。

療妊娠腹痛，下痢赤白不可忍

黃連（[illegible]）　石榴皮　當歸（[illegible]兩）　阿膠（炙，二[illegible]）

熟艾（[illegible]兩）

右用水六升，煮取二升，溫分三服，忌如前。

療妊娠腹痛下痢膿血不止

黃連捌分　厚朴剉　阿膠炙　當歸各陸分
艾葉　黃蘗各肆分　乾薑伍分
右為細末，空心米飲調下方寸匕，日參服
療妊娠臍下刺痛，大便白，晝夜參伍拾行
根黃[illegible]　大蒜[illegible]
右以根黃為末，研蒜作膏，為元如梧子大，空心粥飲下
參拾元，日參服妙
壹方不用根黃，用當歸，以芍藥煎湯吞下
療妊娠痢黃水不絕
厚朴參兩炙　黃連貳兩　肉豆蔻[illegible]
右用水貳升，煑取壹升，頓服，忌如前[illegible]
文仲療妊娠下痢不止方
黃蘗　乾薑　赤石脂各貳兩　酸石榴皮壹枚
右細切，以水捌升，煑取貳升，分參服
古今錄驗療妊娠下痢方
酸榴皮　黃芩　人參　櫸皮各肆兩
粳米參合
右細切，以水柒升，煑取貳升，分參服
療妊娠挾熱下痢，冷熱不調，千金翼同
黃連壹升　黃蘗壹升　梔子仁貳拾枚
右為末，每服伍錢，水貳盞，浸[illegible]時，久煑十沸，頓服，嘔者
加橘皮壹兩，生薑貳兩，亦治丈夫常痢
壹方治下痢挾熱下痢，熬梔子仁，用蜜錢羊脂煎服
肘後方療妊娠下痢，赤白如魚腦，腹中絞痛

阿膠炒　黃蘗炒　地榆炒　當歸各壹兩
川芎　酸榴皮各參分
右為細末，葱白粥飲調貳錢
療妊娠下痢，腹痛不食
薤白切，壹升　當歸炒　地榆各壹兩　甘草半兩
糯米參合
右為散，以水柒升，煑取貳升，去滓，溫分參服
療妊娠下痢，腹痛，小便澁
糯米壹合　當歸炒　黃耆各壹兩
右細切，和停，以水貳盞，煑取壹盞貳分，去滓，溫分肆服
治妊娠臨產下痢
右梔子不以多少，燒存性，為細末，每服壹大錢，空心熟
水調服，甚者連進肆伍服即止
治妊娠臟府氣虛弱，頻併下利，時時腹痛，漸覺羸瘦，面
色痿黃，不美飲食
厚朴兩半　白朮　川芎　白芍藥
當歸炒　熟地黃各壹兩　乾薑　人參各半兩
訶子參分　甘草壹分
右㕮咀，每服肆錢，水壹盞，棗參枚，煎至陸分，溫服
療妊娠下痢赤白，絞刺疼痛，出三因方
烏雞子壹枚[illegible]
黃丹[illegible]
右每服貳錢，米飲調下，壹服愈者是男，兩服愈者是女
妊娠大小便不通方論第三　凡十方

論曰夫姙娠大小便不通者由臟府氣實而生於熱熱者隨停之處則成病也若熱結於大腸則大便不通結於小腸則小便不通若大小腸俱爲熱所結故煩滿而大小便皆不通也

小品療姙娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差宜服甘遂散下之

太山赤皮甘遂貳兩

右壹味爲末以白蜜貳合和服如大豆粒多覺心下煩得微下者日壹服下之後還將猪苓散不得下日兩服漸加至半錢以微利爲度 經心錄同

猪苓散 療姙娠小便澀痛兼療胎水 猪苓伍兩去皮

右爲末白湯調方寸匕加至貳匕日叁夜貳不差宜轉下之服前藥

古今錄驗療姙娠得病六七日以上身熱入藏大小便不利安胎除熱葵子湯

葵子貳升 滑石碎

右以水伍升煑取壹升去滓盡服須臾當下便愈

又方

葵子壹升 川朴消壹兩

右研每服叁錢水壹盞煎至陸分去滓溫服

治姙娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩熱

檳榔 赤茯苓 大腹皮 木通

郁李仁去皮 北五味子各壹兩 桑白皮 甘草

苦梗各半兩

右爲粗末每服叁錢水壹盞煎至陸分溫服

治姙娠大小便不通熱悶心腸脹悶妨悶不飲食

大黃 木通 檳榔各半兩 枳殼叁分

大腹子 訶梨勒

右爲末以童便壹盞葱白貳寸同煎至陸分調下貳錢

□□治胎前諸疾或因怒中氣充子藏或充脬脉腹急肚脹腰腹時疼不思飲食四肢浮腫氣急時喘大便忽難小便忽澀產門忽腫

當歸壹兩 赤茯苓 枳殼 白芍藥

川芎貳兩 川白芷 木香 粉草各半

右㕮咀每服叁大錢水壹盞半薑叁片煎至捌分去滓無時溫服如四肢浮腫氣弱及南人枳殼減半如氣實及北人於內加分兩服之或連日大便秘澀加蜜同煎

初虞世治姙娠大便秘澀方

枳殼 防風 甘草

右爲細末沸湯點服貳錢空心日叁

又治姙娠大便秘方

枳殼 阿膠

右爲細末煉蜜和劑杵貳叁千下元如梧子大別研滑石末爲衣溫水下貳拾元半日來未通再服叁拾元止於伍拾元

又方

車前子壹兩 大黃半兩

右爲細末每服叁錢空心蜜湯調下

姙娠小便不通方論第四凡八方

論曰夫姙娠小便不通者由小腸有熱熱入於脬內熱結甚者故令小便不通也若小便不通則心脇小腹氣澀而喘急也陳無擇云凡姙娠胎滿逼脬多致小便不利者或心腎氣不足不能使脬冷清濁相干爲諸淋病或胞系了

戾小便不通名曰轉胞又胎滿逼胞不知時名曰遺尿治
之各有方
古今錄驗療妊娠卒不得小便
杏仁貳拾枚去皮尖熬令變色
右壹味擣元如大豆燈心煎湯吞七粒立得利
又方 以滑石末水和泥臍下
又方 用車前草汁調滑石末塗臍肆畔方四寸熱即易之
治妊娠卒然小便不利方
滑石末 杏仁等分
右先擣杏仁令爛次入滑石末以軟飯擣和為元如小
豆大每服貳拾元白湯送下
治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂
葵子研 榆白皮剉各 葱白
右以水貳大盞煎取壹盞參分去滓分參服
又方 用紫菀去苗為末井花水調下貳錢
苦參元 治妊娠小便難飲食如故
當歸 貝母炒 苦參各參兩 滑石半兩
右為末蜜元如小豆大以米飲下貳拾元不拘時
葵子散 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫者
王子亨云妊娠小便不通特避寒藥又名茯苓湯
葵子伍兩 赤茯苓參兩
右貳味為末每服貳錢米飲調下小水利則愈
壹方無茯苓有榆白皮壹兩
八味元 治婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息以脬

系了戾不得溺故致此病名轉脬但利小便則愈以此藥
有茯苓故也
熟地黃捌兩 山藥 山茱萸去核各肆兩
附子炮 桂心各貳兩 牡丹皮去心 茯苓去皮
澤瀉各參兩
右為末蜜元如梧子大每服參拾元空心温酒下
妊娠子淋方論第五 凡五方
論曰夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數
也膀胱熱則小便行澀而數不宣妊娠之人胞繫於腎腎
間虛熱而成淋疾甚者心煩悶亂故謂之子淋也
小品療妊娠患子淋宜下地膚大黃湯
川大黃 地膚草各參兩 知母 黃芩
猪苓 赤芍藥 通草 川升麻
枳實 甘草各貳兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓温服
經心錄療妊娠患子淋小便數出少或熱疼痛及足煩
地膚草參兩
右細切水肆升煑取貳升半去滓分參服日參服文仲
小品同
療妊娠患淋小便澀不利小腹水道熱痛
冬葵子壹升 芍藥貳兩 黃芩 赤茯苓
車前子各參兩
右㕮咀以水柒升煎至貳升温分參服
療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思食

瞿麥穗　赤茯苓　桑白皮　木通
葵子各壹兩　黃芩　芍藥　枳殼
車前子各半兩
右為粗末每服肆錢水壹盞煎至陸分溫服
療妊娠子淋小便澁痛
冬葵子　滑石　木通各等分
右為末每服肆錢水壹盞葱白柒寸煎至陸分去滓服
續附療妊娠子淋小便澁痛子母祕錄療妊娠胎水
方見本卷第三論

妊娠遺尿方第六　凡三方

療妊娠尿不知出時胎滿故也宜服白薇散
白薇　芍藥各壹兩
右為細末溫酒調貳錢
又方　白礬　牡蠣等分
右為細末溫酒調貳錢[illegible]
又方　用雞毛灰末之酒調方寸匕[illegible]

妊娠尿血方論第七　凡五方

論妊娠尿血者由勞傷經絡有熱在內熱乘於血血得熱
則流溢滲入脬故令尿血也
千金療妊娠卒下血及子淋方三方出外臺
葵子壹升研
右以水伍升煑取貳升分溫叁服
又方　生艾葉壹斤若無以乾者亦得
右以酒伍升煑取貳升分叁服
又方　生地黃[illegible]
右以酒肆升煑取貳升分溫叁服亦療落身後血
續附治妊娠下血及尿血
當歸　生地黃各壹兩　續斷半兩　赤芍藥壹分
右為末空心葱白煎湯調下貳錢
療妊娠尿血
阿膠　熟地黃
右各等分為細末空心粥飲調貳錢

妊娠胎水腫滿方論第八　凡十一方

產寶論曰夫妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不尅水
血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便祕澁陳無
擇云凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜脚腫俗呼為皺脚亦
有通身腫滿心腹急脹名曰胎水
論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若
中風寒邪氣及有所觸犯則隨邪而生病也凡妊娠經血
壅閉以養胎若忽然虛腫乃胎中挾水水血相搏脾胃惡
濕主身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛水氣流溢故令身腫
滿也然其由有自或因泄瀉下痢臟腑虛滑耗損脾胃或
因寒熱瘧疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆能使頭面或手
足浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎多損壞及其臨產
日脚微腫乃胞臟水少血多水出於外故現微腫則易生
也宿有寒氣因寒冷所觸故能令腹脹腫滿也
產乳集養子論
妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以來行步

數辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水出者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝任經有血風未可妄投湯藥亦恐大段甚者慮將產之際費力有不測之憂故不可不治於未產之前也古方論中少有言者按名醫錄云宋少主元徽與徐文伯微行學鍼法文伯見一娠婦足腫不能行少主脉之此女形也文伯診之曰此男胎也在左則胎黑色少主怒欲破之文伯惻然曰臣請鍼之胎遂墮男形而色黑此妊娠足腫之說見於古者今巢氏病源中但有子煩之論千金幷產寶方亦畧言之劉禹錫續傳廣信方以謂妊婦有水氣而成胎太平聖惠亦言之皆非也元豐中淮南陳景初名醫也獨有方論治此病方名初謂之香附散李伯時易名曰天仙藤散也

天仙藤散方

天仙藤[illegible] 香附子[illegible] 陳皮 甘草

烏藥[illegible]

右等分淨秤為細末每服叁錢水壹大盞生薑叁片木瓜叁片紫蘇叁葉同煎至柒分放溫澄清空心食前服日叁服小便利氣脉通體輕腫漸消更不須多服[illegible]

[illegible]

產寶療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓肆兩 杏仁 檳榔[illegible] 旋覆花

郁李仁[illegible]

右為粗末以水陸升煮取貳升去滓分溫叁服小便通即差

崔氏療妊娠體腫有水氣心腹急滿

茯苓 白术各肆兩 旋覆花貳兩 杏仁

黃芩各叁兩

右細切以水柒升煮取貳升半分溫叁服忌桃李雀肉酢物[illegible]

療妊娠遍身洪腫

葶藶子[illegible] 白术[illegible] 茯苓貳兩 桑白皮貳兩

郁李仁[illegible]

右為粗末以水陸升煮取貳升分溫叁服小便利即差

又方

澤瀉 葶藶各叁分 茯苓 枳殼

白术[illegible]

右細切以水陸升煮取貳升分溫兩服小便利即差

澤瀉散治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘急大便不通小便赤澁

澤瀉 桑白皮 木通 枳殼

檳榔 赤茯苓[illegible]

右㕮咀每服肆錢水壹盞生薑肆片煎至柒分去滓食前溫服

防己湯治妊娠脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防己[illegible] 桑白皮 紫蘇莖葉 赤茯苓[illegible]

木香[illegible]

右為粗末每服肆錢水壹盞生薑肆片煎至柒分去滓食

前溫服、

千金鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣、

白朮五兩 茯苓肆兩 當歸 芍藥各參兩

右細剉以鯉魚壹頭修事如食法煮取汁去魚不用每服肆錢入魚汁壹盞半薑七片橘皮少許煎至柒分去滓空心服集驗同

商陸赤小豆湯 治妊娠手足腫滿攣急

赤小豆 商陸等分

右㕮咀每服壹兩用水壹碗煎至柒分澄清汁服集驗

千金方有澤漆 産寶方無澤漆有桑白皮

[illegible]

[illegible]散 治妊娠腰脚腫

白朮 [illegible] 乾薑 甘草各貳兩

杏仁參兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分食前服

指迷方治胎水五皮散 亦常脾虛腫滿亦治

大腹皮 桑白皮 生薑皮 茯苓皮

橘皮各等分

右㕮咀每服半兩水貳盞濃煎木香水壹呷同煎至捌分去滓空心溫服亦治男子脾虛腫滿 壹方無桑白皮有白朮倍之名白朮散

妊娠腹內鍾鳴方第九 凡一方

治孕婦腹內鍾鳴用鼠窟前後土為細末研麝香酒調下貳錢其產立愈

妊娠孕瘖方第十 凡一方

治孕瘖方立效

烏藥 [illegible]

右用水壹盞牛皮膠壹片同煎至柒分溫服

妊娠不語論第十一 無方

孕婦不語非病也間有如此者不須服藥臨產月但服保生元四物湯之類産下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥産後能語則以為醫之功豈其功也哉 [illegible]

妊娠傷食方論第十二 凡二方

經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味若妊子飲食不節生冷毒物恣性食啖致 [illegible] 傷脾胃故妊娠傷食最難得藥唯此二方最穩捷

木香丸 治婦人有孕傷食

木香 [illegible] 三稜 人參 白茯苓 [illegible]

右為細末麪糊元如綠豆大熟水吞下參拾元

白朮散 治妊娠氣不調和飲食易傷

白朮 乾紫蘇 人參 白芷

川芎 訶子皮 青皮 甘草

右為末每服貳錢水壹盞薑參片煎至柒分溫服

愚詳小七香元 [illegible] 保氣散 [illegible] 豈無良効

妊娠臟燥悲傷方論第十三 凡一方

許學士云鄉里有一婦人數欠無故悲泣不止或謂之有祟祈禳請禱備至終不應予忽憶有一證云婦人臟燥悲

傷欲哭象如神靈數欠者大棗湯予急令治藥盡劑而愈

古人識病制方種種妙絕如此試而後知

大棗湯治婦人臟燥悲傷欲哭象若神靈數欠者皆主之

甘草三兩 小麥一升 大棗十枚

右㕮咀以水六升煮取三升去滓分溫三服亦補脾氣

專治婦人方名甘草湯[illegible]

新編婦人大全良方卷之十五

坐月門

妊娠疾病既明須知坐月避忌故以次之

產寶方周頲序第一

頲聞至靈者人最重者命人皆知命之所重而不知養命之方天年未終疾病攻伐嗟乎非無良醫若述則急難倉卒尋覓其術誤多矣醫之中惟產難為急子母性命懸在片時頲勤恣方書常思救療每見名醫若述皆誌於心且夫男女構精陰陽分氣就中女弱疾狀頗多蓋其稟受質以為人有血藏而施育妊娠之內導理有常至於飲食之間動靜之際尤多制忌以御性情及乎既產解保安若蓋是損觸臟腑傷動筋骨將理稍失疾患便生更值盲醫取[illegible]次下藥致其所若積漸縣延日復一日亟至于死可不痛哉故易曰天地之大德曰生則知在天地之間以生育為本又豈因生產而反危人之命乎自惟攝理因從餌差誤致其產婦不保安全且婦人生產方一二次血氣未衰飲食易進但能節性則無病生縱或偶有微病不難醫治至於四五次迨乎七八次傷敗已深血氣衰微子藏虛弱臟敗內滯風邪外攻若有病生宜須審察醫若不子細疾便危殆此醫殺之理甚明矣且仕俗之家婦人產後復乳其子產既損氣已甚乳又傷血至深蠹命耗神莫極於此稍失常理便合召醫或以家貧不及厚賂醫者醫者怠慢須臾困篤叩人之生產非小事也而醫者圖財悔而致死此醫殺之理又明矣且夫產前產後血氣未寧一疾苟生

百疾同作古人所以著方論於產乳若正在此也至若鯉魚阿膠已治動胎胎痛猶如胎動胎痛非至理也有圖若痛亦如之此略舉大綱蓋須知醫者之功也降及地黃益血生蕢助氣芎藭止痛黃耆補虛用之得門其効如聖用之失理不如不醫乃知醫人不可苟作頲以此疾心常思著方以濟危急而學辭不博未能自信所以偏採產術志在廣行復見昝殷產寶論切深入醫門乃大中歲相國白敏中傷𢚩婦人多患產難詢訪名醫思救人命或人舉殷相國迎召問其產乳殷乃撰方一卷贊於相國相國重其簡要命曰產寶此方雖存得若其少頲志在愈疾常恨不家藏一本故輙敢序之蓋欲開其衆聽凡五十二篇三百七十一方兼拾昝氏之遺作小論一篇次於序末庶幾姙娠之家自得覽斯爲家内明師爾時丁巳歲秋八月序

將護孕婦論第二

凡婦人姙娠之後以至臨月藏府擁塞關節不利切不可多睡須時時行步不宜食粘硬難化之物不可多飲酒不可亂服湯藥亦不可妄行鍼灸須寬神減思慮不得負重或登高涉險若偶然胎不安腰痛者須服安胎藥一二服得安即止周頲論曰生產雖然觸穢排比須要在先入月壹日貼產圖并日遊胎殺所在并借地法於姙婦房内北壁上仍依位設床帳厚鋪薦褥周密使無孔竅夏月亦鋪厚薦用好油單薄席紗帳以備之常焚香令潔淨備湯藥器物既費欲產不得喧鬧人力雖衆大小恬悅[illegible]婦宜預擇年高歷練生婆一人并穩當曾經慣婦人一兩人扶持不得揮霍恐產婦驚又忌閑雜外人并喪孝穢觸之人看視切不得驚動傷早若坐婆拙不能體候胎氣方轉動之際便爲欲生多端下手驚動傷早則橫倒之憂從此而致也

產寶方云姙娠欲產腹雖痛而腰不甚痛者未產也且令扶行熟忍如行不得則凭物扶立行得又行或未爲先下然後作陣腰腹痛眼中如火生此是胎離腎經兒逼產門也即服催生藥一二服即生蓐草切不可坐草早務要產婦用力存養調停亦令坐婆先說諭之如覺心中煩悶可取白蜜壹匙用新汲水調下或覺飢即喫軟飯或粥少許亦須預備勿令飢渴恐產婦無力困乏也若不飢渴亦不須強食大凡生產自有時候不可強服催生滑胎等藥或以坐草早勢不獲已則服之若無事強服恐變生他疾又須戒之

滑胎例第三

凡姙娠已滿十月形體成就神識成備分氣趣產宜服滑胎湯藥

滑胎枳殼散 瘦胎易產胡陽公主每產累日不下南山道士進此方

商州枳殼（貳兩） 粉草（壹兩）

右爲細末百沸湯點貳錢服空心日參服凡懷孕六七箇月已上服之令兒易生初生胎小微黑百日已後肉漸變白此雖孫真人滑胎易產方然抑陽降氣爲衆方

之冠此方分兩出必用方以此爲正
壹方枳殼陸兩甘草壹兩歛加枳殼栽甘草當末半人
細剉斷服㕥外難歛也未産前一月
壹方有糯米半升淘洗控乾同炒爲末米飲白湯調下
壹貳錢
温隱居加當歸木香各等分
張氏方治妊娠胎肥壅隆動□□□臨月服之縮胎易
産兼治腸中諸疾下氣寛膈 枳殼伍兩 甘草壹兩半
香附子壹兩 爲末 邊煎湯點亦可如丈夫婦人冷氣
攻刺脇肋疼痛者用葱白叁寸同煎服 婦人脾寒血
氣成塊作痛熱酒調服 大小便不通白牽牛爲末煎
湯調服

選奇方
香附子 枳殼各貳兩 甘草半兩

內補元 治妊婦衝任脈虛補血安胎
熟地黄貳兩 當歸壹兩微炒
右爲細末煉蜜元如梧子大温酒下叁肆拾元
許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋抑陽助
陰之藥甚多然胎前藥唯恐寒凝若陰陽交錯别生
他病唯是南山道士枳殼散所以抑陽四物湯所以
助陰故爾然枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛
之疾以内補元佐之則陽不至強陰不致弱陰陽調
停有益胎嗣此前人未嘗論及也
易産滑胎方其藥性滑利小便
車前子

右爲末酒調方寸匕服不能飲者水調 詩云采芣苢能
令婦人樂有子矣 陸璣注云治婦人産難惡詩孔子
序詩云樂然而生易於生育後人以爲疰言誤矣
治産難**神寢元**瘦胎滑利易産臨入月服之極有神効知
蘄州施小卿方蘄州徐太丞傳
通明乳香半兩 枳殼壹兩
右爲細末煉蜜元如梧子大空心温酒吞下叁拾元日
壹服懷孕九箇月以後方可服
陸氏方名**寤生元** 乳香□□□元
榆白皮散 治妊娠滑胎易生
榆白皮 甘草各貳兩 葵子壹兩
右爲粗末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓温服

産方無榆白皮有葵子散
主孕九箇月將産消息
猪肚壹枚
依法用葱五味煮熟食食如不盡更食以盡爲度不得
與别人食無効
保氣散 安胎寬氣進食瘦胎易産設或居處失宜偶然頓
仆胎動胎痛漏胎下血兼服佛手散方見前 神寢元 枳殼
散見前 此三藥入月内大宜常服
香附子肆兩 山藥貳兩 縮砂仁壹兩 木香肆錢
粉草□□ 益智仁 紫蘇葉各半兩
右爲細末白湯點貳錢服
月空方位例第四

正月　三月　五月　七月　九月
十一月　已上在丙壬
二月　四月　六月　八月　十月
十二月　已上在甲庚

逐月安產藏衣忌向方位第五

凡安產藏衣方位並於臥閤內分布太平聖惠方云凡姙婦初入月便寫產圖壹本以朱書某月某日空貼在某位如正月在丙壬可於壬位安產婦床帳內位藏衣之類貼掛在產婦房內北壁上若值閏月只看節氣用之又云每月產圖內雷公招搖運鬼力士天狗軒轅大時咸池吳時豐隆白虎大夫天候狂虎凡十二神並從月建易其位所謂月空者按內經云月亦空無寫王冰注云論月輪中空日也即非十二神之數今太平聖惠方以六陽月在丙壬以六陰月在甲庚正如外臺所言正月在丁壬至十二月在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言之簡耳今人多依聖惠方者特從其簡而已或云凡逐月安產藏衣並向月德月空方位所有十二神殺並從節氣更換其交次月節便作次月用書產圖者亦也假如正月十四日立春若姙婦十三日乳卧當可作去年十二月用也必依月分用之乃是若依節氣更換則天德月德所在安產衣月空與壬謂之中天空頗相類議者以為天空若非十三神之數蓋課中有天乙貴人其位無可與對者故此空只謂天空值此神百事不宜止宜安產婦床帳藏衣之類耳集聖曆云天德正月在丁二月在坤三月在壬四月在辛五月在乾六月在甲七月在癸八月在艮九月在丙十月在乙十一月在巽十二月在庚

又堪輿曆有遊年白虎殺神在太歲後一辰如太歲卯則白虎在寅餘做此推之若產及藏衣犯之則子母皆不利也

○王子亨云難產逆生論稱犯一切神殺固有是理然亦有自然難產兒自逆生者及有產腸胃俱下若產已則復如故此非疾病所致氣血所主天下之理蓋有不可窮詰者亦宜知之



安產藏衣十三神吉凶方位

月	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	天狗	狂虎	天侯	大夫	白虎
正月	壬	丙	艮	寅	寅	卯	辰	辰	辰	午	申	酉	戌
二月	坤	甲	乾	亥	卯	子	丑	未	巳	酉	巳	戌	亥
三月	丙	壬	坤	申	辰	酉	戌	戌	午	子	寅	亥	子
四月	甲	庚	巽	巳	巳	午	未	丑	未	酉	亥	子	丑
五月	丙	壬	艮	寅	午	卯	辰	辰	申	子	申	丑	寅
六月	庚	甲	乾	亥	未	子	丑	未	酉	卯	巳	寅	卯
七月	丙	壬	坤	申	申	酉	戌	戌	戌	子	寅	卯	辰
八月	[illegible]	甲	巽	巳	酉	午	戌	丑	亥	卯	亥	辰	巳
九月	丙	壬	艮	寅	戌	卯	辰	辰	子	午	申	巳	午
十月	庚	甲	乾	亥	亥	子	丑	未	丑	卯	巳	午	未
十一月	[illegible]	丙	坤	申	子	酉	戌	戌	寅	午	寅	未	申
十二月	庚	甲	巽	巳	丑	午	未	丑	卯	酉	亥	申	酉

推婦人行年法第六

生氣方 [illegible]

反支月 [illegible]

禍害月 [illegible]

絕命方 [illegible]

懸尸日 [illegible]

閉肚方 [illegible]

八莊方 [illegible]

推婦人行年法第六

行年	生氣方 反支月	禍害月 絕命方	懸尸日	閉肚方	八莊方	產母衣色	臥宜	坐宜
十三歲行年在申	坤 [illegible]月	離 巽	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	黃色衣	西南首	西南方黃衣師看產
十四歲行年在未	離 [illegible]月	坤 兌	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	赤色衣	正南首	正南方赤衣師看產
十五歲行年在午	坎 [illegible]月	乾 艮	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	黑色衣	正北首	正北方黑衣師看產
十六歲行年在巳	震 [illegible]月	艮 乾	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	青色衣	正東首	正東方青衣師看產
十七歲行年在辰	艮 [illegible]月	震 坎	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	黃色衣	東北首	東北方黃衣師看產
十八歲行年在卯	乾 [illegible]月	坎 震	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	黑色衣	西北首	西北方黑衣師看產
十九歲行年在寅	兌 [illegible]月	巽 離	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	白色衣	正西首	正西方白衣師看產
二十歲行年在丑	巽 [illegible]月	兌 坤	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	黃色衣	東南首	東南方黃衣師看產
二十一歲行年在子	坤 [illegible]月	離 巽	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	黃色衣	西南首	西南方黃衣師看產
二十二歲行年在亥	離 [illegible]月	坤 兌	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	赤色衣	正南首	正南方赤衣師看產
二十三歲行年在戌	坎 [illegible]月	乾 艮	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	黑色衣	正北首	正北方黑衣師看產
二十四歲行年在酉	震 [illegible]月	艮 乾	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	青色衣	正東首	正東方青衣師看產
二十五歲行年在申	艮 [illegible]月	震 坎	[illegible]日	[illegible]	[illegible]	黃色衣	東北首	東北方黃衣師看產

二十六歲行年在丁未乾 二八月坎震 卯酉日 在正南偏東丙在正南偏西丁 白色衣 首西北 衣師看產西北方白

二十七歲行年在丙午兌 三九月巽離 寅申日 在正南偏西丁在正南偏東丙 白色衣 首正西 衣師看產正西方白

二十八歲行年在乙巳巽 四十月兌坤 丑未日 在正西偏南庚在正東偏南乙 青色衣 首東南 衣師看產東南方青

二十九歲行年在甲辰坤 五十一月離巽 子午日 在正西偏北辛在正東偏南甲 黃色衣 首西南 衣師看產西南方黃

三十歲行年在癸卯離 六十二月坤兌 巳亥日 在正北偏西壬在正北偏東癸 赤色衣 首正南 衣師看產正南方赤

三十一歲行年在壬寅坎 正七月乾艮 辰戌日 在正北偏東癸在正北偏西壬 黑色衣 首正北 衣師看產正北方黑

三十二歲行年在辛丑震 二八月艮乾 卯酉日 在正東偏北甲在正西偏北辛 青色衣 首正東 衣師看產正東方青

三十三歲行年在庚子艮 三九月震坎 寅申日 在正東偏南乙在正西偏南庚 黃色衣 首東北 衣師看產東北方黃

三十四歲行年在己亥乾 四十月坎震 丑未日 在正南偏東丙在正南偏西丁 白色衣 首西北 衣師看產西北方白

三十五歲行年在戊戌兌 五十一月巽離 子午日 在正南偏西丁在正南偏東丙 白色衣 首正西 衣師看產正西方白

三十六歲行年在丁酉巽 六十二月兌坤 巳亥日 在正西偏南庚在正東偏南乙 黃色衣 首東南 衣師看產東南方黃

三十七歲行年在丙申坤 正七月離巽 辰戌日 在正西偏北辛在正東偏北甲 黃色衣 首西南 衣師看產西南方黃

三十八歲行年在乙未離 二八月坤兌 卯酉日 在正北偏西壬在正北偏東癸 赤色衣 首正南 衣師看產正南方赤

三十九歲行年在甲午坎 三九月乾艮 寅申日 在正北偏東癸在正北偏西壬 黑色衣 首正北 衣師看產正北方黑

四十歲行年在癸巳震 四十月艮乾 丑未日 在正東偏北甲在正西偏北辛 青色衣 首正東 衣師看產正東方青

四十一歲行年在壬辰艮 五十一月震坎 子午日 在正東偏南乙在正西偏南庚 黃色衣 首東北 衣師看產東北方黃

四十二歲行年在辛卯乾 六十二月坎震 巳亥日 在正南偏東丙在正南偏西丁 白色衣 首西北 衣師看產西北方白

四十三歲行年在庚寅兌 正七月巽離 辰戌日 在正南偏西丁在正南偏東丙 白色衣 首正西 衣師看產正西方白

四十四歲行年在己丑巽 二八月兌坤 卯酉日 在正西偏南庚在正東偏南乙 青色衣 首東南 衣師看產東南方青

四十五歲行年在戊子坤 三九月離巽 寅申日 在正西偏北辛在正東偏北甲 黃色衣 首西南 衣師看產西南方黃

四十六歲行年在丁亥離 四十月坤兌 丑未日 在正北偏西壬在正北偏東癸 赤色衣 首正南 衣師看產正南方赤

四十七歲行年在丙戌坎 五十一月乾艮 子午日 在正北偏東癸在正北偏西壬 黑色衣 首正北 衣師看產正北方黑

四十八歲行年在乙酉震 六十二月艮乾 巳亥日 在正東偏北甲在正西偏北辛 青色衣 首正東 衣師看產正東方青

四十九歲行年在甲申艮 正七月震坎 辰戌日 在正東偏南乙在正西偏南庚 黃色衣 首東北 衣師看產東北方黃

體玄子借地法第七

東借十步　西借十步　南借十步　北借十步

上借十步　下借十步

壁方之中四十餘步安產借地或有穢污或有東海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天符地軸入地十丈令此地空閑產婦某氏安居無所妨礙無所畏忌諸神擁護百邪速去急急如律令勅

[illegible]

禁草法第八　鋪草及氈褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵母子相生俱殺鐵急急如律令

禁水法第九　欲産時貯水呪曰

南無三寶水　水在井中爲井水

水在河中爲河水　水在器中爲淨水

水在法中爲眞水　自知非眞莫當眞水

以淨持濁　以正治邪　日遊月殺　五土將軍

青龍白虎　朱雀玄武　招搖天狗　軒轅女姑

天吞地吞　懸尸閉肚　六甲禁諱　十二神王

土符伏神　各安所在　不得動靜　不得忌干

若有動靜　若有忌干　施以神呪　當攝汝形

阿佉尼阿毗羅莫多梨婆地梨娑訶

入月預備藥物第十

保氣散　佛手散　枳殼散　神寢元　榆白皮散

保生元　催生丹　黑神散　大聖散　花蘂石散

黑龍丹　理中元　催生符　生地黃　羗活

葵子　黃連　竹茹　烏梅　雌雄石燕

甘草　海馬　馬啣鐵　棗子　陳皮

薑錢　黑豆　白蜜　無灰酒　童子小便

好醋　白米　煎藥爐　銚子　煑粥沙瓶

濾藥帛　醋炭盆　小石壹貳拾顆　湯瓶

軟硬炭　乾柴茅　暖水釜　洗兒肥皂　頭髮

斷臍線及剪刀　斷臍線剪不用刀剪　乾蓐草

卧交椅　軟厚氈　燈籠　火把　緞巾

油燭　發燭　灯心

催生符第十一

書符時宜以水飛朱砂書之貼於房内北壁上遇坐草之時剳於針上就燈内以燈燒之無免飛揚溫水調服

治産難横生逆産胞衣不下靈符　出博濟方



不安穩揫來

書貼産婦

床北壁上

胎衣不安穩

書貼床北壁上

治横生倒産符

朱砂書此符

以酒水吞下



此四符入月一日墨

書貼床上仍令安産

婦産時符下勿令人知

此三符遇産難

以墨書其合之



治胞衣不出靈符内道

急則以朱砂書符吞下

產難門

坐月既明須知產難故以次之

產難論第一 夫產難之由有六證說之方不同今具載之以[illegible]

凡婦人以血為主，惟氣順則血順，胎氣安而後生理和。今富貴之家，往往保惜產母，惟恐運動，故羞出入，專坐專臥，曾不思氣閉而不舒快，則血凝而不流暢，胎不轉動，以致生理失宜，臨產必難，甚至悶絕，一也。且如貧者生育，日夕勞苦，血氣舒暢，生理甚易，何俟乎藥。則孕婦當貴於運動者明矣。

又則婦人妊娠已經六七箇月，胎形已具，而世人不知禁忌，恣情交合，嗜慾不節，使敗精瘀血聚於胞中，致令子大母小，臨產必難，二也。何以知之？生下孩子頭上有白膜一片，滯膩如膠，俗強名曰戴白生兒。身有青有黑，俗強名曰伯虎。此皆是入月交合所致也。如此則不特母病，其子亦生浸淫赤爛瘡瘍，俗謂之胎蛆，動經歲月不差，可不戒乎？

三則臨月太早，大小擾攘，或信卜筮，或說鬼祟，多方誤恐，致令產母心驚神恐，憂悶怖懼，又被閑雜婦人、喪孝穢濁之人衝觸，若不預為之防，臨產必難，三也。何以知之？如偷生之女，不正之屬，既無產厄，子母俱安，其理可知。

凡臨產初然腹痛，或作或止，名曰弄痛，坐婆疎率，不候時至，便令試水。試水頻併，胞漿先破，風颯產門，產道乾澁。及其兒轉，便令坐草，坐草太早，兒轉亦難，致令產難，四也。直候痛極，眼中如火，此是兒逼產門，方可坐草，即令易產。如坐草稍久，用力太過，產母困睡，抱腰之人又不穩當，致令坐立傾側，胎死腹中，其為產難，五也。作當盛暑，宜居深幽房室，日色遠處，開啟窗戶，多貯清水，以防血運、血悶、血溢妄行、血虛發熱之證。如冬末春初，天色凝寒，宜密閉產室，窒塞罅隙，內外生火，常令暖氣如春，仍下部衣服不可去綿，方免胎寒血結，以致產難，六也。

凡孕婦入月，斷不可洗頭，方免產難及橫、逆產。已上明論。

楊子建十產論第二

凡人生產，先知此十產證候，則生產之婦永無傷損性命。生產之間，性命最重。奇而孩子易生，人不知禍萬一有少艱難，則須臾之間，子母之命懸於絲髮。但世人所患者，惟看生產收生之人少有精良妙手，緣此而多有傾性命。予因傷痛其事，不為無補。外有[illegible]方法在後

一曰正產

正產者，蓋婦人懷胎十月滿足，陰陽氣足，忽然腰腹作陣疼痛，相次胎氣頓當，至於臍腹疼痛極甚，乃至腰間重痛，穀道挺迸，繼之漿破血下，兒子遂生，此名正產。

二曰傷產

傷產者，蓋婦人懷胎忽有七月八月而產，忽至九月十月而產，忽有經一年二年乃至四年五年而後產者。今獨以十月滿足為正產。蓋一人之生，陰注陽定，各有時日，不可改移。今有未產一月已前，忽然臍腹疼痛，有如欲產，仍却無事，是名試月，非正產也。但一切產母未有前面正產證候，即不可令人抱腰，產母亦不可妄亂用力。蓋欲產之婦，臍腹疼痛，兒身未順，收生之人却教產母虛亂用力，兒身纔

方轉動却被產母用力一逼遂使兒子錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母未當用力之所致也凡產母用力須待兒子順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗而助之長非獨無益而又害之此名傷產

三曰催產

催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛其痛極甚腰重穀道挺迸已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之忽有經及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產母之正氣令兒速得下生此名催產

四曰凍產

凍產者蓋言三冬之月天氣寒冷產母經血得冷則凝結而不散因其血之不散以至兒子不能生下此亦之一弊為害最深然世人不知覺若冬月產婦下部不可脫去綿衣并不坐臥寒冷之處當滿房著火令遍房常有暖氣常令產母背身向火令臍下腿膝間常有暖氣若背上心前少聞寒冷須是暖炙綿衣以包之貴其血得熱則流散使兒子易生此名凍產若春秋之間天地少有陰濕寒冷之氣亦可就房中以微炭火暖之為妙

五曰熱產

熱產者蓋言盛暑之月欲產之婦當要其溫涼得所不可因熱恣意取涼及有傷損胎氣又生產之處不可多著人數切恐人多熱氣逼襲產母蓋人之血氣得熱則散熱過則損今當夏暑炎熱之盛而產母氣一虛通人則其血沸溢而血得熱則上蒸能令產母發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事世有名血暈者緣此而成也此名熱產若值夏月少有清涼之氣陰雨之變產母亦不可任意取涼恐生厥

六曰橫產

橫產者蓋兒子下生先露其手忽先露其臂此因未當用力而產母用力之過也臍腹疼痛兒身未順則是產母用力一逼遂致身橫而不能生下不幸而有此證候當令產母安然仰臥令看生之人推而入去凡推兒之法先推其兒身令直上漸漸通手以中指摩其肩推其上而正之漸引指攀其耳而正之須是產母仰臥然後推兒直上徐徐正之候其身正門路皆順煎催生藥一盞令產母喫了方可令產母用力令兒下生此名橫產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

七曰倒產

倒產者蓋因其母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉順生便只直下先露其足也治之之法當令產母於床上仰臥令看生之人推其足入去分毫不得令產母用力亦不得驚恐候兒自順若經久不生却令看生之人輕輕用手內入門中推其足令就一畔直上令兒頭一畔漸漸順下直待兒子身轉門路正當然後煎催生藥令產母服一盞後方始用力一送令兒生下此名倒產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

八曰偏產

偏產者蓋因兒子回轉其身未順生路未正被產母用力一逼致令兒頭偏拄左腿忽偏拄右腿致令兒雖近人門而不能生下但云兒已露頂然不知兒之所露即非頂也忽左額角忽右額角而已謂兒頭偏拄一畔以此不能生收之之法當令產母於床上仰卧令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正向人門然後令產母用力一送即使兒子生下若是小兒頭之後骨偏拄穀道即令兒却只露額當令看生之人以一件綿衣炙令溫暖用裹手急於穀道外旁輕輕推兒頭令正即使令產母用力送兒生也此名偏產凡於穀道外旁推兒頭正須推其上而正之仍是小用輕力推些上兒而正之也若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

九曰礙產

礙產者蓋言兒身已順門路俱正兒子已露正頂而不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生此名礙產收之之法當令產母於床上仰卧令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下其肚帶也仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒子下生此名礙產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

十曰坐產

坐產者蓋言兒子之欲生當從高處牢繫一條手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非令產母臨生兒時坐著一物此名坐產若是產母兒將欲生却令坐著一物即抵著兒路不能生也

十一曰盤腸產 續添

趙都運恭人每臨產則子腸先出然後產子產子之後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能療偶在建昌得一坐婆施之一法而收之其法遇產後子腸不收之時以醋半盞新汲冷水七分碗調停噀產婦面每噀一縮三噀收盡此良法也後學不可不知

治推腸生方又名盤腸產

右以半夏為末搐鼻中則腸上矣

又方　以大紙撚以麻油潤了點燈吹滅以煙熏產婦鼻中腸即上矣

又方　以蓖麻子十四粒去殼研如膏貼產婦頭頂中心腸即上即拭去

催生方論第三　九三十六方

五行論命以年月日時支干所遇五行所屬相生相值以推人之貴賤其間最切要者時也若依閱命書以生為父母爲已身月爲兄弟係交日為妻妾上官時為子孫帝座蓋人之生也得其時則終身富貴失其時則終身貧賤合乎人生之時不可忽也然則人生之時其可催乎殊不知娠有諸生產之難若臨產起坐既久勞力困乏須妙藥催趁以救其危當此之時又何暇論其時耶又理宜方有推娠婦行年法若行年有與本命相值所產歲月君即補盤

馬皮於灰中令娠婦臨產時踐之手擊致繫頭則易產今之醫者便以此等物為產前所需之物誠謬論也其所以然者謂姙婦行年偶與本命相值於所產歲月遂有諸般艱難之厄故以此厭禳之取其快速之意耳如或不值則無用矣今錄催生數方皆名醫士大夫歷用良驗者以幸有緣產寶方論曰夫產難者內宜用藥外宜用法蓋多門救療以取其安也若產難坐草數日困乏不能生此為母先有病經絡俱閉所然

催生柞木飲子 治產難或橫或倒死胎爛脹於腹中此方屢用神妙

生大柞木枝壹大握長壹尺洗淨寸剉 甘草大者伍寸剉作伍段

右用新汲水叁升半同入新沙瓶內以紙叁重緊封之文武火煎至壹升半令香覺腹痛便準備候產婦腰重痛欲坐草時溫溫飲壹小盞便覺心下開豁如覺再渴又飲壹盞至叁肆盞覺下重便生更無諸苦切不可坐草早及坐婆亂下手如催生藥只消壹服此方至驗乃上蔡張不愚方也

催生神妙散 療難產橫生瘦胎兼治產前產後虛損月脉不調崩漏 一名催生黑散一名烏金散一名二神散

百草霜 香白芷不見火各等分為細末

右二味等分研停每服貳大錢於臨產腰痛時以童子小便并少米醋打為膏沸湯調下 或用酒童子小便各半盞同煎緣沸即調停熱服甚者不過兩服[illegible]能閉血免得[illegible]

催生如聖散 黃蜀葵花不以多少焙乾為細末熟湯調下貳錢神妙 或有漏血胎臟乾澀難產痛劇者併進叁服良久腹中氣寬胎滑即時產下如無花時只用葵子爛研小半合以酒調濾去滓溫過頓服尤妙 亦治打撲傷損如胎死不下煎紅花溫酒調下

用子歌曰[illegible]

黃金內子叁拾粒 細研酒調能備急
命若懸絲在須臾 即令眷屬不悲泣

曹秀才方 用葵子壹味研墨或研朱砂為衣每服肆拾粒溫酒吞下

催生丹 療產婦生理不順產育艱難並宜服之[illegible]

十二月兔腦髓去皮膜研如泥 通明乳香壹分研細
母丁香末壹錢 麝香壹字研細

右四味拌停以兔腦髓和圓如雞頭穰大陰乾用油紙密封貼每服壹圓溫水下即時產隨男左女右手中握出是驗

又方 通明乳香壹塊如皂子大

右為末覺腰痛時用新汲水壹小盞入醋少許同調決立令產婦兩手捉兩石燕坐婆飼藥飲之先令坐婦念醫靈藥聖三遍然後服之仍略扶行數步須臾坐草便生更無痛楚神良

經驗方如神散 乳香不以多少五月五日午時令一人在壁背捧乳鉢在壁上令一童兒以筆管透壁縫內

逐粒從筆管中過入乳鉢內研令極細以童兒向北滴水圓如雞頭大每服壹粒無灰酒吞下 海上方用乳香朱砂等分為細末麝香酒調下

治難產或倒横不順方

蛇蛻(全者一條) 蚕蛻紙(壹張一方無)

右入新瓦瓶中鹽泥固濟燒存性為末煎榆白皮湯調下壹錢叁服覺痛便生 一方云臨產腰痛用藥叁字麝香壹字溫酒調下名**一字散**

催生萬金不傳遇仙丹

萆麻子(十四粒去殼) 朱砂 雄黃(各壹錢半) 蛇蛻(壹尺燒)

右為細末粥水飯和圓如彈子大臨產時先用椒湯淋渫臍下次安藥壹圓於臍中用蠟紙數重覆藥上以闊

帛束之須臾生下急取去藥壹圓可用叁次

如聖膏治難產兼治胞衣不下兼治死胎

用萆麻子柒粒去殼細研成膏塗腳心胞衣即下速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入如聖之妙 一方男用七粒女用十四粒

一方用萆麻子百粒雄黃末壹錢同研並用如前法

兔毫散治產難

用敗兔毫筆頭燒為灰細研為末生藕汁壹盞調服立產若產婦虛弱及素有冷病恐藕汁動氣當煮銀石器內重湯調溫服

陸氏方云此難產第一方

金箔(叁拾片) 兔毫筆頭灰(兩個筆頭燒灰)

右二味和勻用蠟為圓如梧子大作壹服溫酒下

又方

大朱砂(不以多少細研[illegible])

右用臘月兔腦髓和圓如綠豆大欲覺產時粥飲下壹圓良久便生其藥男左女右手中把出

又方

臘月兔頭壹枚(燒為灰)

右為細末煎白湯調貳錢立生

指迷方**催生兔血散**

臘月兔血蒸餅切作片子蘸之以紙袋盛掛當風處陰乾為末煎乳香湯調下貳錢

又方

臘月兔腦髓(塗於壹張厚紙上)更用壹張合摺以秤錘搥二五十下每遇難生看大小書天生兩字作符以醋湯調下極效

又方

兔皮和毛燒為灰末之以酒調方寸匕服之即產衣不下者服之即下

治横倒生者或先手足者

明阿膠(炒一方用[illegible]) 滑石末(壹兩) 葵子(貳合)

右水壹盞半煎至壹盞去滓分貳服

治難產五六日不得分娩疲困虛乏者

光明水膠(貳兩)

右用好酒壹升半微火溶膠入新雞子壹箇鹽壹錢匕

攪溫令産婦坐狩物上伸腰大口作貳次服之覺小腰重
便生緣坐草早驚動故也
救産難經日不生
雲母粉半兩溫酒調服入口當産不順者即産萬不
失一 陸氏方云[illegible]
[illegible]
治橫逆産理不順子死腹中
伏龍肝細研每服壹錢酒調服之以土着兒頭上戴
出妙
廣濟療難産三日不下方
呑雞子黃壹枚并少苦酒服
集驗療橫産及胎死腹中以三姓雞卵各壹枚三姓鹽各
壹錢三姓水共壹盞打和煮五七沸分溫貳服令産母東
首服之立出
療難産日久氣力乏盡不能生此是宿疾
赤小豆貳升以水九升煮熟取汁入炙了明黃膠壹
兩同煎少時壹服五合未效再服不過三四服即産
備急方療難産三日不出
呑槐子十四枚即下 廣濟方有蒲黃壹合千金集驗
崔氏同
又方
當歸爲末酒調方寸匕服
催生如聖散臨産腰疼方可服之
人參爲末 乳香細研 辰砂半錢

右三味壹處研臨産之時急用雞子清壹箇調藥末再
用生薑自然汁調開冷服如橫生倒生即時端順子母
平善 傳於邪淳使漢鄉累見功効
陸氏催生神妙七聖散臨産腰疼方可服之
延胡索 沒藥 白礬 白芷
薑黃 當歸 桂心 等分
右爲細末臨産陣痛時燒鏵刃鐵[illegible]令通赤淬酒調
藥末貳錢服壹貳杯立産[illegible]
[illegible]
催生神妙乳珠丹
乳香研細以猪心血爲圓如梧桐子大以朱砂爲衣日
乾每服一粒如催生冷酒化下良久未下再服壹粒如
大段難産時以蓮葉心蒂七箇水貳盞煎至壹盞放溫
化下壹粒良久未下亦可再服此藥靈驗如神無有不
下者如胞漿先破惡水來多胎乾不得卧時須先與四
物湯及滑氣圓補養其血氣次更濃煎葱湯放冷如鮮
令坐婆洗産户須是數曲洗令氣上下通暢仍更用酥
調滑石末塗産户裏次服前催生藥則萬全矣如胎死
不下者用黑豆三合好醋半升煮令豆爛取汁壹盞放
溫化下藥壹粒須臾便下矣萬一未下亦可再服如胎
下胞衣未下者服此亦便下也若胎橫逆不順即先服
如神散前用再服此藥後以此藥催之合藥時要五月
五日午時極妙或七月七日或三月三日及月初上辰
日合亦得

小品療逆產方　鹽塗兒足底又可急搔爪之并以鹽摩
產婦腹上即產
又方　以鹽和粉塗兒兩足下即順矣
集驗方療逆產　燒錢令赤納酒中飲之
又方　取夫陰毛二七莖燒以猪膏和丸如豆大水吞下
兒手即握出神驗。删繁療產難方取車釭中膏畫腹
下及掌心崔氏文仲小品千金集驗備急同
療逆產胞衣不出方　取竈屋黑塵研為細末酒調方寸
匕　一方用梁上塵
張文仲療橫生逆產服諸符藥不捷者灸右腳小指尖頭
三壯艾炷如小麥大
小品療橫生倒產手足先出方　並出外臺
三寸
用粗針刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當回
順　又出千金備急千金崔氏集驗同
橫產逆產二條其理雖別療法盖同可以意量參
用之

郭稽中產難方論第四　九十三方

論曰產難者何胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破與
敗血裹其子故難產但服勝金散逐其敗血即自生若逆
生橫生並皆治之

勝金散方

麝香壹錢研　鹽豉壹兩以舊青布裹了燒令赤急以乳缽研細
右為末取秤錘燒紅以酒淬之調下壹大錢
陳無擇評曰產難不只胎側有兒枕破與敗血裹凝傷其
胎息因緣自有難易其如橫逆多因小早太早努力過多
兒轉未逮或已破水其血必乾致胎難轉　未先露腳謂之
逆先露手謂之橫法當以針刺之使自縮入即服神應黑
散以固其血必自轉生　蓋此方云在兒皇之間兩人命所係
不可不廣傳益資黑散之功也　或以鹽塗兒腳底抓搔
之

神應黑散方　見前即催生如神散

產難子死腹中方論第五　九十八方

夫產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產
難皆因橫決先下產時未到穢露已盡而胎枯燥故子死
腹中其候產母舌青黑及胎上冷者子已死也故產處坐
卧須順四時方面并避五行禁忌若有觸犯多招災禍也
治妊娠三五箇月胎死在腹內不出
大腹子　赤芍藥　榆白皮以上各壹兩　當歸壹兩炒
滑石末參分　瞿麥　葵子炒　茯苓
粉草　子芩各半兩
右為粗末每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓不拘時溫服
療死胎腹內不出母已危殆不得已者立效方
水銀半兩　桂末壹錢
右只作壹服溫酒調下粥飲亦可
又方
以利斧煆赤置酒中待溫飲之其子便下
治妊娠胎死　腹中候其母面赤舌青者是宜錫粉圓
出指迷

錫粉　水銀各壹錢

右同研不見水銀為度以棗肉和圓如豌豆大[illegible]

湯吞下

十全博救療胎死腹中

以朔砂壹兩水煮數沸研令極細酒調貳錢服

又方

以雞子黃壹枚用薑汁壹合調雞子黃令均頓服分

娩後喫芸薹粥良

趙和叔傳下死胎方

桂心末貳錢　麝香當門子壹箇

右同研溫酒調服須臾如手推下比之用水銀等不

損血氣

何氏方無麝香每用桂末貳錢痛陣急時用溫童子小便

調下名觀音救生散兼治產難及橫倒生

療胎死腹中不出母欲絕

水銀貳兩　頓吞之兒立出

又方

用水銀如彈子大以棗肉均研和如大豆許水吞下

立出

救急治子死腹中

取夫尿貳升煑令沸飲之

文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草不

產血氣上盪心母面無顏色氣欲絕方

豬脂壹斤　白蜜壹升　淳酒貳升

右三味合煎取貳升分溫兩服不能飲隨所能服之

又療子死腹中不出。以牛屎塗母腹上立出

崔氏療胎死

甘草壹尺　蒲黃貳合　筒桂肆寸　香豉貳升

雞子壹枚

右細切以水陸升煑取叁升頓服胎胞穢惡盡去大良

產經數日不出或子死腹中母氣欲絕

瞿麥陸兩　通草　桂心各叁兩　牛膝肆兩

榆白皮壹升

右㕮咀以水九升煎取三升去滓分溫三服

一字神散　治子死胎不下胞破不生此方累有效救人數

百人

鬼臼不拘多少黃色者去毛𥂝為末以手指撚之如

粉極細為度每服貳錢用無灰酒壹盞同煎至捌分

通口服立生如神此藥不用羅只碾令極細

鄭知縣傳方療死胎不出

朴消為末每用貳錢溫童子小便調下知洪州進賢

曾通仕定以為甘酉為曹城尉時有猫孕五子一子已

生四子死腹中垂殆欲死詢問醫者令以此藥灌之

死子即下猶得再生後有一牛亦如此用此法亦活

醫者本治人方用以治畜也後因以救人無不驗[illegible]

[illegible]

治死胎不下其證指甲青舌青脹悶甚者口中作屎臭先

以平胃散一貼作兩服每服酒水各半盞同煎至七分投朴消半兩研細再煎三五沸傾出候微溫服盡其胎即化血水而下

繆宅一婦人杜氏生產數日不下坐婆魂童救療皆無効召僕診之僕曰產前脈不可考但當察色而知之遂揭帳明燭以察之其面色赤舌色青見此色者知胎已死母却無憂矣或問曰何以知之予曰面赤舌青者子死母活明矣供自合至寶丹二粒服之胎即落矣以此見古人處方神速

至寶丹方見和劑方

產難生死訣第八

欲產之婦脈離經 [illegible]

沉細而滑也同名 [illegible]

夜半覺痛應分娩來日日午定知生 [illegible]

身重體寒熱又頻舌下之脈黑復青反舌上冷子當死腹中須遣母歸泉 [illegible]

面赤舌青細尋看母活子死定應難 [illegible]

唇口俱青沫又出子母俱死總高判 [illegible]

面青舌赤沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛陳 [illegible]

新產之脈緩滑吉實大弦急死來親 [illegible]

若得沉重小者吉忽若堅牢命不停 [illegible]

寸口澀疾不調死沉細附骨不絕生 [illegible]

審看此候分明記長須念此向心經 [illegible]

王子亨云凡產後諸疾最忌脈大

新編婦人大全良方卷之十七

○產後門

產前既明須知產後疾病故以次之

產後將護法第一　周頲論附在其中

論曰凡婦人生產畢且令飲童子小便一盞不得便臥且宜閉目而坐須臾方可扶上床仰臥不得側臥宜立膝未可伸足高倚床頭厚鋪茵褥遮圍四壁使無孔隙免被賊風兼時時令人以物從心擀至臍下使惡露不滯如此三日可止仍不可令多臥如臥多看承之人且頻喚醒[illegible]產婦分娩了然日方可上床若三日上床則必就地睡臥又宜可令產婦近地氣乎　纔生產畢不得問是男是女且先研醋墨三分服之　一法云不可服醋墨有傷肺經恐致欬嗽之戒誠過慮也然醋墨本破凝血之藥[illegible]不可[illegible]多即不至傷肺[illegible]更產後三日內令產婦常聞醋炭氣或燒乾漆煙若無乾漆以破舊漆器燒之以防血逆血迷血運不省之患更月內於房門外燒磚以醋沃之置於房中[illegible]分娩之後須臾且食白粥一味不可令太飽頻少與之爲妙逐日漸增之煮粥時須是煮得如法不用經宿若又不可令溫冷不調恐留滯成疾仍時與童子小便或益母草散之[illegible]新產後不問腹痛不痛有病無病以童子小便以酒和半盞溫服五七服妙一臘[illegible]之後方可少進醇酒并些小鹽味　一法纔產不得與酒緣酒引血迸入四肢兼產母臟腑方虛不禁[illegible]入腹必[illegible]七日後少進些酒不可多飲如未滿月間欲酒喫或服藥者同用華黑豆炒令煙出以無灰酒五升淬之仍入好羌活[illegible]同浸尤妙當用此酒下藥或時時飲少許可以祛風引養氣血下惡露行乳脉也如產婦不喜飲者或夏月之間亦不須強飲　一臘之後恐吃物無味可漸吃羊肉或雞汁略用滋味[illegible]不可過多[illegible]三月之後方可食濕麵[illegible]凡喫[illegible]成疾[illegible]悔[illegible]喜笑驚恐憂[illegible]巧[illegible]針線用力工巧[illegible]之物及不避風寒脫衣洗浴或冷水洗濯當時雖未覺大損滿月之後即成蓐勞手腳及腰腿痠重冷痛骨髓間颼颼如冷風吹纖有名醫亦不能[illegible]大都產婦將息須是滿百日方可平復大慎[illegible]犯此多[illegible]如[illegible]及[illegible]致不救又不得伐期獨處緣去血心虛恐有驚悸切宜謹之所有血氣攻下又不得刮舌[illegible]及久低頭皆成血逆血運此產家謹護之常法也滿月之後尤忌任意飲食觸冒風寒恣意喜怒梳頭用力高聲作勞工巧[illegible]一及上高廁便溺[illegible]和腑腑平復[illegible]設不依此即致產後[illegible]不可虛羸大抵[illegible]成大患[illegible]不治巨細後[illegible]婦人非止[illegible]後大[illegible]取次

為之乃縱心恣意無所不為若有觸傷便難整理犯時微
若秋毫感病重如山岳知命者可不謹之

產後調理法第二

若產後將息如法四肢安和無諸疾苦亦須先服黑神散
四服亦略備補益圓散之類不可過多又恐因藥致疾不
可不戒 [illegible] 或產婦血盛初經生產
覺氣悶不安者調七寶散 [illegible] 服之若寧帖不須服
若三日後覺壯熱頭痛胸膈氣滿者不可便作傷寒傷風
治之此是乳脈將行宜服玉露散 [illegible] 若因
床帳太暖或產婦素多喜怒覺目眩暈如在舟車
精神鬱冒者此是血暈即須服血暈藥當歸散止 [illegible]
仍須看承之人照管問當也或覺飲食不美虛困即服四

順理中圓養氣服若不效 [illegible] 若於兩三日間覺腹中時時
撮痛者此為兒枕作痛必須服治兒枕藥當歸散 [illegible]
若大便秘澀或小便澁切不可服通利藥以其無津液故也
若投通利之藥則滑泄不禁不可止也切須戒之若虛
必欲通利方可服和脾散即通 [illegible]

產後通用方論第三　九二十一方

千金云凡產後滿百日乃可會合不爾至死虛羸百病滋
長慎之。凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故
也。凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃
進羊肉湯有痛甚切者不在此例候兩三日消息可服澤
蘭圓比至滿月乃藥盡為佳不爾虛損不可平復也全極
消瘦不可救若服五石澤蘭圓補之服法必七日外不得

早服也。凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積
聚百病競起迄至於死百方療不能差桃仁煎主之出千金
後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一二劑以至年內
常將服之佳

黑神散 治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胸痞滿
或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾
並皆治之

熟乾地黃　蒲黃炒　當歸　乾薑炮
桂心　芍藥　甘草炙各四兩　黑豆炒去皮半升

右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞同煎調服

烏金散 治產後十八疾方 [illegible]

一曰產後因熱病胎死腹中者何但服烏金散　二曰
產難者何但服烏金散　三曰產後胞衣不下者何但
服烏金散　四曰產後血暈者何但服烏金散　五曰
產後口乾心悶者何但服烏金散　六曰產後乍寒乍
熱者何但服烏金散　七曰產後虛腫者何但服烏金散
兼朱砂圓　八曰產後乍見鬼神者何但服烏金散　九曰
產後月內不語者何但服烏金散　十曰產後腹內疼
痛兼瀉者何但服烏金散兼用止瀉調氣藥　十一曰
產後遍身疼痛者何但服烏金散　十二曰產後血崩
者何但服烏金散　十三曰產後血氣不通咳嗽者何
但服烏金散　十四曰產後乍寒乍熱心痛月候不來
者何但服烏金散。十五曰產後腹脹滿嘔逆不定者

何宜服【人參湯】服【生地】……三二日加小薑……下……前
○十六曰産後口鼻黑氣及鼻衄者何論同此證不可
治○十七曰産後喉中氣喘急者何論同十死不治○
十八曰産後中風者何但服【……】　已上論與郭稽
中二十一論問答同故不詳録
【桃仁煎】療萬病婦人産後百病諸氣方
桃仁（壹千貳百枚去皮尖雙仁熬）
右一味擣令極細熟以上等酒壹斗伍升研三四遍如
作麥粥法以極細爲佳納小長項瓷瓶中密塞以麵封
之納湯中煮一復時不停火亦勿令火猛使瓶口常出
在湯上勿令沒之熟訖出溫酒服壹合日再服丈夫亦
可服
【千金增損澤蘭圓】療産後百病理血氣補虛勞方
澤蘭　甘草　當歸　川芎各柒分
附子炮　乾薑　白朮　白芷
桂心　北細辛各肆分　北防風　人參
牛膝各伍分　栢子仁　熟地黃　石斛各陸分
厚朴　藁本　蕪荑各貳分　麥門冬去心捌分
右二十味爲末煉蜜圓如梧桐子大溫酒下貳拾元
産後醋墨
松煙墨不拘多少用炭火煅通紅以米醋淬之再煅再
淬如此柒度研令極細用絹羅過每産了喫醋墨貳錢
用童子小便調下
【……】治産後一切諸疾纔分娩喫壹服尤妙

當歸（……）延胡索（……）血竭（……）
沒藥（……）各等分
右爲細末每服各抄半錢用童子小便壹琖煎至陸分
通口服
【玉露散】治産後乳脈行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澀
滯悉能治之涼膈壓熱下乳
人參　白茯苓　甘草各半兩　苦梗炒
川芎　白芷各壹兩　當歸壹分　芍藥叁分
右爲細末每服貳錢水壹琖煎至柒分溫服如煩熱
甚大便秘者加大黃貳錢半
【地黃煎】治産後諸疾
生地黃汁　生薑汁各壹升　藕汁半升　大麻仁（……）
右和停以銀器內慢火熬成膏溫酒調半匙服更以北
朮煎膏半匙入之尤佳　産寶方無麻仁用白蜜治産
後虛汗嘔吐
【理中圓】治新産血氣俱傷五臟暴虛肢體羸瘦之氣乏汗
纔産直至百晬日常服壯氣補虛和養臟腑蠲除餘疾消
穀嗜食
甘草炙貳兩　白朮　人參　乾薑各壹兩
右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大溫米飲下叁拾圓空
心服纔産了以童子小便打開與服七日內日叁服
産乳方云此乃大理中圓加甘草兩倍耳然其功比之
四味等分大故不同蓋取甘味以緩其中而通行經絡
之功甚勝者也此産婦月內不可闕者出月不須服矣

○古方中有婦人補益之藥如大☐☐圓澤蘭圓熟乾地黄圓大☐散之類其藥味稍衆而中下之家村落之地卒何以致下藥肆中少有真者不若以四味理中圓易一較其功比澤蘭圓之類十倍頗多也

黑神丹 治産後一切血疾産難胎衣不下危急惡疾垂死者但灌藥得下無不全活神驗不可言

當歸 五靈脂 川芎 各壹兩
熟地黄 各壹兩

右細剉以沙合盛赤石脂泯縫紙筋鹽泥固濟炭火拾斤煆令通赤去火候冷取開看成黑糟色取出細研却入後藥

百草霜 五兩 硫黄 乳香 各壹兩半
花蕊石 琥珀 各壹錢重

右伍味並細研與前伍味再研如法修製和勻以米醋煮麵糊圓如彈子大每服壹圓炭火燒令通赤投於生薑自然汁與童子小便入酒漉出 研細只用此酒調下

茂恂此方初從事濮上幕府郡之醫胡者爲予言數政之前有朱汴水部施黑龍丹凡産後諸疾危甚垂死者無不愈郡中及村落人賴以全活者甚衆汴受代歸婦人數千號泣遮道送行尚有一二粒未之施也先人自三峯謫官淮陽家嫂馬氏蓐中大病醫者療從變投丹必愈訪之乃得於汴也且言每當一粒輙受千錢必其獲厚利不欲求之後起守汝海收藏別一驛臨行出此方爲獻每以救人無不驗者處道原侍郎再帥涇原時姨母姬娠至臨蓐就蓐後數日有少血夜入其室驚悸成疾衆醫不能治乃以此丹嘗遺之服之遂安家人金華君在秦生文度數日苦頭痛未止又心痛痛發兩股上下凡注疾勢甚亟從顖頂慣目視燈如金色勺飲不下服藥良衆無效忡然憶黑龍丹可服初以半粒投之即能飲粥而泄瀉入粥吐出不覺痛稍緩又投半粒又得安眠自中夜服藥至五鼓下惡物數升頭痛頓減又至食時復下數升渙然醒愈蓋敗血所致其效如此建中靖國元年五月二十日郭茂恂記仲氏嫂金華君在秦産七日而不食始言頭痛頭痛而心痛作既而目睛痛如割如是者更作更止相去纔瞬息間每頭痛甚欲取大石壓食久漸定心痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是者十日不已國醫二三輩郡官中有善醫者亦數人相顧無以爲計且言其藥犯芎可以愈頭痛犯當歸可以治心痛率皆悠悠不根之言竟不知病本所起張益困頓醫益術殫予度疾勢危矣非神丹不可愈方治藥而張召予夫婦付以諸子與仲氏別悽惻不復言予殿門成張曰弟安心養疾亟出召伯氏曰事急矣進此丹可乎仲氏尚遲遲以兩旬不食恐不勝任黄昏進半粒疾少間中夜再服藥下瞑目寐如平昔平旦一行參升許如蝗虫子三疾減半巳刻又行如前則頓愈矣遂剃鉸輩視之殆無氣午後體方涼氣方屬乃微言索飲自此遂平復大抵産者以去敗惡爲先血滯不快乃至是爾

後生夫婦不習此理老嫗庸醫不能中病所以疾苦之
人十死八九大數難定豈得與天不遇良醫終抱遺恨
今以施人俾終天年非祈于報者所冀救疾苦養性命
時崇寧元年五月九日郭稽中序
治產後氣血俱虛煩熱大補恐增寒熱別致他病惟令速
露快利為佳當歸散
當歸　芍藥　川芎　黃芩各壹兩
白朮半兩
右為細末溫童子小便或酒調下貳錢[illegible]　又
周頲傳授濟急方四道
頲嘗見人傳經効諸方自書修合實有大功然多紛於表末
普用傳授以濟急難治產後血暈血氣及惡血不散便成
癥瘕兼瀉面色黃腫嘔吐惡心頭痛目眩口吐清水四肢
羸弱五臟虛怯常日睡多喫食減少漸覺羸瘦年久多為
勞疾如此所患偏宜服澤蘭圓
澤蘭葉肆兩　芍藥　蕪荑仁　甘草
當歸　芎藭各壹兩貳分　乾薑　桂心各壹兩半
石膏　桔梗　細辛　厚朴
吳茱萸　栢子仁　防風　烏頭炮
白薇　枳殼　南椒　石[illegible]
蒲黃　石斛　茯苓各壹兩貳分　白朮
白芷　人參　青木香　藁本各壹兩貳分
右揀擇上等州土如法修製為末煉蜜圓如彈子大有
所患熱酒研壹圓入口便愈大忌豬膩熱麵鮭汁生葱

冷水菓子等若死胎不下胎衣在腹並以炒鹽酒研服
未効再服
治產後諸疾[illegible]　方與局方[illegible]同但無地
黃阿膠桔梗故不錄
神效產後[illegible]
[illegible]　蒲黃各壹兩　當歸
沒藥　桂心　好墨　芫花
青木香　麝香各[illegible]　丈夫髮灰　[illegible]各半兩
右為細末以新瓷器盛密封勿令走氣每產後以好酒
調下壹錢匕如血暈衝心下血不盡臍下攪刺疼痛不
可忍塊血癥疾甚者日加兩服不拘時候忌冷物菓子
粘食
保生圓　方與局方同但無麻仁有川椒故不復錄
[illegible]治產後虛中有積結成諸疾
黑附子　桂心　白薑各壹兩半　巴豆[illegible]
右為細末入巴豆研停醋煮麵糊為圓如麻子大每服叁
圓至伍圓冷茶下服之取瀉為度
[illegible]產服此蕩蓄兒枕除百病
當歸　人參　木香　黃耆
川芎　甘草　茯苓　芍藥
桂心　知母　大黃炒　草豆蔻
白朮　訶子　良薑　青皮
熟地黃少許　附子重半兩者壹箇
右除地黃附子外各等分焙乾生薑壹斤研取自然汁

於椀中停冷食久傾去清汁取下面粉澱在箬葉上入焙籠焙乾擣羅為末產後用熱酒調下一錢[illegible]片棗壹箇煎至柒分熱服服後產母自然睡着半日以來睡覺再服全除腹痛每日只叁服至九日不可服灶中冷也

地黃酒 治產後百病未產宜月先釀產訖可服

地黃汁　好麴　好淨秫米[illegible]

右先以地黃汁漬麴令發準家法釀之至熟封七日取清者服常令酒氣相接勿令絕忌蒜生冷酢滑雞豬肉一切毒物婦人皆可服之但夏一箇月不可合春秋宜合以地黃汁并滓納米中炊合用之若作壹碩拾碩準此壹升為率[illegible]後服此酒

烏金散 治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎衣不下失音不語心胸脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口內生瘡咽喉腫痛心中忪悸夜不得睡產後中風角弓反張面赤牙關緊急或崩中如豚肝臍腹[illegible]痛煩躁恍惚四肢腫滿及受胎不穩唇口指甲青黑[illegible]

[illegible]

生地黃[illegible]　蒲黃　當歸[illegible]

右於銀石器內用慢火取地黃汁炒生薑滓以生薑汁炒地黃滓各令乾四味同焙乾為細末醋煮麵糊圓如彈子大每服壹圓食前用當歸酒化下神妙

琥珀散 治產後一切危困之疾

琥珀　[illegible]　麝香　香墨[illegible]

白僵蠶　當歸各壹分　鯉魚鱗[illegible]　桂心

百草霜　白附子　梁上塵[illegible]

右為細末炒生薑熱酒調下[illegible]治產後一切病服之[illegible]

治產後諸疾如產時[illegible]切須用童子小便[illegible]服

除百病[illegible]無[illegible]便用白湯亦可

或產時力[illegible]下血[illegible]或微熱[illegible]

馬尾大當歸[illegible]

右在未產前修製為末如遇產有疾無疾若產了但用童子小便調服令產婦月後無疾[illegible]有神効

療產後[illegible]利[illegible]心腹[illegible]悶腸脹咳嗽不能食大便不通眼[illegible]行坐[illegible]腹時痛[illegible]

白朮　當歸　桑白皮　大黃[illegible]

[illegible]桂心[illegible]生薑[illegible]

細辛

右[illegible]用水貳升煎取壹升分為[illegible]服如人行七八里久再服此湯當得利利又不宜過多所利者為已[illegible]而微利之其不然未合令利既初產後[illegible]虛尚藉藥食補之豈宜取利[illegible]病熱既要不利[illegible]以當[illegible]服湯得通氣息安帖利[illegible]未止即[illegible]取三匙醋飯喫即止止後但須[illegible]溫將息後取[illegible]飲食之節量其所宜如利不[illegible]作依後方服之[illegible]

[illegible]

當歸[illegible]　白朮[illegible]　甘草[illegible]　細辛[illegible]

桂心　人參　生薑[illegible]　桑白皮[illegible]

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下叁拾圓

產後血氣不通，當時不甚覺，如有產時血少，留成瘕結，心
便疼硬，作寒作熱，飲食不進，不生肌肉，心腹有時刺痛，口
乾粘，手足沉重，有此狀者，宜此藥。

當歸　芍藥　甘草　牛膝

鬼箭羽　人參各四分　牡丹皮　虎杖

白朮各陸分　大黃捌分　乾地黃各分　朴消拾分

烏梅肉炒　白薇　桂心各肆分　水蛭炒

蒲黃各叁分　虻虫各肆枚，熬

右為末，煉蜜圓如梧桐子大，空心酒下貳拾圓，日兩服。以差為度。有[illegible]

萬[illegible]　翁

[illegible]

產科序論　陳無擇

世之論產者，有產書甚多，千金、外臺、會王產寶、馬氏、王氏、崔氏皆有
產書，喜嘗世有衛生寶集、子母秘錄等，備則備矣，但倉卒
之間，未易應試。惟李師聖序郭稽中產科經驗十八論
一篇，凡十八方，用之頗効，但其間不論災怪，產者始末，
理甚簡略，於諸方之下，以備識之者。非敢[illegible]

[illegible]

胞衣不出方論第四　凡二十二方

夫有產兒出，胞衣不落者，世謂之息胞，由產初時用力，此
產兒出而體已疲憊，不能更用力，產胞經停之間，而外冷
氣乘之，則血道澀，故胞衣不出。須急以藥救之，不妨害
於兒。所奈者胞系連兒臍，胞不出即不得以時斷臍浴洗，
冷氣傷兒，則成病也。舊法胞衣不出，恐損兒者，依法截臍
而已。產處須順四時方面，并避五行禁忌，若有觸犯，多
令產婦難產。難產者未產也，必腹痛連腰甚者即產。
也。所以然者，腎候於腰，胞係腎故也。診其脈轉急如切繩
無殊者即產也。郭稽中論曰：胎衣不下者何？答曰：母生子
訖，流血入衣中，衣為血所脹，是故不得下。治之稍緩，脹滿
腹中，以次上衝心胸，疼痛喘急者，但服奪命丹以逐去衣
中之血，血散脹消，胎衣自下，而無所患。更有牛膝湯等用
之甚效，錄以附之。

奪命丹

附子半兩，炮去皮臍　牡丹皮壹兩　乾漆壹分，碎之，炒令煙盡

右為細末，以釅醋壹升，大黃末壹兩，同熬成膏，和藥圓
如梧桐子大，溫酒吞五七圓，不拘時。

必效方[illegible]治胎衣不出，臍腹堅脹急痛，即殺人。服此
藥，胞即爛下，死胎

牛膝　瞿麥各肆兩　當歸叁兩　通草陸兩

滑石捌兩　葵子伍兩

右細切，以水九升，煮取叁升，分叁服。若衣不下，腹滿即
殺人。推其源，是胞衣有血，奔心是以不出也。或坐婆
生疏，斷帶收兒，其衣失於繫住，則帶縮入腹中，便不得
出，宜服此藥，衣即爛出也。[illegible]千金崔氏同

花蕊石散治產後氣欲絕，緣敗血不盡，血迷血暈，惡血奔

心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭暖皆以童子小便
調膏錢服下惡物如豬肝終身無血風血氣疾隔上有血
化為黃水即從口出或小便中出也若先下胎衣則泛之
藥不能達先引治血悶則第之藥無此功無如此藥有
兩全之效也

花蘂石一斤　上色硫黃四兩

右二味相拌令均先用紙和膠泥固濟瓦罐子一箇內可
容藥候泥乾入藥在內密泥封口了焙籠內焙令透熱
便安在四方磚上磚上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自巳
午時從下生火令漸漸上徹有墜下火放炭火上直至
經宿火冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以絹羅
至細瓷合內盛依法用之

有一親戚婦人産後胞衣不下血脹迷悶不記人事告之
曰死矣僕曰某收得趙大觀文局中真花蘂石散在笥中
漫以一貼贈之以童便調灌藥下即甦衣與惡物旋即隨
下乘與無恙

牛膝湯　治妊娠五六月墮胎胞衣不出

牛膝　川芎　朴硝　蒲黃各三分

桂心半兩　當歸一兩半

右為粗末每服四錢水一盞半薑三片生地黃一分煎至
陸分去滓溫溫頻服

若胞衣不出若腹脹則殺人

黑豆壹合炒令熱

右入醋壹盞煎三五沸去滓分溫三服酒煮亦可

必効方療胞衣不出方　服蒲黃如棗大集驗千金同

又方以生地黃汁壹升苦酒參合煖服之

救急一方　見子死腹中論中

又方　以水噀産婦面神驗

延年方　以洗兒水令産母飲半盞其衣便下勿令産婦知

又方　牛膝壹兩　葵子壹合

右擣碎以水壹盞半煎至壹盞去滓分貳服

廣濟療胞衣不出方

右以末竈突中土三指撮以水服之集驗千金備急文
仲同

又方　竈下土一寸研碎用好醋調令相入納臍中續煎生
甘草湯參合服

又方　以醋湯飲之出

又方　雞子一枚苦酒壹合和飲之立出

一方　用草麻子名〓〓見産難門

延年方　療胞衣不出腹脹則殺人

吞雞子黃兩三枚解髮刺喉中令嘔即出若困極以水
煮螻蛄壹枚以水煮灌入口中汁下即出崔氏同

救急方　用赤小豆男吞七枚女吞十四粒東流順水吞下

産乳方療産後惡血衝心或胞衣不下腹中血塊等疾同

右大黃壹兩為末以好醋半升熬成膏以藥末投膏為
圓如梧桐子大溫醋湯下伍圓亦以取下惡物不可多服

療胞衣不下

栝樓實壹箇取子研令細

右酒與童子小便各半盞煎至七分去滓溫服如無實用根亦得

又方　紅花壹兩酒煮濃汁服

又方　以鹿角鎊錯炙令分為末以葱白湯調下

凡欲產時必先脫常所着衣以籠竈胞衣自下仍易產神驗

廣濟方云取夫單衣蓋井上立出　千金翼論救急崔氏小品同

治胞衣不下訣

婦人百病莫甚於生產產科之難臨產莫重於催生既產莫甚於胞衣不下惟有花蕊石散一件最為緊要如黑神散琥珀散諸方之類雖皆有驗然鄉居或遠於藥局倉卒[illegible]之間無法可施令採得胡氏寶慶方一妙法云若產訖胞衣不下停待稍久非特產母疲倦又且血流入胞中為血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤若有此證宜急斷臍帶以少物繫住[illegible]使其子血脉不潮入胞中則胞衣自當萎縮而下縱淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰終自下矣累試有驗不可輕信坐婆妄用手法多有因此而亡深可浩歎所以劉氏卑別視見其說為據

產後血暈方論第五　九十六方

論曰產後血暈者由敗血流入肝經眼見黑花頭目旋暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈細酒調黑神散最佳或作暗風中風治之凡產血熱氣逆上湊心故昏迷不省氣閉欲絕是也然其由有二有用心使力過多而暈者有下血多而暈者有下血少而暈者其暈雖同其治特異當詳審之下血多而暈者但昏悶煩亂而已當以補血清心藥治之下血少而暈者乃惡露不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥治之古法有云產婦才分娩了預燒秤錘或江中黃石子硬炭燒令通赤置器中急於床前以醋沃之得醋氣可除血暈產後一臘不妨時作為妙崔氏云凡暈者皆是虛熱血氣奔迸腹中空所致欲分娩者第一須先取釅醋以塗口鼻仍置醋於傍使聞其氣兼細細沃之此為上法如覺暈即以醋噀面醒來即飲醋仍少少解之一法燒乾漆[illegible]

郭稽中論曰產後血暈者何答曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但服清魂散即省

清魂散方

澤蘭葉　人參各壹分　荊芥壹兩　川芎半兩

右為末用溫酒熱湯各半盞調壹錢急灌之下咽即開眼氣定即醒　一方有甘草貳錢

若去血過多而暈者宜服[illegible]

廣濟方治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲絕

芍藥　甘草各壹兩炙　丹參　生地黃汁[illegible]

生薑汁　白蜜各壹合
右水貳升先煎前三味取捌合下地黃生薑汁蜜分為兩服
又方
荷葉貳枚炙　真蒲黃壹兩　甘草貳兩　生地黃汁半升
白蜜壹匙
右切細以水叁升煮取濃汁去滓入蒲黃蜜地黃汁煖服立愈
療產後血暈心悶
蒲黃肆分　紫葛　芍藥各捌分　紅花拾貳分
右㕮咀以水貳升煎至柒合入生地黃汁貳合更煎叁伍沸每服叁合
產後血暈心悶氣絶欲如見鬼
生益母草汁叁合根亦可　生地黃汁貳合
童子小便壹合　雞子清叁枚
右煎叁肆沸後入雞子清攪停作壹服
產後血暈狂語不識人狂亂
童子小便伍合　生地黃汁壹合　赤馬通七枚　紅雪捌分
右以上貳味浸赤馬通絞去滓下紅雪溫為兩服
獨行散治產後血暈昏迷不省衝心悶絶
五靈脂半生半炒　貳兩
右為末溫酒調下貳錢口噤者拗開口灌之入喉即愈
一方加荊芥等分為末童便調下
又方治產後血暈
右神麴為末熟水調貳錢
療產後血暈狂言煩渴不止
生香附子去毛
右為末每服貳錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒分服
治產後血暈危困國醫以此方獻禁中用之大效以獲賞
賚時供賞號沈
生地黃汁壹大盞　當歸壹分剉　赤芍藥壹分
右水煎叁伍沸溫服如覺煩熱去當歸入童子小便半盞妙
張氏方治產後血暈全不省人事極危殆者
用韭菜切入在一有嘴瓶內煎熱醋沃之便密縛瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋氣透入須先扶病人起惡血衝心故有此證韭能去心之滯血加以醋氣運達之用無不效
近效方療血暈絶不識人煩悶言語錯亂惡血不盡腹中絞痛胎死腹中紅藍花酒
紅花壹兩
右為末分貳服每服酒貳盞童子小便貳盞煮取盞半候冷分為貳服留滓再併煎　一方無小便
崔氏療產乳暈絶方
以洗兒水飲叁合良　或以惡血服少許良
又方　半夏洗不以多少
右為末圓如大豆內鼻中即省亦療五絶指迷文仲同
又方　生赤小豆擣為末取東流水和服方寸匕不瘥再

服教各同
茯苓散治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失志及產
後百病
沒藥　血竭等分
右細研爲末每服二錢空心下便用童子小便與細酒各半盞煎
壹貳沸調下貳錢良久再服其惡血自隨下行更不衝
上先生自談專治婦人方只用白湯調　五羊洪運使
下賊子舍婦人產後語言顛倒譫語不已如有神靈服
諸藥無効召予診之六脈和平僕以此藥兩服而愈
產後顛狂方論第六　九三方
療產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟宜用局方大
聖散[illegible]加好辰砂研令極細每服加壹字許
煎酸棗仁湯調下一服可安
何氏方療產後因敗血及邪氣入心如見祟物顛狂方
用大辰砂壹貳錢重研令極細用飲兒乳汁三四茶腳
許調仍掘紫項活地龍一條入藥候地龍滚三滚取出
地龍不用不令帶藥出但欲得地龍身上涎耳却入無
灰酒與前乳汁相合七八分重湯溫過分作三服
余家荊布方產一日忽見鬼物言語顛倒遂取合
蘇合香圓壹錢重以童子小便調服即醒神思如故
產後狂言譫語如有神靈方論第七　九一方
夫產後言語顛倒或狂言譫語如見鬼神若其原不一須
仔細辨證用藥治療產後驚風言語亂道如見鬼神精神
不定者研好朱砂酒調下龍虎丹說見後用此法宜服兼暖

珀地黃圓服之○一則因產後心虛敗血停積上干於心
而狂言獨語者當在第十九卷第一論求之○二則產後
臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自覺知神思不安
者當在十九卷第二論求之○三則有風熱乘虛心虛
氣弱腰背強直或歌哭嗔笑言語亂道當作風痙治療當
在十九卷第三論求之○四則產後心虛中風心神恍惚言
語錯亂當在十九卷第四論求之○五則產後多因敗血
迷亂心經而顛狂言語錯亂無常或暈悶者當於本卷第
五六論求之○六則因產後感冒風寒惡露斬然不行憎
寒發熱如瘧晝日明了暮則譫語如見鬼狀當作熱入血
室治之宜琥珀地黃圓及四物湯只用生乾地黃加北柴
胡等分煎服如不退者以小柴胡湯加生乾地黃如黃芩
分兩煎服愈雖然已上諸證大抵胎前產後之疾自有專
門一定之法毫髮不同如產後首當逐敗生新然後子細
詳辨疾證不可妄立名色自立新意妄自加減方藥大宜
斟酌依古法施治未有不安者也
琥珀地黃圓方見十九卷第一論　四物湯方見一卷第一論通用方
小柴胡湯方見六卷第五論
治產後敗血衝心發熱狂言奔走脈虛大者男六[illegible]等論
乾荷葉　生地黃　牡丹皮各等分不以多少
右三味濃煎湯調生蒲黃貳錢匕壹服即定
產後不語方論第八　九二方
論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多
致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心

氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此者但服七珍散

人參　石菖蒲　生乾地黃　川芎各一兩
細辛一錢　防風　辰砂別研各半兩
右為細末每服一錢薄荷湯調下不拘時

胡氏孤鳳散治產後閉目不語
白礬研細
右每服一錢以熟水調下

產後乍見鬼神方論第一　凡二方

論曰產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脈因產傷耗血脈心氣虛則敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛錯醫人不識呼為風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦一捻得睡即安

調經散方
沒藥　琥珀並細研　桂心各一錢　芍藥
當歸各一分　麝香研　細辛各半錢
右為末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服

柏子仁散治產後狂言亂語皆由內虛敗血挾邪氣攻心
柏子仁　遠志去心　人參　桑寄生
防風　琥珀別研　當歸炒　生地黃焙
甘草等分
右為粗末先用白羊心一箇切片以水一大盞半先煮至九分去羊心入藥末五錢煎至六分去滓無時服

茯神散治產後血邪心神恍惚言語失度睡臥不安
茯神一兩去木　人參　龍齒研　琥珀研
赤芍藥　黃耆　牛膝各三分　生地黃一兩半
桂心半兩
右為末每服三錢水一盞煎至七分不拘時去滓溫服

產後臟虛心神驚悸方論第二　凡七方

夫產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為風

邪所乘也或恐懼憂迫令心氣受於風邪風邪搏於心則
恍惚不自安若驚不已則悸動不安其狀目睛不轉而不能
呼診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸矣
産乳七寶散 療初產後服之調和血氣補虛安神壓驚悸
辰砂研 桂心 當歸 川芎
人參 白茯苓 羚羊角燒存性各貳兩
乾薑
右為末每服壹錢用羗活豆淋酒調下如不飲
酒用清米飲調下如覺心煩熱悶以麥門冬去心煎
水調下若心下煩悶而痛用童子小便調下若覺心胷
煩熱即減乾薑冷即加之腹痛加當歸心悶加羚羊角
心虛氣怯加桂心不下食或惡心加人參虛煩加茯苓
[illegible]
以意斟酌日貳夜壹服

治產後臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自覺知
茯神 遠志 人參 麥門冬
甘草 生地黃 當歸 龍齒
桂心 白芍藥 羚羊角等分
右為粗末每服叁錢水壹盞入生薑三片棗壹枚同煎至陸分
去滓溫服無時候

治產後心虛驚悸神思不安
龍齒 黃芩 白薇 生地黃各壹兩
人參 茯神 遠志 羗活各叁分
甘草 桂心 防風各半兩 一方無
右為粗末每服叁錢水壹盞入生薑三片棗壹枚煎至陸分
去滓無時服

治產後臟府虛心怔驚悸言語錯亂
麥門冬去心 人參各貳兩 牛黃研 白薇各壹兩
茯神 獨活 遠志 生地黃
朱砂研 防風 天竺黃 甘草
龍齒研 龍腦研 麝香各壹分研
右為末用薄荷酒調下貳錢

療血虛多驚及產後敗血衝心
辰砂 琥珀 沒藥研 當歸各等分
右為細末每服貳錢空心日午臨卧白湯調服
產後驚風亂語言語如見鬼狀精神不定者研好朱砂酒
調下[illegible]服之
[illegible]
南番琥珀研 延胡索 當歸各壹兩
蒲黃 生地黃 生薑
右為末煉蜜圓如彈子大食前當歸湯化壹圓服

產後心驚中風方論第三 凡五方
論曰產後心悶氣絕眼張口噤遍身強直腰背反偃狀如
癇疾心忪驚悸言語錯亂皆是宿有風毒因產心氣虛弱
發成風痙
療產後心氣虛損卒驚狂語或歌哭嗔笑性氣不定
桂心 甘草各陸分 細辛肆分
人參 牛黃 遠志 茯神各捌分

生地黄貳拾分　龍骨拾分　棗子參拾枚
右㕮咀以水捌升煮麥取肆升半入藥煎至壹升分作叁
服温進
療産後多虚羸弱若大汗利皆至於死此重虚故也若産後
中風語澁昏悶不知人者
人參　茯苓　羌活　桂心
大棗　遠志各貳兩　竹瀝壹升
右用水陸升煮取叁升下竹瀝更煎取貳升温分叁服
療産後心驚中風
防風　當歸　茯苓　防己
麻黄各陸分　秦艽　人參　川芎
獨活　白鮮皮　甘草　白薇各伍分
石膏拾貳分　竹瀝貳升
右水柒升先煮麻黄掠去沫下諸藥入竹瀝煎取貳升
半去滓温分叁服忌豬肉生冷
療産後狂語志意不定精神昏亂心氣虚風邪發茯苓湯
茯苓一方用茯神　生地黄各拾貳分　遠志　白薇
龍齒各拾分　防風　人參　獨活各捌分
右以銀壹大斤水壹斗伍升煎取柒升下諸藥煎取叁
升温分叁服忌如前　一方治産後風邪所干心神恍
惚志意不定加荆芥捌分甘草伍分
療産後心虚忪悸不定亂語錯誤精神恍惚不主當由心
虚所致
人參　甘草　芍藥　當歸

龍齒各陸分　遠志　茯苓各捌分　桂心陸分
麥門冬　大棗各貳分
右為散以水捌升煮取叁升去滓温分叁服
産後中風恍惚方論第四　凡三方
夫産後中風恍惚者由心主血血氣通於榮衛藏府遍循
經絡産則血氣俱傷府藏皆虚心不能統於諸藏榮衛不
足即為風邪所乘則令心神恍惚不定也
千金療産後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆由心虚所致
茯苓伍兩　芍藥貳兩　甘草　桂心
當歸各叁兩　生薑陸分　麥門冬壹升　大棗叁拾枚
右為散水叁升煎取壹升去滓分作兩服食後
經効療産後心虚忪悸志意不定煩躁恍惚
茯神　當歸　黄芩　麥門冬去心
甘草　人參　芍藥　酸棗仁
白鮮皮各叁兩　大棗拾枚
右為粗末水貳升煮取柒合去滓温服
療産後中風恍惚語澁四肢不利天麻丸
天麻　朱砂　防風　羌活各壹兩
殭蚕炒叁分　乾蝎炒　白附子炮裂　五靈脂各半兩
雄雀糞炒　牛黄各壹分
右為末糯米軟飯為丸如梧桐子大以薄荷酒研拾伍
丸服之
産後所下過多虚極生風方論第五　凡一方
論曰産後所下過多虚極生風者何答曰婦人以榮血為

主因為血下太多，氣無所主，唇青肉冷，汗出目瞑，神昏命
在須臾。此但虛極生風也。如此則急服濟危上丹，若以風
藥治之則誤矣。

濟危上丹

乳香（研） 五靈脂 硫黃 玄精石（同研極細）
阿膠（炒） 卷柏（去土） 桑寄生 陳皮（各等分）

右將上四味同研，停於銀石器內，微火炒，勿焦了，再研
極細，後入餘藥為末，用生地黃汁和丸如梧桐子大。每
服二十丸，食前溫酒或當歸酒送下。

產後虛汗不止方論第六　凡八方

夫虛汗不止者，由陰氣虛而陽氣加之，裏虛表實，陽氣獨
發於外，故汗出也。血為陰，產則傷血，是為陰氣虛也。氣為
陽，其氣實者陽加於陰，故令汗出，而陰氣虛弱不復者，則
汗出不止也。凡產後血氣皆虛，故多汗，因之遇風則變
為痙，縱不成痙，則虛乏短氣，身體柴瘦，唇口乾燥，久則經
水斷絕，由津液竭故也。[illegible]

治產後虛汗不止。[illegible]

當歸 黃芪 麻黃根 牡蠣（煅）
人參 粉草（各等分）

右㕮咀，每服四錢，水一盞，煎至七分，去滓溫服。

又方

當歸 黃芪（各壹兩） 麻黃根（貳兩）

右㕮咀，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓溫服。

千金療產後風虛汗出不止，小便難，四肢微急，難以屈伸。

甘草（炙） 附子（一枚，炮） 桂心 芍藥（各一兩）

右㕮咀，每服四錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎至七分，
去滓，空心溫服。忌豬肉、冷水、生葱等物。

經效療產後汗出不止。

黃芪（六分） 白朮 牡蠣 茯苓
防風 麥門冬（去心） 生地黃（各五分） 大棗（七枚）

右㕮咀，水二升，煎取八合，去滓，空心分溫兩服。

又療產後血氣暴虛汗出。

淡竹葉煎湯三合，微溫服之，須臾再服。

又方

馬齒莧研取汁三大合（[illegible]）

右煮一沸，投蜜匙許，令停冷服。

止汗散　治產後盜汗不止，應多汗者皆可服。

牡蠣（煅，研細） 小麥麩（炒令黃色，碾為細末）

右等分研細，煎生豬肉汁調下二錢，無時候。

人參湯　治產後諸虛不足，發熱盜汗。方出胡氏

人參 當歸（等分）

右為末，以豬腰子一隻，去脂膜，切小片子，以水三升，糯
米半合，葱白兩條，煮米熟，取清汁一盞，入藥二錢，煎至
八分，溫服，不拘時候。

產後冒悶汗出不識人方論第七　凡一方

凡產後忽冒悶，汗出不識人者，暴虛故也。
破雞子吞之便醒，若未醒，可與童子小便一升，甚
驗。丈夫小便亦得，切不得用病人者。又若不識人，
或時復發者，此為有風，因產血氣暴虛，風行脈中故也。
若產後去血多者，又增此疾，與雞子不醒者，可急作竹

瀝汁壹服五合須臾不定再與五合頻與叁伍服瘥

產後汗出多而變痓方論第八

論曰產後汗出多而變痓者何答曰產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪搏之則變痓痓者口噤不開背強而直如發癇狀搖頭馬鳴身反折須臾十發氣息如絕宜速斡口灌小續命湯稍緩即汗出如雨手拭不及者不可治也

小續命湯 治中風及剛柔二痓及腳氣痺弱不能轉側兼治小兒驚風

麻黃去根節　桂心　甘草各半兩　防風三分

芍藥　白朮　人參　川芎

附子　防己　黃芩各壹分

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓取捌分清汁入生薑汁再煎壹貳沸溫服日叁服夜貳服若柔痓自汗者去麻黃更加葛根有熱者去附子減桂壹半冬及初春去黃芩　雖然陳無擇評曰產後汗出多變痓亦令服續命湯此又難信既汗多如何更服麻黃官桂防己黃芩輩不若大豆紫湯為佳太醫局方大聖散亦良藥也𦇑觀朱奉議云凡剛柔二痓小續命湯並可加減與之若柔痓自汗者去麻黃加葛根之說朱奉議必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦不可偏見曲說有妨古人之意

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風痱痓背強口噤直視煩熱脈緊大者不治

小品方主產後中風困篤背強口噤或但煩躁或頭身皆重或身重痒劇嘔逆直視者

川獨活壹兩半　大豆半升　酒叁升

右先以酒浸獨活煎壹貳沸別炒大豆極焦煙出急投酒中密封候冷去豆每服壹貳合許得少汗則愈日拾服此藥能去風消血結如妊娠折傷胎死腹中服此得差凡產後口噤腰背強直角弓反張皆名曰痓又名曰痓古人察有汗無汗以分剛柔陰陽而治今產寶諸書有中風口噤一門又有角弓反張一門其實一也如增寒發熱有類傷寒皆不論及豈可只以一二藥治之愚今取百問中方論已詳備前篇郭稽中論庶幾覽者如指諸掌

中風口噤角弓反張方論附

凡產後中風口噤是其血氣虛而風入於頷頰夫人之筋也手三陽之筋結入於頷產則勞損府藏傷於筋脈風若來之其三陽之筋脈則偏搏之筋得風冷則急故令口噤也若角弓反張者是體虛受風風入於諸陽之經也人陰陽經絡周環於身風邪乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀也

濟產後中風口噤牙關緊急手足瘛瘲如角弓狀　愈風散

○亦治血暈四肢強直不省人事或築心眼倒吐瀉欲死

出郭氏方　百問經驗以本事同

荊芥略焙為末

右每服叁錢以淋酒調下用童子小便亦可其效如神

口噤者灌藥斡開牙齒或吹入鼻中皆効

一方川芎老錢煎湯調服名一捻金散

一方云用舉卿古拜貳味各等切㕮咀謂以秘方也此藥委有奇效神聖之功大抵產室但無風為佳不可衣被帳褥太暖暖即汗出則腠理開易於中風便昏冒

交加散 又名交解散

專治婦人方治產後中風不省人事口吐涎手足瘈瘲

當歸 荊芥穗 等分

右為細末每服二錢水一盞酒少許煎至七分灌之如牙關緊急用匙斡微微灌下但下咽即有生理不問多少便服不可以藥味尋常忽之屢用救人有效

小品療產後中風虛人不可服他藥者一物獨活湯主之及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮之

川獨活 三兩細切

右水三升煮取一升分服耐酒者亦可酒水煮

一方用白鮮皮亦依此法

產後中風痙口噤面青手足急強者

以竹瀝二升分為五服溫溫頻服大效

治產後中風口噤四肢頑痺不仁身體如角弓反張羌活酒

羌活 防風 黑豆

右細剉以好酒二斗於瓶中攪動密封經半日許又於鍋中重湯煮瓶至半日候瓶冷取出每服暖一中盞飲之日可三四服度之當汗出即差

治產後中風身如角弓反張口噤不語方

川烏 如豆大

右取黑豆半升同炒半黑以酒三升瀉於鐺內急攪以絹濾取酒微溫服一小盞取汗若口不開者拗開口灌之未效加烏雞糞一合炒內酒中服之以差為度

寶方療產後腹中堅硬兩脇脹滿手足冷心中煩熱欲飲水乾嘔腦節疼痺中風之疾

羚羊角 防風 羌活 桔梗

敗醬 桂心 柴胡 大黃

右水二升煎取八合空心兩服服了吐即良久更服了

○喫地黃酒用地黃切一升炒令黑瓷瓶中下熱酒三升密封口煮令減半任意服之

千金雞糞酒療產後中風及男子諸風并產後百疾神效方又治產後中風口噤掣縱煩悶或為腰背強直時時反折

烏雞糞 大豆

右先炒豆令聲絕次炒雞糞令黃以酒一升先淋雞糞取汁淋大豆每服一升重者凡四五服之極妙

深師療產後中風口噤不任大小

獨活 乾葛 甘草 生薑 伍分

右㕮咀以水二升煮取一大升分為兩服

張文仲療產後中風風痙通身冷直口噤不識人方

白朮

右以酒三升煮取一升頓服效

經效療產後中風腰背強直時時反張名曰風痙

防風　葛根　川芎　地黄（[illegible]）
麻黄（去節）　甘草　桂心　川獨活
防己（[illegible]）　杏仁（[illegible]）
右細切以水捌升煮麻黄去沫後下諸藥煎取叁升分
温叁服（[illegible]）

治産後中風口噤潰悶不能言身體強直
羌活　防風　秦艽　桂心
粉草　葛根（各[illegible]）　生薑（[illegible]分）　附子（[illegible]）
杏仁（[illegible]）　麻黄（去節[illegible]）
右㕮咀水[illegible]升煮麻黄去沫後下諸藥煮取貳升分為
叁服（[illegible]）

産後中風方論第九　凡七方

論曰産後中風由産傷動血氣勞損臟府未平復起早勞動氣虚而風邪氣乘虚傷之故中風風邪冷氣客於皮膚經絡但疼痺羸乏不任少氣若筋脉挾寒則攣急喎僻挾温則縱緩若入諸臟恍惚驚悸隨其所傷藏附經絡而生病焉

郭稽中産後中風方論

論曰産後中風者何答曰産後五七日内強力下床或一月之内傷於房室或懷憂怒擾盪中和或因着艾傷動臟府得病之初眼澁口噤肌肉瞤搐漸至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶爾中風所得也

陳無擇評曰問産後中風風是外邪血虚則或有中之者真答以人作不可治問答不相顧解如何開示後人立論之難有如此者若是中風當以脉辨[illegible]何藏依經調之強力下床月内房室憂怒着艾非中風類蓐勞性氣火邪治各有法非産後病不暇繁引學者識之

經効療産後風虚頭目痛語言時僻
防風　乾葛　茯苓（[illegible]）　麥門冬（[illegible]）
芎藭　黄芩（[illegible]）　羚羊角（[illegible]分）　甘草（[illegible]分）
右㕮咀以水貳升煎取柒合分為兩服

療産後中風心忪悸志意不定恍惚語言錯亂方
人參（[illegible]分）　羚羊角（[illegible]）　麥門冬　茯神（[illegible]）
黄芩　白鮮皮　甘草（[illegible]）　石膏（[illegible]）
淡竹瀝（[illegible]）
右㕮咀水貳大升煎至柒合下竹瀝分叁服

療産後中風身背拘急如束並渴
川芎　羌活　羚羊角（[illegible]）　酸棗仁
芍藥（[illegible]）　桑白皮（[illegible]分）　防風（[illegible]分）
右㕮咀水肆升煎取貳升分温叁服

療産後中風四肢拘束筋節掣痛不得轉側如角弓反張
麻黄（[illegible]去節）　生薑　桂心　白朮（[illegible]）
防風　芍藥（[illegible]）　川芎（[illegible]分）　竹瀝（[illegible]合）
右細剉以水[illegible]升先煮麻黄掠去沫下諸藥煎取柒合
下竹瀝再煎叁沸分叁服取微汗為度

治産後納涼太過中風着或成常急瘛瘲昏冒[illegible]
以局方小續命湯連進三服即愈

療産後中風煩渴

紅花子（細研合炒碎）

右以水壹升，煎取柒合，每壹匙頃以徐呷。

治產後中風，半身手足不遂，言語蹇澀，恍惚多忘，精神不定。

川獨活　當歸　芍藥　防風

川芎　玄參（各伍兩）　桂心（分半）

右細剉，以水捌升，煮取貳升半，分為參服。覺效，又更作壹劑。若產後須滴七溫，消息如不差，即以此方作元，每服貳拾元。有熱加乾葛伍兩，有冷加白朮伍兩，有氣加生薑陸分，手足不穩加牛膝伍分、萆薢參兩、黃耆肆兩，腹痛加當歸、芍藥各參分，不食加人參貳分、玄參肆分。

產後中風筋脈四肢攣急方論第十（凡四方）

夫產後中風筋脈攣急者，是氣血不足，臟腑俱虛，日月未滿而起早勞役，動傷臟腑，虛損未復，為風邪冷氣初客於皮膚經絡，則令人頑痹不仁，羸乏少氣，風氣入於筋脈，挾寒則攣急也。

治產後中風，四肢筋脈攣急疼痛，背項強直。

防風（壹兩）　赤芍藥　桂心（各半兩）　羚羊角（屑）

川芎　羌活　當歸　酸棗仁

牛蒡子（微炒，各分）

右㕮咀，每服肆錢，水壹盞，煎至陸分，去滓溫服。

療產後中風，睡臥不安，筋脈四肢攣急，或強直。（出聖惠方）

獨活　天麻　防風（各壹兩）　桂心

當歸　荊芥　川芎　蔓荊子（各半兩）

麻黃（去節）　附子（炮）　羚羊角（屑）　赤芍藥（各參分）

右㕮咀，每服肆錢，水、酒各半盞，煎至柒分，去滓溫服。

療產後中風，四肢筋脈攣急疼痛。

羌活　天麻　酸棗仁　川牛膝

防風　當歸　薏苡仁　柏子仁

鹿角膠（搗碎炒）　蔓荊子　桂心（各半兩）　羚羊角（屑）

附子（炮）　川芎（各參分）　麝香（研，壹分）

右為細末，每服以豆淋酒調貳錢服。

治產後中風，四肢筋脈攣急疼痛，心神煩悶，背項強直。

羌活　防風　附子（炮去皮）　羚羊角（屑）

麻黃（去根節，各壹兩）　地黃　桂心（各參分）　酸棗仁（炒）

黃耆　當歸　川牛膝　川芎

萆薢（各半兩）

右為細末，煉蜜元如梧桐子大，每服參拾元，溫酒吞下。

產後熱悶氣上轉為腳氣方論第十一（凡一方）

論曰：產後熱悶氣上轉為腳氣者，何？答曰：產臥血虛生熱，復因春夏取涼過多，地之蒸濕因足履之，所以着為腳氣。其狀熱悶掣瘲，驚悸心煩，嘔吐氣上，皆其候也。可服小續命湯（方見第三卷）兩三劑必愈。若醫者誤以逐敗血藥攻之，則血去而疾益增矣。陳無擇評曰：腳氣固是常病，未聞產後能轉為者，往往讀《千金》見產婦多有此疾之語，便出是證，文辭害義，然可見矣。設是熱悶氣上，如何便服續命湯？此藥本主少陽經中風，非均治諸經腳氣，要須依腳氣方論陰陽經絡調之。此涉專門，未易輕論。既非產後要病，更

不緊引　陳無擇評有此評然小續命湯加減與之用無不效故白朮云産中三陽所患必以小續命湯主之蓐中生

蓐若中三陰所患必熟小續命湯[illegible]大煩躁若紫雪最良如無紫雪用真薄荷煎冷水嚥下

産後遍身疼痛方論第一　凡二方

論曰産後遍身疼痛者何答曰産後百節開張血脉流散遇氣弱則經絡肉分之間血多留滯累日不散則骨節不利筋脉急引故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若醫以爲傷寒治之則汗出而筋脉動惕手足厥冷變生他病但服趁痛散除之

趁痛散方

牛膝半兩　甘草　薤白　當歸

桂心　白朮　黃耆　獨活

生薑各半兩

右㕮咀每服半兩水三盞煎至一盞半去滓食前服陳無擇評曰趁痛散不特治産後氣弱血滯兼能治太陽經感風頭疼腰背痛自汗發熱若其感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發熱頭痛況有蓐勞諸證尤甚趁痛散皆不能療不若五積散入醋煎用却不妨

五積散方見…

産後腰痛方論第二　凡七方

論曰腎主腰脚産後腰痛者爲女人腎位繫於胞産則勞傷腎氣損動胞絡虚未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰痛也若寒冷邪氣連滯背脊則痛久未已後忽有娠必致損動蓋胞絡屬腎腎主腰故也

療産後風冷腰痛不可轉

獨活　川芎　芍藥　桂心

續斷(各[illegible]) 牛膝 桑寄生(各[illegible]分) 當歸

防風(各[illegible])

右㕮咀，以水叁升，煑取壹升，去滓，空心分貳服。

廣濟療產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉

敗醬 當歸(各八分) 川芎 芍藥

桂心(各六分)

右㕮咀，水貳升，煑取捌合，空心分溫貳服。忌葱。

救急療婦人產後餘血不盡，血流入腰脚疼痛，胷滿氣急，兩脇痛方

生薑(肆兩) 淡竹葉(壹升)

右貳味，以水貳升，煑取壹升，去滓，分溫貳服。

千金療產後中風，腰背強痛，中風煩熱，苦渴，頭身皆重，此因風冷所致，及傷寒，大豆酒方

大豆(伍升 炒令煙出) 以酒壹升投之，密蓋令溫，去豆，服壹升，日夜數服，卧取微汗，避風。([illegible])

廣濟療產後二日，患腰疼，腹中餘血未盡，幷手脚疼，不下食，生地黃湯方

生地黃汁(壹升) 芍藥 甘草(各貳兩) 丹參(肆兩)

蜜(壹合) 生薑汁(伍合)

右切，以水叁升，煑取壹升，去滓，內地黃汁、蜜、薑汁，微火煎一二沸，壹服叁合，日貳夜叁，利一兩行，中間進食，與藥更進服。

陳氏如神湯亦効([illegible])

右廿料五積散加桃仁煎，亦妙。此藥逐敗血，去風濕。

產後惡露方行，忽然漸少，斷絶不來，腰中重痛，下注兩股，痛如錐刀刺痛入骨中，此由血滯於經絡，不即通之，有大痛處必作癰瘡，宜桃仁湯，恐作癰者，預服五香連翹湯。

桃仁湯方

桃仁(去皮尖) 蘇木 生地黃(各半兩) 虻蟲(去翅足 炒)

水蛭(炒 各卅枚)

右爲粗末，每服叁錢，水壹盞，煎至陸分，去滓溫服，無時。候惡露下即住服。

五香連翹湯方(一方有大黃壹兩)

木香 沉香 丁香 乳香

麝香 升麻 獨活 桑寄生

連翹 木通(各貳兩)

([illegible])

右爲粗散，每服伍錢，水貳盞，煎至壹盞，入竹瀝少許，攪停，去滓溫服。

產後惡露不絶方論第三 凡九方

夫產後惡露不絶者，由產後傷於經血，虛損不足，或分解之時，惡血不盡，在於腹中，而藏腑挾於宿冷，致氣血不調，故令惡露淋瀝不絶也。

廣濟療婦人產後惡血不絶，崩血不可禁，腹中絞痛，氣息急，療蓐中二十六疾

亂髮([illegible]) 阿膠(貳兩) 代赭 乾薑(各叁兩)

馬蹄(壹枚 燒) 乾地黃(肆兩) 牛角䚡([illegible])

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，空心米飲下叁肆拾圓，日兩服。

文仲葛氏療惡露不絕方

右以鋸截桑木取屑五指撮酒服日叁差

療產後泄血不止無禁度及治腹痛胸膈悶

乾薑末酒服方寸匕日叁服

療產後血不止虛羸迨死亦治血氣

蒲黃水貳升煎取捌合頓服

斷弓弦散 療產後亡血過多心腹徹痛然後血下久而不止

亦治赤白帶下年深諸藥不能療者良驗此京師祝景助

教方

貫衆 用不

右用好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷爲細末用米飲調

下貳錢空心食前服

療產後七八日惡露不止

敗醬　當歸　芍藥　續斷

川芎　竹茹　生地黃

右細剉以水貳升煑取捌合空心頓服

治產後虛羸勞冷痛淋露不止或惡物不下方

當歸　白芍藥　甘草　乾薑

桂心　熟地黃　蒲黃　黑豆

右爲細末溫酒調下貳錢食前服米飲亦可似黑神散

治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱不思飲食頭

目昏重五心煩熱面黃體瘦

牡蠣　川芎　熟地黃　白茯苓

龍骨　續斷　當歸　艾葉

人參　五味子　地榆　甘草

右爲末每服貳錢水壹盞中盞生薑叁片棗壹枚煎至陸

分去滓食前服

產後惡露不下方論第四 凡六方

夫惡露不下者由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞絡挾於

宿冷或產後當風取涼風冷乘虛而搏於血血則壅滯不

宣積蓄在內故令惡露不下也

療產後三四日惡露不下嘔逆壯熱

芍藥　知母　生薑　當歸

蒲黃　紅花貳分　荷葉中心蒂　生地黃汁

右細切以水貳升煎至柒合去滓下蒲黃煎四沸分溫

貳服

治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊 出產寶

右以綿紋大黃壹兩杵爲細末用釅醋半升同熬成膏

丸如梧桐子大用醋湯化伍丸至柒丸服之

須臾血下即愈亦治內損惡血不出神效

此藥難用大段虛弱不可服

治產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶

乾荷葉　鬼箭羽　劉寄奴

蒲黃　桃仁

右爲粗末每服叁大錢以童子小便大盞

生地黃分煎至陸分去滓無時熱服

療產後惡露不多下方

川牛膝 大黃（各兩） 牡丹皮 當歸（各）
芍藥 蒲黃 桂心（各）

右為末，以生地黃汁調酒服方寸匕，日二服，血下愈。

生料五積散治產後惡露不快，腹中疼痛，或腹有塊，
及發寒熱，並加醋少許煎，通口服，亦能療血崩。
產後惡露方行，而忽然斷絕，驟作寒熱，臍腹百脈皆痛，如
以錐刺，非常，此由冷熱不調，或思慮動作，氣所擁遏，血蓄
經絡，宜□□□。

當歸 桂心 芍藥 桃仁
沒藥 虻蟲 水蛭

右為末，醋糊元如豌豆大，醋湯下三元。

產後餘血上搶心痛方論第五 凡三方

論曰：夫產後血上搶心者，由產後氣虛挾宿冷，冷搏於血，則凝結不消，氣逆上者則血隨上衝，擊而心痛也。凡產後餘血不盡，得冷則留結，與氣相搏，故痛。若重遇寒，結血乃甚，則變成血瘕，亦令月水不通不調也。

論曰：產後心痛者何？答曰：心者血之主，人有伏宿寒，因產大虛，寒搏於血，血凝不得消散，其氣逆上衝擊於心之絡脈，故心痛。但以大岩蜜湯治之，寒去則血脈溫而經絡通，心痛自止。若誤以為所傷治之，則疑極寒益甚矣。心絡寒甚，傳心之正經，則變為真心痛，朝發夕死，夕發朝死，藥不可輕用如此。

大岩蜜湯方

生乾地黃 當歸 獨活 吳茱萸
芍藥 乾薑 甘草 桂心
小草（各一兩） 細辛（半兩）

右為散，每服半兩，水三盞，煎至一盞，去滓，稍熱服。評曰：產後心痛，雖非產蓐常疾，痛或有九，痛未必便是血痛。設是血痛，大岩蜜湯豈可用熟地黃？熟地黃泥血，安能去痛？此方本出千金，用生乾地黃耳。茱萸壹升，合準伍兩，乾薑參兩，細辛治陳寒在下焦，方本壹兩，卻減半兩，制奇制偶，量病淺深，自有品數，不可妄意加減。然以岩蜜湯治血痛，不若失笑散用之有功。

失笑散治心腹痛欲死，百藥不效，服此頓愈。與第八卷紫金元大同小異。（見本卷新論）

五靈脂 蒲黃（等分）

右為末，先用釅醋調貳錢熬成膏，入水一盞，煎至七分，食前熱服，是驗。

經心錄□□療產後心痛，此大寒所為方

蜀椒（貳合） 芍藥（參兩） 半夏 當歸
桂心 人參 甘草 茯苓（各貳兩）
生薑汁（五合） 蜜（壹升）

右切，以水玖升，煮椒令沸，下諸藥，煮取貳升半，去滓，下薑汁、蜜等，更煎取參升，壹服伍合，至陸合。

產後惡露不盡腹痛方論第六 凡十二方

論曰：產後惡露不盡，腹痛者何？答曰：產後惡血雖常通行，或因外感五邪，內傷七氣，致令斬然而止，餘血停積，壅滯不行，所下不盡，故令腹痛。產寶云：皆因姙娠當風取涼

則胞絡有冷至於産時其血必少或新産時而取風冷時
令風冷搏於血血則壅滯不得宣通蓄積在內有時惡露
不盡故令腹痛

溫隱居澤蘭湯療産後惡露不盡腹痛往來兼滿少氣
澤蘭熬 生乾地黃 當歸各叁分 芍藥
生薑各拾分 甘草陸分 大棗拾肆枚
右細切以水玖升煑取叁升分爲叁服欲死塗身得瘥

救急療惡露不盡腹脹痛
取亂髮如雞子大灰汁洗淨燒爲末酒調服貳錢

又療産後血不盡血痛悶方
取荷葉燒作灰暖水和服煑取汁亦佳

又方
以鐵秤鎚壹枚燒赤投酒伍升中用此酒煑當歸
叁兩取貳升去滓分溫再服千金同一方無當歸

療産後下血不盡腹內堅痛不可忍
當歸 芍藥 桂心各叁 桃仁[illegible]
右細切以水陸升煑取貳升分溫貳服如未差加大黃
叁兩

療産後血結下不盡腹中絞痛不止
大黃別浸 生乾地黃 當歸各分 川芎
芍藥 桂心各分 甘草 黃芩
桃仁[illegible]
右細切以水柒升煑取貳升半下大黃更煎叁沸分溫
叁服

療産後血下不盡腹中痛無計
青木香 當歸 牛膝 川芎
黃耆 芍藥各叁分 大黃 芒硝各貳分
右細切以水柒升煑取貳升入大黃更煎叁沸分叁服

療産後惡露不盡結聚小腹疼痛
當歸 香附子 琥珀 沒藥
青皮 赤芍藥 木香 桂心各等分
右爲細末以豆淋酒調下貳錢

産寶療産後餘血作疼痛兼塊者
桂心 [illegible]等分
右爲細末酒服方寸匕血下盡妙

經效方治産後惡物不盡腹內污痛産後常服甚妙
生乾地黃 當歸 生薑[illegible]
右爲細末炒當酒調[illegible]大錢服

聖惠方治産後血上衝心血刺血暈血氣腰痛惡露不快
初出卷荷 紅花 當歸 蒲黃
牡丹皮
右爲細末每服貳平錢空心溫酒調下 腸內只使童
子小便調如纔産後便服此藥即諸疾不生 出婦人方

寶慶方療産後惡露不下血結不散衝心刺痛將來纔冒
寒路冷其血必往來心腹間刺痛不可忍謂之血母塊
但産後心腹諸疾並宜服之 出産乳
芫荽子 當歸 桂心 赤芍藥各等
右爲細末溫酒調服貳平錢逐下惡物産後叁日不可
無此

產後兒枕心腹刺痛方論第七　凡十八方

夫兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患也若產婦臟虛風冷使血凝滯在於小腹不能流通則令結聚疼痛名曰兒枕也

產寶論產後心腹痛者由產後氣血俱虛遇風寒乘之與血氣相搏隨氣上衝於心或下攻於腹故令心腹痛若久痛不止則變成血瘕也

經效散治產後兒枕腹痛得効　出經驗婦人方

延胡索　當歸各壹兩　真琥珀　蒲黃各壹分炒

赤芍藥半兩　桂心三分　紅藍花貳錢

右為細末以童子小便合細酒溫溫調叁錢食前服

[illegible]治產後兒枕亦治赤白痢 [illegible]

丁香三七粒　罌粟殼[illegible]　香白芷[illegible]　百草霜[illegible]

右為細末每服貳錢童子小便調下如痢疾米飲調下

產後兒枕痛不可忍

五靈脂慢火炒為細末每服貳錢溫酒調下

天仙藤散治產後腹痛不止及一切血氣腹痛　出婦人方

天仙藤炒焦為細末每服貳錢產後腹痛用炒生薑小便和細酒調下常患血氣用溫酒調服効

[illegible]產後腹中有塊上下時動痛發不可忍此由妊娠聚血產後氣虛惡露未盡新血與故血相搏而痛俗謂之兒枕乃血瘕也宜[illegible]散

真蒲黃研飲調服貳錢如燥渴者新水調

[illegible]散療產後血塊痛經脈行後腹疼并經脈不調

熟地黃壹斤　陳生薑半斤

右拌同炒乾為末每服貳錢產前烏梅湯調下常服酒調經脈不通烏梅荊芥酒調下

療新產後腹痛惡血不盡行[illegible]散方見前方

療新產後七八日腹痛兩脇痛

當歸　劉寄奴　苦梗各貳兩　延胡索[illegible]

桂心　陳皮各壹分　茯苓　芍藥各[illegible]

右㕮咀以水貳升煮取捌合調延胡索末空心服

療先患冷氣因產後發腹痛

芎藭　桂心　當歸　吳茱萸

茯苓　芍藥　甘草各[illegible]　桃仁[illegible]分

右㕮咀水柒升煮取貳升去滓分叁服

千金療產後腹痛桃仁芍藥湯 [illegible]

桃仁半升　芍藥　當歸

乾漆研熬　桂心　甘草各貳兩　川芎

右細切以水捌升煮取貳升半去滓分叁服

廣濟療腹中絞痛不可忍

當歸　白芍藥　川芎　乾薑

右等分為末每服貳錢溫酒調下　一方加延胡索妙

必効方療產後腹痛方

羌活[illegible]兩以酒貳升煮取壹升分服

千金治產後餘疾腹中絞痛不下食瘦乏方

當歸　黃耆　芍藥各陸分　乾地黃

白朮各肆分　桂心　甘草各肆分　大棗[illegible]

右㕮咀水貳升煑取捌合去滓空心作兩次服忌生冷
千金茱萸酒治心腹內外痛
吳茱萸壹升 酒叁升煑取壹升空心分貳服
聖惠療同前
生地黃汁 藕汁 童子小便各壹盞
右同煎叁貳沸分溫叁服
沒藥散 治產後腹疼
沒藥壹分 川芎 [illegible]各叁分
右以水壹升小便各壹盞入藥煎至壹盞半分作叁服
通口服約行五十里再進壹服即止不過叁服便安
療血氣痛欲死
[illegible]雞半兩為末酒調煎頻服立愈

[illegible]散 療產後腹痛
當歸為末每服貳錢水壹盞煎至柒分溫服
又局方失笑散 亦治產後腹痛不錄
[illegible] 治產後腹中如刀刺疼痛無聊方
白蜜壹斤 當歸貳兩
右當歸為末入蜜中煎取貳沸稍溫頻服
產後小腹疼痛方論第八 凡六方
夫產後小腹痛者此由產時惡露下少胞絡之間有餘血
與氣相擊搏令小腹痛也因重遇於冷則血結變成血瘕
亦令月水不利也
延胡索散 治產後臍下痛
延胡索 桂心各半兩 當歸壹兩

右為細末熱酒調下貳錢
治產後臍下疼痛不止 [illegible]
川芎 當歸各貳分 桂心半兩
右為細末分為叁服每服酒壹盞煎三五沸更入小便
少許煎至柒分溫服甚者不過再服即差 出博濟
又方
[illegible]各等分 延胡索 劉寄奴 桂心
[illegible]
右等分為末熱酒調下貳錢
[illegible] 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛
不思飲食亦治久有瘀血月水不調黃瘦不思飲食並能
治之亦可療心痛與失笑散同 出產乳

五靈脂 [illegible] 蒲黃 [illegible]
右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末
搜和圓如櫻桃大每服壹元水與童子小便各半盞煎
至柒分令藥化溫服之少頃再壹服惡露即下久有疼
血成塊月信不利者並用酒磨下
產後六七日忽然臍腹痛皆由呼吸之間冷氣乘虛而入
宜服當歸建中湯和四順理中元共研再元作小元飯飲
吞下極妙
產後寒疝方第九 凡三方
王子亨云產後臍腹大痛由呼吸冷氣乘虛入客於血宜局
方當歸建中湯
[illegible] 療虛及產婦腹中痛臍下不能支持兩脅急

痛氣上衝前後相引痛治之如神

精羊肉肆兩　當歸　川芎各　生薑壹兩

右細切以水拾盞煎至叁盞去滓去沫分肆服空心

熱服壹日來日再作兩日淨合為壹日煎當一劑服

千金當歸湯療婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛

其方無川芎有芍藥　陳無擇云仲景羊肉湯治寒疝

右用生薑羊肉湯服之無不驗有一人產當寒月寒氣

入產門臍下脹滿手不得犯此寒疝也醫將治之以抵

當湯謂有瘀血或曰非其治也可服仲景羊肉湯少減

水貳服遂愈

外臺療產後內虛寒氣入腹腹中絞痛下赤白痢譫語見

鬼羊肉湯

肥羊肉壹斤　當歸　甘草　芍藥

右㕮咀以水壹斗先煮羊肉取柒升入藥更煮取貳升

去滓分服

產寶療產後心腹切痛不能飲食之氣忽然往來寒熱

當歸　川芎　黃芩　人參

甘草　芍藥　防風　生薑

大黃　桃仁

右水柒升煮取貳升下大黃更煎叁沸分作叁服

千金羊肉湯無大黃人參桃仁有羊肉煮汁煎藥崔氏同

產後兩脇脹滿氣痛方論第十　凡六方

論曰產後兩脇脹滿疼痛由膀胱宿有停水因產後惡露

下不盡水與血相并氣相搏積在膀胱故令脇肋脹滿氣與

水相激故令痛也

經效療產後血氣脇肋脹痛

當歸　芍藥　苦梗　檳榔

枳殼　桂心　青木香　柴胡

右㕮咀以水貳升煎取捌合去滓空心分溫貳服

又產後惡露不下血氣壅痞腹痛不下食

蘇木　紫葛　芍藥　當歸

桂心　蒲黃　生地黃汁

右㕮咀以水貳升煎取六合下蒲黃分兩服

經驗方治產後腹痛腹脇脹滿

當歸　乾薑

右為末每服叁錢水壹盞煎捌分入鹽醋少許食前熱

服

經效理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥　蒲黃　延胡索　當歸

荷葉蒂

右水貳升煎取柒合後入蒲黃空心分作兩服

廣濟療產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微利

茯苓　人參　當歸　甘草

生薑　陳皮　厚朴

右㕮咀以水貳升煎取捌合去滓分溫服

產後積聚癥瘕方論第十一　凡三方

夫積者陰氣也五藏所生聚者陽氣也六府所成皆由飲

食不節寒熱不調致五藏之氣積六府之氣聚積者痛不

氣其部聚者其痛與有常處所以然者積成於陰陰性沉
伏故痛不離其部聚成於陽陽氣浮動故痛無常處產後
血氣傷於臟腑臟腑虛弱為風冷所乘搏於臟府與血氣
相結故成積聚癥塊也

治產後餘血不散結成癥塊疼痛宜服桃仁散

桃仁　當歸　鬼箭羽　大黃
鱉甲醋炙　赤芍藥　延胡索　琥珀各三分
川芎　桂心各半兩

右為粗末每服三大錢水一盞入生薑三片煎至六分去滓
溫服

治產後積血不散結聚成塊或時寒熱不思飲食京三稜散

京三稜　熟地黃　鱉甲醋炙　桂心
[illegible]
當歸　川芎　牡丹皮　劉寄奴
赤芍藥各半兩　大黃炒　桃仁　牛膝各三分

右為粗末每服三錢水一盞入生薑三片煎至六分去滓
溫服

治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢羸
瘦煩疼不思飲食桂心元

青皮　乳香[illegible]　沒藥　檳榔
當歸　桂心　赤芍藥　牡丹皮各半兩
大黃炒　桃仁　鱉甲　厚朴
三稜　延胡索各一兩

右為細末煉蜜元如梧桐大溫酒下三拾元

產後血瘕方論第十二　凡八方

夫新產後有血與氣相搏而痛者謂之瘕瘕之言假也謂
其痛浮假無定處也此由夙有風冷血氣不治至產血下
則少故致此病也不急治則多成積結妨害月水輕則否
澀重則不通也

治產後惡露不盡結成血瘕下實寒熱心腹脹痛不欲飲
食四肢瘦弱或時口乾當歸元

當歸　木香　赤芍藥各半兩　鱉甲醋炙
大黃炒一兩　牛膝　白朮　水蛭炒
虻蟲各半分　牡丹皮　桂心各三分　鬼箭羽半兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大桃仁湯下二拾元食
前服[illegible]

治產後血氣不調腹中生瘕結而不散生地黃煎元一名
[illegible]

[illegible]治血瘕痛無定處

童便三升　生地黃汁　生藕汁各一升　生薑汁三升

右先煎前三味約三分減二次下薑汁慢火煎如稀餳
每服一合暖酒調下

療血瘕痛臍下脹不下食

當歸八分　桂心　芍藥　[illegible]
蒲黃各八分　延胡索四分

右為細末空心溫酒調服二錢匕

千金療血瘕

生乾地黃一兩　烏賊骨二兩

右為細末空心溫酒調服二錢匕

濟陰紅花散治血瘕血塊及產後穢露不盡兒枕急痛應干
積聚疼痛漸成勞瘦悉皆治之
凌霄花壹分　牡丹皮　山梔子仁　赤芍藥
紫荊草　血竭　沒藥　硇砂
地骨皮　五加皮　甘草各貳錢　紅娘子各壹
桃仁　紅花　桂心　延胡索
當歸各壹兩
右為細末溫酒調壹錢服
葛氏方療腹中瘕痛
桂心為末溫酒調貳錢
產後血瘕腹痛及喉痺熱塞本人呼血瘕名兒枕產後即
起痛不可忍
鐵秤錘燒令通赤淬酒中候溫飲之用斧亦得
治產後血海氣虛腹臟疼痛心胸注悶每遇經脈行或多
或少及有瘀積者蓬莪茂散出博濟
蓬莪茂　桃仁去皮尖麩炒　大黃炒　當歸各壹兩
桂心　川芎　木香　牡丹皮
延胡索炒　赤芍藥各半兩
右為細末溫酒調壹錢空心臨卧服
產後餘血奔心煩悶方論第十三
論曰餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便并擀心下
及卧太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不瘥
療產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛
川芎　生乾地黃　枳殼　芍藥各等分

右為末酒服方寸匕日貳服
廣濟療血氣煩悶方
生藕汁飲貳升甚效　竹瀝亦得千金同
集驗療產後血氣煩方千金同
生地黃汁　清酒各壹升
右相和煎壹沸分為兩服
療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶
荷葉炒　延胡索壹兩　地黃汁貳合
右水煎壹升煮貳味取捌合下延胡索空心分三服忌肉食
壹日
療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕
羊血壹盞頓服如不定更服立效
經效療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹滿
當歸　桂心　川芎　吳茱萸
橘皮　生薑各壹兩　芍藥各貳兩
右㕮咀以水叁升煮取壹升去滓空心服
治產後餘血奔心
右用陳白梅捶碎濃煎湯喫
治產後惡血衝心時發躁[illegible]出博濟
延胡索　蒲黃各半兩　桂心壹分
右為細末烏梅煎湯冷調下壹錢
治產後心胸煩躁惡血不快沒藥丸出博濟
沒藥研　蠻薑　延胡索　乾漆炒
當歸　桂心　牛膝　牡丹皮

乾地黃壹分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大煎麥門冬湯下拾元至拾伍元

產後虛煩方第十四　凡七方

薤白湯治產後胃中煩熱逆氣方

薤白　半夏　甘草　人參各貳兩

栝蔞根參兩　麥門冬半升

右陸味㕮咀以水壹斗煮取肆升去滓分伍服日參夜貳熱甚即加知母壹兩

竹根湯治產後虛煩方

淡竹根細切壹斗伍升水貳斗煮取柒升去滓內小麥貳升大棗貳拾枚復煮麥熟參肆沸內甘草壹兩麥門冬壹升湯成去滓服伍合不差更服取差短氣亦服之

人參當歸湯治產後煩悶不安方

人參　當歸　麥門冬　桂心

乾地黃各壹兩　大棗貳拾枚　粳米壹升　淡竹葉參升

芍藥肆兩

右玖味㕮咀以水壹斗貳升先煮竹葉及米取捌升去滓內藥煮取參升去滓分參服若煩悶不安者當取豉壹升以水參升煮取壹升盡服之甚良

甘竹茹湯治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹壹升　人參　茯苓　甘草各壹兩

黃芩參兩

右伍味㕮咀以水陸升煮取貳升去滓分參服日參

千金療婦人產後短氣欲絕心中煩悶不解必效方

竹葉切　麥門冬　小麥各壹升　甘草壹兩

生薑貳兩　大棗拾貳枚

右陸味細切以水壹斗煮竹葉小麥取捌升去滓內餘藥煮取參升去滓溫服若虛悸加人參貳兩少氣力加粳米伍合

壹方用竹皮若胃中氣逆加半夏貳兩忌如常法

赤小豆散治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆參拾枚燒作末以冷水和頓服之

治產後煩悶蒲黃散

蒲黃以東流水和服方寸匕極良

常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知產後與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死

產後口乾痞悶方論第一

論曰產後口乾痞悶者何荅曰產後榮衛大虛血氣未定食麪太早胃不能消化麪毒結聚於胃脘上熏胸中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胸膈壅滯以藥下之萬不得一但服見睍圓則愈

見睍元方

薑黃　三稜　蓽澄茄　陳皮

良薑　人參　莪茂等分

右為細末用蘿蔔慢火煮爛研細將汁煮麪糊元如梧桐子大用蘿蔔湯下三拾元

評曰產後口乾痞悶未必只因食麪或產母內積憂煩外傷燥熱飲食甘辛使口乾痞悶當隨其所因調之可也煩心宜四物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱看屬何經當隨經為治難以備舉飲食所傷見睍元却能作効

四物湯 方見本卷第二論

產後血渴方第二

產寶療產後大渴不止

蘆根切壹升　栝樓　人參　甘草

茯苓各參兩　大棗貳拾枚　麥門冬生肆兩

右以水玖升煮取參升分參服頻服四劑即差忌菜

楊氏家藏方黃芩散治產後血渴飲水不止

黃芩　麥門冬等分

右㕮咀每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓溫服無時

集驗療產後血渴栝樓根湯

栝樓根肆兩　麥門冬　人參各參兩　生乾地黃

甘草各貳兩　土瓜根伍兩　大棗貳拾枚

右㕮咀以水捌升煮取貳升半分參服[illegible]

千金療產後虛渴少氣力竹葉湯

竹葉參升　甘草　人參　茯苓各壹兩

小麥伍合　生薑　半夏各參兩　麥門冬伍兩

大棗拾伍枚

右㕮咀以水玖升先煮竹葉小麥生薑大棗取柒升去滓內藥再煎取貳升去滓每服伍合日參夜貳

博濟療產後血渴不止延胡索散

延胡索　蒲黃　乾葛　桂心

青皮　枳殼麸炒等分

右並以好醋浸一宿焙乾杵為細末每服壹錢冷橘皮湯調下不過參服差

產後乍寒乍熱方論第三 產後乍寒乍熱凡九方

論曰產後乍寒乍熱者何荅曰陰陽不和敗血不散能令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作瘧疾治之則誤矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減

增損四物湯方
人參　當歸　芍藥　川芎
乾薑各壹兩　甘草肆錢重
右㕮咀每服肆錢水壹盞薑叁片煎至柒分去滓熱
服無時候
評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散
豈止脾肺二藏耶大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝
故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒
閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再會而復作大
調經散五積散入醋煎佳
大調經散治産後血虛惡露未消氣爲敗濁凝滯榮衛
諸陰陽相乘憎寒發熱或自汗或腫滿皆氣血未平之
爲也
大豆炒去皮半兩　茯神壹兩　眞琥珀壹錢重
右爲細末濃煎烏豆紫蘇湯調下
五積散　方見局方
産頽大廢産後惡寒壯熱遍夜叁伍度發惡語口中生瘡時
時乾嘔困乏悶絕
人參　獨活　白鮮皮　葛根
防風　青竹茹　遠志各陸分　茯神捌分
白斂拾分　玄參拾貳分　竹瀝貳合半
右銀壹斤水壹斗伍升煎取柒升下諸藥重煎取叁升
分溫叁服忌魚酒麪等物
産後乍寒乍熱心痛月候不來如何答曰敗血充心痛遂

臍腹面色無光纖然得或暫時發痊不過三兩日又發服
局方黑神散大効
知母湯治産後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶方
知母叁兩　芍藥　黃芩各貳兩　桂心
甘草各壹兩
右伍味㕮咀以水伍升煮取貳升半分叁服壹方不用
桂心加生地黃
産後方論附
評曰郭稽中云産後乍寒乍熱者多是敗血爲害或陰陽
不和所作若作瘧疾治之誤矣如陳無擇評曰只可云敗
血循經流入閉諸陽則熱閉　諸陰則寒血氣與
衛氣解則休亦未盡也亦有産後而瘧而作寒熱有一
一發或一日二三發或間日一發或三兩日一發或先寒
後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或但寒但熱
者亦有産前病瘧而産後未愈者最難用藥安常此
信耐等斷不可片今有經效草果飲子生熟飲子常用之
有效更備檢閱如易簡方以數飲亦可用男六陽方續
治婦人産後瘧疾寒熱相半者或多熱者宜草果飲子
半夏湯洗　赤茯苓　甘草炙　草果煨去皮
川芎　陳皮　白芷各貳錢　青皮去白
良薑　紫蘇各壹錢　乾葛肆錢
右㕮咀每服叁錢重水壹大盞薑叁片棗貳枚同煎至
柒分去滓當發日侵早連進叁服無有不安
生熟飲子治産後瘧疾多寒者

肉豆蔻　薏苡仁　厚朴（薑汁製）　半夏

陳皮　甘草　大棗（去核）　生薑

右八味等分細剉和勻，並半生壹半用濕皮紙裹煨令香熟，去紙與壹半生者和勻，每服秤伍錢重，水貳盞煎至柒分，食前溫服，食後壹服

産後蓐勞方論第四

夫産後蓐勞者，此由生産日淺，血氣虛弱，飲食未平復，不滿日月，氣血虛羸，將養失所，而風冷客之，風冷搏於血氣，則不能溫於肌膚，使人虛乏勞倦，乍卧乍起，顔容憔悴，食飲不消，風冷邪氣而感於肺，肺受微寒，故咳嗽口乾，遂覺頭昏，百節疼痛，榮衛受於風邪，流注臟府，須臾頻發，時有盜汗，寒熱如瘧，背膊煩悶，四肢不舉，沉重著床，此則蓐勞之候也

又論曰：婦人因産理不順，疲極筋力，憂勞心慮，致令虛羸喘乏，寒熱如瘧，頭痛自汗，肢體倦怠，咳嗽痰逆，腹中絞刺，名曰蓐勞

石子湯 療産後虛羸喘乏，乍寒乍熱，如瘧，四肢疼痛，面色痿黃，名爲蓐勞

猪腎（壹雙，去脂膜，四破）　香豉（[illegible]）

葱白　粳米　當歸　芍藥（各貳兩）

右㕮咀，分爲兩劑，用水叁升，煮取壹升，去滓，分叁服

廣濟方無芍藥，有人參

許仁則療産後日淺，久坐視聽言語多，或運用氣力，遂覺頭腰肢節皮肉痛，乍寒乍熱，此爲蓐勞

猪腎（壹雙，去脂膜，四破）　當歸　芍藥

生薑（各貳兩）　葱白（切）　桂心（各壹兩）

右以水八升，煮腎取陸升，下藥，煎取貳升，分溫爲貳服

胡氏方 人參鱉甲散 治婦人産後蓐勞，皆由在産內未滿百日，體中虛損，血氣尚弱，失於將理，或勞動作傷，致成蓐勞，其狀虛羸，乍起乍卧，飲食不消，時有咳嗽，頭目昏痛，發歇無常，夜有盜汗，寒熱如瘧，背膊拘急，沉困在床，服此蠲

人參　桂心　當歸　桑寄生

白茯苓　白芍藥　桃仁　熟地黃

甘草　麥門冬（各半兩）　續斷（壹分）　牛膝（叁分）

鱉甲（炙）　黃耆（各壹兩）

右爲細末，每服先以猪腎壹對，去筋膜，以水兩大盞，生薑半分，棗叁枚，煎至壹盞，去猪腎、薑、棗，然後入藥末貳錢，入葱叁寸，烏梅壹箇，荊芥伍穗，煎至柒分，去滓，空心晚食前溫服，此藥神妙

老孫太保 [illegible] 療産後虛羸發寒熱，飲食少，腹脹方（[illegible]）

北柴胡　人參　甘草　半夏

陳皮　川芎　白芍藥（各等分）

右㕮咀，每服叁錢，水壹大盞，薑伍片，棗貳枚，煎至柒分，去滓，食後溫服，日貳服

治産後蓐勞，皆由體虛氣力未復，勞動所致，四肢煩疼，時發寒熱，不思飲食 熟乾地黃散

熟乾地黃　人參　白芍藥　白茯苓

白朮各壹兩 續斷 黃耆 桂心
五味子 當歸 麥門冬 川芎各叁分
右㕮咀每服肆錢水壹大盞薑叁片棗叁枚煎至柒分
去滓溫服無時
治產後蓐勞蓋緣生産日淺久坐多語運動用力遂致頭
目四肢疼痛寒熱如瘧狀宜服白茯苓散
白茯苓壹兩 當歸 川芎 桂心
白芍藥 黃耆 人參各半兩 熟乾地黃壹兩
右㕮咀先以水貳大盞入豬腎壹雙去脂膜細切以生薑
半分棗叁枚煎取壹盞去腎薑棗入藥半兩煎取柒分
去滓食前分溫貳服
治產後蓐勞寒熱進退頭目眩痛百骨節痠疼氣力羸乏

黃耆圓
黃耆 鱉甲 當歸剉微炒 桂心
續斷 白芍藥 川芎 牛膝
蓯蓉 沉香 柏子仁 枳殼各叁分
北五味 熟乾地黃各壹兩
右為細末煉蜜元如梧桐子大食後粥飲吞下肆拾元
療産後大虛心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益方
黃耆 白朮 當歸 甘草
人參各貳兩 生薑肆兩
右先以白羊肉叁斤去脂以水壹斗玖升煮肉取汁伍
升後下諸藥更煎取叁升分溫叁服
療産後虛羸喘乏氣急腹內絞痛自汗出

黃耆 人參 茯苓 甘草
白朮 五味子 當歸各壹兩貳分
澤蘭葉 陳皮各叁分 麥門冬 訶子炮去核
桂心 熟乾地黃各壹兩貳分
右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下叁肆拾元
日再服
濟生牡丹散 治婦人產後虛羸發熱自汗欲變蓐勞或血
氣所搏及經候不調及發寒熱自汗羸瘦並宜服之
白芍藥 當歸 五加皮 地骨皮
人參各半兩 沒藥 桂心各貳錢 牡丹皮叁錢
右為細末每服貳錢水酒各半盞如不飲酒只用水壹
盞開通錢壹文麻油蘸之同煎柒分去滓通口服煎不
得攪動不得吹
治產後蓐勞頭疼肢體疼痛面無顏色或增寒壯熱四肢疼
心煩頭痛 人參鱉甲散
黃耆 鱉甲醋炙各壹兩 桂心 當歸炒
桑寄生 白茯苓 白芍藥 人參
熟地黃 麥門冬去心 甘草炙各半兩 牛膝叁分
右為細末每服用豬腎子壹對去脂膜先以水壹盞入
薑半分棗叁枚煎至柒分去滓下腎子切下藥伍錢更
煎至肆分去滓空心晚食前溫服貳滓併煎

產後虛羸方論第五
產寶論曰產後虛羸者因產傷損臟腑勞役氣血輕者將
養滿日即差重者日月雖滿氣血猶不調和故患虛羸也

夫產後氣血虛竭，臟腑勞傷，若人年齒少盛，能節慎將養，
滿月便得平復。如產後多因血氣虛弱，雖逾日月，猶常疲
乏。或因飲食不節，調適失宜，為風冷邪氣所侵，搏於氣血，
流注於五臟六腑，則令肌膚不榮，頭目昏疼，故曰虛羸。

治產後虛羸，脾胃乏弱，四肢無力，全不思飲食，心腹脹滿。

人參散

黃耆　人參　草菓仁　厚朴

附子各壹兩　白朮　當歸　白茯苓

木香　川芎　桂心　甘草各半兩

陳皮　良薑　訶梨勒皮各叁分

右㕮咀，每服肆錢，水壹盞半，生薑叁片，棗壹枚，煎至陸分，去
滓，無時溫服。

治產後虛羸，短氣，不能食。**熟乾地黃湯**

熟乾地黃　人參　北五味子　石斛

白茯苓　白朮　鹿角膠　附子各壹兩

桂心　當歸　川芎　澤蘭葉

黃耆　續斷各叁分

右㕮咀，每服肆錢，薑棗依前煎服。

治婦人虛勞，或本來虛寒，或產後血脈虛竭，四肢羸
弱，飲食減少，血脈斷絕，血脈不通，虛實依源。**澤蘭元**

澤蘭葉玖分　石膏貳兩　川芎　甘草

當歸各柒分　白芷　防風　白朮

藁本　川椒　厚朴　乾薑

桂心　細辛各伍分

右為細末，煉蜜元如梧桐子大，溫酒下貳叁拾元，日再服。忌
海藻菘菜桃李生葱雀肉。

治產後虛羸，乏力短氣。**羊腎湯**

羊腎壹對去脂膜　麥門冬　羚羊角屑　北五味子

茯神　桂心　續斷　黃耆

川芎　當歸各半兩　人參　附子炮

乾薑各叁分　熟乾地黃壹兩

右㕮咀，先以水貳大盞煮腎至壹盞，去腎，入藥伍錢，棗
貳枚，薑叁片，煎至伍分，去滓，空心溫服。

治產後虛羸，乏弱無力，喘急汗出，腹中疞痛。**羊肉當歸湯**

肥羊肉壹斤　當歸　白芍藥　桂心

附子炮　川芎　黃耆　人參

白朮各壹兩　熟地黃壹兩

龍骨

右為粗末，先以水伍大升煮羊肉，取汁貳升，入每服肆
錢，汁壹中盞，薑叁片，棗壹枚，煎至柒分，去滓溫服。

治產後虛羸，腹痛，冒悶。**[illegible]**

小黃雌雞壹隻去腸肚　黃耆各半兩　當歸　白朮

熟地黃　桂心

右㕮咀，先以水柒升煮雞至叁升，每服肆錢，以雞汁
壹盞，煎至陸分，去滓溫服，日叁。

產寶療產後經血虛損，羸弱過後，身虛無力。

澤蘭葉　細辛　熟乾地黃各伍分

黃耆　當歸　防風　麥門冬

石膏　藁本　白芷　川芎

栢子仁　五味子　甘草各壹分　桂心半分

右爲細末煉蜜元如梧桐子大空心温酒下叁肆拾元

救急療産後羸乏不復令肥白方

大烏豆淨揀蒸熟如造豆黄法去皮擣爲末以臘月豬脂成煉者和元如梧桐子大酒下伍拾元日再服壹月内肥白充盛無所忌

婦人方當歸散治産後補虛益血

當歸　羌活各壹兩　延胡索半兩

右爲細末用豬腰子壹隻切作片以水壹盞入藥末貳錢同煎至柒分同腰子喫

栟手散治産後血虛勞倦盜汗多困少力交接有效

當歸　川芎　黄耆各壹兩　北柴胡　前胡各壹分

右㕮咀每服叁錢水壹大盞桃柳枝各叁寸棗子烏梅各壹枚薑叁片煎至陸分去滓温服如有痰去烏梅

許仁則療産後雖無疾狀但覺虛弱兼心腹痛欲得補氣方當歸羊肉湯

肥羊肉壹斤去脂膜　當歸伍兩　黄耆肆兩

生薑陸兩

右以肉汁煮叁味取貳升伍合分爲肆服若覺惡露下不盡加桂心叁兩惡露下多覺有風加芎藭叁兩有冷加茱萸壹兩有氣加細辛貳兩有熱加生地黄汁貳合

療産後雖無餘苦但覺氣虛

當歸拾貳分　乾地黄拾分　澤蘭葉肆分　地骨皮

芍藥各柒分　黄耆　防風　續斷各肆分

人參　桂心各伍分

右爲細末煉蜜元如梧桐子大温酒吞下貳拾元

療産後虛羸

黄雌雞壹隻去毛背上破　生百合淨洗擇壹升　粳米半升

右依常法著五味調和縫背合五味汁煮令熟開腹取百合并飯和汁作羹食之肉亦食令盡一兩頓卧佳

産寶療産後虛乏不思飲食四肢皆倦心腹陰痛補虛益氣

人參　芍藥　桂心　甘草

生薑各壹兩　當歸壹兩半　生地黄貳兩

右㕮咀每服叁錢水兩盞棗貳枚煎至壹盞去滓温服日叁服

古今録驗療産後諸疾羸瘦欲令肥白飲食和調地黄羊脂煎方

生地黄汁壹斗　生薑汁伍升　羊脂貳斤　白蜜伍升

右肆味先煎地黄汁令餘伍升下羊脂煎減半次下薑汁次下蜜使以銅器盛著湯中煎令如飴狀空肚酒壹升取煎如雞子大投酒中飲日叁服

産後風虛勞冷方論第六

夫産則血氣勞傷藏府虛弱而風冷客之冷搏於血氣血氣不能温於肌膚使人虛乏疲頓致羸損不平復若久不平復若久不瘥風冷入於子藏則胞藏冷亦使無子謂之風虛勞損也

治産後風虛勞損羸瘦不思飲食四肢疼痛[illegible]

黃耆　白朮　木香　羚羊角屑
人參　當歸　桂心　川芎
白芍藥　白茯苓炮　附子　甘草各壹分
右㕮咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗壹枚同煎至柒分去
滓溫服無時
治產後風虛勞損氣攻心腹四肢疼痛不思飲食木香散
木香　人參　陳皮　白茯苓
白芍藥　黃耆　川芎各叁分　熟乾地黃
當歸　附子各壹兩　甘草壹分　桂心
白朮各半兩
右㕮咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗壹枚煎至柒分去滓溫服
治產後風虛勞損羸瘦四肢無力不思飲食人參散
人參　黃耆　熟地黃各壹兩　羚羊角屑叁分
桂心　川芎　防風　當歸
北五味子　白茯苓　白朮各半兩　甘草壹分
右為粗末每服叁錢先用水貳大盞猪腎壹隻切去
脂膜薑棗同煎至壹盞去猪腎入藥煎至柒分去滓空
心溫服
療產後風虛勞損四肢疼痛心神虛煩不飲食枸杞子元
枸杞子　牛膝　白茯苓　人參
黃耆各壹兩　當歸　漏蘆　防風
桂心　酸棗仁　羚羊角屑　羌活
五加皮　白朮　川芎各叁分　熟乾地黃貳兩
甘草半兩　麥門冬壹兩半

右為細末煉蜜元如梧桐子大溫酒下叁拾元則若添
亦可
治產後風虛勞損腹痛冷氣脚膝無力面色萎黃飲食減
少日漸羸瘦補益白薇元
木香　當歸　桂心　澤蘭葉
牛膝　白薇　牡丹皮　枳殼
人參　川芎　厚朴　白朮
續斷　熟地黃　北細辛　赤石脂
龍骨　禹餘粮　黃耆各壹兩　白茯苓
附子各叁分　吳茱萸壹分
右為細末煉蜜為元如梧桐子大食前溫酒下叁拾元
產寶療產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉
黃耆　當歸　芍藥　人參各貳兩
桂心　甘草　川芎　生薑各叁分
大棗拾貳箇
右水柒升煮取叁升分溫叁服
療產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出
當歸　人參　生薑各貳兩　黃耆各叁兩
淡豉伍合　猪腎壹隻　粳米叁合　葱白各叁合
右水壹㪷伍升先煮猪腎取陸升後下諸藥煎至貳升
分為叁服
又方　從賢嘗此方入葱豉作臛如常食之
延年澤蘭元主產後風虛損瘦不能食令肥悅方
澤蘭葉叁分　當歸　甘草各柒分　厚朴

藁本　食茱萸　蕪荑　白芷
乾薑　芍藥各叁分　石膏捌分　人參
栢子仁　桂心各肆分　白朮伍分
右爲細末煉蜜元如梧桐子大酒服拾伍元至貳拾伍
元日貳服忌生冷粘滑猪牛肉麪生葱桃李雀肉海藻
菘菜

古今錄驗[illegible]元　産後風虛勞損羸弱宜服此效方
澤蘭葉陸分　白芷　川椒　蕪荑仁
藁本　北細辛各肆分　人參　白朮
栢子仁　防風　桂心　厚朴
丹參各伍分　川芎　當歸　甘草各[illegible]分
乾地黃拾分
[illegible]
右爲細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下貳拾元至
叁拾元日貳服忌如前

療濟衆産後患風虛冷氣腹內不調補益肥白悅澤方
澤蘭柒分　厚朴　人參　石斛
蕪荑仁　續斷　防風　桂心各叁分
川芎　白朮　栢子仁　北五味子
黃耆　遠志各肆分　赤石脂　甘草
乾地黃各陸分
右爲細末煉蜜元如梧桐子大酒下貳拾元至叁拾元
日貳服忌如前

延年[illegible]元　主産後風虛勞損黃瘦方
澤蘭捌分　防風　乾地黃　當歸
北細辛　桂心　茯苓　芍藥
人參　甘草　藁本　烏頭炮
麥門冬　石斛　紫菀　川芎各伍分
乾薑　栢子仁　蕪荑仁　厚朴
川椒各肆分　白朮　黃耆各陸分　紫石英
石膏各捌分
右爲細末煉蜜元如梧桐子大酒下貳拾元至叁拾元

産後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七

論曰産後腹脹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血散於脾胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服抵聖湯則愈

抵聖湯方
赤芍藥　半夏　澤蘭葉　人參
陳皮各壹分　甘草[illegible]
右㕮咀每服壹劑用水壹碗生薑焙乾半兩煎至半碗
去滓分叁服

産後嘔逆不食方論第八

夫胃爲水穀之海水穀之精以爲血氣榮潤臟腑因産則臟腑傷動有時而氣獨盛若則氣乘腸胃腸胃燥澀其氣則逆故嘔逆不下食也

治産後脾胃氣寒心胸滿悶吐逆四肢少力不納飲食
[illegible]散
丁香　人參　檳榔　白朮

桂心　當歸　厚朴　前胡各叁分
甘草半兩　良薑壹兩
右為粗末，每服肆錢，水壹盞，薑叁片，煎至柒分，去滓，溫服，空心。
治產後胃氣不和，嘔吐不止，全不納食，宜服【開胃散】
訶子肉壹兩半　人參壹兩　甘草半兩
右叁味為細末，別以半夏半分、生薑壹分、薤白貳柒莖，水壹大盞，煎至陸分，去滓，分為兩服。
療產後嘔逆不止 錄和劑方
橘紅壹兩　半夏麴　甘草各半兩　藿香叁兩
右為細末，每服貳錢，水壹盞半，薑叁片，煎至陸分，溫服，無時。
治產後更無他疾，但多嘔逆，不能食
白朮伍分　生薑陸分
右細切，以水各貳升，煎取壹升，分叁服。
產後霍亂方論第九
夫產後霍亂，氣血俱傷，臟腑虛損，或飲食不消，觸冒風冷所致。陰陽不順，清濁相干，氣亂於腸胃之間，真邪相搏，冷熱不調，上吐下利，故曰霍亂也。經云：渴而飲水者，五苓散；寒多不飲水者，理中元。夫暴虛冷者，加附子，來復丹亦妙。見蜀方
【白朮散】治產後霍亂，吐利腹痛，煩渴，手足逆冷
白朮　橘紅　麥門冬　人參
乾薑各壹兩　甘草半兩
右為粗末，每服肆錢，生薑伍片，水壹盞，煎至柒分，去滓，溫服。
療產後霍亂，吐利不止，手足逆冷【附子散】
附子　白朮　當歸　吳茱萸
桂心　人參　丁香　橘紅
甘草各半兩
右為細末，粥飲調下貳錢，無時候。
治產後霍亂吐瀉不止【溫中散】
人參　白朮　當歸　草豆蔻仁
乾薑各壹兩　厚朴貳兩
右為粗末，每服叁錢，水煎服。
治產後霍亂吐利，腹中㽲痛【[illegible]散】
良薑　當歸　草豆蔻仁
右等分為細末，每服貳錢，粥飲調下。
【[illegible]散】【胡椒湯】亦妙 方見第七卷第二論

産後傷寒方論第一

凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等疾證多是血虛或敗血作梗血虛者陰虛也陰虛者陽必湊之故發熱且以平和之劑與服必效如玉露散方見十卷第十六論或四物湯以生地黃易熟地黃加北柴胡等分煎服或人參當歸散秦艽鱉甲散人參輕骨散人參百解散竹葉湯皆可選用若發熱與閒繇見產後發熱不退便以爲熱入血室便以小柴胡湯竟不可救者亦有用竹葉石膏湯而死者亦有見前失而投以溫劑且熱愈熾者諸如此等非不知罪福皆是不觀古典杜撰妄度枉傷人命殊不知此等疾狀是產後去血過多而虛發熱亦有夾痙生熱但以上件之藥以脈證選用無不獲安若是陰陽不和乍寒乍熱宜增損四物湯如敗血不散者宜奪命丹大調經散五積散加醋煎 評證詳見二十卷第二論

千金翼云婦人新產去血過多津液燥少既陰陽俱虛如中風傷寒時氣之類雖當發汗如麻黃證不可用取汗毋令過多以意斟酌

大人觸冒寒氣而爲病者謂之傷寒產婦血氣俱虛日月未滿而起早勞動爲寒所傷則淅淅惡寒翕翕發熱頭項肩背骨節皆痛至七八日乃瘥也

婦人產後亡血汗多故令鬱冒其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以爲產婦喜汗出者亡陰血陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也方可用小柴胡湯加生乾地黃主之秦艽鱉甲散人參輕骨散神仙百解散並見和劑局方

人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱內熱曰煩其證心胸煩悶吸吸短氣頭痛悶亂骨節疼痛晡時輒甚與大病虛煩相類急宜治之

人參　當歸　生乾地黃　桂心

麥門冬去心各壹兩　白芍藥貳兩

右㕮咀每服肆大錢水貳盞先將粳米壹合淡竹葉十片煎至壹盞去米竹葉入藥并棗貳枚煎至柒分去滓溫服虛甚者用熟地黃

治婦人草蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼與小柴胡湯若頭不疼但煩者三物黃芩湯

黃芩半兩　苦參壹兩　生乾地黃貳兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓溫服

治婦人產後虛羸發寒熱飲食少腹脹等疾宜柴胡湯

柴胡叁錢　人參　芍藥　半夏炮

甘草　橘紅　川芎各叁分

右㕮咀每服四錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒分去滓溫服

治婦人產後傷風發熱面赤喘而頭痛宜服竹葉防風湯

淡竹葉半把　防風　人參　桂枝

苦梗　甘草各半兩　葛根壹兩半

右㕮咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒分去

淳溫服使汗出頸項強用附子炮去皮剉如豆大抄壹錢同煎嘔者加半夏煎服

治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出宜**陽旦湯**

桂枝　芍藥各叁兩　甘草炙　黃芩各貳兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒分去滓溫服無時候自汗者去桂加附子一枚渴者去桂加栝樓根叁兩下痢者去芍藥加乾薑叁兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時入膠飴為佳若脉浮緊無汗發熱者莫與也

治產後惡露方下忽爾斷絕晝日明了暮則譫語寒熱往來如見鬼狀此由熱入血室不即治之譫妄不則宜服柴胡地黃湯 方見第八卷第十六論中 **四物湯**加北柴胡

千金**芍藥湯** 療產後虛熱頭痛身體發熱兼治腹內拘急疼痛

桂心叁兩　牡蠣　白芍藥各伍兩

黃芩 [illegible]　乾地黃伍兩

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓溫服

產後虛熱往來心胸煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱日晡加甚又如瘧狀 **千金蜀漆湯**

黃耆伍兩　生地黃壹斤　蜀漆葉　桂心

甘草　黃芩各壹兩　知母　芍藥各貳兩

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓溫服

產後頭痛方論第二九　方

夫人頭者諸陽之會也凡產後五藏皆虛胃氣虧弱飲食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上湊於頭陽實陰虛則令頭痛也又有產後敗血頭痛不可不知黑龍丹言之甚詳

川芎散 治產後頭痛

真天台烏藥皮　大川芎各等分

右為細末每服叁錢秤錘燒紅淬酒調服

芎附散 治產後敗血作梗頭痛諸藥不效者 徐明仲先生傳

大附子壹枚釅醋壹碗用火四畔炙透蘸醋令盡去皮臍　川芎壹兩並為細末每服貳錢茶清調下

一奇散 治產後頭疼

取當歸川芎為細末每服貳錢水壹盞煎至柒分溫服

產後咳嗽方論第二九　四方

夫肺者主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也○若產後喫鹽太早而咳嗽者難治

產後血氣不通咳嗽者何答曰產後咳嗽多因食熱麪壅納或熱病或有氣塊發時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛肢体無力宜服局方黃黑神散五積散加棗煎服

二母散 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服此藥如傷風痰嗽却以尋常傷風藥主治

知母　貝母　白茯苓　人參各半兩

桃仁　杏仁並去皮尖炒各[illegible]分

右為細末每服叁錢水壹盞半煎至八分無時溫服如
嘔腹痛仍服之（又有神效）

集驗療產後吐風傷寒咳嗽多痰唾粘（產寶方）

甘草　苦梗各陸分　款冬花四分　生麥門冬

生地黃（陸分）　葱白（壹握）　豉（貳合）

右㕮咀每貳升煮取八合去滓食後分貳服

經効療咳嗽多痰唾粘氣急

前胡　五味子　紫菀　貝母各陸分

桑白皮　茯苓各八分　淡竹葉貳拾片

右㕮咀水貳升煎取八合去滓食後分兩服

療產後咳嗽氣喘

百部根　苦梗各陸分　桑白皮（貳分）　乾百合

赤茯苓（各分）

右㕮咀水貳升煮取柒合去滓食後分兩服

產後喉中氣急喘促方論第四（凡四方）

論曰產後喉中氣急喘促者何荅曰榮者血也衛者氣也榮行脈中衛行脈外相隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡露不快敗血停凝上熏於肺亦令喘急但服奪命丹（方見胞衣不下論中）血去喘自定

評曰產後喘急固可畏若是敗血上熏於肺猶可責効奪命丹若感風寒或因憂怒飲食鹹冷等奪命丹未可均濟況孤陽絕陰乎若榮血暴絕宜大料煮芎藭湯亦自可救傷風寒宜旋覆花湯性理鬱發宜小調經散用

桑白皮杏仁煎湯調下傷食宜服見現元（又五積散）

芎藭湯（方見第貳卷第伍論）（又名佛手散）

旋覆花湯 治產後傷風感寒暑濕咳嗽喘滿痰涎壅盛坐臥不寧

旋覆花　赤芍藥　前胡　半夏麯

荊芥穗　甘草　茯苓　五味子

杏仁　麻黃各等分

右㕮咀每服四錢水壹盞半姜伍片棗壹枚煎至柒分去滓食前溫服（有汗者不用麻黃）

小調經散（方見）　五積散（方見）　見現元（方見）

參蘇飲 治婦人產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參壹兩（別為末）　蘇木貳兩

右以水兩碗煮取壹碗以下去滓調參末隨時加減服神效不可言

產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五（凡二方）

論曰產後口鼻黑氣起及鼻衄者何荅曰陽明者經脈之海起於鼻交頞中還出頰口交人中左之右右之左產後氣消血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑起及變鼻衄此緣產後虛熱變生此證其疾不可治名胃絕肺敗此證不可治故不出方

經驗方云遇有此疾急取緋線一條并產婦頂心髮兩條緊繫中指節上即止無藥可療亦厭禳之一端也

海上方治產後鼻衄以荊芥為末童子小便調下貳錢匕

產後咳嗽方論第六 凡六方

夫肺主於氣五臟六腑俱稟於氣產後則氣血傷臟腑皆損而風冷搏於氣氣則逆上而又脾虛聚冷胃中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣嗽而不順則咳嗽也脾者主中焦為三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰陽不和使榮衛氣厥逆則致生斯病也經云咳嗽者胃與所生脈樂無汋者灸期門二壯必愈期門穴乃胃之大絡穴見第十五卷中

丁香散 治產後心煩咳噫不止

丁香 白豆蔻仁各半兩 伏龍肝一兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散 治氣咳噫又治吐逆心怔目暈不思飲食出經驗方

石蓮肉炒兩 白茯苓一兩 丁香半兩

右為細末每服二錢米飲調下無時候

產寶療產後咳逆三日不止欲死

桂心半兩 姜汁三合

右同煎取二合以火先炙手摩令背熱時塗藥汁盡妙

產後咳逆方

乾柿一个

右切碎以水一盞煎至六分熱呷

又方 古壁鏡窠三兩个水一小盞煎至一半熱服

羌活散 治咳逆

羌活 附子炮 茴香炒各半兩 木香

白姜炮各一分

右五味為末每服二錢水一盞鹽一捻煎一二十沸熱服一服止

產後血崩方論第七 凡八方

論曰產後血崩者何答曰產卧傷耗經脉未得平復而勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷蠹榮衛氣血衰弱亦多崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服固經元以止之

固經元 方

艾葉 赤石脂煅 補骨脂 木賊各半兩

附子一个炮

右為末陳米飲和丸如梧桐子大食前溫酒下二十丸米飲亦可許仁則云血崩不是輕病況產後有此是謂重傷恐不止職緣不節而能致之多因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血不消鬱滯作堅亦成崩中固經元自難責効不若大料煮芎藭加芍藥候定續次隨證諸藥治之為得

芎藭湯 加芍藥方

芎藭 當歸 芍藥等分

右㕮咀每服四錢水一盞半煎取七分去滓熱服

治產後崩中頭目旋暈神思昏迷四肢煩亂不知人事

熟乾地黃散

熟乾地黃 伏龍肝 黃芪 赤石脂各一兩

阿膠 甘草 白朮 艾葉炒

川芎 人參各半兩 當歸三分

右㕮咀每服三錢姜三片煎至七分去滓溫服

治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損宜白芍藥散

白芍藥　牡蠣　乾薑　熟乾地黃

桂心　黃耆　烏賊骨　鹿角膠

龍骨各壹兩

右為末食前溫酒調下貳錢

又方

熟地黃　赤石脂各壹兩　鹿茸　牡蠣

當歸各半兩

右為細末食前粥飲調貳錢

治產後崩中下血不止虛羸無力阿膠丸

阿膠　赤石脂　續斷　川芎

當歸　甘草　丹參各壹兩　龍骨

鹿茸　烏賊骨　鱉甲各貳兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下貳參拾元

又方　治產後崩中不止下血

益母草壹握

右細剉以酒貳盞煮取壹盞去滓分溫服食前

瑞蓮散　治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮　棕櫚　當歸　桂心各壹兩

鯉魚鱗　川芎各參分　檳榔貳枚

右為細末每服參錢煨薑酒調下如未止更進壹服或

產後血崩無以治但進參服即止

產後月水不調方論第八　凡貳方

夫產後月水不調者由產傷動血氣虛損未復而風邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少或在月前或在月後故名不調也

治產後經脈不調四肢煩疼飲食全少日漸羸瘦琥珀散

琥珀　牛膝　生乾地黃　當歸各壹兩

桃仁　赤芍藥各半兩

右為粗末每服參錢水壹盞薑參片煎至陸分去滓溫服

治產後虛乏不足胸心短氣腹內緊急腰背疼痛月水不調食少煩渴四肢無力澤蘭元

蒲黃　當歸　熟地黃　牡丹皮

厚朴　桂心　川芎　續斷

桃仁　白朮各壹兩　赤芍藥　木香各參分

羚羊角屑參分

右為細末煉蜜元如梧桐子大食前溫酒下參拾元

產後月水不通方論第九　無方

論曰夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷所傷血之為性得冷則凝結故風冷傷於經血結於胞絡之間故令月水不通也凡血結月水不通則血結成瘕水血相併後遇脾胃衰弱肌肉虛者則為水腫也

夫婦人衝任之脈為經絡之海皆起於胞內而手太陽小腸之經手少陰心之經也此貳經上為乳汁下為月水若產後月水不通者新產之後劫傷氣血或去血過多乳汁通行自是不通若新產之後或壹歲之內而月經不行此是常候即非病也何必通之諸云旅假是也若半歲而行者或四五個月便經行者皆是少壯血盛之人注受極

易產乳必瘦其子失乳必四肢羸瘦肚大青筋頭大髮焦
好啖泥土病名無辜若經血有餘者不可以藥止之若產
後壹貳歲月經不通而無疾苦何必服藥或勞傷氣血衝
任脈虛氣血衰少而不能行者但服健脾胃資氣血之藥
自然通行若以牛膝紅花蘇木乾漆虻蟲水蛭等藥以通
之則為害滋大經水枯竭則無以滋養其能行乎初虞世曰
所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並下而不可得也
後之學者更宜詳審而療之 自明補註

產後四肢浮腫方論第十九 九方

論曰產後四肢浮腫者何答曰產後敗血乘虛停積於
五臟循經流入四肢留滯日深卻還不得腐壞如水故令
面黃四肢浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水氣多用
導水藥極虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往
因致夭枉但服小調經散血行腫消則愈

小調經散方

沒藥 琥珀 桂心 芍藥
當歸各壹錢 細辛 麝香各半錢

右為細末每服半錢匕薑汁溫酒各少許調停服 評曰
產後浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有產後
失於將理外感寒暑風濕內作喜怒憂驚血與氣搏留
滯經絡氣分血分不可不辯要當隨所因脈證治之宜
得其情小調經散治血分固效但力淺難憑不若吳茱
萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也
經云產後肌浮柑皮酒服

加減吳茱萸湯 治婦人臟氣本虛宿挾風冷胸膈滿痛腹
脇絞刺嘔吐噁心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄不
止少氣羸困及因生產臟氣暴虛邪冷內勝宿疾轉增

吳茱萸湯泡壹兩 苦梗 乾薑 甘草
麥門冬 防風 半夏 細辛
當歸 赤茯苓 牡丹皮 桂心各半兩

右為粗末每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓食前熱服

枳朮湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實壹兩半 白朮叁兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服中軟
即當散也

奪魂散 治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑 白麪 半夏

右以生薑汁搜麪裹半夏為小餅子炙焦熟為末水調
壹錢小便利為效

大調經散 故治產後腫滿喘急煩渴小便不利
又論曰夫產後勞傷血氣腠理虛則為風邪所乘邪搏於
氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚
如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便
差也

治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫 漢防己散

漢防己 豬苓 枳殼 桑白皮各壹
商陸 甘草各叁分

右為粗末每服肆錢水壹盞半薑叁片煎至柒分去滓溫

服空心

治產後遍身青腫疼痛產後血水疾 出婦人經驗方

乾漆　大麥蘖各等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘖一重乾漆如此填滿用鹽泥固濟火煅通赤放冷研為散但是產後諸疾熱酒調下二錢

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉　防己等分

右為末每服貳錢溫酒調下不能飲者醋湯調亦可

產後腹痛及瀉痢方論第十一 凡七方

論曰產後腹痛及瀉痢者何答曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於肓膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白胠脇䐜脹或走痛不定急服調中湯立愈若誤以為積滯取之禍不旋踵謹之謹之

調中湯方

高良薑　當歸　桂心　芍藥

附子炮　川芎各壹兩　甘草半兩

右為粗末每服叁錢水叁盞煎至壹盞去滓熱服

評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜怒憂思還從內性況勞逸飢飽皆能致病若其洞泄可服調中湯亦同滯下非此能愈各隨門類別有正方今錄桃膠散白頭翁湯以備用餘從滯下門選之

桃膠散治產後痢下赤白裏急後重疞刺疼痛等證

桃膠瓦上焙　沉香　蒲黃隔紙炒等分

右為末每服貳錢食前陳米飲調下

白頭翁湯治產後下痢虛極

白頭翁　甘草　阿膠各貳兩　黃連

蘗皮　秦皮各叁兩

右㕮咀每服肆錢水一盞半煎至柒分去滓空心服

張氏方的奇散治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉分過則愈或瀉泄不禁下青黑色物亦驗因食傷動用調中湯

荊芥大者四五穗於盞內燃火燒成灰不得犯油火入麝香少許研沸湯一兩呷調下此藥雖微能愈大病宜勿忽之

產後諸痢方

煮薤白食之

又方

羊腎脂炒薤白空腹食尤佳

又方

炙肥羊肉食之

產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第十二 凡三十一方

論曰產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛乏未復或勞動太早或飲食生冷若行起太早則外傷風冷乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變為痢也若血滲入大腸則為血痢難治世謂

之產子痢是也得冷則白或如魚腦得熱則赤黃或為驟
血若冷熱相搏則下痢赤白或膿血相雜若下痢青色則
極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛更加
久痢不止無力瘦乏愈見羸弱謂之虛羸下利又有產後
氣宇不順而下痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷
則溫之冷熱相搏則調之滑者澁之虛羸者補之水穀不
分者當利小便若產婦性情執著不能寬解須當順其氣
未有不安者也治之各有方

深師療產後冷熱痢黃連丸

黃連肆兩　烏梅叁兩　乾薑貳兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心米飲下叁拾元忌
猪肉

經效治產後赤白痢臍下氣痛

厚朴肆分　當歸　枳殼　訶子肉各叁分

甘草伍分　肉豆蔻伍箇　薤白壹合

右水壹升煮取玖合空心分為叁服

張文仲治產後赤白痢腹中絞痛不可忍

黃連肆兩　阿膠　蒲黃　梔子仁各壹兩

當歸壹兩半　黃芩貳兩　黃蘗皮叁兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大飲下拾元日叁夜壹立
定破血止痢

救急治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥肆兩　阿膠　艾葉各貳兩　乾地黃肆兩

甘草　當歸各貳兩

右水貳升煮取捌合分兩服空心

必效療新產後赤白痢心腹刺痛

薤白切壹升　當歸貳兩　酸石榴皮叁兩　地榆肆兩

粳米伍合　阿膠　人參　甘草

黃連各兩半

右㕮咀以水陸升煮取壹升日叁服壹方有厚朴壹兩
千金方只有前五味

又療產後赤白痢腹中絞痛不下食

當歸　石榴皮　地榆各貳分　白蘘荷

黃連各拾貳分　黃蘗壹分　犀角屑肆分　黃芩

枳殼　甘草　升麻各陸分　茜根貳分

粳米貳合　薤白壹升

右為末煉蜜元如梧桐子大空心米飲下貳拾元

療產後赤白痢疾

黃連貳分　阿膠陸分　赤茯苓　當歸

黃蘗各肆分

右為末煉蜜元如梧桐子大粥飲吞下貳拾元空心

療產後下痢赤白有血

赤石脂　黃連　地榆各陸分　當歸捌分

乾薑　甘草炙各叁分　厚朴貳分　葱白

右水貳升煎取捌合空心分作兩服

廣濟療產後腹痛氣脹脅下妨滿不能食兼微痢方

茯苓　人參　厚朴各捌分　甘草

橘紅　當歸　黃芩

右為細末以飲調下方寸匕日三

又療產後下痢赤石脂元大冷洞痢色青為溏

赤石脂各貳兩 甘草 當歸 白朮

黃連 乾薑 秦皮各貳兩 川椒

附子各壹兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大酒下貳拾元日三良

忌豬肉冷水海藻菘菜

深師療產後下痢當歸湯

阿膠 當歸各陸分 蠟如博棊子大 粳米壹合

黃連拾分

右細切以水陸升先煮米令蟹目沸去米內藥煮取貳升入阿膠蠟令烊分溫三服

千金療產後下痢腹痛當歸湯

當歸 龍骨各參兩 乾薑 附子

甘草 熟艾各壹兩 白朮貳兩 川芎貳兩半

右捌味細切以水陸升煮取貳升半去滓分為參服日參壹日令盡忌豬肉冷水桃李雀肉毒物

廣濟療產後赤白痢臍下絞痛

當歸 芍藥 地榆 龍骨

黃連 艾葉 甘草 厚朴各捌分

黃芩 乾薑各陸分

右㕮咀以水捌升煮取貳升半去滓分溫參服即差忌生冷油膩海藻菘菜豬魚肉

又療產後赤白痢臍下氣痛

當歸陸分 厚朴 黃連各捌分 肉豆蔻伍枚

甘草陸分

右㕮咀以水伍升煮取貳升去滓分溫參服

千金療產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血桂心湯

桂心 乾薑 甘草各貳兩 赤石脂拾兩

當歸參兩 附子壹兩 蜜壹升

右細切以水柒升煮取參升入蜜再煎壹貳沸去滓分服壹升日參

必效療產後痢日伍拾行者方

取木裏蠹蟲糞炒令黃急以水沃之稍稍得所服之差止獨孤祭酒訥方

療產後虛羸下利臍腹痛

黃連 芍藥 甘草 當歸

乾薑 人參各肆兩 艾葉參分

右㕮咀水柒升煮取貳升分為參服忌豬肉

治產後下痢不禁止困乏氣欲絕無問赤白水穀不分

黃連 厚朴各參兩 芍藥 黃蘗各貳兩

右水陸升煮取貳升分溫貳服

治產後痢困赤白痢疾心腹絞痛

薤白 石榴皮 黃連各參分 當歸貳兩

地榆參分

右水柒升煮取貳升半分為參服

療產後熱痢不止方

青木香各三分　訶子[illegible]

右爲細末空心米飲調下方寸匕　壹方有縮砂仁叁味

等分爲細末入蜜壹匙米飲調下貳錢

療産後水痢

枳殼肆分　厚朴　茯苓　黄連各陸分

當歸叁分

右水壹升煮取捌合空心分爲叁服

療産後水痢

黄連陸分　烏梅伍分　石榴皮　赤石脂

當歸各肆分　乾薑叁分

右爲細末煉蜜爲元如梧桐子大空心米飲下叁拾元

療産後血痢

艾葉叁分　阿膠捌分　黄連[illegible]分　芍藥

黄蘗　甘草各陸分

右爲細末粥飲調下方寸匕

療産後下痢膿血相雜

赤石脂　五色龍骨　黄連各拾分　白术伍分

阿膠　黄耆各[illegible]分

右爲細末飲服方寸匕

治壹切積滯化氣消食補益真氣　**硇砂煎元**　治産後逐敗血

補虚至善

硇砂[illegible]　金鈴子去皮核

天雄[illegible]　當歸[illegible]　巴戟

檳榔　[illegible]　木香　附子[illegible]

沉香各壹兩[illegible]　肉從蓉[illegible]

右爲細末以無灰酒煮白麪糊元如梧桐子大每服叁拾元空心日午温酒下此方家家有之[illegible]家婦人常病脅中下痢日久甚困篤[illegible]方不差士人李濟善醫[illegible]脅中痢與他痢不同常痢可用苦濇藥止之脅中痢生於血不足投濇藥則病愈不行到當更甚爲之作硇砂法云此藥最能治産後痢先以桂元小下之次投硇砂圓日玖拾圓利頻減半次日遂愈硇砂圓産後雖無疾亦宜服之能養血氣去積滯

桂元方　[illegible]

硇砂　桂心　甘遂　丁香

木香　芫花[illegible]　巴豆[illegible]

右爲細末麪糊元如菉豆大每服貳元叁元温水下加減更量虚實[illegible]云此元取積最勝不以久近皆能消化

又許仁則秘方

神麴[illegible]　枳殼　白术各陸分　人參捌分

赤石脂拾分

右爲細末米飲調下方寸匕

療産後驟血不止　**阿膠湯**

白蜜[illegible]

右同煎[illegible]亦投童子小便壹升去[illegible]煎兩沸分爲叁次頓服之

療産後血痢小便不通臍腹痛

生馬齒莧

右擣取汁叁大合煎一沸下蜜壹合調頓服

療產後血痢不止

臭樗根叁分

右爲末水和元如梧子大以枚大麪裹作餛飩無定數煑熟以湯固熱吞之

療產後下血不止

桑耳炙 芍藥炙 地榆 茜根

牛角䚡 阿膠各陸分炙 艾葉 雞蘇各伍分

白龍骨拾貳分

右㕮咀以水貳升煮取捌合分叁服

全良方卷二十三

新編婦人大全良方卷之二十三

產後痢疾作渴方論第一 一九三方

論曰產後下痢作渴夫水穀之精化爲血氣津液以養臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止反溢水氣脾胃既虛不能剋水水自流溢浸漬皮膚則令人腫但止其渴痢則自差

必効療產後痢而渴飲無度數

麥門冬拾貳分 烏梅貳拾箇

右細剉以水壹升煮取柒合細呷

經效療產後久痢津液竭渴不止

龍骨拾貳分 厚朴 茯苓 黃耆

麥門冬 人參各捌分 生薑陸分 大棗拾肆箇

右水壹大升煮取柒合空心分兩服

古今錄驗療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥

冬瓜壹枚

右以黃泥裹厚伍寸煨令爛熟去皮擣汁服之差

產後大便秘澀方論第二 九七方

論曰產後大便秘澀者何答曰產卧水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通若過五六日腹中悶脹者此有燥屎在臟腑以其乾澀未能出耳宜服麻仁元以津潤之若誤以爲有熱而投以寒藥則陽消陰長變證百出性命危矣

麻仁元方

麻仁 枳殼 人參 檳榔四分 大黃貳分

右爲末煉蜜元如梧桐子大空心温酒下貳拾元未通
漸加元數不可太過
評曰産後不得利利者百無一生去血過多臟燥大
便秘澁澁則固當滑之大黃似難輕用惟葱涎調臘
茶爲元復以葱茶下之必通 [illegible]
[illegible]
療産後五七日不大便切不宜妄服藥丸宜用蘇麻粥方
大麥芽不以多少
右炒黄爲末每服三錢沸湯調下與粥間服
阿膠枳殼丸 治産後虚羸大便秘澁
阿膠 枳殼等分
右爲末煉蜜圓如梧桐子大別研滑石末爲衣温水下
貳拾圓半日以來未通再服
許學士云婦人産後有三種疾鬱冒則多汗汗則大便秘
故難於用藥唯麻子仁蘇子粥最佳穩當
紫蘇子 大麻子仁
右二味各貳合淨洗研令極細用水再研取汁壹琖分
貳次煮粥啜之此粥不惟産後可服大抵老人諸虚風
秘皆得力
千金療産後熱結大便不通蜜兌法
白蜜伍合慢火煎令如硬餳以投冷水中良久取出捻
如母指大長貳寸內穀道中即通

産後大小便不通方論第三 凡十二方

論曰産後大小便不通者腸胃本挾於熱因産血水俱下
津液燥竭腸胃痞澁熱氣結於腸胃故令大小便不通也
千金療産後淋澁葵根湯方
葵根貳兩 通草貳兩 車前子壹升 亂髮灰
大黃 桂心各壹兩 冬瓜汁柒合 生薑陸兩
滑石末別研壹兩
右玖味㕮咀以水柒升煮取貳升半去滓下滑石末分叁
服 此恐考之既有大黃亦可治大便不通故錄于此
更宜斟量虛實而投之
集驗療産後津液燥竭大小便不通
芍藥 大黃 枳殼 麻仁等分
右爲細末煉蜜元如梧子大空心熱水下貳拾元 一方
有甘草 山梔仁
治産後大小便秘澁桃花散
桃花 葵子 滑石 檳榔等分
右爲細末每服貳錢葱白湯空心調下

産後遺糞方第四

廣濟療産後遺糞方
取故燕巢中草燒爲末以酒調下半錢亦治男子
集驗方
礬石枯 牡蠣煅
右等分爲末酒服方寸匕日叁亦治男子
又療産後遺糞不知出時方
白斂 芍藥
右各等分爲末酒服方寸匕

產後諸淋方論第五 凡十五方

論曰：產後諸淋，因產有熱氣客於脬中，內虛則起數，熱則小便澁痛，故謂之淋。

又有因產損氣虛則挾熱，熱則搏於血，血即流滲於胞中，故血隨小便出而為血淋。淋者如雨之淋也。

三因論曰：治諸產前後淋，秘其法不同，產前當安胎，產後當去血。如其冷熱膏石氣淋等，為治則一，但量其虛實而用之。瞿麥、蒲黃最為產後要藥，唯當尋其所因，則不失機要。

茅根湯 治產後諸淋，無問冷熱膏石氣結，悉主之。

白茅根 [illegible] 瞿麥 [illegible] 白茯苓 [illegible] 葵子

人參 各貳兩 蒲黃 桃膠 滑石

甘草 各壹兩 [illegible] 石首魚頭中石 [illegible]

右剉為散，每服肆大錢，水壹盞半，燈心貳拾莖，煎至柒分，去滓溫服。亦可為末，木通煎湯調下貳錢。如氣壅閉，木通、橘皮煎湯調服。

葉驗 療產後患淋，小便痛。

通草 叁兩 大棗 貳拾枚 葵子 壹升 白朮 壹兩

榆白皮 伍兩 石韋 黃芩 各貳兩

右以水捌升，煮取貳升半，空心服，溫卧。千金有芒硝壹兩。

療產後小便淋澁不通

葵子 壹合 朴消 捌分

右水貳升，煮取捌合，下消，分兩服。

千金 療產後淋 滑石散

滑石 伍分研 通草 車前子 [illegible] 葵子 [illegible]

右為末，以漿水調服方寸匕，至二匕為妙。

療產後小便不通，腹脹，不過方

陳皮 壹兩去白

右為末，空心溫酒調貳錢，壹服便通。

療卒不得小便

杏仁 拾肆箇去皮尖

右炒為末，和飯丸服之立通。

古今錄驗 療產後卒得傷熱，大小便赤澁

雞蘇 壹分 通草 捌分 冬葵子 叁合 芍藥

滑石 芒硝 各捌分 生地黃 拾貳分

右水叁升，煮取捌合，下芒硝，空心分叁服。

療[illegible]不得小便不通，八九日

滑石 [illegible] 寒水石 [illegible]分

右水貳升，煮取捌合，空心分叁服。

經效 療氣結成淋，小便熱淋引痛，或如豆汁，面色萎黃

貝齒 [illegible] 葵子 壹合 石膏 [illegible] 滑石 [illegible]分

右水壹升，煮取捌合，下豬膽汁半枚，合煎叁肆沸，空心溫服。

療產後小便澁痛，或血淋者

瞿麥 黃芩 冬葵子 貳合 通草 叁兩

大棗 貳拾枚

右以水柒升，煮取貳升半，分作兩服。

療產後血淋

車前子 瞿麥 各[illegible] 黃芩 [illegible]兩 鬱金末 壹兩

右水陸升煎取貳升下滑石末分參服

廣濟療產後卒患淋小便澀痛及至尿血

冬葵子壹升 通草叁兩 滑石肆兩研 石韋去毛貳兩

茯苓 黃芩各貳兩

右水玖升煮取叁升入滑石末空心服忌熱麪醋物

療產後淋小便痛及血淋

白茅根伍兩 瞿麥 車前子各貳兩 冬葵子貳合

鯉魚齒壹百箇為末 通草叁兩

右水貳升煮取壹升入齒末空心服

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒緣未產之前內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用鹽於產婦臍中填可與臍平却用葱白剝去麤皮拾餘根作一縛切作一指厚安鹽上用大艾炷滿葱餅子大小以火灸之覺熱氣直入腹內即時便通神驗不可具述 出產乳集

治產後小便不通 [illegible]

木通 大麻仁 葵子 滑石

檳榔 枳實 甘草各半兩

右為粗末每服叁大錢水一盞半煎至柒分去滓溫服

產後小便數方論第六 凡二方

夫產後小便數者此由脬內宿有冷氣因產後發動冷氣入腹虛弱不能制其小便故數也

千金翼治產後小便數及遺尿 [illegible]

桑螵蛸炙半兩 鹿茸酥炙 黃耆各叁兩 牡蠣煅

人參 厚朴 赤石脂各貳兩

右為末空心粥飲調下貳錢 外臺方無厚朴石脂有甘草生薑

集驗療產後小便數兼渴 [illegible]

桑螵蛸 甘草炙 黃連 生薑各貳兩

栝樓根 人參各叁兩 大棗伍拾箇

右細切以水柒升煮取貳升半分參服忌豬肉冷水

產後小便不禁方論第七 凡四方

廣濟療產後小便不禁

以雞尾毛燒作灰細研溫酒調方寸匕服日參

又方

桑螵蛸炒半兩 龍骨壹兩

右為細末食前粥飲調下貳錢

千金翼療產後遺尿不知出

白薇 芍藥

右等分為細末以酒服方寸匕日參服

[illegible]治婦人臨產時傷手胞破小便不禁

黃絲絹 [illegible]

右用水[illegible]升再煎至壹盞空心頓服服時勿[illegible]氣服之不得作聲如作聲無效

產後小便出血方論第八 凡三方

夫產後有於血氣與氣虛而挾於熱血得熱則流散滲於脬內故血隨小便出○治小便利血方

亂髮 [illegible]燒灰

右米飲調服方寸匕一方有滑石等分每服壹錢生地黄汁調下

療産後大小便不利下血

車前子　黄芩　蒲黄　生地黄

牡蠣　芍藥各陸分

右爲細末空心米飲服方寸匕忌蕪荑

崔氏療産後血滲入大小腸

車前子草汁壹升　蜜壹大合

右相和煎一沸分爲兩服

産後陰脫玉門不閉方論第九

三因論曰婦人趣産勞力努咽太過致陰下脫若脫肛狀及陰挺下出逼迫腫痛舉動房勞能發作清水續續小便淋露

硫黄散　治産後勞傷陰脫

硫黄　烏賊骨各半兩　五味子壹分

右爲細末研令極細摻患處日參易

[illegible]　治陰下脫

千金方治産後陰下脫

以鐵精粉上推内之　又灸臍下横文二七壯

廣濟療産後陰腫下脫内出玉門不閉

石灰壹升炒令能燒草

右熱湯貳升投灰湯中適温冷澄清坐水中以浸玉門斷須平復如故

[illegible]　治産後陰下脫方

當歸　黄芩　牡蠣各貳兩　芍藥壹兩半

蝟皮半兩燒存性

右爲細末每服貳錢空心温酒調服米飲調服亦可忌登高舉重

集驗療婦人産後陰冷玉門不閉實冷方千金同

蛇床子　硫黄各肆分　兔絲子伍分

吳茱萸陸分

右爲細末以湯壹升投藥方寸匕以洗玉門日再用

陳氏[illegible]湯　治婦人産後用力太過産門惡出

以四物湯入真龍骨末少許煎空心連進二服麻油湯熏洗

集驗療婦人産後陰下脫方

單炒蛇床子壹升乘熱以帛裹熨患處亦治産後陰中痛

[illegible]　治産後陰腫妨悶

桃仁研去皮尖別　枯礬　五倍子

右等分爲細末以膏子拌均傅之

[illegible]　治産後子腸下出不能收拾不論年深者皆治之

樗枝取皮焙乾壹握

右用水伍升連根葱伍莖漢椒壹撮同煎至叁升去滓傾在盆内乘熱熏候通手淋洗如冷傾入伍升瓶内再煎一沸依前用一服可作伍度用洗了睡少時忌鹽藏鮓醬濕麵發風毒物及用心力房勞等事

古今錄驗療産後陰下脫方

鼈頭（貳箇）　葛根（壹斤）

右貳味爲末，酒服方寸匕，日叁服

集驗治產後脫

皂角樹皮　川楝樹皮　[illegible]角核（壹合）　石[illegible]（壹合，炒）

右爲粗末，用水煎湯，乘熱以物圍定，熏通，手洗於淨房中，就熏洗[illegible]，熏洗了，以帛揩乾，便喫[illegible]露通真元，熟酒下貳元，便仰[illegible]

古今錄驗療產後陰下脫方

川椒　吳茱萸　[illegible]　戎鹽（半雞子大）

右爲末，以綿裹如半雞子大，內陰中，日壹易，貳拾日愈

婦人陰蝕五疳方論第十　凡八方

凡婦人少陰脉數而滑者，陰中必生瘡，名曰䘌瘡，或痛或癢，如蟲行狀，淋露膿汁，陰蝕幾盡者，此皆由心神煩鬱，胃氣虛弱，致氣血留滯，故經云：諸痛癢瘡，皆屬於心。又云：陽明[illegible]肉，痛癢皆屬於心，治之當補心養胃，外以[illegible]湯坐浴之乃可

千金療陰蝕瘡方

當歸　芍藥　甘草　芎藭（各貳兩）

地榆（叁兩）

右細切，以水伍升，煮取貳升，去滓，熏洗，日三夜一

又方

蒲黃（壹升）　水銀（壹兩）

右貳味研均，以粉上

又方

肥猪肉（叁拾斤）

右以水叁頭煮熟，去肉，入盆中浸之，冷即易，不過三度

崔氏療陰蝕[illegible]湯方

甘草　乾漆（各壹兩）　黃芩　乾地黃

當歸　芍藥（各貳兩）　龜甲（五兩）

右細切，以水柒升，煮取壹半，去滓，以綿帛內湯中，以搨瘡處，良久即易，日貳度，每搨湯可行十里許，即裛乾，捻取甘濕散薄傅瘡上，使遍，可經半日，又以湯搨，搨訖如前傅藥[illegible]

又名蛔蟲膽散，療疳蟲陰蝕方

蛔蟲膽[illegible]　青木香末　石硫黃　[illegible]精

[illegible]

右件味等分，分爲末，更細研，有患取如三棋子，和井花水，日再服，訖，先令便利了，即以後方桃枝熏下部，訖，然後取藥如棋子，安竹管裏，吹入下部中，亦日再度，老少量減，其熏法每日一度，不用再爲之，良

又療疳蟲食下部及五藏方

取桃東南枝三七枝，輕打頭使散，以綿纏之，又搗石硫黃爲末，將此綿纏桃枝捻轉之，令末少厚，又截壹短竹筒，先內下部中，仍以所撚藥桃枝熟燃熏之

文仲療陰蝕欲盡者方

蝦蟆　兔屎

右等分爲末，傅瘡上，良

古今録驗療婦人陰蝕其中爛傷膿水淋漓臭穢[illegible]
狼牙三兩
右㕮咀以水肆升煮取半升去滓內苦酒如雞子中黃
大沸湯一盃消盡適寒溫以綿纏筯頭大如繭濡湯
以瀝瘡中日四五度即差

產後乳汁或行或不行方論第十一　凡十五方

論曰凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡不調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之令乳無汁若乳盈溢可潑東壁上佳或有產後必有乳若乳雖脹而產後臖作若此年少之人初經產乳有風熱耳須服清利之藥則乳行若累經產而無乳者亡津液故也須服滋益之藥以動之若雖有乳又却不甚多者須服通經之藥以動之仍以羹臛引之蓋婦人之乳資於衝脉與胃經通故也予嘗經產而乳汁常多者亦婦人血氣不衰使然也大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而其色帶黃所生之子怯弱而多疾

三因論曰產婦有二種乳脉不行有氣血盛而壅閉不行者有血少氣弱澀而不行者虛當補之盛當疏之盛者當用通草漏蘆土瓜根輩虛者當用成煉鍾乳粉豬蹄鯽魚之屬槩可見矣

涌泉散療乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯奶乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然內消乳汁通行

漏蘆[illegible]　蛇脫[illegible]　瓜蔞[illegible]

右為末溫酒調下貳錢無時候服藥後即以豬蹄羹投之

經驗方有牡蠣燒存性　一方只用牡蠣燒為末酒調下貳錢

又方

葵菜子炒香　縮砂仁各等分

右為細末每服貳錢熱酒調下滋益氣脉榮衛行津液上蔡張不愚方施人極有驗

療乳婦氣少血衰脉澀不行乳汁絕少

成煉鍾乳粉[illegible]　濃煎漏蘆湯調下貳錢

療產後[illegible]乳無汁

土瓜根　漏蘆各叁兩　甘草貳兩　通草肆兩

右㕮咀以水八升煎取貳升分溫叁服忌熱面法

一方加桂心並為末飲服方寸匕

一方

以豬蹄如食法羹清粥食之[illegible]驗

靈苑方下乳汁立效方

粳米　糯米各半合　萵苣子[illegible]　生甘草半兩

右以水壹升研前藥令細去滓分作叁服立下

又方

漏蘆貳分　蠐螬[illegible]　瓜蔞根　土瓜根[illegible]

右為細末酒調方寸匕日三服

一方無土瓜根有鍾乳少許米調服

又方

通草拾分　鍾乳粉　麥門冬各等分

右為細末食後酒服方寸匕日三兩服效千金方同前

理石一方出産寶

一方

土瓜根爲末酒調方寸匕日三兩服效

一方

猪蹄貳隻 通草肆兩

右以水壹斗煮作羹食之最妙

漏蘆散 療乳無汁成都教授單驤方亦治乳結癰腫

穿山甲 [illegible] 壹兩以炒令[illegible]

右爲細末酒調服方寸匕

下乳方

大麻仁 [illegible] 生蝦 [illegible]

右同研爛去滓用酒水各壹盞煎至[illegible]半有效

食後臥服仍用被覆[illegible]乳即通流[illegible]

又方

以用方云漏蘆栝樓皆要藥或云多食猪蹄羹栝樓取

子淨洗炒令香熟搥碎取仁研細爲匕攤[illegible]令白色研

爲細末温酒調下壹錢服了合面臥少時未効再作

○一方瓜蔞壹枚熟搗以白酒壹斗煮取肆升去滓温飲

壹升日參

崔氏療乳汁不下

鼠肉伍兩 羊肉陸兩 麞肉捌兩

右參物作臛啜之勿令食者知

千金療乳無汁 [illegible]

漏蘆 通草 [illegible] 鍾乳肆分 黍米壹升

方先將米漬一宿研取汁參升煮藥三四沸去滓飲食

經心錄同 [illegible]

産後乳汁自出方論第十二 凡一方

[illegible]

論曰産後乳汁自出蓋是身虚所致宜服補藥以止之若

乳多温滿急痛者温帛熨之産寶有是論却無方以治之

若有此證但以漏蘆散亦可

亦有未産前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未

曾論及

産後吹奶方論第十三 凡六方

夫産後吹奶者因兒吃奶之次兒忽自睡呼氣不通乳不

時泄蓄積在内遂成腫硬壅閉乳道津液不通腐結疼痛

亦有不癢不痛腫硬如石名曰吹奶若不急治腫甚成癰

産後吹奶最宜急治不爾結癰逮至死者速與服皂角散

栝樓散傅以天南星散以手揉之則散矣 [illegible]

栝樓散方

乳香 壹錢研 栝樓根末 壹兩

右研令均温酒調貳錢服

天南星散

天南星爲末用温湯調以鵝翎塗之

皂角散方 詞曰

婦人吹奶意如何 皂角燒灰蛤粉和

熱酒壹盃調捌字 須臾揉散笑呵呵

治妳結硬疼痛仙經驗方

百藥煎爲細末每服參錢酒壹盞煎數沸熱服

療乳硬作痛
嬰兒初生採頰以米飲調攤紙花貼病處
產後婦乳汁以衛生十四
夫妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不泄或乳脹捏其
汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大渴引飲牢
強掣痛手不得近是也初覺便以手助捏去汁更令傍人
助吮引之不爾或作瘡有膿其熱勢盛必成癰也
吹妬妬乳急於癰若輕則一只分輕重而已輕則為吹妬妬
乳重則為癰雖有異同不可不錄
療產後吹妳作癰
葵莖及子
右擣篩為散酒服方寸匕即愈
又方
雞屎為末酒服方寸匕須臾三服愈
又方
皂莢拾條以酒壹升揉取汁硝石半兩煎成膏傅之
療產婦乳初結脹不消令敗乳自退方
爪樓壹箇 乳香 生薑
右同以用酒壹碗煮取壹盞去滓服之其痛一會不可
忍即搜去敗乳臨臥時更服順所患處乳側臥於床上
令其垂行故也
療乳腫結成癰方
右以馬溺塗之立愈
婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出方附

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出浸
淫為長百種療不差者動經年月名為妬乳病婦人飲兒
者乳皆欲斷世論名妬乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯
洗之傅二物飛烏膏及飛烏散佳始作者可傅以黃芩漏
蘆散及黃連胡粉散並佳
赤龍皮湯方
槲皮 切三升
右以水壹斗煮五升夏冷用冬溫之分以洗乳亦
洗諸深敗爛久瘡洗畢傅膏散千金同
天麻草湯方
天麻草 切五升
右以水壹斗半煎取壹斗隨寒溫分洗乳以殺痒也此
天麻草葉如麻冬生夏著花赤如鼠尾花亦以洗浸淫黃
爛熱瘡癢疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡洗畢傅膏散千金同
飛烏膏方
用燒朱砂作水銀上黑煙名 礬石
右貳味以絹篩了以甲煎和之令如脂以傅乳瘡日三
作散者不須和有汁自著可用散亦傅諸熱瘡黃爛浸
淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕癢濕諸小兒頭瘡疳蝕口邊肥
瘡蝸瘡等並以此傅之千金同
又黃連胡粉散方
黃連貳兩 胡粉拾分 水銀壹兩
右叁味擣黃連為末三物相和皮裹熟挼之自和合
也縱不成一家且得水銀細散入粉中也以傅乳瘡諸

湯藥黃爛肥瘡皆有中前證爲背千金同

乳癰方論第十五　凡二十五方

夫婦人乳癰者由乳腫結聚皮薄以澤是成癰也足陽明之經脉則血澁不通其血又歸之氣積不散故結聚成癰千金云年四十以下治之多愈年五十以上宜速治之即差若不治者多死中年又懷胎發乳癰腫及體結癰此必無害也蓋懷胎之癰病起於陽明陽明者胃之脉也主肌肉不傷臟故無害也診其右手關上脉沉則爲陰虛者則病癰乳癰久不差則變爲瘻

開慶閏淫川　嘉林晝都運恭人吳氏年已五十而病妳癰後來不起以此知聖賢不妄說也

產寶論曰産後宜勤去乳汁不宜蓄積不出惡汁內引於熱則結硬堅腫牽急疼痛或渇思飲其妳手近不得若成膿治名妬乳乃急於癰宜服連翹湯利下熱毒外以赤小豆末水調塗之便愈或數捏去乳汁或以小兒手摩動之或大人含水嗍之得汁吐之其汁狀如膿若産後不曾乳兒蓄積乳汁亦結成癰

療産後妬乳并癰連翹湯

連翹子　升麻　芒硝各拾分　玄參

芍藥　白斂　防己　射干各捌分

大黃拾貳分　甘草陸分　杏仁捌拾枚去皮尖

右以水玖升煎取叁升大黃次下硝分叁服

又方

蒲黃草

右熟搗傅腫上日叁度易之并搗取汁飲之亦佳妬乳及癰並差

又方

以地黃汁傅即愈

又療諸癰不散已成膿懼針令自決破方

取白雞內翅第一翎各一莖燒末服之即決

又方

取白丁香研塗乾即易

又療乳癰初得令消

赤小豆　菵草

右等分爲細末苦酒和傅之愈

又療乳癰初覺有異

黃芩　甘草　赤芍藥

黃耆各伍兩　通草拾分　防風　桑寄生　麥門冬各陸分

大棗伍枚

右細切以水壹升煮取玖合去滓入乳糖陸分分爲服

療乳癰或瘡久不差膿汁出疼痛欲死不可忍

鹿角貳兩　甘草壹兩

右爲細末用雞子白和於銅器中煖溫傅患處日五七易即愈

壹方只用鹿角石上磨取濃汁塗之乾即易

壹方以鹿角燒作灰酒調抹之愈

治乳癰

鹿角屑壹兩

右爲細末以猪蹄汁調下壹錢不過兩服神驗以蹄湯
水服亦得 集驗方以猪蹄下清汁

張氏橘香散 治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者
藥下即不痛神驗不可云喻因小兒吹奶變成斯疾者並
皆治之

陳皮 湯浸去白曬乾麪炒微黃爲細末麝香研酒調貳
錢初發覺赤腫疼痛一服見效再服有效

療乳癰諸般癤癰疽
橘紅 刮內 阿膠 粉炒 粉草 炙各壹兩
右㕮咀分爲貳服每服用泉水壹椀半煎至壹盞半去滓
溫服

療奶癰並無名癰癤
鹿角不以多少於石上用醋磨分入輕粉二十文研停麻
油調塗如有頭即潰無頭即消 又療大全

療乳頭裂破
以丁香爲末水調傳立愈又以蛤粉胭脂等分新水
調傳

陳日華方 **一醉膏** 治奶癰
石膏不以多少煅通赤取於地上碗覆出火毒細研
每服貳錢溫酒調下添酒盡醉睡覺再進壹服 千金
療乳無汁以水煮服

金黃散 治奶癰即出婦人經驗方
川大黃 粉草 各壹兩
右爲細末以好酒熬成膏傾在瓷中放冷攤紙上貼痛

處仰面臥至五更未貼時先用溫酒調服壹大匙就患處
臥明日取下惡物相度強弱用藥羸弱不宜服

療發背乳癰四肢虛熱大渴
生地黃 焙 黃芩 芍藥 人參
知母 甘草 各貳兩 升麻 黃耆
麥門冬 栝樓 各參兩 大棗 拾貳枚
右以竹葉切壹升以水壹斗貳升煮取玖升去竹葉內
藥煮取參升分溫三服飲之

療婦人發乳丈夫發背爛生膿血後虛成氣疾
黃耆 麥門冬 地黃 人參
升麻 茯苓 各參兩 當歸 芍藥
遠志 甘草 各壹兩 大棗 拾枚
右以水貳升煮取壹升分溫三服若有是證局中排膿內
補十宣散亦妙

生乳癰 婦人乳癰初穿出膿大止痛斂瘡口
以芙蓉花爛研如凝若無花只取根上皮先用竹刀
刮去粗皮但用內一層嫩白皮研如泥去入蜜少許
調停看瘡大小如未穿即留中乳如已穿即塞其孔
洪膿根自然流出盡不倦頃頃重換此方大治一切
癰疽發背已見神效膿出盡卻用後藥傅

又鈴灌口 **神驗散**
烏賊骨 黃丹 天竺黃 各等分 輕粉 貳匕
麝香 壹字 茗降真骨 各等分
右研爲細末乾摻瘡口不數日乾

又方

降真節（細剉） 天竺黄 露蜂房（各一錢） 麝香

輕粉（各少許）

右為末乾糝

又方

乳香 沒藥 黄丹（各少許） 龍骨（各一錢）

真坯子（金漆） 血竭（半錢） 麝香（一字） 降真節（一錢）

右為細末乾糝

產寶療乳癰方

黄藥（一分）

右為細末以雞子白調塗之乾則易之愈

又方

苧根搗傅之愈

必效方療婦人乳癰（丹參散）

丹參 白芷 芍藥（各二兩）

右㕮咀以苦酒淹經宿以猪脂半斤微火煎之白芷黄

為度膏成去滓傅之

治妳發痛不可忍（[illegible]方）

水楊柳根新採者生擂碎以好酒同甘草為梅烊

至六分去滓時時溫服

治婦人乳疽妳勞（[illegible]）（[illegible]方）

瓜蔞（[illegible]） 生粉草（半兩）

當歸（[illegible]） 乳香（[illegible]） 通明沒藥（[illegible]）

右用無灰酒參升同於銀石器中慢火熬取壹升清汁

分作參服食後良久服如有妳勞便服此藥可杜絕病

根如毒氣已成能化膿為黄水毒未成即於大小便中

通利疾甚再合服以退為妙婦人乳癰方甚多獨此一

方神效無比萬不失一

（[illegible]）

[illegible]方觀[illegible]

新編婦人大全良方卷之二十三

新編婦人大全良方卷之二十四

拾遺方

烏喙丸 治腸覃病，因寒氣客於腸外，與胃氣相搏，正氣不榮，繫瘕內著，惡氣乃起，其生也，始如雞卵，久久乃成，狀如懷胎，按之則堅，推即移，月事時下，故曰腸覃。亦治乳餘疾，大小便不利，并食有伏蟲，臚脹，癰疽，毒腫，久寒邪氣。

烏喙（炮，去皮尖，一錢） 半夏（湯洗七次，[illegible]） 石膏（煅） 藜蘆（炒）

牡蒙 茯苓（[illegible]） 乾薑（炮） 桂心（去粗皮，[illegible]）

巴豆（去皮心膜，出油）

右為細末，煉蜜丸如綠豆大，每服叁伍丸，食後酒下，亦治男子疝痛。

[illegible]散 治婦人臍腹血[illegible]氣[illegible]水[illegible]

木香 沉香 乳香（研） 甘草（炙，各[illegible]）

川芎 胡椒 陳皮 人參

晉礬（各半兩） 桂心 乾薑（炮） 縮砂（[illegible]）

茴香（炒，兩半） 天茄（四兩，去小者，剉細）

右洗焙為末，空心日午溫陳米飲調下貳錢，忌羊肉。

石英散 治婦人血結胞門，或為癥瘕在腹脇間，心腹脹滿，腫急如石水狀，俗謂之血蠱。

石英（一兩） 當歸尾 馬鞭草 紅花（炒）

烏梅肉（各半兩） 莪茂 三稜（炮） 蘇木節

沒藥 琥珀（別研，各[illegible]） 甘草（炙，[illegible]）

右為末，濃煎蘇木酒調下貳錢，不飲酒，薄荷湯調，得[illegible]

大腹皮飲 治婦人血氣蠱，單腹腫

大腹皮 防己 木通 厚朴（薑製）

栝樓 黃芪 枳殼（麸炒） 桑白皮（炙）

大黃（蒸） 陳皮 青皮 五味子（各等分）

右㕮咀，每服秤壹兩，水壹碗，煎至六分，去滓入酒壹分，溫服，不以時候。

大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如敦敦狀，小便微難而不渴，由產後者，水與血并結在血室也。

大黃（[illegible]） 甘遂（[illegible]） 阿膠（炒，各貳兩）

右剉散，每服叁錢，水壹盞半，煎[illegible]分，去滓溫服，其血當下。

竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹 熟地黃（[illegible]） 人參 白芍藥

桔梗 川芎 當歸 甘草（炙）

桂心（各等分）

右㕮咀，每服肆錢，水壹大盞，煎至[illegible]分，去滓，不以時服。

膏髮煎 治婦人穀氣實，胃氣下泄，陰吹而正喧，陰中出血

頭髮灰 豬脂

右調停，綿裹如棗核大，納陰中

產後腸頭如以針刺，連穀道，又如痔痛，小便如淋狀，或寒熱，此產時用力氣併腸間，亦由陰虛，邪熱乘之，毒氣攻衝，恐成腸癰，宜[illegible]湯

薏苡仁（[illegible]） 桃仁（去皮尖） 牡丹皮 瓜蔞子（[illegible]）

右為粗末，每服伍錢，水貳盞，煎至壹盞，去滓溫服

固精丹 治元臟久虛，及小腸腎餘膀胱疝氣，五般淋疾，精滑精漏，小便白濁，及婦人赤白帶下，漏下，崩，子宮血海

虛冷等疾並皆治之高司法方（續添）

製蒼朮法 洗去土米泔浸透日換新泔春五日夏三日秋七日冬十日切作片子焙乾秤壹斤分肆處

蒼朮肆兩 入茴香壹兩鹽壹兩同炒令朮黃爲度

蒼朮肆兩 入川烏壹兩炮裂去皮尖切作片子并川楝子壹兩和皮核擘開同炒令朮黃爲度

蒼朮肆兩 入紅椒壹兩去目并合口者破故紙壹兩同炒令朮黃爲度

蒼朮肆兩 同用好醋好酒各壹升半煮令乾焙

右壹處爲末用煮藥酒醋打麪糊爲元如梧桐子大每服貳拾元男子溫酒或鹽湯下空心食前婦人醋湯下藥性溫無毒小便頻數爲効

大効[illegible]濟元 治受氣虛弱及五勞七傷藏府積冷痰癖癥瘕虛脹或經脉不調并冷赤白帶下口苦舌乾面色痿黃黑黯心煩驚悸頭目旋暈不美飲食痰涕黏涎手足百節熱疼無力肌肉消瘦子息斷絕服壹月當姙娠百病皆愈

萆薢肆兩 牛膝 五加皮 白朮各貳兩

川烏炮 枳實炒 丹參各壹兩

右爲細末煉蜜元如梧桐子大溫酒下貳拾元空心日午晚食前各進壹服

南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁以上疾證皆令孕育不成以致絕嗣此藥治產後百病百晬內常服除宿血生新血令人有孕及生子充實亦治男子亡血諸疾

桃仁去皮尖麩炒 木香炮 茯苓 京墨燒各壹兩

秦艽 甘草 人參 桔梗炒

石斛酒浸炒 蠶布燒 藁本各貳兩 當歸

桂心 乾薑炮 細辛 牡丹皮去心

川芎各壹兩半 川椒去目及閉口炒出汗 山藥各叁兩 澤蘭葉

熟地黃洗酒蒸焙 香附子炒去毛各肆兩 蒼朮米泔浸去皮 大豆卷炒各半斤

糯米炒壹升

右爲細末煉蜜元每兩作陸元每服壹元細嚼溫酒送下淡醋湯調亦可空心食前服

治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺用盡藥不効者惟有此藥可治神妙不可言每以少許臨臥時洗面令淨如面油用之數日間瘡腫處自平赤亦消如風刺粉刺一夕見效但塗藥勿近眼處

生硫黃 香白芷 瓜蔞子仁 膩粉各半錢重

全蠍壹枚去毒 蟬蛻五枚洗 芫青各七枚去翅足

右爲細末麻油黃蠟約度如合面油多少熬滚取下離火入諸藥在內每用少許塗面上 林提點方

烏雞煎 治婦人百病

吳茱萸 良薑 白薑 當歸

赤芍藥 延胡索 破故紙 川椒

生乾地黃 劉寄奴 蓬莪朮 橘紅

青皮 川芎各壹兩 荷葉灰肆兩 熟艾貳兩

○右爲末醋煮麪糊元如梧子大每服三五十元湯使如后

○月經不通紅花蘇木酒下 ○白帶牡蠣粉調酒下

○子宮久冷白茯苓煎湯下 ○赤帶建茶清下

○血崩豆淋酒調綿灰下　○胎不安糯米和酒下
腸風陳米飲調百草霜下　心疼菖蒲煎酒下
漏胎下血烏梅温酒下　耳聾蠟點茶下
胎死不動斑猫叁拾箇煎酒下　肋腰痛當歸酒下
胎衣不下芸薹研水下　頭風薄荷點茶下
血風眼黑豆甘草湯下　生瘡地黃湯下
身體疼痛黃蓍末調酒下　四肢浮腫麝香湯下
咳嗽喘滿杏仁桑白皮湯下　腹痛芍藥調酒下
產前後痢白者乾薑湯下赤者甘草湯下赤白雜者二
宜湯下常服温酒醋湯任下並空心食前服

產乳集將護嬰兒方論

凡新生兒坐婆急以綿裹手指繳去兒口中惡物令盡不
可遲若嚥入腹中[illegible]諸疾[illegible]先斷兒臍帶
可只留貳寸許更看帶中如有小虫急撥去之留之必生
異病或以線繫乳定然後洗兒不然則濕氣入腹必作臍
風之疾[illegible]既綳裹了取生甘草壹寸搥
碎用水壹合煎濃汁用綿纂子蘸令兒咂之當吐出惡汁
盡半合不妨[illegible]
[illegible]此乃[illegible]吐故也忌好辰砂壹字以蜜調置兒口中吮之以去驚
邪然後飼乳自此飼乳之後須依時量多寡與之勿令太
飽恐成哯奶久則吐奶不可節也三朝洗兒可用虎頭骨
桃枝猪膽金銀煎湯洗之則兒少驚[illegible]
每日頻就無風處看兒上腭并兩頰內有白泡如粟起者
速以指甲刮破更生更去之[illegible]更看舌下
恐生重舌皆由兒在胎中母喫炙煿肥膩飲酒服熱藥所
致[illegible]三日洛臍帶或灸之外不可別加火艾恐
成驚癇[illegible]又天寒時兒用父母舊衣
作衣服不可用新綿絹只用舊者若太温煖則令兒筋骨
軟弱若天色和煖無風可令奶婆抱孩兒頻見風日則血
壯氣剛肌膚硬密堪耐風寒不致疾病又擇乳母須精神
爽健情性和悅肌肉充肥無諸疾病知寒温之宜能調節
乳食奶汁濃白則可以飼兒不得與奶母大段酸鹹飲食
仍忌衝寒或衝熱來便餵兒奶如此則必成奶癖或驚
癇瀉利之疾切須忌之夜間不得令兒枕臂須作一二豆
袋令兒枕兼左右附之可近乳母之側蓋覆衣衾須露兒
頭面一向仰卧恐成驚疾須時復回動之夏月須凉簟如
夜間餵奶須奶母起身坐地抱兒餵之如陰陽交接之際
切不可餵兒奶此正謂之交奶也必生癖或換易衣綳三
月房中不可太煖奶母不可頻喫酒恐兒作痰嗽驚熱昏
眩之疾至於變蒸次第奶乳所傷夜啼潮熱之類自有專
於小方脉者此略見之若能調和奶食并看承愛護如法
則別無疾病亦不須令兒常服湯藥此尤宜審之也[illegible]
[illegible]

初生浴兒良日

寅卯酉日大吉　壬申丁巳癸巳大凶

回氣元　療兒初生下口中穢惡不盡入喉中即便吐自後
纔啼聲一發則又嚥下因生異疾矣
木瓜　麝香　膩粉　木香

檳榔末各壹字

右水麪糊丸如小黄米大每服一二丸甘草水下不拘時候

孩兒初生下盤腸刺痛面青色啼哭不止延胡索散

延胡索壹錢 乳香 木香各半錢

右爲細末水壹大盞煎三分無時與服少許

婦人大全良方卷之二十四